



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

# KULTURTECHNIK

---

Erster Band, erster Teil

Main Lib.


*Agrie Dept Lib*

LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

*Class*







3/11 6:4

# GRUNDLEHREN DER KULTURTECHNIK.

**Dritte Auflage,**

unter Mitwirkung von

Prof. Dr. **M. Fleischer**, Geh. Ober-Reg.- und vortragendem Rat im Landwirtschafts-Ministerium zu Berlin, **P. Gerhardt**, Geh. Bau- und vortragendem Rat im Ministerium der öffentl. Arbeiten zu Berlin, Dr. **E. Gieseler**, Geh. Reg.-Rat, Prof. an der Landw. Akademie zu Bonn-Poppelsdorf, Dr. **Th. Freiherrn v. d. Goltz**, Geh. Reg.-Rat, Prof. an der Universität Bonn, Direktor der Landw. Akademie zu Bonn-Poppelsdorf, **M. Grants**, Reg.- und Baurat, Prof. an der Technischen Hochschule zu Charlottenburg, **A. Hüser**, Oberlandmesser der Generalkommission zu Kassel, **H. Mahraun**, Reg.-Rat zu Kassel, **W. v. Schlebach**, Oberfinanzrat zu Stuttgart, Dr. **L. Wittmack**, Geh. Reg.-Rat, Prof. an der Landw. Hochschule und der Universität zu Berlin,

herausgegeben von

**Dr. Ch. August Vogler,**

Geh. Regierungsrat, Professor an der Landw. Hochschule zu Berlin.



**Erster Band, erster Teil.**

Mit 170 Textabbildungen und 2 Tafeln.

BERLIN.  
VERLAGSBUCHHANDLUNG PAUL PAREY.

Verlag für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.

SW., Hedemannstrasse 10.

1903.



S493  
V7  
v.1.1

Übersetzungsrecht vorbehalten.

Maximilian  
J. J. J. J.

MND-

## Aus dem Vorwort zur ersten Auflage.

Es trifft sich gerade, daß dieses Buch erscheint zur Zeit, da ein Mann von seinen Ämtern zurück und in den Ruhestand tritt, der sich um die Kulturtechnik große Verdienste erworben hat. Der Geheime Regierungsrat Herr Prof. Dr. Dunkelberg, bisher Direktor der Landwirtschaftlichen Akademie zu Poppelsdorf, ist es gewesen, der die Kulturtechnik in Preußen in das akademische Studium eingefügt und dieses den Landmessern zugänglich gemacht hat, als denjenigen Technikern, welche vorzugsweise berufen erscheinen, Meliorationsanlagen für Landgemeinden und Genossenschaften auszuführen und als Vertrauensmänner und Ratgeber der Landbevölkerung den Sinn dafür zu wecken. Seit 1876 besteht in Poppelsdorf, seit 1883 auch an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin ein kulturtechnischer Kursus, an dem die meisten daselbst studierenden Landmesser teilnehmen und dessen Besuch den Vermessungsbeamten der landwirtschaftlichen Verwaltung vorgeschrieben ist.

Dunkelbergs „Encyklopädie und Methodologie der Kulturtechnik“ (2 Bände, Braunschweig bei Vieweg & Sohn) erschien 1883, ein weitgreifendes, groß angelegtes Werk. Daß daneben, vielleicht gerade durch dies Buch hervorgerufen, das Bedürfnis nach kulturtechnischer Belehrung in schlichter Form bestand, beweisen Schriften, wie das Bändchen der Thaerbibliothek: „Der Landwirt als Kulturingenieur“ von Zajiček, Berlin 1892. Unsere „Grundlehren der Kulturtechnik“, aus dem akademischen Unterricht an den genannten beiden Anstalten hervorgegangen und dem Bedürfnis des geodätisch vorgebildeten Studierenden möglichst angepaßt, werden nach der Umrahmung ihres Stoffes *zwischen* jenen Werken stehen.

Die Kulturtechnik umfaßt alle vermessungs- und bautechnischen sowie Verwaltungsmaßnahmen, welche darauf hinzielen, durch günstigere Verteilung des ländlichen Grundbesitzes und damit Hand in Hand durch günstigere Oberflächengestaltung, Herstellung besserer Verkehrsmittel, Verwertung des nutzbringenden Wassers, Abwehr schädlicher Gewässer den Betrieb der Landwirtschaft zu fördern und die Bodenerträge zu steigern.

Das Programm eines umfassenden kulturtechnischen Unterrichts neben dem Landmesserstudium steht hiernach fest. Es soll zunächst die natur-

wissenschaftlichen Grundlagen enthalten, welche die Einwirkung von Boden und Wasser auf den Pflanzenwuchs verstehen lehren. Daran schließt sich die Wetterkunde und die Lehre vom Klima, sowie als unentbehrliche Einleitung zur Baukunde die Grundzüge der Mechanik fester Körper, sowie die Lehre vom Gleichgewicht und der Bewegung des Wassers. Dies der *naturwissenschaftliche Teil* des Programms. — Aus der Baukunde soll es den Erd-, Weg-, Brücken- und Wasserbau in dem Umfang geben, daß alle ausschließlich für landwirtschaftliche Zwecke herzustellenden Bauten eingehend zur Sprache kommen, aber der Blick auch auf Bauwerke für allgemeinere Interessen gelenkt wird, insofern sie von Einfluß auf die Bodenkultur sein können. Breiter Raum ist der Kulturtechnik im engeren Sinne, als der Lehre vom Beherrschen des Wassers im Interesse der Landwirtschaft, zu gewähren. Fügt man die Lehre vom Tracieren, d. h. von den Vorerhebungen, dem Entwerfen der Bauwerke und dem Abstecken der Entwürfe hinzu, so ist der *technische Teil* des Programms umgrenzt. — Ein letzter *kameralistischer Teil* hat die Rechts- und Gesetzeskunde, die Darlegung nationalökonomischer und betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte, sowie die Lehre vom Verwaltungsorganismus zu umfassen; alles in Bezug auf die Änderungen der Grundbesitz- und landwirtschaftlichen Nutzungsverhältnisse bei Meliorationen jeder Art.

Dem Leser wird alsbald auffallen, daß im vorliegenden Buche der kameralistische Teil des Programms ganz fehlt und auch im naturwissenschaftlichen Teil einiges aus dem entwickelten Programm übergangen ist. Unsere „Grundlehren“ wollten aber in erster Linie das kulturtechnische Studium der angehenden preussischen Landmesser fördern und mußten daher vor allem diejenigen Stoffe berücksichtigen, welche noch nicht in genügend knapper, jedoch strenger Form in Einzelschriften lehrhaft behandelt sind. Damit ist nicht gesagt, daß eine zusammenfassende Behandlung der fehlenden Abschnitte nicht auch sehr erwünscht wäre, aber in der gegebenen Zeit und dem verfügbaren Raum eines nicht allzu dickleibigen Bandes war vorerst mehr nicht zu leisten, als dargeboten wird.

Berlin, im März 1896.

Der Herausgeber.

## Vorwort zur dritten Auflage.

---

Der erste Band dieses Buches ward 1898 neu aufgelegt und erscheint jetzt in dritter Auflage, in zwei getrennten Teilen, dem *naturwissenschaftlichen* und dem *technischen*, nachdem ihm 1899 als zweiter Band<sup>1)</sup> ein *kameralistischer* Teil gefolgt war. Was im Vorwort zur ersten Auflage als Programm eines *umfassenden kulturtechnischen Unterrichts neben dem Landmesserstudium* bezeichnet wird, das findet sich nun in den beiden Bänden behandelt, mit einziger Ausnahme der Wetterkunde nebst Lehre vom Klima; dieser Abschnitt wird jedoch durch eine Reihe von Einzelschriften entbehrlich gemacht, so neuestens durch Professor R. Börnstens Leitfaden der Wetterkunde, Braunschweig 1901, ein Buch, das die Bedürfnisse der Landwirtschaft berücksichtigt.

Von den 6 Abschnitten des ersten Bandes ist keiner, der nicht bis zur dritten Auflage merklich angeschwollen wäre, teils weil ein inneres didaktisches Entwicklungsbedürfnis bestand, teils gemäß äußerer Anregung. So trat in der zweiten Auflage die Einführung in die Bodenchemie, ein Kapitel über Eindeichung und Einpolderung und mehreres andere zu dem früher behandelten Stoff, ganz im Einklang mit dem ursprünglichen Plan und in strenger Deutung des Buchtitels *Grundlehren* der Kulturtechnik, wonach unser Werk in das Gesamtgebiet der Meliorationen, aber *von Grund aus* einführen soll, dort einsetzend, wohin die Schul- und praktischen Vorkenntnisse seiner Leser im allgemeinen nicht mehr reichen.

Im selben Sinne vermehrt sich jetzt der Stoff des dritten Abschnitts um die Lehre vom Gleichgewicht fester Körper und von der Elastizität und Festigkeit der Baumaterialien, und bringt ein Anhang zum 6. Abschnitt die Formelableitung für die Kubatur der Erdkörper.

*Außerer Anregung folgend*, hat neuerdings der vierte Abschnitt sich um das Kapitel über ländliche Wasserleitungen vergrößert und der zweite Abschnitt die Pflanzen systematisch behandelt, die zur Wertschätzung von Boden und Wasser dienen sollen und die bisher nur aufgezählt wurden.

Freilich hätte der Herausgeber, und der Herr Verfasser selbst, lieber gesehen, daß dies möglich gewesen wäre, ohne den Umfang der „Botanik“ zu verdoppeln. Vielleicht sprechen sich wohlwollende und kundige Fach-

---

<sup>1)</sup> II. Band. Kameralistischer Teil. Mit 18 Textabbildungen und 7 Tafeln. 1899. 462 S. Gebunden 13 Mark.

männer darüber aus, ob etwa künftig der botanische Stoff, den ein *Landwirt* sich wohl noch reichlicher bemessen wünschen möchte, für den *Kulturtechniker* doch wieder zu beschränken sei, und wäre es nur zu gunsten näherer Behandlung der torfbildenden Moose (Teil I, S. 101) oder jener Gewächse, die durch ihre starke Verdunstung entwässernd wirken (Teil II, S. 230), oder zu gunsten der Abbildung von minder bekannten, aber unzweifelhaft kulturtechnisch wichtigen Pflanzen. Unseren „Grundlehren“ hat es an wohlwollender Kritik bisher nicht gefehlt, es sei auch jetzt wieder für manchen freundlichen Rat aufs beste gedankt. Möchte dies wertvolle Interesse nicht schwinden, aber auch nicht jeder gutgemeinte Rat auf eine Erweiterung des Umfanges der „Grundlehren“ hinzielen.

Überblicken wir die einzelnen Abschnitte in Bezug auf ihren vorigen Bestand und ihren Zuwachs, sowie auf die Absichten ihrer Verfasser.

**Die Bodenkunde** von Herrn Prof. Dr. Moritz Fleischer, Geh. Oberregierungs- und vortragendem Rat im Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, früher Direktor, jetzt Kurator der Moorversuchstation zu Bremen, will einen möglichst klaren Einblick in die *chemischen* und *mechanischen* Vorgänge bei der Entstehung und fortwährenden Umbildung des Bodens, sowie in die *chemischen* und *physikalischen* Eigenschaften der verschiedenen Bodenarten geben.

Sie erörtert den Einfluß, den der Landwirt und Kulturtechniker auf die „bodenchemischen“ Vorgänge und die Änderung der physikalischen Beschaffenheit des Bodens auszuüben vermag, läßt aber auch die *biologischen* Vorgänge im Boden nicht unberührt, deren Bedeutung für die Bodenumbildung und für die Bodenfruchtbarkeit erst die neuere Wissenschaft klargelegt hat. Auf die *Mineralogie*, auf *Gesteins-* und *Formationslehre* Bezug zu nehmen, war schon aus dem äußeren Grunde erforderlich, weil zahlreiche tief eingebürgerte Benennungen von Bodenarten den Mineralien, Gesteinen und Formationen entnommen sind, die sich an ihrer Bildung beteiligt haben.

Durch eine noch eingehendere Besprechung des hochbedeutsamen Werkes der Preussischen Geologischen Landesanstalt, der „*geognostisch agronomischen Kartierung*“ des Flachlandes, ihres Zweckes und ihrer Darstellungsart hofft der Verfasser in der neuen Auflage eine weitere Anregung zum Verwerten dieser wichtigen, vom landwirtschaftlichen Praktiker wie vom Kulturtechniker noch viel zu wenig gekannten und gewürdigten Hilfsmittel gegeben zu haben.

Unter Berücksichtigung der von Tag zu Tag wachsenden Bedeutung der *Moorkultur* ist die Entstehung und das Verhalten der Moorböden eingehender behandelt worden, als es in den bisher erschienenen bodenkundlichen Werken geschehen ist. Dabei haben in der vorliegenden Auflage die auf Grund der neuesten Forschungen gewonnenen Anschauungen über

die Entstehung und botanische Zusammensetzung der verschiedenen Moorbodenarten gebührende Berücksichtigung erfahren.

Der zweite Abschnitt, **Botanik**, von Herrn Geheimen Regierungsrat Dr. Ludwig Wittmack, Professor an der Universität und der Landw. Hochschule zu Berlin, ist ganz neu bearbeitet und, wie oben schon erwähnt, bedeutend erweitert worden. Anlaß hierzu gab besonders der in Rezensionen zur 2. Auflage geäußerte Wunsch, die *bodenbestimmenden* Pflanzen eingehender berücksichtigt zu sehen. So sind denn nicht, wie früher, nur die Gräser und Kleegewächse behandelt, sondern drei umfangreiche Kapitel hinzugekommen, in denen in systematischer Reihenfolge die wichtigeren sonst noch auf der Wiese vorkommenden, sowie auch andere zur Bonitierung dienende Pflanzen besprochen sind. Alle aufzunehmen war nicht möglich, der vorgesehene Raum ward ohnehin überschritten.

Doch ergab sich dabei Gelegenheit, noch einem andern geäußerten Wunsch nachzukommen und die wichtigsten *Wasserpflanzen* vorzuführen, mit denen der Kulturtechniker zu tun hat; so namentlich solche, die zur Verkrautung der Gräben beitragen. In manchen Fällen konnte angegeben werden, ob die betreffenden Pflanzen gutes Rieselwasser anzeigen.

Mehr Rücksicht als früher ist auch auf die *Pflanzengeographie* und das *Zusammenleben* der Pflanzen genommen. In den verschiedenen *Wiesentypen* drückt sich dies Zusammenleben eigenartig aus.

Endlich ist auch der Wunsch erfüllt worden, Tabellen über die *Erträge* der Wiesenpflanzen in dem Werk zu sehen.

Wie schon gesagt, hat der dritte Abschnitt, **Grundzüge der technischen Mechanik und Hydraulik**, von Herrn Dr. Eberhard Gieseler, Geh. Regierungsrat, Professor an der Landw. Akademie zu Bonn-Poppelsdorf, noch die Lehre vom Gleichgewicht fester Körper, sowie von der Elastizität und Festigkeit der Baustoffe aufgenommen. So ist daraus eine zwar knapp gefasste, aber gerade darum klar übersehbare Einleitung in die Ingenieurmechanik geworden, und es dürfte denen, die Gieselers Grundzüge studiert haben, nicht schwer werden, etwa in Ritters Lehrbuch der technischen Mechanik einzudringen. Auch in den neu hinzugetretenen Kapiteln hat der Verfasser höhere Rechnungsarten vermieden, was den nicht stören wird, der ihrer mächtig ist, und den übrigen zu gute kommt.

Der Verfasser des vierten Abschnittes, **Baukunde**, Herr Reg.- und Baurat Max Grantz, Prof. an der Technischen Hochschule zu Charlottenburg, hat das praktische Bedürfnis des Kulturtechnikers in den Vordergrund stellen zu müssen geglaubt. An Skizzen hat er nicht gespart, damit der Studierende an ihrer Hand sich in die Bauformen hineinzudenken lernt und zunächst *entlehnend*, allmählich aber selbständiger und nur an das Hergebrachte sich *anlehnend*, kleinere Bauwerke zu entwerfen vermag. —



Es ist dem Verfasser besonders dafür zu danken, daß er in einer Zeit großer Arbeitslast die Abfassung des neuen Kapitels über ländliche Wasserleitungen auf sich nahm, nachdem eine gewichtige Stimme aus der Praxis ihn von dessen Nützlichkeit überzeugt hatte. — Einer strengen Durchsicht hat Verfasser sämtliche Figuren seines Abschnittes unterzogen und sie, wo es nötig schien, verändert oder ersetzt.

Auch der fünfte Abschnitt, **Kulturtechnik** im engeren Sinne, von Herrn Geh. Baurat Paul Gerhardt, vortragendem Rat im Ministerium der öffentl. Arbeiten zu Berlin, ist gründlich durchgesehen und stellenweise durch Erfahrungen und Erfindungen der letzten Jahre ergänzt worden. So ist die Mischkultur und die Anlage von Weiden auf Moorboden neu aufgenommen, und in Wort und Bild findet sich eine Reihe neuerdings bewährter Werkzeuge dargestellt: der Regenschreiber, Kuhnkes Kultivator, Belows Krautungsmesser, Funkes Untergrunddüngepflug, die Dandy-Telleregge, Laakes Wiesenegge, der Schleifteller für Drainröhren, des Verfassers Ausmündungskasten mit *einem* Seitengitter u. a. m.

In seinen eigenen, den letzten Abschnitt über **Tracieren**, konnte der Herausgeber ebenfalls einige neuere Geräte aufnehmen, insbesondere tachymetrische Auftragapparate. Die Erweiterung durch den erwähnten Anhang über Kubatur der Erdkörper wird manchem Leser willkommen sein.

Mit bestem Dank sei zum Schluß des freundlichen Eifers gedacht, mit dem Herr Landmesser Otto Thie, z. Z. Assistent für Geodäsie an der Landw. Hochschule, zwei Lesungen der Korrekturbogen durchgeführt hat.

Berlin, Dezember 1902.

Der Herausgeber.

# Inhalt.

## Naturwissenschaftlicher Teil.

### Erster Abschnitt.

#### Die Bodenkunde auf chemisch-physikalischer Grundlage

von Prof. Dr. Moritz Fleischer,  
Geh. Ober-Regierungs- und vortragendem Rat im Landwirtschafts-Ministerium zu Berlin.

##### Einleitung.

Seite

§ 1.	Begriffsbestimmung . . . . .	3
§ 2.	Die Bildung der Erdrinde . . . . .	4
§ 3.	Geologische Perioden und Formationen . . . . .	5

##### Einführung in die Bodenchemie.

§ 4.	Zusammengesetzte und einfache Körper . . . . .	9
§ 5.	Atom, Molekul, Atomgewicht, Molekulargewicht . . . . .	12
§ 6.	Das Gesetz der „konstanten Proportionen“ . . . . .	13
§ 7.	Chemische Zeichensprache . . . . .	14
§ 8.	Valenz oder Wertigkeit der Elemente; gesättigte und ungesättigte Verbindungen, Radikale . . . . .	16
§ 9.	Oxydation, Oxyde, Hydroxyde, Säuren, Basen, Salze . . . . .	19
§ 10.	Haloidsäuren, Haloidsalze . . . . .	25

##### Kapitel I.

#### Die Bestandteile der festen Erdrinde.

##### A. Die gesteinsbildenden Mineralien, ihr chemischer Charakter und ihr chemisches Verhalten.

§ 11.	Vorbemerkung . . . . .	26
§ 12.	Die Kieselerde-Mineralien und ihr chemischer Charakter . . . . .	26
§ 13.	Chemischer Charakter der kiesel-sauren Salze oder Silikate . . . . .	28
§ 14.	Ordnung der Silikate nach Gruppen . . . . .	30
§ 15.	Prozentische Zusammensetzung der wichtigsten Silikate . . . . .	33
§ 16.	Das chemische Verhalten der Silikate . . . . .	36
§ 17.	Die kohlensaur-sen Salze oder Karbonate . . . . .	38
§ 18.	Chemisches Verhalten der Karbonate . . . . .	40
§ 19.	Die phosphorsaur-sen Salze oder Phosphate . . . . .	41
§ 20.	Chemisches Verhalten der natürlichen Phosphate . . . . .	43
§ 21.	Die schwefelsaur-sen Salze oder Sulfate . . . . .	43
§ 22.	Chemisches Verhalten der Sulfate. <i>Reduktionsprozesse</i> . . . . .	44
§ 23.	Die Schwefelverbindungen oder Sulfide . . . . .	45
§ 24.	Oxyde und Hydroxyde . . . . .	46
§ 25.	Die Chlorverbindungen oder Chloride . . . . .	47
§ 26.	Chemisches Verhalten der Chloride . . . . .	47

	Seite
§ 27. Die salpetersauren Salze oder Nitrate . . . . .	48
§ 28. Entstehung der Nitrate . . . . .	48
§ 29. Chemisches Verhalten der Nitrate . . . . .	49

#### B. Die bodenbildenden Gesteine.

§ 30. Einteilung . . . . .	49
§ 31. Die kristallinen Massengesteine (Urgesteine) . . . . .	50
§ 32. Der verschiedene mineralogische Charakter der sauren und basischen Gesteine . . . . .	51
§ 33. Die Sedimentär- oder Flözgesteine . . . . .	53

### Kapitel II.

#### Die Vorgänge bei der Bodenbildung.

##### A. Mechanische Vorgänge.

§§ 34 und 35. Temperaturänderungen . . . . .	63
§ 36. Die mechanischen Wirkungen des bewegten Wassers und Eises, sowie des Windes . . . . .	64
§ 37. Verschwemmung, Transport, Verwehung . . . . .	66

##### B. Chemische Vorgänge.

§ 38. Verwitterung . . . . .	70
§§ 39 bis 44. Einfache Verwitterung . . . . .	70
§§ 45 und 46. Komplizierte Verwitterung . . . . .	74

##### C. Umwandlung der Gesteine in Boden unter dem Einfluß der mechanisch und chemisch wirkenden Kräfte.

§ 47. Einfluß der Beschaffenheit der gesteinsbildenden Mineralien auf die Umwandlung . . . . .	75
§ 48. Einfluß der bei der Verwitterung mitwirkenden Mengen von Wasser und der Art und Menge der im Wasser gelösten Stoffe . . . . .	80
§ 49. Endergebnisse der Verwitterung . . . . .	81

##### D. Umwandlung der festen Erdrinde unter dem Einfluß vegetativer Kräfte.

§ 50. Einfluß lebender Pflanzen auf die Bodenbildung . . . . .	82
§ 51 und 52. Verwesung, Verlauf des Verwesungsprozesses . . . . .	84
§ 53. Humus . . . . .	86
§ 54. Vermoderung und Verkohlung . . . . .	89
§ 55. Reduktionsprozesse . . . . .	90
§ 56 und 57. Moorbildung, Vertorfung, Torf. Einteilung der Moore . . . . .	91
§ 58. Die Bildung der Niedermoor . . . . .	94
§ 59. Niedermoor auf Bergen . . . . .	98
§ 60. Übergang von Niedermoor in Hochmoor . . . . .	98
§ 61. Der Aufbau der Hochmoore . . . . .	99
§ 62. Gebirgshochmoore . . . . .	104
§ 63. Zusammensetzung des Hochmoortorfes . . . . .	104
§ 64. Übergang von Hochmoor in Niedermoor . . . . .	106

### Kapitel III.

#### Die Klassifikation des Bodens und die geognostisch-agronomische Bodenkartierung.

##### A. Klassifikation des Bodens.

§ 65. Einteilung nach petrographischen und geologischen Kennzeichen . . . . .	107
§ 66. Einteilung der Böden nach ihrer Entstehungsart . . . . .	107

§ 67.	Ökonomische Einteilungs-Systeme . . . . .	Seite 109
§ 68.	Die Klassifikation auf physikalisch-chemischer Grundlage . . . . .	110

**B. Die geognostisch-agronomischen Bodenkarten.**

§ 69.	Zweck der Karten und Art der Darstellung . . . . .	112
§ 70.	Bohrkarte, Bohrregister, Bodenprofile . . . . .	113
§ 71.	Das Kartenlesen . . . . .	115
§ 72.	Nutzen der Bodenkarten . . . . .	118

**Kapitel IV.**

**Die Eigenschaften des Bodens und ihre Beeinflussung durch menschliches Eingreifen.**

**A. Die physikalischen Bodeneigenschaften.**

§ 73.	Allgemeines . . . . .	120
§§ 74 bis 77.	Die festen Gemengteile des Bodens . . . . .	121
§§ 78 und 79.	Das Verhalten des Bodens zum Wasser . . . . .	125
§§ 80 bis 82.	Die Bewegung des Bodenwassers . . . . .	128
§ 83.	Die Kondensation von Wasserdampf durch den Boden. Taubildung . . . . .	132
§§ 84 und 85.	Bedeutung des Bodenwassers für die Vegetation . . . . .	132
§ 86.	Die künstliche Bewässerung . . . . .	135
§§ 87 bis 91.	Das Verhalten des Bodens gegen die Wärme . . . . .	137
§§ 92 und 93.	Die Durchlüftbarkeit des Bodens . . . . .	141

**B. Der Boden als Nährstoffbehälter für die Pflanzen.**

§ 94.	Allgemeines . . . . .	142
§§ 95 bis 99.	Die chemische Zusammensetzung des Bodens . . . . .	143
§ 100.	Beurteilung der Bodenfruchtbarkeit nach der chemischen Zusammensetzung . . . . .	146
§§ 101 bis 103.	Die Bodenabsorption . . . . .	148
§§ 104 und 105.	Das Bodenwasser . . . . .	152

**Kapitel V.**

**Kurze Charakteristik der Hauptbodenarten.**

§ 106.	Die Steinböden . . . . .	156
§ 107.	Die Sandböden . . . . .	156
§ 108.	Die Tonböden . . . . .	158
§ 109.	Die Lehm Böden . . . . .	159
§ 110.	Kalk- und Mergelböden . . . . .	160
§ 111.	Die Humusböden . . . . .	161
§ 112.	Die Moorböden . . . . .	162
	Literatur zum ersten Abschnitt . . . . .	166

**Zweiter Abschnitt.**

**Botanik der kulturtechnisch wichtigen Pflanzen.**

von Dr. Ludwig Wittmack,

Gehelmem Reg.-Rat., Professor an der Landw. Hochschule und der Universität zu Berlin.

**Einleitung.**

§ 1.	Übersicht des Pflanzenreichs . . . . .	169
§ 2.	Hauptabteilung I. Kryptogamae . . . . .	169
§ 3.	Hauptabteilung II. Phanerogamae . . . . .	172
	Erklärung der Abkürzungen und Zeichen . . . . .	173

## Kapitel I.

## Monokotyledonen, Einkeimblättrige.

	Seite
4. Allgemeines . . . . .	174
5. Übersicht nach Engler . . . . .	174
6. Erste Reihe: Pandanales . . . . .	175
7. Zweite Reihe: Helobiales . . . . .	176
8. Dritte Reihe: Glumiflorae . . . . .	181
9. Vierte Reihe: Spathiflorae . . . . .	181
10. Fünfte Reihe: Liliiflorae . . . . .	182
11. Sechste Reihe: Microspermae . . . . .	185

## Kapitel II.

## Dikotyledonen, Zweikeimblättrige.

12. Allgemeines . . . . .	187
13. Übersicht nach Engler . . . . .	187

## A. Erste Reihengruppe: Archichlamydeae.

14. Siebente Reihe: Polygonales . . . . .	189
15. Achte Reihe: Centrospermae . . . . .	191
16. Neunte Reihe: Ranales . . . . .	194
17. Zehnte Reihe: Rhoeadales . . . . .	196
18. Elfte Reihe: Rosales . . . . .	199
19. Zwölfte Reihe: Geraniales . . . . .	201
20. Dreizehnte Reihe: Parietales . . . . .	203
21. Vierzehnte Reihe: Myrtiflorae . . . . .	203
22. Fünfzehnte Reihe: Umbelliflorae . . . . .	204
23. Kulturtechnisch wichtige Umbelliferen . . . . .	206

## B. Zweite Reihengruppe: Metachlamydeae.

24. Sechzehnte Reihe: Ericales . . . . .	209
25. Siebzehnte Reihe: Primulales . . . . .	210
26. Achtzehnte Reihe: Contortae . . . . .	211
27. Neunzehnte Reihe: Tubiflorae . . . . .	212
28. Zwanzigste Reihe: Plantaginales . . . . .	219
29. Einundzwanzigste Reihe: Rubiales . . . . .	219
30. Zweiundzwanzigste Reihe: Campanulatae . . . . .	222
31. Unterfamilie I: Tubuliflorae . . . . .	223
32. Unterfamilie II: Liguliflorae . . . . .	228

## Kapitel III.

## Pflanzengeographisches über die Wiesen.

33. Übersicht über die deutschen Pflanzenformationen . . . . .	233
34. Einteilung nach Graebner . . . . .	234
35. Einteilung nach Warming . . . . .	235
36. Begriff der Wiesen . . . . .	235
37. Entstehung der Wiesen . . . . .	235
38. Bestandteile . . . . .	236
39. Wiesentypen . . . . .	236

## Kapitel IV.

## Bau und Entwicklung der echten Gräser.

40. Allgemeines . . . . .	240
41. Bau des Kornes . . . . .	240
42. Keimung und Entwicklung . . . . .	241

	Seite
§ 43. Stengel . . . . .	243
§ 44. Übersicht über die Wuchsverhältnisse der Gräser . . . . .	246
§ 45. Das mechanische Prinzip im Bau des Monokotyledonenstengels . . . . .	247
§ 46. Die Blätter . . . . .	248
§ 47. Die Blüten . . . . .	251
§ 48. Teile des Gräsährchens . . . . .	252
§ 49. Aufblühen, Bestäubung und Befruchtung . . . . .	254
§ 50. Dauer der Gräser . . . . .	255
§ 51. Ansprüche an den Boden und das Wasser . . . . .	256
§ 52. Wuchs, Ober- und Untergräser . . . . .	257

## Kapitel V.

### Systematik der Gräser und Verwandten.

#### Reihe oder Ordnung Glumiflorae, Spelzblütige.

##### 1. Familie. Gramineae (Gramina), Gräser (Echte oder Süßgräser).

§ 53. Einteilung der Gräser . . . . .	259
§ 54. Künstlicher Schlüssel . . . . .	261
§ 55. Die ersten vier Gruppen der Gräser . . . . .	266
§ 56 bis 62. <i>Die wichtigsten Gattungen und Arten</i> aus den Gruppen 5—10 . . . . .	267
§ 56. Gruppe 5. Phalarideae . . . . .	267
§ 57. Gruppe 6. Agrostae . . . . .	271
§ 58. Gruppe 7. Aveneae (Gruppe 8 fällt aus) . . . . .	276
§ 59. Gruppe 9. Festuceae . . . . .	283
§ 60. Fortsetzung. Festuceae . . . . .	289
§ 61. Gruppe 10. Hordeae . . . . .	297
§ 62. Fortsetzung. Hordeae. Raigräser . . . . .	300
§ 63. 2. Familie. Cyperaceae, Halb-, Ried- oder Sauergräser . . . . .	304

## Kapitel VI.

### Bau, Entwicklung und Systematik der Hülsenfrüchte (Leguminosae.)

#### A. Bau und Entwicklung.

§ 64. Allgemeines . . . . .	311
§ 65. Unterfamilie Papilionatae, Schmetterlingsblütler . . . . .	311
§ 66. Bau des Samens, Keimung und Entwicklung . . . . .	312
§ 67. Bau der Wurzel, Wurzelknöllchen, Impfung . . . . .	313
§ 68. Bau des Stengels und der Blätter . . . . .	314
§ 69. Bestäubung . . . . .	314

#### B. Systematik der Hülsenfrüchte.

§ 70. Systematische Übersicht der Papilionatae . . . . .	318
§ 71 bis 78. <i>Beschreibung der wichtigsten Arten</i> . . . . .	319
§ 71. Tribus 3. Genisteae . . . . .	319
§ 72. Tribus 4. Trifolieae . . . . .	320
§ 73. Fortsetzung. Trifolieae . . . . .	324
§ 74. Tribus 5. Loteae . . . . .	328
§ 75. Tribus 6. Galegeae . . . . .	330
§ 76. Tribus 7. Hedysareae . . . . .	330
§ 77. Tribus 8. Viciae. 1. Untergruppe: Ervoidinen . . . . .	333
§ 78. Fortsetzung. 2. Untergruppe: Lathyroidinen . . . . .	336

## Anhang.

**Bonitierungspflanzen und Samenmischungen.**

	Seite
79. Bonitierungspflanzen . . . . .	338
80. Gebrauchswert der Samen und Samenmischungen . . . . .	340
81. Erträge der Wiesen und der einzelnen Futterpflanzen . . . . .	351
Literatur zum zweiten Abschnitt . . . . .	355

## Dritter Abschnitt.

**Grundzüge der technischen Mechanik und Hydraulik**

von Dr. Eberhard Gieseler,

Geheimem Regierungsrat, Professor an der Landw. Akademie zu Bonn-Poppelsdorf.

## Kapitel I.

**Bewegung fester Körper und mechanische Arbeit.**

1. Von der Bewegung . . . . .	357
2. Gleichförmige Bewegung . . . . .	357
3. Geschwindigkeitskurve . . . . .	358
4. Gleichförmig beschleunigte Bewegung . . . . .	359
5. Gleichförmig verzögerte Bewegung . . . . .	360
6. Fallgesetze . . . . .	360
7. Aufsteigende Bewegung . . . . .	362
8. Mechanische Arbeit . . . . .	362
9. Energie . . . . .	364
10. Erhaltung der Energie . . . . .	364
11. Formen der Energie . . . . .	364
12. Energie des fallenden Wassers . . . . .	366
13. Arbeit zum Heben von Wasser . . . . .	367

## Kapitel II.

**Vom Gleichgewicht fester Körper.**

14. Darstellung von Kräften durch gerade Linien . . . . .	368
15. Voraussetzungen über die Beschaffenheit der Körper . . . . .	368
16. Grundsätze . . . . .	368
17. Kräfte an einem Punkt wirkend . . . . .	369
18. Konstruktion der Mittelkraft . . . . .	370
19. Parallelogramm der Kräfte . . . . .	370
20. Verlegung des Angriffspunktes einer Kraft . . . . .	370
21. Mittelkraft zweier gleichgerichteten Kräfte . . . . .	371
22. Drei parallele Kräfte . . . . .	371
23. Kräftepaare . . . . .	372
24. Verlegung eines Kräftepaares . . . . .	373
25. Drehung eines Kräftepaares . . . . .	373
26. Änderung des Hebelarmes . . . . .	374
27. Wesentliche Bestandteile eines Kräftepaares . . . . .	374
28. Versetzung des Angriffspunktes einer Kraft . . . . .	374
29. Gleichgewicht paralleler Kräfte im Raume . . . . .	375
30. Gleichgewicht beliebiger Kräfte im Raume . . . . .	376
31. Vom Schwerpunkt . . . . .	376
32. Bestimmung des Schwerpunktes eines Körpers . . . . .	377

## Kapitel III.

**Elastizität und Festigkeit der Baumaterialien.**

33. Voraussetzungen . . . . .	379
34. Zug- und Druckfestigkeit . . . . .	379

35.	Schubfestigkeit . . . . .	380
36.	Biegezugfestigkeit . . . . .	380
37.	Widerstandsmoment eines Rechtecks . . . . .	383
38.	Widerstandsmoment eines doppelt T- oder U-förmigen Querschnittes . . . . .	383
39.	Beispiele . . . . .	384
40.	Zulässige Spannungen . . . . .	385
41.	Knickfestigkeit . . . . .	386
42.	Drehzugfestigkeit . . . . .	386

Kapitel IV.

**Hydrostatik oder Lehre vom Gleichgewichtszustand  
der Flüssigkeiten.**

43.	Die Oberfläche der Flüssigkeiten . . . . .	387
44.	Fortpflanzung des Druckes . . . . .	388
45.	Prinzip des Archimedes . . . . .	388
46.	Schwimmende Körper . . . . .	389
47.	Auftrieb eines Zylinders . . . . .	389
48.	Bodendruck . . . . .	390
49.	Kraft zur Hebung eines Ventils . . . . .	390
50.	Druck gegen lotrechte ebene Wände . . . . .	391
51.	Kraft zum Aufziehen einer lotrecht stehenden Schütze . . . . .	392
52.	Druck gegen eine geneigte ebene Fläche . . . . .	392

Kapitel V.

**Hydrodynamik oder Lehre von der Bewegung der Flüssigkeiten.**

**A. Bewegung des Wassers durch Öffnungen.**

53.	Ausfluß aus einer gerundeten Öffnung . . . . .	394
54.	Ausfluß in dünner Wand . . . . .	395
55.	Widerstandshöhe . . . . .	396
56.	Zahlenwerte der Koeffizienten . . . . .	396
57.	Beispiele . . . . .	396
58.	Ausflußöffnungen in lotrechter dünner Wand . . . . .	397
59.	Unvollständige, teilweise oder partielle Kontraktion . . . . .	398
60.	Schützenöffnungen mit seitlicher Kontraktion . . . . .	399
61.	Geneigte Schützen . . . . .	399
62.	Überfälle in dünner Wand . . . . .	399
63.	Ausflußkoeffizienten für Überfälle in dünner Wand nach Lesbros . . . . .	401
64.	Desgl. nach Hansen und nach Frese . . . . .	402

**B. Durchfluß durch Röhren.**

65.	Bewegung des Wassers in Röhren . . . . .	402
66.	Beispiele . . . . .	404
67.	Neuere Versuchsergebnisse . . . . .	405
68.	Lange Röhren . . . . .	406
69.	Einfluß der Krümmungen . . . . .	407

**C. Bewegung des Wassers in Flüssen und Kanälen.**

70.	Allgemeine Erklärungen . . . . .	408
71.	Der Wasserspiegel im Längenprofil . . . . .	409
72.	Berechnung der Wassermenge . . . . .	409
73.	Werte von $k$ nach den Versuchen von Bazin . . . . .	411
74.	Erfolg des Suchens nach allgemein anwendbaren Ausdrücken . . . . .	411
75.	Die Formel von Ganguillet und Kutter . . . . .	411
76.	Vorteilhaftestes Querprofil . . . . .	412
77.	Beispiel . . . . .	413



	Seite
§ 78. Die Geschwindigkeit des fließenden Wassers . . . . .	414
§ 79. Ungleichförmige Bewegung des Wassers . . . . .	414
§ 80. Der Einfluß des Gefälles auf die Werte von $k$ . . . . .	415
§ 81. Berechnung des Rückstaues . . . . .	416
§ 82. Einfluß der Krümmungen . . . . .	418
D. Wassermessungen in Flüssen und Kanälen.	
§ 83. Gefällmessungen . . . . .	419
§ 84. Schwimmer . . . . .	419
§ 85. Pitot'sche Röhre . . . . .	420
§ 86. Der Woltmann'sche Flügel . . . . .	423
§ 87. Bestimmung der Wassermenge aus Profilaufnahmen und Geschwindigkeitsmessungen . . . . .	426
§ 88. Wassermengen, abgeleitet aus der Größe des Zuflußgebietes . . . . .	430
Literatur zum III. Abschnitt . . . . .	431
Sachregister . . . . .	433

## Verzeichnis der Tafeln.

	nach Seite
I und II. Ausschnitte aus der Bodenkarte des norddeutschen Flachlandes, aufgenommen von der Geologischen Landesanstalt . . . . .	112

## Berichtigungen und Zusätze.

- S. 99 Zeile 20 v. o. statt verwesenden lies: **vermodernden**.
- S. 101 " 9 v. o. füge bei: **Sph. acutifolium**.
- S. 106 " 19 v. o. statt die im Salpeter lies: **nämlich in Salpeterstickstoff**.
- S. 135 " 5 v. u. nach sich füge bei: **nach von Wangenheim**.
- S. 143 " 1 v. o. statt Salpetersäure lies: **Salpetersäure-**.
- S. 145 " 7 v. u. statt auch lies: **aber**.
- S. 154 " 1 von Anm. 2 statt Hanemann lies: **Hanemann**.
- S. 172 " 18 v. u. statt Equisetum limosum, E. heleocharis lies: Equisetum limosum, **auch E. Heleocharis genannt**.
- S. 173 zu den Zeichen füge bei:  $\infty$  = **viele**.
- S. 184 Zeile 10 v. o. statt Feld-, Hainsimse lies: **Feld-Hainsimse**.
- S. 185 " 20 v. o. statt Narbe lies: **Narben**.
- S. 266 " 5 v. o. statt Ähren lies: **Ährchen**.
- S. 267 " 1 v. o. statt Paspalum lies: **Paspalum**.
- S. 269 " 7 v. u. statt Anthoxanthum aristatum Puellii lies: **Anthoxanthum aristatum (A. Puellii)**.
- S. 273 in der Erklärung der Fig. 58 füge hinzu: **e ein verzweigtes Astchen der Scheinähre**.
- S. 283 Zeile 1 v. o. bei Sieglingia füge hinzu: **benannt nach Prof. Siegling in Erfurt, Anfang des 19. Jahrh., der sich mit Botanik beschäftigte**.
- S. 289 Zeile 5 v. o. füge hinzu: **Benthalm**.
- S. 300 " 17 u. 18 v. o. statt Seitliche Ährchen verkümmert. Keulenförmig lies: **Seitliche Ährchen verkümmert, keulenförmig**.
- S. 302 Zeile 17 v. o. statt am Rande lies: **an den beiden Nerven (scheinbar am Rande)**.
- S. 308 Zeile 2 von unten statt Fig. 95 lies: **Fig. 94**.
- S. 408, erste Tabelle, statt 0,470 lies unter  $\delta = 100^\circ$  richtig  $\zeta = 0,740$ .

# Naturwissenschaftlicher Teil.

---



## ERSTER ABSCHNITT.

# Die Bodenkunde auf chemisch-physikalischer Grundlage.

## EINLEITUNG.

### § 1.

**Begriffsbestimmung.** Unter *Boden* verstehen wir vom landwirtschaftlichen, forstlichen und kulturtechnischen Standpunkt aus die oberste Schicht der Erdrinde, soweit sie fähig ist, höhere Pflanzen hervorzubringen. Besitzt sie hierzu die nötigen Eigenschaften von Natur, so bezeichnet man sie als *Naturboden*, während die Benennung *Kulturboden* in den Fällen am Platz ist, wo menschliches Eingreifen jene Fähigkeit erst erzeugt oder auch nur gesteigert hat. Die Ausdrücke: *Wiesen-, Wald-, Ackerboden* beziehen sich zunächst zwar nur auf die augenblickliche Benutzungsweise eines Bodens, sollen aber nicht selten auch den Zweck bezeichnen, zu dem er seiner *natürlichen Beschaffenheit* nach sich am besten eignet. Bei Ackerböden pflegt man noch zwischen „Ackerkrume“ und „Untergrund“ zu unterscheiden und versteht dann unter jener die obere Bodenschicht, soweit sie mit den gewöhnlichen Ackerwerkzeugen bearbeitet und gedüngt wird, unter diesem die unmittelbar darauffolgenden, dem Pflanzenwuchs noch als Nährstoffquelle und namentlich als Wasserreservoir dienenden Schichten.<sup>1)</sup>

Die Fähigkeit einer Erdschicht, höhere Pflanzen hervorzubringen, ist an gewisse Vorbedingungen geknüpft. Sie verdient im landwirtschaftlichen und forstlichen Sinne nur dann die Bezeichnung „Boden“, wenn sie so locker, lose, „erdig“ ist, daß die Pflanzenwurzel in sie eindringen kann.

---

<sup>1)</sup> Etwas abweichend von dieser Unterscheidung wird auf den Bodenkarten der Preussischen Geologischen Landesanstalt als „Oberkrume“ die Oberflächenschicht bezeichnet, die unter dem Einfluß der natürlichen Verwitterungsagentien (s. u.) eine wesentliche Veränderung erlitten hat und von der die „Ackerkrume“ meist nur einen Teil bildet, als „Untergrund“ dagegen und weiterhin als „tieferer Untergrund“ die dem gleichen Gestein angehörige, aber von der Verwitterung nicht oder doch weit weniger berührte Schicht.

Da ferner alle Pflanzen darauf angewiesen sind, eine grössere Anzahl zum Aufbau ihres Leibes notwendiger Stoffe durch die Wurzeln aufzunehmen, so müssen die letzteren jene im Boden vorfinden und zwar in einer Form, in der sie von ihnen aufgesaugt werden können. Beide Bedingungen erfüllt das harte Gestein, das früher die äußerste Rinde der Erde bildete, nicht. Mannigfaltige, teils mechanische, teils chemische, teils biologische Vorgänge mußten in Wirkung treten, um ihren Zusammenhang zu lockern, ihre Bestandteile in Pflanzennahrung umzuwandeln. Je nach der Beschaffenheit des Muttergesteins, je nachdem diese oder jene Kräfte in ihrer Wirkung überwogen, entstanden die mannigfaltigen Bodenarten, deren Verschiedenartigkeit deutlich genug in ihrem verschiedenen Verhalten zur Pflanzenwelt sich ausspricht. Dieselben Kräfte aber, die die Umwandlung der starren Erdrinde herbeiführten, wirken in dem bereits gebildeten Boden unablässig fort, ihn nach dieser oder jener Richtung hin verändernd, und weitere Umwandlungen werden veranlaßt durch das Eingreifen menschlicher Tätigkeit, darauf gerichtet, die Eigenschaften des Bodens durch geeignete Maßnahmen für den Pflanzenwuchs immer günstiger zu gestalten. Die Kenntnis aller dieser Dinge fällt in das Gebiet der *Bodenkunde*, wir bezeichnen sie daher als die *Wissenschaft von der Entstehung des Bodens, von den Umwandlungen, die er durch die Naturkräfte und durch menschliches Eingreifen erfährt, und von seinen für den Pflanzenwuchs wichtigen Eigenschaften*.

## § 2.

**Die Bildung der Erdrinde.** Die Oberfläche unserer Erde ist nicht nur in ihrer äußeren Gestaltung, im Verhältnis zwischen Berg und Tal, zwischen Festland und Wasser, sondern auch hinsichtlich des Gefüges und der Zusammensetzung der festen Erdrinde und damit ihres Verhaltens zum Leben von Pflanze und Tier in immerwährender Wandlung begriffen. Hat schon die kurze Zeitspanne, in der man von einem wissenschaftlichen Erfassen der Naturvorgänge reden kann, genügt, um diese Tatsache festzustellen, so erscheint der Schluß nicht unberechtigt, daß im Beginn des unermesslichen Zeitabschnittes, in dem die Ausgestaltung unseres Planeten sich vollzog, sein Antlitz und seine innere Beschaffenheit von dem jetzigen Zustand wesentlich verschieden war. Und in der Tat führt der astronomische Vergleich der Erde mit anderen Weltkörpern, die genaue Bestimmung ihrer Gestalt, die geologische und physikalische Erforschung des Erdinnern zu der fast unabweislichen Anschauung, daß sie einst ein feurig-flüssiger Ball gewesen ist, dessen Oberfläche sich allmählich abkühlte und zu einer an Stärke immer mehr zunehmenden festen Rinde von wahrscheinlich sehr gleichmäßiger Beschaffenheit sich verdichtete. Die durch weitere Abkühlung hervorgerufene ungleichmäßige Zusammenziehung des Erdkerns und der Erdrinde im Verein mit den im Innern eingeschlossenen

Gasen riefen später Druckwirkungen hervor, die sich in Erhebungen und Senkungen („Faltungen“) der Oberflächenschicht äußerten und stellenweise zu einem Zerreißen der letzteren und zum Hervordringen der noch flüssigen Massen des Erdinnern führten. Er litt schon hierdurch die gleichmäßige Zusammensetzung der Oberflächenschicht eine Störung, so wurden die entstandenen *Niveauunterschiede* die Veranlassung zur Scheidung von dem in frühester Zeit den Erdball gleichmäßig bedeckenden Wasser und dem festen Land und weiterhin zu zwar allmählich erfolgenden, aber tief eingreifenden Umgestaltungen der ursprünglichen Gesteinsmasse. Sie ermöglichten es dem der Tiefe zustrebenden Wasser, seine großartige Zerstörungstätigkeit auf die Gesteine auszuüben. Der Gewalt seines Stosses, dem unablässigen Nagen des fallenden Tropfens, dem gewaltigen Druck des in den Rissen sich bildenden Eises widersteht auf die Dauer nicht das festeste Gestein. Des Zusammenhanges mit dem Muttergestein beraubt, durch ihre eigene Schwere, vom Eise der Gletscher, vom reissenden Gebirgswasser fortgeführt, dabei durch gegenseitige Reibung zu immer feineren Teilchen zermahlen und durch die chemische Wirkung von Wasser, Kohlensäure und Sauerstoff in ihrer Zusammensetzung immer mehr verändert, wurden die Zerstörungsprodukte je nach ihrer Größe und Schwere bald früher, bald später an tieferen Stellen abgesetzt und bilden hier, das ursprüngliche Gestein bedeckend, meist *schichtenförmige*, allmählich wieder zu kompaktem Gestein erhärtende Ablagerungen, die in ihrer Zusammensetzung wie in ihrem inneren Gefüge untereinander und von ihrem Muttergestein sich wesentlich unterscheiden.

### § 3.

**Geologische Perioden und Formationen.** Nach der Aufeinanderfolge der Vorgänge, die die jetzige Gestalt der Erdoberfläche herbeigeführt haben, und die sich namentlich an den von den verschiedenen Gesteinen eingeschlossenen tierischen und pflanzlichen Überresten („Leitfossilien“) verfolgen lassen, unterscheidet man in der Entwicklungsgeschichte der Erde verschiedene „Geologische Perioden“. Jede geologische Periode umschließt die Bildung einer Anzahl von scharf voneinander zu sondernden Gesteinsschichten-Gruppen, die man „Geologische Formationen“ nennt. Viele davon sind nach ihrer Bildung nochmals durch glutflüssige Massen des Erdinnern durchbrochen worden, die die „Eruptivgesteine“ bildeten und das durchbrochene Gestein an den Berührungsfächen nicht selten wesentlich veränderten. Im folgenden sind die von der Geologie augenblicklich angenommenen geologischen Perioden und Formationen übersichtlich geordnet, und Angaben über die wichtigsten Gesteinsarten<sup>1)</sup> der letzteren beigelegt worden.

<sup>1)</sup> Näheres über die Gesteine selbst findet sich in Kapitel I.

I. Zeitalter: **Die Urzeit der Erde** (Archaische oder primitive Periode).

Von lebenden Wesen waren nur die niedersten Organismen vorhanden.

1. **Laurentinische Formation**: Urgneifsgebirge (Gneifs, stellenweise übergehend in Granit).
2. **Huronische Formation**: Urschiefergebirge (Glimmerschiefer, Tonschiefer).

II. Zeitalter: **Das Altertum der Erde** (Paläozoische Periode).

Auftreten der ersten höheren Lebewesen.

1. **Silurische Formation** (Gliederlose Tiere, Tange): Grauwacke, Tonschiefer, Quarzite, Kalke.
2. **Devonische Formation** (Fische, Gefäßkryptogamen): Grauwacke, Kalke, Sandsteine.
3. **Steinkohlen-Formation** (Erste Amphibien, Kohlenpflanzen): Kalke, Sandsteine, Schiefertone, Kohlenflöze.
4. **Dyas- oder Permische Formation** (Fische, Amphibien, Reptile, Farne):
  - a) Rotliegendes: Konglomerate, Sandstein, Letten.
  - b) Zechsteinformation: Kalkstein, Gips, Steinsalz, Kupferschiefer.

III. Zeitalter: **Das Mittelalter der Erde** (Mesozoische Periode).

(Neben den früher genannten Organismen: Saurier, die ersten Säugetiere und Vögel, Koniferen, Cykadeen.)

1. **Trias-Formation** (oder Salzgebirge) (Froschsaurier, die ersten Ammoniten, Vögel und Säugetiere):
  - a) Buntsandstein-Formation: Sandsteine, Tone, Mergel, Gips, Steinsalz.
  - b) Muschelkalk-Formation: Kalkstein, Dolomit, Gips, Steinsalz.
  - c) Keuper-Formation: Bunte Mergel, Gips, Sandstein, schiefrige Letten [„Lettenkohle“].
2. **Jura-Formation** („Oolithengebirge“) (Ammoniten, Belemniten, Fisch- und Flugsaurier), (Kryptogamen, Koniferen, Cykadeen, die ersten Laubbölzer):
  - a) Lias oder schwarzer Jura: Bituminöse Schiefer, Kalksteine, Sandsteine.
  - b) Brauner oder mittlerer Jura: Sandsteine, dunkle Tone, Eisenerze.
  - c) Weißer oder oberer Jura: Helle Kalke, Mergel.
  - d) (Nur stellenweise vorkommend) Wealden-Formation: Kalkstein, Sandstein, Ton (bisweilen Kohlen).
3. **Kreide-Formation** („Quadersandsteingebirge“): Sandstein („Grünsandstein“), Kalksteine („Plänerkalk“, Kreide).

IV. Zeitalter: *Die Neuzeit der Erde* (Känozoische Periode).

(Säugetiere, Mensch — zahlreiche Laubbölzer.)

1. *Ältere Tertiär-Formation* („Älteres Braunkohlengebirge“):

a) Eocän: Kalke, Tone.

b) Oligocän: Gips, Tone, Braunkohlen, Sandstein (Molasse).

2. *Jüngere Tertiär-Formation* („Jüngeres Braunkohlengebirge“):

a) Miocän: Kalke, Sandstein (Molasse).

b) Pliocän: Schotter, Gerölle, Sand.

3. *Quartär-Formation* („Aufgeschobenes Gebirge“ und Schwemmland):

a) Diluvium (Erste Spuren des Menschen in Europa): Zum Teil Gletscher-Geschiebe („Erratische Blöcke“) und deren mannigfach veränderte, aber meist kalkhaltige Abkömmlinge, zum Teil Ablagerungen der damaligen Flußläufe. Im norddeutschen Flachlande unterscheidet man:<sup>1)</sup>

a) Unteres Diluvium: Wechsellagernde Schichten von Sand und geschiebeführendem und geschiebefreiem Mergel.

<sup>1)</sup> Die Gliederung des Diluviums in unteres, oberes und Taldiluvium entspricht der bei der geognostisch-agronomischen Bodenkartierung (s. Kap. IIIA) innegehaltenen Unterscheidung. Die neuere Forschung teilt die dem Diluvium Norddeutschlands angehörigen Gebilde in folgende Gruppen:

In den geologisch-agronomischen Karten bezeichnet als

Unteres  
Diluvium

1. Produkte der ersten Eiszeit  
(s. Kap. II):

{ Grande, Sande, Tone,  
Geschiebemergel,  
Grande, Sande, Tone.

2. Produkte der ersten Interglacialzeit:

{ Sande, Grande, Wiesenkalke,  
Kalktuffe, Tone, Moorbildungen,  
Diatomeenerde und andere Reste pflanzlichen und tierischen Lebens.

3. Produkte der zweiten (Haupt-) Eiszeit:

{ Die gleichen wie bei der ersten Eiszeit und Interglacialzeit.

4. Produkte der zweiten Interglacialzeit:

Oberes  
Diluvium

5. Produkte der letzten Eiszeit:

{ Geschiebemergel, Endmoränen,  
Grande, Sande, Tone.

6. Produkte der Abschmelzperiode der letzten Eiszeit:

{ Höhendiluvium: Geschiebesand, Decksand, Deckton.  
Taldiluvium (gleichaltrig mit dem Höhendiluvium):  
Talsand, Talton.



- β) Oberes Diluvium: Nebeneinander auftretender Mergel, Lehm, Ton, Sand, Grand.
- γ) Taldiluvium (früher „Altalluvium“): Die aus dem oberen Diluvium stammenden, von diluvialen Strömen auf Plateaus oder in den Niederungen abgesetzten, steinfreien, ganz horizontalen Sandablagerungen („Talsande“, manchmal auch als „Heidesand“ bezeichnet).
- b) Alluvium: Neue, noch jetzt entstehende Bildungen des Süßwassers, des Windes („äolische“) und des pflanzlichen und tierischen Lebens; Flußsand und Geröll, Ton, Lehm, Moorbildungen, Wiesenkalk, Kieselgur, Flugsand.
-



## EINFÜHRUNG IN DIE BODENCHEMIE.

### § 4.

**Zusammengesetzte und einfache Körper.** Ein an feuchter Luft liegendes Stück metallisches Eisen erleidet bald eine auffällige Veränderung seiner stofflichen Beschaffenheit, es nimmt eine rotbraune Farbe an und geht allmählich vollständig in eine rotbraune, leicht zerreibliche Masse über, die unter dem Namen „Eisenrost“ bekannt ist. Der Eisenrost hat ein größeres Gewicht als das Eisen, woraus er hervorging. Bei seiner Umwandlung in Eisenrost muß also das Eisen aus der feuchten Luft etwas aufgenommen haben.

In der Tat gelingt es der chemischen Untersuchung, nachzuweisen, daß der Eisenrost neben Eisen noch zwei Körper enthält, die im freien Zustande luftförmig sind. Der eine, ein farbloses, geruch- und geschmackloses Gas, besitzt die Fähigkeit, einen hineingebrachten nur glimmenden Span wieder zu entflammen. Er wird *Sauerstoff* genannt. Der andere, äußerlich nicht vom Sauerstoff verschieden, ist nicht imstande, den Verbrennungsprozeß zu unterhalten oder gar lebhafter zu gestalten. Dagegen ist er selbst brennbar. Er heißt *Wasserstoff*. Der Eisenrost ist also ein zusammengesetzter Körper, er besteht aus Eisen, Sauerstoff und Wasserstoff. Die Eigenschaften dieser Stoffe treten im Eisenrost nicht mehr hervor. Es ist eine *chemische Verbindung*, Eisen, Sauerstoff und Wasserstoff sind seine *chemischen Bestandteile*.

Wird Kalkstein im Kalkofen stark erhitzt, so tritt gleichfalls eine erhebliche stoffliche Veränderung ein. Der feste Stein verwandelt sich in eine mürbe Masse von laugenhaftem Geschmack und eigentümlichem Verhalten gegen Wasser. Der „gebrannte“ Kalk besitzt ein *geringeres* Gewicht als der Kalkstein, der ihn lieferte. Beim Erhitzen des Kalksteins ist also etwas aus ihm entwichen. Durch geeignete Maßnahmen kann man den beim „Kalkbrennen“ sich absondernden Stoff auffangen. Er ist ein luftförmiger Körper, äußerlich von der atmosphärischen Luft, dem Sauerstoff und dem Wasserstoff nicht verschieden, aber weit schwerer als alle diese Luftarten, nicht brennbar und nicht fähig, den Verbrennungsprozeß zu unterhalten. Ein hineingebrachter brennender Span erlischt augenblicklich.

Man nannte dieses Gas früher Kohlensäure, jetzt *Kohlendioxyd*.

Der Kalkstein ist also ein zusammengesetzter Körper, er spaltet sich beim Erhitzen in *Kalk* und *Kohlendioxyd*. Aber auch diese beiden Körper sind zusammengesetzt. Der gebrannte Kalk läßt sich in zwei Körper von ganz anderen Eigenschaften, nämlich in *Sauerstoff* und ein gelbes, zähes, hämmerbares Metall, genannt *Calcium*, zerlegen. Letzteres ist brennbar und wandelt sich beim Verbrennen durch Aufnahme von Sauerstoff wieder in gebrannten Kalk (Calciumoxyd) um. Auch das Kohlendioxyd kann man noch weiter spalten, in *Sauerstoff* und einen festen Körper, der den Namen *Kohlenstoff* trägt, brennbar ist und beim Verbrennen Kohlendioxyd liefert.

Somit gelingt es, durch eine Zerlegung oder eine „chemische Analyse“ aus dem Kalkstein drei ganz verschiedenartige Körper: Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff abzusondern. Der Kalkstein ist eine *chemische Verbindung*, seine *chemischen Bestandteile* sind Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff.

Schon diese Erörterungen lassen erkennen, daß die chemischen Verbindungen wesentlich verschieden sind von den *Mischungen* oder *Gemengen*. In diesen kann man die Mischungsbestandteile allermeist schon mit dem bloßen oder dem verschärften Auge erkennen, in ihnen finden sich die Eigenschaften der Gemengteile wieder, und sie lassen sich durch mechanische Mittel leicht zerlegen. Eine chemische Verbindung bildet dagegen eine in sich ganz gleichartige Masse, die Eigenschaften ihrer chemischen Bestandteile sind in ihr nicht mehr wahrzunehmen, sie treten erst wieder hervor, wenn die Verbindung chemisch zersetzt wird.

Die Körper Eisen, Calcium, Kohlenstoff, Sauerstoff noch weiter zu zerlegen, ist bis jetzt nicht gelungen. Nach dem augenblicklichen Stande unseres Wissens müssen wir sie als einfache Körper ansehen. Auch bei der Analyse der zahlreichen übrigen in der Natur vorkommenden chemischen Verbindungen gelangt man schließlich zu Körpern, die allen Bestrebungen, sie weiter zu spalten oder etwas Andersartiges von ihnen abzutrennen, widerstehen. Man nennt sie daher *Einfache Körper*, auch *Grundstoffe* oder *Elemente*. Derartiger Stoffe kennt man augenblicklich über 70.<sup>1)</sup> Sie finden sich in der Tabelle auf Seite 11 verzeichnet.

<sup>1)</sup> Ob damit die Zahl der einfachen Körper abgeschlossen ist, erscheint sehr fraglich gegenüber der Tatsache, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil der jetzt bekannten Elemente erst durch die verschärften Untersuchungsmethoden der neueren Zeit aufgefunden wurde. Auf der anderen Seite ist es nicht ausgeschlossen, daß es in Zukunft gelingen wird, Körper, die wir augenblicklich als Elemente ansehen, noch weiter zu zerlegen. (Ja eine große Anzahl neuerer Erfahrungen macht es wenigstens nicht unwahrscheinlich, daß alle oder fast alle sogenannten chemischen Elemente auf einen oder mehrere Urstoffe zurückzuführen sind.)

Zusammenstellung der augenblicklich bekannten Elemente mit Angabe ihres Zeichens („Symbols“),<sup>1)</sup> ihres Atomgewichtes<sup>1)</sup> und ihrer Wertigkeit.<sup>1)</sup>

Name der Elemente	Zeichen	Atomgewicht	Wertigkeit	Name der Elemente	Zeichen	Atomgewicht	Wertigkeit
<b>a) Nichtmetalle oder Metalloide.</b>				Germanium	Ge	72	
Antimon (Stibium)	Sb	119,6	3, 5	Gold (Aurum)	Au	196,7	1, 3
Argon	Ar	40	?	Indium	In	113,4	3
Arsen	As	74,9	3, 5	Iridium	Ir	192,3	2, 4, 6
Bor	B	10,9	3	Kalium	K	39,04	1
Brom	Br	79,76	1, 3, 5, 7	Kobalt (Cobaltum)	Co	59,6	2, 4
Chlor	Cl	35,37	1, 3, 5, 7	Kupfer (Cuprum)	Cu	63,3	2
Fluor	Fl	19,0	1	Lanthan	La	138,0	4
Helium	He	4	?	Lithium	Li	7,01	1
Jod	J	126,54	1, 3, 5, 7	Magnesium	Mg	24,3	2
Kohlenstoff (Carbo, Carboneum)	C	11,97	4	Mangan	Mn	54,8	2, 4, 6, 7
Krypton	Kr	81	?	Molybdän	Mo	95,8	6
Neon	Ne	20	?	Natrium	Na	22,99	1
Phosphor	P	30,96	3, 5	Neodym	Nd	143	3
Sauerstoff (Oxygenium)	O	15,96	2	Nickel	Ni	58,6	2, 4
Schwefel (Sulfur)	S	31,98	2, 4, 6	Niob	Nb	93	5
Selen	Se	78,9	2, 4, 6	Osmium	Os	189,5	2, 4, 6, 8
Silicium	Si	28,3	4	Palladium	Pd	106,2	2, 4, 6
Tellur	Te	126,7	2, 4, 6	Platin	Pt	194,3	2, 4, 6
Stickstoff (Nitrogenium)	N	14,01	3, 5	Praseodym	Pr	139	3
Wasserstoff (Hydrogenium)	H	1	1	Quecksilber (Hydrargyrum)	Hg	199,8	2
Wismut (Bismuthum)	Bi	208,4	3, 5	Rhodium	Rh	104,1	2, 4, 6
Xenon	Xe	127	?	Rubidium	Rb	85,2	1
<b>b) Metalle.</b>				Ruthenium	Ru	103,6	2, 4, 6, 8
Aluminium	Al	27,0	4	Samarium	Sa	149	3
Baryum	Ba	136,8	2	Scandium	Sc	44,0	
Beryllium	Be	9,0	2	Silber (Argentum)	Ag	107,66	1
Blei (Plumbum)	Pb	206,4	2, 4	Strontium	Sr	87,3	2
Cadmium	Cd	111,7	2	Tantal	Ta	182,0	5
Cäsium	Cs	132,5	1	Terbium	Tb	159	
Calcium	Ca	39,9	2	Thallium	Tl	202,6	1, 3
Cer	Ce	140,0	4	Thorium	Th	231	4
Chrom	Cr	52,0	4, 6	Thulium	Tu	169	?
Eisen (Ferrum)	Fe	55,9	2, 4, 6	Titan	Ti	48,0	4
Erbium	Er	165	2	Uran	U	239,8	4, 6
Gadolinium	Gd	156	?	Vanadin	V	51	3, 5
Gallium	Ga	69,8	4	Wolfram	Wo	183,6	6
				Ytterbium	Yb	172	
				Yttrium	Y	88	4
				Zink	Zn	65,1	2
				Zinn (Stannum)	Sn	118	4
				Zirkonium	Zr	90	4

<sup>1)</sup> Die Erklärung dieser Bezeichnung s. u.

Die Elemente Chlor, Fluor, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, ferner von den selteneren Argon, Helium, Krypton, Neon und Xenon sind unter gewöhnlichen Verhältnissen luftförmige Körper (Gase), Brom und Quecksilber sind Flüssigkeiten, alle übrigen Elemente feste Körper.

Um die Übersicht zu erleichtern, teilt man die Elemente gewöhnlich in zwei Klassen, in *Metalle* und *Nichtmetalle* oder „Metalloide“.<sup>1)</sup> Die Metalle zeigen „Metallglanz“ und sind gute Leiter für Wärme und Elektrizität, Eigenschaften, die den Nichtmetallen abgehen oder doch in geringerem Grade innewohnen. Die Nichtmetalle gehen mit Wasserstoff weit leichter als die Metalle Verbindungen ein, und diese sind in der Regel gasförmige Körper. Ihre Sauerstoffverbindungen bilden mit Wasser allermeist zusammengesetzte Körper von saurem Charakter (Säuren, s. u.).

### § 5.

**Atom, Molekul, Atomgewicht, Molekulargewicht.** Lassen sich die Körper, die wir als Elemente bezeichnen, mit den uns bekannten Hilfsmitteln auch nicht in *verschiedenartige* Stoffe zerlegen, so kann man sie doch durch mechanische Mittel in kleinere *gleichartige* Teile spalten. Aller Wahrscheinlichkeit nach erreicht aber die Teilbarkeit schließlich eine Grenze. Nach unserer heutigen („atomistischen“) Anschauung bestehen die Elemente aus sehr kleinen (aber nicht etwa unendlich kleinen) Teilchen, die sich durchaus nicht weiter zerlegen lassen und daher *Atome* (von *ἄτομος* = unteilbar) genannt werden. Sie besitzen ein bestimmtes unveränderliches Gewicht, eine bestimmte Gröfse und alle für das Element charakteristischen Eigenschaften. Jedes Element besteht aus gleichartigen, gleich grofsen und gleich schweren Atomen, die Atome verschiedener Elemente sind verschiedenartig, verschieden grofs und verschieden schwer. Das *absolute* Gewicht der verschiedenen Atome kennen wir nicht, wohl aber kann man bestimmen, wievielmals schwerer das Atom irgend eines Elementes ist als das eines andern. So wissen wir z. B., dafs ein Atom Sauerstoff 15,96 (rund 16) mal, ein Atom Kohlenstoff 11,97 (rund 12) mal,

<sup>1)</sup> Die Einteilung der Elemente in Metalle und Nichtmetalle ist die alt-hergebrachte, und sie genügt für die Zwecke dieses Buches. Es darf aber nicht verschwiegen werden, dafs eine scharfe Grenze zwischen beiden Klassen sich nicht ziehen läfst. Manche Elemente, die wir ihren äufseren Eigenschaften nach zu den Metallen rechnen müfsten, und die in den Lehrbüchern der Mineralogie auch den Metallen zugesellt werden, z. B. das Arsen, Antimon, Wismut, stehen in ihrem chemischen Verhalten dem Stickstoff und Phosphor so nahe, dafs man vom chemischen Standpunkte aus sie in die Klasse der Nichtmetalle verweisen mufs. Die neuere Chemie hat das alte Einteilungsprinzip fallen lassen. Sie ordnet die Elemente nach gewissen Eigenschaften, die mit der Gröfse des Atomgewichts (s. u.) in enger Beziehung zu stehen scheinen („Natürliches“ oder „Periodisches“ System).

ein Atom Eisen 55,9 (rund 56) mal schwerer ist als ein Atom Wasserstoff. Da das Wasserstoffatom von allen bekannten Atomen das geringste Gewicht besitzt, so bezieht man das Gewicht aller übrigen Atome auf das des Wasserstoffatoms als Einheit. Man setzt das Gewicht eines Wasserstoffatoms gleich 1, dann wird das Gewicht des 15,96 mal schwereren Sauerstoffatoms durch die Zahl 15,96, das des Kohlenstoffatoms durch die Zahl 11,97, das des Eisenatoms durch die Zahl 55,9 ausgedrückt. Diese Zahlen nennt man schlechtweg *Atomgewichte*.<sup>1)</sup>

Die Atomgewichte der einzelnen Elemente sind auf der Übersichtstabelle (S. 11) angegeben.

Vereinigt sich ein Element mit einem anderen, so lagert sich nach der atomistischen Anschauung im einfachsten Falle immer ein Atom des einen mit einem Atom des andern Elementes aneinander. So tritt bei Vereinigung des Calciums mit Sauerstoff immer ein Atom Calcium mit einem Atom Sauerstoff zu einer Atomengruppe Calciumoxyd (s. o.) zusammen. Es können aber auch ein Atom eines Elementes mit zwei oder mehr, und ferner mehrere Atome eines Elementes mit mehreren Atomen eines anderen Elementes, und endlich ein oder mehrere Atome von mehr als zwei Elementen sich aneinander lagern. So besteht z. B. Kohlendioxyd (s. o.) aus Atomgruppen, deren jede 1 Atom Kohlenstoff und 2 Atome Sauerstoff, das Eisenoxyd aus Atomgruppen, deren jede 2 Atome Eisen und 3 Atome Sauerstoff, der Eisenrost aus Atomgruppen, deren jede 2 Atome Eisen, 6 Atome Sauerstoff und 6 Atome Wasserstoff enthält.

Diese Atomgruppen bezeichnet man als *Molekule* (von *molecula* = sehr kleine Masse). Sie bilden die kleinsten, als solche nicht mehr zerlegbaren Teilchen einer chemischen Verbindung. Jede chemische Verbindung besteht aus lauter gleichartigen Molekulen; das Gewicht jedes Molekuls, das *Molekulargewicht*, setzt sich aus dem Gewicht der darin enthaltenen Atome zusammen. Ist z. B. das Atomgewicht des Kohlenstoffs 11,97, das des Sauerstoffs 15,96, so ist das Molekulargewicht des (aus 1 Atom Kohlenstoff und 2 Atomen Sauerstoff bestehenden) Kohlendioxyds  $11,97 + 2 \times 15,96 = 43,89$ .<sup>2)</sup>

## § 6.

**Das Gesetz der „konstanten Proportionen“.** Ist die Vorstellung, die wir uns über die Natur der Atome und über den Vorgang der chemischen Verbindung gebildet haben, richtig, so muß notwendig die Vereinigung zweier oder mehrerer Elemente zu einer chemischen Ver-

<sup>1)</sup> Zutreffender wäre die Bezeichnung *relative Atomgewichte*.

<sup>2)</sup> Auch diese Zahl bedeutet natürlich nicht das *absolute* Gewicht eines Molekuls Kohlendioxyd, sie sagt vielmehr nur, daß ein Molekul Kohlendioxyd 43,89 mal so schwer ist als ein Atom Wasserstoff.

bindung stets nach ganz bestimmten unveränderlichen Gewichtsverhältnissen erfolgen, nämlich in dem Verhältnis der in die Verbindung eintretenden Atomgewichte.

Wenn z. B. ein Atom Calcium (Atomgewicht 39,9) mit einem Atom Sauerstoff (Atomgewicht 15,96) sich vereinigt, so kommen in einem Molekul Calciumoxyd auf 39,9 Gewichtsteile Calcium 15,96 Gewichtsteile Sauerstoff. Da die Atomgewichte des Calciums wie des Sauerstoffs unveränderlich sind, so erfolgt auch die Vereinigung von  $x$  Atomen Calcium mit  $x$  Atomen Sauerstoff in dem Gewichtsverhältnis von 39,9:15,96, und in  $x$  Molekulan, d. h. in jeder beliebigen Menge Calciumoxyd kommen auf 39,9 Gewichtsteile Calcium stets 15,96 Gewichtsteile Sauerstoff.

In einem wie in jeder beliebigen Menge von Kohlendioxydmolekulan kommen auf 1 Atom Kohlenstoff stets 2 Atome Sauerstoff oder, da das Atomgewicht jedes Kohlenstoffatoms 11,97, jedes Sauerstoffatoms 15,96 ist, auf 11,97 Gewichtsteile Kohlenstoff  $2 \times 15,96$ , d. i. 31,92 Gewichtsteile Sauerstoff u. s. f.

In jeder bestimmten chemischen Verbindung, wo und wie immer sie entstanden sein mag, sind die Elemente, aus denen sie besteht, stets in demselben Gewichtsverhältnis enthalten (*Gesetz der konstanten Proportionen*).<sup>1)</sup>

## § 7.

**Chemische Zeichensprache.** Um den Vorgang der chemischen Vereinigung wie der chemischen Zerlegung bequem darstellen zu können, bezeichnet man jedes Element mit dem Anfangsbuchstaben seines lateinischen Namens, wenn nötig unter Zufügung eines zweiten Buchstabens. So hat der Sauerstoff (Oxygenium) das „*Zeichen*“ (oder „*Symbol*“) O, das Element Wasserstoff (Hydrogenium) das Zeichen H, das Element Magnesium das Zeichen Mg erhalten. Diese — auch in der Übersicht über die Elemente aufgeführten — Zeichen bedeuten aber nicht bloß den Namen, sondern zugleich die durch die Atomgewichtszahl ausgedrückte Gewichtsmenge der Elemente, oder, wie man schlechtweg sagen kann, ein Atom des Elementes.

<sup>1)</sup> Die Richtigkeit dieses Satzes erleidet keine Einbuße durch die Tatsache, daß nicht selten mehrere Elemente in verschiedenen Gewichtsverhältnissen sich miteinander vereinigen. So kann sich ein Atom Kohlenstoff sowohl mit einem als auch mit zwei Atomen Sauerstoff verbinden. Im ersten Fall entsteht *Kohlenoxyd*, eine Verbindung, in der auf 11,97 Gewichtsteile Kohlenstoff 15,96 Gewichtsteile Sauerstoff kommen; im anderen Fall entsteht *Kohlendioxyd*, das auf 11,97 Gewichtsteile Kohlenstoff  $2 \times 15,96 = 31,92$  Gewichtsteile Sauerstoff enthält. Beide Verbindungen sind ganz verschiedenartige Körper, und für jede von ihnen gilt das Gesetz der konstanten Proportionen.

Durch Nebeneinanderstellen mehrerer Zeichen wird ausgedrückt, daß die betreffenden Elemente chemisch miteinander verbunden sind. Z. B. bedeutet der „*Ausdruck*“ oder die „*Formel*“




ein Molekul Calciumoxyd, worin 1 Atom Calcium mit 1 Atom Sauerstoff oder 39,9 Gewichtsteile Calcium mit 15,96 Gewichtsteilen Sauerstoff zu 55,86 Gewichtsteilen Calciumoxyd verbunden sind. Die Formeln



lassen erkennen, daß in einem Molekul Kohlendioxyd ein Atom Kohlenstoff mit *zwei* Atomen Sauerstoff, in einem Molekul Wasser *zwei* Atome Wasserstoff mit einem Atom Sauerstoff, in einem Molekul Eisenoxyd *zwei* Atome Eisen mit *drei* Atomen Sauerstoff verbunden sind. Damit ist zugleich gesagt, daß in der Verbindung:


*Wasser* auf 2 Gewichtsteile Wasserstoff 15,96 Gewichtsteile Sauerstoff,  
*Kohlendioxyd* „ 11,97 „ Kohlenstoff 31,92 „ „  
*Eisenoxyd* „ 55,9 „ Eisen 47,88 „ „  
 kommen.

Den Vorgang der chemischen Vereinigung drückt man durch eine „chemische Gleichung“ z. B. wie folgt aus:



d. h. ein Atom Kohlenstoff vereinigt sich mit 2 Atomen Sauerstoff zu einem Molekul Kohlendioxyd.

Das Rosten des Eisens (s. o.) vollzieht sich nach folgender chemischen Gleichung:




Hiernach vereinigen sich beim Liegen des Eisens an feuchter Luft immer zwei Atome Eisen mit 3 Atomen Sauerstoff (aus der Luft) und den Wasserstoff- und Sauerstoffatomen aus 3 Molekulan Wasser (Luftfeuchtigkeit) zu einem Molekul Eisenhydroxyd. Mit Hilfe der Atomgewichte berechnet sich aus dieser Gleichung leicht, daß

111,8 Gewichtsteile Eisen 213,50 Gewichtsteile Eisenrost  
 oder 100 „ „ 190,96 „ „

liefern.

Die Zerlegung des Kalksteins (s. o.) in seine Bestandteile kann man durch die folgenden chemischen Gleichungen ausdrücken:



<sup>1)</sup> Kalkstein in völlig reinem Zustande besteht aus einer chemischen Verbindung, die man nach der älteren chemischen Sprache als kohlen-sauren Kalk, nach der neueren als Calciumkarbonat (auch als kohlen-saures Calcium) bezeichnet.






Der durch Gleichung 1 veranschaulichte Vorgang vollzieht sich im Kalkofen. Hier zerfällt jedes Molekul Calciumkarbonat in ein Molekul Calciumoxyd und ein Molekul Kohlendioxyd. Durch chemische Mittel können diese beiden Körper noch weiter zerlegt werden. Nach Gleichung 2 liefert hierbei immer ein Molekul Calciumoxyd ein Atom Calcium und ein Atom Sauerstoff, ein Molekul Kohlendioxyd ein Atom Kohlenstoff und 2 Atome Sauerstoff. Diese Gleichungen gestatten es, wieder an der Hand der Atomgewichte, die Vorgänge auch „quantitativ“ zu verfolgen:

Ein Molekul, d. i.  $(39,9 + 11,97 + 3 \times 15,96 =) 99,75$  Gewichtsteile Calciumkarbonat, liefert im Kalkofen 1 Molekul, d. i.  $(39,9 + 15,96 =) 55,86$  Gewichtsteile Calciumoxyd („gebrannten Kalk“) und ein Molekul, d. i.  $(11,97 + 2 \times 15,96 =) 43,89$  Gewichtsteile Kohlendioxyd. Bei weiterer chemischer Zersetzung zerfallen die 55,86 Gewichtsteile Calciumoxyd in 39,9 Gewichtsteile Calcium und 15,96 Gewichtsteile Sauerstoff, und die 43,89 Gewichtsteile Kohlendioxyd in 11,97 Gewichtsteile Kohlenstoff und 31,92 Gewichtsteile Sauerstoff.


### § 8.

**Valenz oder Wertigkeit der Elemente; gesättigte und ungesättigte Verbindungen, Radikale.** Wir haben vorhin gesehen, daß ein Atom Calcium mit einem Atom Sauerstoff zu *einem* Molekul Calciumoxyd ( $\text{CaO}$ ), ein Atom Kohlenstoff hingegen mit *zwei* Atomen Sauerstoff zu einem Molekul Kohlendioxyd ( $\text{CO}_2$ ) sich vereinigen kann. Das Kohlenstoffatom besitzt mithin ein größeres Bindungsvermögen als das Calciumatom. Auch bei den Atomen anderer Elemente findet man eine verschieden große Atombindekraft. Am deutlichsten spricht sich das in ihrem Verhalten gegen die Wasserstoffatome aus. So vereinigt sich


ein Atom *Chlor* mit *einem* Atom Wasserstoff zu einem Molekul Chlorwasserstoff




ein Atom *Sauerstoff* mit *zwei* Atomen Wasserstoff zu einem Molekul Wasser



ein Atom *Stickstoff* mit *drei* Atomen Wasserstoff zu einem Molekul Ammoniak



ein Atom *Kohlenstoff* mit *vier* Atomen Wasserstoff zu einem Molekul Methan („Sumpfgas“)



Ein Chloratom besitzt mithin die gleiche Bindekraft wie ein Wasserstoffatom. Bezeichnet man das Wasserstoffatom als „*einwertig*“, so ist auch das Chloratom einwertig. Das Sauerstoffatom besitzt die doppelte Bindekraft oder „*Wertigkeit*“ wie das Chlor- und das Wasserstoffatom, es ist

*zweiwertig*, der Stickstoff ist *drei-*, der Kohlenstoff *vierwertig*. Ein *Fluor*-atom besitzt die gleiche Wertigkeit wie ein Chloratom. Das Element *Schwefel*, das mit dem Wasserstoff eine Verbindung von der Zusammensetzung  $H_2S$  (Schwefelwasserstoff) eingeht, ist dem Sauerstoff „gleichwertig“ oder „äquivalent“, der *Phosphor* ist dem Stickstoff, das Element *Silicium* dem Kohlenstoff äquivalent; denn der erstere vereinigt sich mit 3 Atomen Wasserstoff zu Phosphorwasserstoff ( $PH_3$ ), das letztere mit 4 Atomen Wasserstoff zu Siliciumwasserstoff ( $SiH_4$ ).

Die verschiedene Wertigkeit der Elemente bezeichnet man auch durch den Ausdruck: Der Wasserstoff besitzt eine, der Sauerstoff zwei, der Stickstoff drei etc. *Verwandtschaftseinheiten* oder *Valenzen*.

„*Gesättigt*“ nennt man eine Verbindung, wenn sämtliche Valenzen eines Bestandteiles durch die Valenzen der übrigen Bestandteile in Anspruch genommen, „gebunden“, „gesättigt“ werden. Gesättigt sind z. B. folgende Verbindungen:

$H_2O$	$CO_2$	$CaO$	$CaCO_3$
Wasser	Kohlendioxyd	Calciumoxyd	Calciumkarbonat.

Im *Wasser* werden die beiden Valenzen des zweiwertigen Sauerstoffatoms durch die 2 Valenzen der beiden einwertigen Wasserstoffatome, im *Kohlendioxyd* die 4 Valenzen des Kohlenstoffatoms durch die 4 der beiden Sauerstoffatome gesättigt. Im *Calciumoxyd* binden die 2 Valenzen des zweiwertigen Calciums die 2 des Sauerstoffatoms, im *Calciumkarbonat* die 6 Valenzen der 3 zweiwertigen Sauerstoffatome die (im ganzen) 6 Valenzen des zweiwertigen Calcium- und des vierwertigen Kohlenstoffatoms.

Die Verbindungen bleiben gesättigt, wenn einzelne ihrer Bestandteile durch *gleichwertige* Körper vertreten werden, wenn z. B.

im *Wassermolekul* an die Stelle des Sauerstoffs das gleichwertige Schwefelatom tritt:  $H_2S$  (Wasserstoffsulfid oder Schwefelwasserstoff);

im *Kohlendioxyd* der Kohlenstoff durch das gleichwertige Silicium „substituiert“ wird:  $SiO_2$  (Siliciumdioxyd oder Kieselerde);

im *Calciumoxyd* das Calcium durch das gleichfalls zweiwertige Magnesium oder der Sauerstoff durch Schwefel vertreten wird:  $MgO$  (Magnesiumoxyd oder Magnesia),  $CaS$  (Calciumsulfid oder Schwefelcalcium), oder endlich


im *Calciumkarbonat* an die Stelle des einen zweiwertigen Calciumatoms zwei einwertige Kaliumatome oder ein Kaliumatom und ein Wasserstoffatom treten:  $K_2CO_3$  (Kaliumkarbonat oder kohlensaures Kalium),  $KHCO_3$  (Saurer Kaliumkarbonat oder doppeltkohlensaures Kalium).

Ein Atom des einwertigen Elementes Chlor kann wohl mit einem Atom des einwertigen Natriums eine gesättigte Verbindung schließen:  $NaCl$  (Natriumchlorid oder „Kochsalz“), dagegen wird ein Atom der zwei-


wertigen Elemente Calcium, Magnesium erst durch zwei Atome Chlor gesättigt:  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{MgCl}_2$  (Calciumchlorid, Magnesiumchlorid).

Die Lehre von der Wertigkeit (Valenzlehre) beruht nicht wie die Lehre von der konstanten Zusammensetzung der chemischen Verbindungen auf einem klar erkannten Naturgesetz, sondern nur auf einer Annahme (Hypothese), die in sehr vielen Fällen eine befriedigende Erklärung für die Bindungsart der verschiedenen Atome bringt.


Gewisse Verbindungen zwingen uns aber zu der Folgerung, daß die Wertigkeit keine *Grundeigenschaft* der Elemente ist, daß sie vielmehr unter verschiedenen Verhältnissen verschieden sein kann. So tritt z. B. der Schwefel in seiner Verbindung mit Wasserstoff *zweiwertig*:  $\text{H}_2\overset{\text{II}}{\text{S}}$ , in seinen Verbindungen mit Sauerstoff *vier-* oder *sechswertig* auf:



Dem Phosphoratom muß man nach seiner Wasserstoffverbindung  $\overset{\text{III}}{(\text{PH}_3)}$  *drei* Valenzen zuerkennen. In seinen Sauerstoffverbindungen besitzt es dagegen *fünf* Valenzen:




Ebenso erscheint der *Stickstoff* in seinen Sauerstoffverbindungen:



aber auch in gewissen Wasserstoffverbindungen nicht als drei-, sondern als *fünf*wertig, z. B. im Salmiak:  $\overset{\text{V}}{\text{NH}_4}\text{Cl}$ .

In der Übersichtstabelle über die Elemente (S. 11) ist die Wertigkeit oder die Zahl der Valenzen aufgeführt, die den verschiedenen Elementen zugeschrieben werden.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Nicht selten kann man die Annahme eines Wechsels der Wertigkeit durch die Anschauung vermeiden, daß ein Teil der Valenzen eines Atoms dazu diene, ein anderes gleichartiges Atom an sich zu ketten. Manche Beobachtungen lassen z. B. darauf schließen, daß das Eisen unter gewöhnlichen Verhältnissen stets vierwertig ist (z. B. die Verbindung Eisenbisulfid  $\text{FeS}_2$ ). Nun kennt man aber Eisenverbindungen von der Zusammensetzung



Nach der ersteren scheint das Eisen als *zwei*wertiges, in der zweiten als *drei*-wertiges Element aufzutreten. Man *kann* sich aber auch denken, daß in beiden Verbindungen das Eisen vierwertig ist, daß aber beim Eisenoxydul zwei, beim Eisenoxyd eine Valenz *jedes* Eisenatoms dazu verwendet wird, das andere

Werden den Molekulan einer gesättigten Verbindung Atome entzogen, so bleiben gewöhnlich<sup>1)</sup> ungesättigte Atomgruppen oder „Reste“ zurück, die nur ausnahmsweise im freien Zustande bestehen, dagegen in chemischen Verbindungen die Stelle von Elementen vertreten können. Solche ungesättigten Atomgruppen nennt man *Radikale*. Denkt man sich z. B. aus der gesättigten Verbindung Wasser:  $H_2O$  ein Wasserstoffatom herausgenommen, so bleibt ein Rest oder ein Radikal  $OH$  zurück, das eine freie Valenz enthält und Hydroxyl genannt wird. Das Radikal Hydroxyl findet sich in einer grossen Zahl von Verbindungen wieder. Im „Ätzkali“ ist es an ein Atom Kalium gebunden:  $KOH$ , das zweiwertige Calciumatom vereinigt sich mit zwei Hydroxylgruppen zu Ätzkalk =  $Ca(OH)_2$  oder  $CaO_2H_2$ .

Auch die Gruppe  $NH_4$ , die im Salmiak (s. o.) mit einem Atom Chlor verbunden ist, kann man als ein einwertiges Radikal ansehen. (Seine 4 Wasserstoffatome binden nur 4 Valenzen des in diesem Falle *fünfwertigen* Stickstoffatoms). Es wird *Ammonium* genannt und bildet einen Bestandteil zahlreicher Verbindungen (z. B. des Ammoniumsulfates  $(NH_4)_2SO_4$ ), die grosse Ähnlichkeit mit den entsprechenden Kalium- und Natriumverbindungen aufweisen.

### § 9.

**Oxydation, Oxyde, Hydroxyde, Säuren, Basen, Salze.** Fast alle in der Bodenkunde zu besprechenden zusammengesetzten Körper gehören einer der folgenden Gruppen an: *Oxyde, Basen, Säuren, Salze*.

Das Fluor ausgenommen, können alle Elemente sich mit Sauerstoff verbinden. Den Vorgang der direkten Vereinigung bezeichnet man als *Oxydation* oder *Verbrennung*,<sup>2)</sup> die Vereinigungsprodukte als *Oxyde*.

Eisenatom an sich zu binden. Dann bleiben von den beiden Eisenatomen des Eisenoxyduls vier, von denen des Eisenoxyds sechs Valenzen übrig, die im ersteren Fall durch die vier, im anderen durch die sechs Valenzen der vorhandenen Sauerstoffatome ausgeglichen werden. Übrigens gibt man dem Eisenoxydul gewöhnlich die Formel  $FeO$ , man schreibt also dem Eisen in dieser Verbindung gewöhnlich nur zwei Valenzen zu.

<sup>1)</sup> Nicht immer. So kann die gesättigte Verbindung Calciumsulfat  $CaSO_4$  durch Entziehung des Sauerstoffs („Reduktion“) in die gleichfalls gesättigte Verbindung Calciumsulfid  $CaS$  übergehen. Im Calciumsulfat werden die 8 Valenzen der 4 Sauerstoffatome durch die (im ganzen) 8 Valenzen des Calciumatoms und des hier sechswertigen Schwefelatoms ausgeglichen. Im Calciumsulfid tritt der Schwefel zweiwertig auf und bildet mithin mit dem gleichfalls zweiwertigen Calcium eine gesättigte Verbindung.

<sup>2)</sup> Als Verbrennung im gewöhnlichen Sinn, wenn die Vereinigung sich rasch unter lebhafter Wärme- und Lichtentwicklung vollzieht; als „langsame Verbrennung“, wenn sie nur allmählich und ohne oder doch nur mit ganz schwacher Lichtentwicklung erfolgt.

Wasserstoff, an der Luft entzündet, verbrennt, er vereinigt sich mit Sauerstoff, er wird zu Wasserstoffoxyd oder Wasser ( $H_2O$ ) „oxydiert“. Die Metalle *Kalium*, *Natrium*, *Calcium* oxydieren sich beim Verbrennen an der Luft zu Kaliumoxyd oder Kali ( $K_2O$ ), Natriumoxyd oder Natron ( $Na_2O$ ), Calciumoxyd oder Kalk ( $CaO$ ).

Geht ein Metall mehrere Verbindungen mit Sauerstoff ein, oder m. a. W. bildet es „niedere und höhere Oxydationsstufen,“ so bezeichnete man nach der älteren chemischen Ausdrucksweise das *an Sauerstoff ärmere* als *Oxydul*, das *an Sauerstoff reichere* als *Oxyd*. So bildet z. B. das Eisen folgende Oxyde:




Die neuere chemische Sprache kennzeichnet die verschiedenartigen Oxyde dadurch, daß sie dem Namen des Metalls bei den *an Metall ärmeren* Verbindungen die Endung *i*, bei den *an Metall reicheren* die Endung *o* gibt. Danach erhält die Verbindung  $Fe_2O_3$  den Namen *Ferrioxyd*, die Verbindung  $FeO$ , bei der schon auf (ein Atom Sauerstoff ein Atom Eisen oder) *zwei* Atome Sauerstoff zwei Atome Eisen kommen, den Namen *Ferrooxyd* und die Verbindung  $Fe_3O_4$  den Namen *Ferroferrioxyd*.

Das Nichtmetall Schwefel kann bei seiner Vereinigung mit Sauerstoff zwei Oxyde, Schwefeldioxyd ( $SO_2$ ) und Schwefeltrioxyd ( $SO_3$ ) liefern. Beim Verbrennen des Phosphors entsteht Phosphorpenoxyd ( $P_2O_5$ ), beim Verbrennen des Kohlenstoffs Kohlendioxyd ( $CO_2$ ).

Die meisten Oxyde können sich mit den Elementen des Wassers zu gesättigten Verbindungen vereinigen, die man *Hydroxyde* nennt.

Calciumoxyd in Berührung mit Wasser geht in Calciumhydroxyd (Ätzkalk) über:



Das Calciumhydroxyd ist in Wasser etwas löslich, die Lösung („Kalkwasser“) hat einen laugenhaften Geschmack und bläut roten Lackmusfarbstoff. Diese Eigenschaften bezeichnet man als „alkalische Reaktion“. Mit Säuren zusammengebracht bildet es Salze (s. u.) Derartige Hydroxyde nennt man *Basen*, die Oxyde, woraus sie hervorgehen, basenbildende Oxyde. „Alkalisch reagierende“ Basen sind z. B. das *Kaliumhydroxyd* oder Ätzkali ( $KOH$ ), das *Natriumhydroxyd* oder Ätznatron<sup>1)</sup> ( $NaOH$ ). Aus ihren Oxyden können sie entstehen nach der Gleichung:



Nicht in Wasser löslich und deswegen auch nicht alkalisch reagierende Basen sind das *Ferrohydroxyd*<sup>2)</sup>  $FeO_2H_2$  (in der älteren chemischen Sprache

<sup>1)</sup> Die Lösung von Kaliumhydroxyd und Natriumhydroxyd in Wasser nennt man „Kalilauge“ und „Natronlauge“.

<sup>2)</sup> Vergl. § 8, insbesondere Anmerkung auf S. 18.

Eisenhydroxydul) und das *Ferrihydroxyd*  $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{H}_2$  (Eisenrost, s. o., früher auch als Eisenhydroxyd bezeichnet).

Die Metalle liefern bei ihrer Vereinigung mit Sauerstoff allermeist basenbildende Oxyde.





Andere Oxyde vereinigen sich mit den Elementen des Wassers zu Hydroxyden, die, falls sie in Wasser löslich sind, sauren Geschmack und die Fähigkeit besitzen, blauen Lackmusfarbstoff zu röten (sie zeigen „saure Reaktion“). Man nennt sie daher „säurebildende Oxyde“, ihre Hydroxyde aber *Säuren*. Mit Basen zusammengebracht bilden sie Salze (s. u.).

Die meisten Nichtmetalle vereinigen sich mit Sauerstoff zu säurebildenden Oxyden.

Säurebildende Oxyde sind z. B.:

$\text{SO}_3$	$\text{CO}_2$	$\text{N}_2\text{O}_5$	$\text{P}_2\text{O}_5$
Schwefeltrioxyd	Kohlendioxyd	Stickstoffpentoxyd	Phosphorpentoxyd.

In Berührung mit Wasser liefern sie Säuren nach folgenden Gleichungen:




Oxyde, die mit den Elementen des Wassers sich weder zu Säuren noch zu Basen vereinigen, nennt man *indifferenten Oxyde*. Beispiele: Wasser  $\text{H}_2\text{O}$ , Eisenhammerschlag oder Ferroferrioxyd ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ), Braunstein oder Manganperoxyd ( $\text{MnO}_2$ ) („Mangansuperoxyd“, „Manganhyperoxyd“) u. a. Nach den *älteren chemischen Anschauungen* bezeichnete man die basenbildenden Oxyde als Basen, die säurebildenden Oxyde als Säuren, ihre Hydroxyde aber sah man als Verbindungen mit Wasser an und bezeichnete sie dementsprechend als „Oxydhydrate“ und „Säurehydrate“. Zum Beispiel:


CaO, $\text{H}_2\text{O}$	(	„	„	Verbindung von Kalk mit Wasser): „Kalkhydrat“,
$\text{N}_2\text{O}_5$ , $\text{H}_2\text{O}$	(	„	„	Salpetersäure mit Wasser): „Salpetersäurehydrat“,
$\text{SO}_3$ , $\text{H}_2\text{O}$	(	„	„	Schwefelsäure mit Wasser): „Schwefelsäurehydrat“ u. s. w.

<sup>1)</sup> In einem Molekul Salpetersäure sind nicht 2 Atome Wasserstoff, 2 Atome Stickstoff, 6 Atome Sauerstoff, in einem Molekul Phosphorsäure nicht 6 Atome Wasserstoff, 2 Atome Phosphor, 8 Atome Sauerstoff, sondern nur die Hälfte dieser Mengen enthalten; es entstehen bei den oben dargestellten Vorgängen also nicht ein, sondern *zwei* Molekule Salpetersäure und Phosphorsäure.


Die *heutige Chemie* sieht in den *Basen* Verbindungen eines Metalls, in den sauerstoffhaltigen<sup>1)</sup> Säuren Verbindungen eines „Säureradikals“ (s. § 8) mit dem Radikal Hydroxyl (OH). Zum Beispiel:



Denkt man sich aus den Säuren Wasserstoff und Sauerstoff in dem Verhältnis, in dem sie Wasser bilden, herausgenommen, so bleiben die säurebildenden Oxyde, die man früher „Säuren“ nannte, zurück. Letztere kann man daher als „Anhydride“ der Säuren bezeichnen, z. B.:



Säuren und Basen bilden miteinander unter gleichzeitiger Entstehung von Wasser *Salze*:



Bei der Salzbildung tritt also das Metall aus der Base an die Stelle des Wasserstoffs in der Hydroxylgruppe der Säure, während der letztere mit der Hydroxylgruppe der Base sich zu Wasser vereinigt.<sup>6)</sup>

Enthält eine Säure mehrere Hydroxylgruppen, so können auch mehrere Wasserstoffatome durch ein Metall ersetzt werden, z. B.:


<sup>1)</sup> Über sauerstofffreie Säuren s. u. u.

<sup>2)</sup> Wenn der Stickstoff 5wertig, der Sauerstoff 2wertig ist, so besitzt das Säureradikal *Nitroxyl*  $\text{NO}_2$  noch eine freie Valenz, die *eine* einwertige Hydroxylgruppe an sich ketten kann. Im *Sulfuryl* ist der Schwefel 6wertig. 4 Valenzen werden durch die 4 Valenzen der 2 Sauerstoffatome ausgeglichen, die überbleibenden 2 freien Valenzen können *zwei* Hydroxylgruppen binden. Das Radikal *Carbonyl* muß 2wertig sein, weil das Kohlenstoffatom 4-, das Sauerstoffatom 2wertig ist. Das Radikal der Phosphorsäure  $\text{PO}$  ist 3wertig, weil von den 5 Valenzen des Phosphoratoms nur 2 durch die Valenzen des Sauerstoffatoms gesättigt werden.

<sup>3)</sup> Umgekehrt kann man auch sagen: Das Säureradikal der Säure tritt an die Stelle des Wasserstoffs in die Base, während der letztere mit dem Hydroxyl der Säure sich zu Wasser vereinigt.




Schwefelsäure    „Saures Kaliumsulfat“



„Normales Kaliumsulfat“

Im Fall 1 entsteht ein „saures“, im Fall 2 ein „normales“<sup>1)</sup> Salz.


Je nachdem eine Säure eine oder mehrere Hydroxylgruppen enthält, heißt sie *ein-* oder *mehrbasisch*. Die Phosphorsäure ist dreibasisch, sie kann drei Reihen von Salzen bilden:



Monokaliumphosphat<sup>2)</sup>




Dikaliumphosphat<sup>2)</sup>



Trikaliumphosphat<sup>2)</sup>

Treten mehrwertige Metallatome in ein Säuremolekül ein, so kann das häufig nur dann geschehen, wenn mehrere Säuremoleküle sich vereinigt haben. So bei der Entstehung von Calciumnitrat:



Calciumhydroxyd    Salpetersäure    Calciumnitrat

Ferner kann z. B. *ein* Molekül einer zweibasischen Säure mit dem Atom eines zweiwertigen Metalls nur ein *normales* Salz bilden:




Kohlensäure

Normales


Calciumkarbonat

Zur Bildung eines *sauren* Salzes sind *zwei* Säuremoleküle erforderlich:



Saures Calcium-  
karbonat

Die ältere Chemie betrachtete ein Salz als die chemische Verbindung eines säurebildenden mit einem basenbildenden Oxyd oder nach ihrer Auffassung als die Verbindung einer „Säure“ mit einer „Base“. Ein Molekül Calciumsulfat:  $\text{CaSO}_4$  enthielt hiernach die beiden Gruppen  $\text{CaO}$  (Kalk) und  $\text{SO}_3$  („Schwefelsäure“):



Ein Molekül des normalen Kaliumphosphats bestand aus „Kali“ und „Phosphorsäure“:  $3\text{K}_2\text{O}, \text{P}_2\text{O}_5$ ,<sup>3)</sup> dementsprechend bezeichnete man diese

<sup>1)</sup> Die sogenannten sauren Salze, die man als Zwischenstufen zwischen der Säure und dem „normalen“ Salz ansehen kann, zeigen häufig, wenn auch nicht immer, saure Reaktion, die „normalen“ reagieren meist neutral, bisweilen alkalisch

<sup>2)</sup> Wohl auch als zweifachsaures, einfachsaures und normales Kaliumphosphat bezeichnet.

<sup>3)</sup> Die Ziffer 3 bezieht sich bei dieser Schreibweise nur auf die vor dem Komma stehende Atomgruppe.



Salze als „schwefelsauren Kalk“ und als „phosphorsaures Kali“. Heute spricht man von „schwefelsaurem Calcium“ und „phosphorsaurem Kalium“, oder man hängt dem Namen des in dem Salz vertretenen Metalls eine aus dem Namen des säurebildenden Elementes hergeleitete Endung an, z. B.:


Calciumsulfat, Kaliumphosphat u. s. w.

Die folgende Zusammenstellung enthält die Bezeichnungen und Formeln einiger besonders wichtiger Salze nach der älteren und der neueren Anschauungsweise.


Nach älterer Anschauung:	Nach neuerer Anschauung:
Salpetersaures Kali $K_2O, N_2O_5$ ,	Kaliumnitrat $KNO_3$
Salpetersaures Ammoniak $(NH_4)_2O, N_2O_5$ (richtiger: Salpetersaures Ammoniumoxyd),	Ammoniumnitrat $NH_4NO_3$
Salpetersaurer Kalk $CaO, N_2O_5$ ,	Calciumnitrat $Ca(NO_3)_2$
Schwefelsaures Kali $K_2O, SO_3$ ,	Kaliumsulfat $K_2SO_4$
Schwefelsaurer Kalk $CaO, SO_3$ ,	Calciumsulfat $CaSO_4$
Schwefelsaures Eisenoxydul $FeO, SO_3$ ,	Ferrosulfat $FeSO_4$
Schwefelsaures Eisenoxyd $Fe_2O_3, 3SO_3$ ,	Ferrisulfat $Fe_2(SO_4)_3$
Kohlensaures Natron $Na_2O, CO_2$ ,	Normal. Natriumkarbonat $Na_2CO_3$
Doppeltkohlensaures Natron $Na_2O, CO_2 + H_2O, CO_2$ <sup>1)</sup>	Saures Natriumkarbonat $NaHCO_3$
Kohlensaurer Kalk $CaO, CO_2$ ,	Normal. Calciumkarbonat $CaCO_3$
Doppeltkohlens. Kalk $CaO, CO_2 + H_2O, CO_2$ ,	Saures Calciumkarb. $CaH_2(CO_3)_2$
Basisch. phosphorsaures Kali $3K_2O, P_2O_5$ ,	Trikaliumphosphat $K_3PO_4$ (dreifach)
Neutr. phosphors. Kali $2K_2O, H_2O, P_2O_5$ ,	Dikaliumphosphat $K_2HPO_4$ (zweifach)
Saures phosphors. Kali $K_2O, 2H_2O, P_2O_5$ ,	Monokaliumphosphat $KH_2PO_4$ (einfach)
Basisch. phosphors. Kalk $3CaO, P_2O_5$ ,	Tricalciumphosphat $Ca_3(PO_4)_2$
Neutr. phosphors. Kalk $2CaO, H_2O, P_2O_5$ ,	Dicalciumphosphat $Ca_2H_2(PO_4)_2$
Saurer phosphors. Kalk $CaO, 2H_2O, P_2O_5$ ,	Monocalciumphosphat $CaH_4(PO_4)_2$
Phosphorsaures Eisenoxydul $3FeO, P_2O_5$ ,	Ferrophosphat $Fe_2(PO_4)_2$
Phosphorsaures Eisenoxyd $Fe_2O_3, P_2O_5$ ,	Ferriphosphat $Fe_2(PO_4)_2$
<sup>1)</sup> Die „doppelsauren“ Salze sah man als Verbindungen des neutralen Salzes mit einem „Säurehydrat“ (s. o.) an.	
<sup>2)</sup> Gewöhnlich wendet man die einfachere Formel $FePO_4$ oder $PO \cdot O_6Fe$ an.	

## § 10.

**Haloidsäuren, Haloidsalze.** Mit den Elementen Fluor, Chlor, Brom, Jod geht der Wasserstoff gasförmige Verbindungen von der Zusammensetzung:



ein, die in Wasser leicht löslich sind und stark saure Reaktion (s. o.) zeigen. Mit Basen bilden sie Salze, z. B.:



Sie sind also als (sauerstofffreie) Säuren zu betrachten und sie werden, im Gegensatz zu den sauerstoffhaltigen Säuren oder „Sauerstoffsäuren“, als „Wasserstoffsäuren“ (auch als „Haloidsäuren“) bezeichnet.

Ihre Salze kann man auch als Verbindungen der oben genannten Elemente mit Metallen ansehen und man bezeichnet sie daher als Fluor-, Chlor- u. s. w. Metalle oder als Fluoride, Chloride, Bromide, Jodide (z. B. Chlornatrium oder Natriumchlorid, Fluorcalcium oder Calciumfluorid u. s. w.). Wegen ihrer Fähigkeit, mit Metallen salzartige Verbindungen zu bilden, nennt man die Elemente Fluor, Chlor, Brom, Jod auch *Salzbildner* („Halogene“), während die Salze selbst als *Haloidsalze* bezeichnet werden.

<sup>1)</sup> Die Lösung in Wasser wird auch Flusssäure genannt.

<sup>2)</sup> Die wässrige Lösung wird auch Salzsäure genannt.

## Kapitel I.

### Die Bestandteile der festen Erdrinde.

#### A. Die gesteinsbildenden Mineralien. Ihr chemischer Charakter und ihr chemisches Verhalten.

##### § 11.

Die so verschiedenartigen, die Erdrinde zusammensetzenden und bei ihrer weiteren Umwandlung den Boden bildenden *Gesteine* („Felsarten“, „Gebirgsarten“) bestehen aus *Mineralien*, d. h. leblosen, nicht oder doch nur sehr mittelbar von lebenden Wesen abstammenden, ihrer Hauptmasse nach in sich gleichartigen Naturkörpern, die sich nicht mehr oder nur auf chemischem Wege zerlegen lassen. Da die Umwandlung der Gesteine und die Art der dabei entstehenden Produkte sehr wesentlich von der Art der gesteinsbildenden Mineralien abhängt, so haben wir uns zunächst mit der Zusammensetzung und dem chemischen Verhalten der letzteren zu befassen.

Ihrem chemischen Charakter nach lassen sich die wichtigeren an der Bodenbildung beteiligten *Mineralien* in die folgenden Gruppen teilen: *Kieselerde-Mineralien* und *Kieselsaure Salze* oder Silikate, *Kohlensaure Salze* oder Karbonate, *Phosphorsaure Salze* oder Phosphate, *Schwefelsaure Salze* oder Sulfate, *Schwefelmetalle* oder Sulfide, *Oxyde* und *Oxydhydrate* oder Hydroxyde, *Chlorverbindungen* oder Chloride, *Salpetersaure Salze* oder Nitrate.

Nach ihrer Verbreitung nehmen die Kieselerde-Mineralien und die Silikate bei weitem die erste Stelle ein.

##### § 12.


**Die Kieselerde-Mineralien und ihr chemischer Charakter.**  
Die Kieselerde, eine Verbindung des Elementes Silicium mit Sauerstoff von der Zusammensetzung  $\text{SiO}_2$ , daher nach chemischem Sprachgebrauch Siliciumdioxid benannt, findet sich in ungeheuren Mengen im Boden, im Wasser und in den Pflanzen verbreitet. Kristallisiert und wasserfrei kommt sie als *Quarz* mit zahlreichen Varietäten (Bergkristall, Amethyst u. a.), amorph und dabei wasserhaltig als *Opal* im Boden vor. Als Gemenge von wasserhaltiger, amorpher und kristallisierter Kieselerde lassen sich *Feuerstein*, *Chalcedon* und *Achat* ansehen. Brunnen-, Quell- und Seewasser,

namentlich manche heiße Quellen enthalten nicht unbeträchtliche Mengen von Kieselerde (wahrscheinlich als „Hydroxyd“, § 9) gelöst und setzen sie als „Süßwasserquarz“ oder „Kieselsinter“ ab.


Auch in den Geweben zahlreicher Pflanzen wird sie gefunden, obwohl sie nicht zu den eigentlichen Pflanzennährstoffen zu gehören scheint. Bemerkenswert ist ihr Vorkommen in den Zellwänden gewisser einzelliger Algen, deren auf dem Grunde früherer Seen massenhaft angehäuften Reste, bekannt unter dem Namen *Kieselgur* („Infusorienerde“), *Tripel*, *Polierschiefer*, zum größeren Teil aus reiner, bisweilen durch Beimengung humoser Teilchen leicht grau gefärbter Kieselerde bestehen.<sup>1)</sup>

Durch reines Wasser wird das Siliciumdioxid so schwer in Lösung gebracht, daß man es gewöhnlich als unlöslich betrachtet. In Kali- und Natronlauge (§ 9), sowie in Lösungen von Kalium- und Natriumkarbonat lösen sich die verschiedenen natürlich vorkommenden Kieselerden in sehr verschiedenem Grade, die amorphen leicht, die kristallisierten sehr schwer, in der Regel um so leichter, je mehr Wasser sie enthalten.

Nach älterer chemischer Anschauung, die in vielen Lehrbüchern der Mineralogie noch festgehalten wird, sah man das Siliciumdioxid als eine Säure an (s. o.) und bezeichnete es schlechtweg als Kieselsäure. Kieselsaure Salze oder Silikate galten als Verbindungen des Siliciumdioxids mit Metalloxyden, erhielten also beispielsweise die chemische Formel



worin R ein einwertiges Metall bedeutet. Nach den heutigen chemischen Anschauungen (§ 9) würde einer dem soeben angeführten Salz entsprechenden Kieselsäure die chemische Formel ( $H_2O + SiO_2 =$ )



zukommen. Eine Säure von dieser Zusammensetzung wird als „Metakieselsäure“, die Verbindung  $SiO_2$  mithin als das Anhydrid (§ 9) der Metakieselsäure bezeichnet.

Ein großer Teil der in der Natur vorkommenden kieselsauren Salze läßt sich von der Metakieselsäure (s. o.) ableiten, andere müssen als die Salze einer Säure von der Zusammensetzung ( $2H_2O + SiO_2 =$ )  $H_4SiO_4$  („Orthokieselsäure“) angesehen werden. Die Meta- wie die Orthokieselsäure können auf künstlichem Wege hergestellt werden; daß sie oder die eine oder andere von ihnen auch im freien Zustande in der Natur vorkommen, ist höchst wahrscheinlich, wenn es auch noch nicht gelungen ist, sie mit Sicherheit nachzuweisen. Übrigens setzt die Zusammensetzung einer großen Anzahl

<sup>1)</sup> Kieselgurlager finden sich sowohl im Diluvium als im Alluvium. Sie sind als Baugrund sehr gefürchtet. Ihr Material wird u. a. als schlechter Wärmeleiter vielfach zu Isolierungen, ferner zum Aufsaugen des Nitroglycerins bei der Dynamitfabrikation verwendet.

natürlich vorkommender Silikate das Vorhandensein von Kieselsäuren voraus, in deren chemischer Formel mehrere Atome Silicium enthalten sind. Zur Aufklärung ihrer Konstitution nimmt man an, daß zwei oder mehrere Moleküle der Ortho- oder Metakieselsäure unter gleichzeitigem Austritt von Wasser zu sogenannten „Polykieselsäuren“ sich zusammengelagert haben. So kann entstehen

aus 2 Molekülen Metakieselsäure durch Austritt von 1 Molekül Wasser:

1 Molekül „Metadikieselsäure“:



aus 2 Molekülen Orthokieselsäure durch Austritt von 1 Molekül Wasser:

1 Molekül „Orthodikieselsäure“:



aus 3 Molekülen Orthokieselsäure durch Austritt von 4 Molekülen Wasser:

1 Molekül „Polykieselsäure“:



Im freien Zustande sind diese Säuren zwar nicht mit Sicherheit bekannt, jedoch scheinen viele natürlich vorkommende wasserhaltige Kiesel-erden (Opal, Chaledon, Achat u. a.) aus ihnen zu bestehen.

Beim Abscheiden aus ihren Salzen, das durch die Einwirkung von Säuren (auch von Kohlensäure) herbeigeführt werden kann (s. u.), bleiben nach Umständen nicht unerhebliche Kieselsäure-Mengen in Lösung. Unter gewissen Bedingungen bildet die ausgeschiedene Säure mit Wasser eine gallertartige Masse („Colloidale“ Kieselsäure), die beim Eintrocknen fest wird, beim Glühen das Wasser völlig verliert und sich in Siliciumdioxyd umwandelt.

### § 13.

#### Chemischer Charakter der kieselsauren Salze oder Silikate.

Früher betrachtete man diese Salze als Verbindungen von Siliciumdioxyd ( $\text{SiO}_2$ ) mit Metalloxyden (§ 9) und unterschied je nach dem Verhältnis, in dem die mit Metall verbundene Sauerstoffmenge zu der an Silicium gebundenen steht, zwischen Singulo-, Bi-, Trisilikaten u. s. w. So läßt sich z. B. das Silikat Olivin als eine Verbindung von 2 Molekülen Magnesiumoxyd (Magnesia) mit 1 Molekül Siliciumdioxyd ansehen:

$2\text{MgO} + \text{SiO}_2$ ; Verhältnis des Magnesiasauerstoffs zum Kieselerde-sauerstoff wie 1:1.

Hiernach bezeichnete man den Olivin als ein *Singulosilikat*. Als Bisilikate sind anzusehen z. B. der *Enstatit*, dessen frühere Formel:  $\text{MgO} + \text{SiO}_2$  auf 1 Atom Magnesiasauerstoff 2 Atome Kieselerdesauerstoff enthält, und ebenso der *Leucit*, den man sich nach der Formel  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3 + 4\text{SiO}_2$  zusammengesetzt dachte. Im Leucit ist neben dem Monoxyd

$K_2O$  noch ein Sesquioxyd<sup>1)</sup>  $Al_2O_3$  enthalten. Derartige Silikate, die zwei verschiedene Metalle enthalten und die zu den verbreitetsten gehören, bezeichnete man als *Doppelsilikate* und gab ihnen beispielsweise den chemischen Ausdruck:  $K_2O \cdot SiO_2 + Al_2O_3 \cdot 3SiO_2$ .

Dieser älteren chemischen Anschauungsweise entspricht es, wenn man bei Mineralanalysen den Gehalt der Verbindungen an Kieselerde oder „Kieselsäure“ ( $SiO_2$ ), an Kaliumoxyd oder Kali ( $K_2O$ ), an Natriumoxyd oder Natron ( $Na_2O$ ), an Calciumoxyd oder Kalk ( $CaO$ ), an Magnesiumoxyd oder Magnesia ( $MgO$ ), an Eisenoxydul ( $FeO$ ), an Eisenoxyd ( $Fe_2O_3$ ), an Aluminiumoxyd oder Tonerde ( $Al_2O_3$ ) u. s. w. aufführt.

Auf Grund der jetzigen Ansichten über die Anordnung der Elemente innerhalb chemischer Verbindungen leitet man die Silikate von den eigentlichen Kieselsäuren her (§ 6), indem man sich deren Wasserstoff durch Metalle vertreten denkt. Durch Eintritt von 2 Atomen des zweiwertigen Magnesiummetalls an die Stelle der 4 Wasserstoffatome der Orthokieselsäure ( $H_4SiO_4$ ) entsteht der *Olivin*  $Mg_2SiO_4$ , durch Eintritt von einem Magnesiumatom anstelle der zwei Wasserstoffatome der Metakieselsäure ( $H_2SiO_3$ ) der *Enstatit*  $MgSiO_3$ . Man kann sich diese Silikate auch als Verbindungen des vierwertigen „Säurerestes“  $SiO_4$  mit 2 Atomen Magnesium und des zweiwertigen „Säurerestes“  $SiO_3$  mit 1 Atom Magnesium vorstellen. In den mehrwertigen Metallatomkomplexe enthaltenden Silikaten denkt man sich jene mit zwei oder mehr Säureresten verbunden, so im *Leucit*  $K_2Al_2(SiO_3)_4$  die achtwertige Atomgruppe  $K_2Al_2$  mit 4 zweiwertigen Säureresten  $SiO_3$ .

Wenn es bis jetzt auch noch nicht in befriedigender Weise gelungen ist, die zahlreichen, äußerst mannigfaltig zusammengesetzten Silikate in ein chemisches System zu bringen, so läßt sich doch die Zusammensetzung der überwiegenden Mehrzahl zwanglos von den bereits früher erwähnten Kieselsäuren:

Orthokiesel- säure	Metakiesel- säure	Orthodikiesel- säure	Metadikiesel- säure	Polykiesel- säure
$H_4SiO_4$	$H_2SiO_3$	$H_8Si_2O_7$	$H_2Si_2O_6$	$H_4Si_3O_8$

theoretisch herleiten. So z. B. wichtige Glieder der Feldspatgruppe, Orthoklas, Albit (s. u.) von der Polykieselsäure, der Cordierit:  $Mg_3Al_2(Si_2O_7)_4$ , von der Orthodikieselsäure u. s. w.

<sup>1)</sup> Unter „Monoxyden“ versteht man solche Sauerstoffverbindungen, in denen mit einem Atom Sauerstoff 2 Atome eines einwertigen oder 1 Atom eines zweiwertigen Elementes verbunden sind, z. B.  $K_2O$ ,  $Na_2O$ ,  $CaO$ ,  $MgO$  u. s. w. In einem „Sesquioxyd“ kommen auf 3 Atome Sauerstoff 2 Atome eines anderen Elementes, z. B.  $Al_2O_3$  oder  $Fe_2O_3$ . Die Atomgruppen  $Al_2$ ,  $Fe_2$  betrachtet man als sechswertig (s. o. § 8 Anm.).

Die natürlich vorkommenden, sowie die künstlich hergestellten Silikate sind entweder *wasserhaltig* oder *wasserfrei*. Die ersteren geben zum Teil das Wasser bereits bei mäßigem Erhitzen ab; man nimmt in diesem Fall an, daß es in molekularer Verbindung mit dem Salz vorhanden sei, und bezeichnet es als *Kristallwasser*. So bei der Mehrzahl der Zeolithe (s. u.), z. B. beim Analcim:  $\text{Na}_2\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ . Bei anderen beteiligen sich die Elemente des Wassers am Aufbau des Silikatmolekuls selbst. Solche Mineralien verlieren das Wasser erst bei sehr heftigem Glühen, und man spricht in diesem Fall von *basischem* oder *Konstitutionswasser*. So enthält z. B. der Kaolin (s. u.) neben Kristallwasser noch basisches Wasser, was durch die chemische Formel  $\text{H}_2\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8 + \text{H}_2\text{O}$  angedeutet wird.

Die *Mannigfaltigkeit* der natürlich vorkommenden Silikate wird nicht nur durch die abweichende Zusammensetzung der verschiedenen Kieselsäuren und die große Anzahl von Metallen, die in sie eintreten können, sondern namentlich auch dadurch bedingt, daß jedes darin enthaltene Metall zu größeren oder kleineren Teilen durch gleichwertige Metalle vertreten werden kann, so Kalium durch Natrium oder Ammonium, Calcium durch Magnesium, Aluminium durch Eisen u. s. w., ohne daß dadurch der mineralische Gesamtcharakter, namentlich die Kristallform, verändert wird.

## § 14.

**Ordnung der Silikate nach Gruppen.** Von den an der Bodenbildung beteiligten Silikaten folgen hier zunächst diejenigen, die kein Kristallwasser enthalten.

1. *Die Gruppe der Feldspate*. Sie enthalten neben Aluminium stets noch ein oder mehrere Metalle der Alkalien oder alkalischen Erden.

a) *Orthoklas* oder „Kalifeldspat“. Einfachste Zusammensetzung:  $\text{K}_2\text{Al}_2(\text{Si}_3\text{O}_8)_2$ . Gewöhnlich ist ein kleiner Teil des Kaliums durch Natrium ersetzt, auch enthält das Silikat häufig geringe Mengen von Calcium, Magnesium und Eisen. Eine Abart ist der „Sanidin“ oder „glasige Feldspat“.

b) *Die Plagioklasse*. Sie unterscheiden sich in ihrer Kristallform vom Orthoklas. Ihre wichtigsten Arten sind: der dem Orthoklas gleich zusammengesetzte *Mikroklin*; der *Albit* oder „Natronfeldspat“, einfachste Zusammensetzung:  $\text{Na}_2\text{Al}_2(\text{Si}_3\text{O}_8)_2$ ; der *Anorthit* oder „Kalkfeldspat“:  $\text{CaAl}_2(\text{SiO}_4)_2$ . Im Albit pflegt ein Teil des Natriums durch Kalium oder Calcium, im Anorthit ein Teil des Calciums durch Kalium, Natrium oder Magnesium vertreten zu sein. Als Mischungen von Albit und Anorthit sind anzusehen der *Oligoklas* und der *Labrador*. Im ersteren scheint der Albit, im letzteren der Anorthit vorzuherrschen. Beide Mineralien enthalten kein oder nur wenig Kalium.

2. *Die Nephelin- oder Leucitgruppe* mit dem an Kali reichen *Leucit*  $K_2Al_2(SiO_3)_4$  und den natronreichen Mineralien *Nephelin*  $(NaK)_2Al_2(SiO_4)_2$  und *Sodalith*  $3Na_2Al_2(SiO_4)_2 + 2NaCl$ . Im Leucit kann ein kleiner Teil des Kaliums durch Natrium vertreten sein, im Nephelin ist das Natrium stets vor dem Kalium vorwiegend.

3. *Die Augit- und Hornblende-Gruppe*. Die wichtigsten Glieder dieser Gruppe, Augit und Hornblende, enthalten stets Calcium und Magnesium, meist auch Eisen. Einige Arten enthalten außerdem Aluminium, andere nicht. a) *Augit* oder „Pyroxen“, einfachste Zusammensetzung:  $CaMg(SiO_3)_2$ . Der Gehalt an Calcium pflegt den an Magnesium zu überwiegen. Alkalimetalle sind gewöhnlich nicht, Aluminium in geringen Mengen vorhanden. Dem Augit nahe stehen b) der *Enstatit*  $(MgSiO_3)$ , c) der *Hypersthen*, in denen Eisen vorhanden zu sein, das Calcium aber fast ganz zu fehlen pflegt, und d) der *Diallag*, der etwas Aluminium, ziemlich viel Eisen und etwas Wasser enthält. Durch ihre vollkommene Spaltbarkeit unterscheiden sich die Glieder der Hornblendereihe von denen der Augitreihe, denen sie hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung sehr ähnlich sind. *Hornblende* oder „Amphibol“ enthält etwas weniger Calcium und Aluminium als der Augit, dafür fast immer Alkalimetalle.

4. *Die Gruppe der Glimmer*. Die durch ihre große Spaltbarkeit ausgezeichneten Glimmer gehören neben den Feldspaten zu den besonders häufig vorkommenden bodenbildenden Mineralien. Sie enthalten neben Aluminium Metalle der Alkalien und alkalischen Erden in so wechselnden Verhältnissen, daß eine chemische Formel noch nicht aufgestellt werden konnte. Die wichtigsten Glieder der Gruppe sind: a) der *Muscovit* oder „Kaliglimmer“, der neben Aluminium und Kalium meistens kleine Mengen Natrium, dagegen Calcium und Magnesium gar nicht oder nur in sehr untergeordneten Mengen enthält; b) der *Biotit* oder „Magnesiaglimmer“. Er zeichnet sich durch hohen Gehalt an Magnesium und oft auch an Eisen aus, enthält aber auch stets Kalium und etwas Natrium.

5. *Die Cordieritgruppe*. Der *Cordierit* oder „Dichroit“, einfachste Zusammensetzung  $Mg_3Al_2(Si_2O_7)_4$ , enthält neben dem Aluminium stets größere oder geringere Mengen Eisen und etwas Calcium.

6. *Die Granatgruppe*. Von den in ihrer Zusammensetzung sehr wechselnden Gliedern dieser Gruppe beteiligt sich nur der *gemeine Granat* an der Bodenbildung. Einfachste Zusammensetzung  $Ca_3Al_2(SiO_4)_3$ . Meistens enthält er außer Calcium und Aluminium noch Magnesium und Eisen.

7. *Die Olivingruppe*. Die Silikate dieser Gruppe enthalten als wesentliches Metall nur Magnesium, von dem ein Teil durch Eisen ersetzt ist; das wichtigste ist der *Olivin* oder „Peridot“. Einfachste Formel  $Mg_2SiO_4$ . Der Gehalt an Eisen ist starken Schwankungen unterworfen.



8. *Die Epidotgruppe.* Der *Epidot* oder „Pistazit“ enthält neben Aluminium noch Calcium und Konstitutionswasser (s. o.). Ein Teil des Aluminiums ist durch Eisen vertreten. Außerdem enthält er nicht selten, von Einschlüssen herrührend, kleine Mengen Magnesium, Kalium und Natrium.

9. *Die Turmalingruppe.* Die Glieder dieser Gruppe enthalten bei äußerst wechselnder Zusammensetzung stets etwas Konstitutionswasser. Im gemeinen *Turmalin* oder „Schörl“ finden sich neben Aluminium noch Magnesium, Eisen, Alkalimetalle und Wasserstoff, meistens auch Calcium.

Kristallwasser enthalten die Glieder der nun folgenden Gruppen:

10. *Die Chloritgruppe.* Die Silikate der Chloritgruppe entstehen vielfach durch Umwandlung anderer magnesium- und eisenhaltiger Mineralien. Hinsichtlich ihrer Spaltbarkeit nähern sie sich den Glimmern. Der *Chlorit* enthält neben Aluminium noch Magnesium, Eisen und Kristallwasser.

11. *Die Talk- und Serpentingruppe.* Die Glieder dieser Gruppe, die als hauptsächliches Metall Magnesium enthalten, sind aus der natürlichen Umwandlung magnesiumhaltiger Mineralien, namentlich von Olivin (s. o.) hervorgegangen. a) *Talk* oder „Speckstein“. Einfachste Zusammensetzung:  $H_2Mg_3(SiO_3)_4$  (wobei das erst bei starkem Glühen entweichende Wasser als Konstitutionswasser angesehen wird); er enthält meist etwas Eisen und Aluminium. b) *Serpentin*  $H_2Mg_3(SiO_3)_4 + H_2O$ . Ein größerer oder kleinerer Teil des Magnesiums ist fast stets durch Eisen vertreten. c) *Glaukonit*. Das Mineral besitzt eine sehr schwankende Zusammensetzung, an der sich Eisen, Kalium und Wasser stets, häufig auch Aluminium und Magnesium, selten aber Calcium beteiligen.

12. *Gruppe der Zeolithe.* Die Zeolithe sind Umwandlungsprodukte anderer Mineralien, namentlich aus der Feldspat- und Leucitgruppe. Sie enthalten neben reichlichen Wassermengen Calcium oder Natrium oder beide Elemente, meist auch Aluminium, nicht selten Kalium und Magnesium, diese aber nur in geringen Mengen. Zu den wichtigeren Gliedern der Gruppe gehören: a) der *Mesotyp* mit den Unterarten Natrolith  $Na_2Al_2Si_3O_{10} + 2H_2O$  und Skolezit  $CaAl_2Si_3O_{10} + 3H_2O$ , b) der *Analcim*  $Na_3Al_2(SiO_3)_4 + 2H_2O$ , c) der *Stilbit*  $CaAl_2Si_6O_{16} + 5H_2O$ .

13. *Die Gruppe der Tonmineralien.* So wichtig die Tonmineralien für die Bodenbildung sind, so große Schwierigkeiten stellen sich ihrer Erforschung in den Weg. Sie sind durchweg Verwitterungsprodukte von aluminiumhaltigen Mineralien, namentlich von Feldspaten, in den verschiedensten Stadien der Umwandlung. Von Metallen überwiegt stets das Aluminium, jedoch findet sich häufig auch ein größerer oder geringerer Gehalt an Eisen, Calcium, Magnesium. Am besten bekannt ist der *Kaolin* („Porzellanerde“)  $H_2Al_2(SiO_3)_2 + H_2O$ . Er enthält außer dem Kristallwasser noch Konstitutionswasser (§ 13), das erst bei sehr hoher Temperatur sich verflüchtigt. —

§ 15. Einen Überblick über den prozentischen Gehalt der oben besprochenen Mineralien an den wichtigeren bodenbildenden Bestandteilen gewährt die folgende Tabelle. Soweit sich aus den vorhandenen Analysen eine chemische Formel für die Zusammensetzung der Silikate herleiten läßt, ist diese mit aufgeführt, und es sind dann allermeist die hieraus berechneten prozentischen Zahlen (die „theoretische“ oder „schematische“ Zusammensetzung) angegeben worden. Bei der so außerordentlich schwankenden Zusammensetzung der Silikate können diese Zahlen natürlich nur einen ungefähren Anhalt bieten. In einigen Fällen und überall da, wo die Aufstellung eines chemischen Ausdrucks noch nicht gelungen ist, wurden nur die aus den vorliegenden chemischen Analysen entnommenen Grenzwerte<sup>1)</sup> eingestellt. Bei einem jeden der in die Tabelle aufgenommenen Silikate sind in Kleindruck dann noch die Bestandteile angefügt, welche stets, gewöhnlich oder selten, in größeren oder geringeren Mengen an seiner Zusammensetzung teilnehmen.

(Siehe die Tabelle auf Seite 34 und 35.)

Ordnet man die in der umstehenden Tabelle aufgeführten Mineralien in absteigender Reihe nach dem prozentischen Gehalt an bodenbildenden Bestandteilen, wie er sich aus der chemischen Formel sowie aus den Analysen ergibt, so erhält man die folgenden Reihen.

a) *Nach dem Gehalt an Kali* ( $K_2O$ ) (Kaligehalt sinkt von ca. 21,5 bis auf ca. 3%<sub>0</sub>): Leucit — Orthoklas (Sanidin, Mikroklin) — Muscovit (Kaliglimmer) — Biotit (Magnesiaglimmer) — Nephelin — Glauconit.

b) *Nach dem Gehalt an Natron* ( $Na_2O$ ) (Natrongehalt sinkt von ca. 19 bis auf ca. 4%<sub>0</sub>): Sodalith — Natrolith — Nephelin — Analcim — Albit — Oligoklas — Labrador.

c) *Nach dem Gehalt an Kalk* ( $CaO$ ) (Kalkgehalt sinkt von ca. 37 bis auf ca. 2%<sub>0</sub>): Granat — Epidot (Pistazit) — Augit — Anorthit — Skolezit — Labrador — Hornblende — Stilbit — Oligoklas.

d) *Nach dem Gehalt an Magnesia* ( $MgO$ ) (Magnesiagehalt sinkt von ca. 57 bis auf ca. 10%<sub>0</sub>): Olivin (Peridot) — Serpentin — Talk (Speckstein) — Biotit (Magnesiaglimmer) — Chlorit — Hornblende (Amphibol) — Augit (Pyroxen) — Cordierit (Dichroit) — Turmalin.

e) *Nach dem Gehalt an Eisenoxydul* ( $FeO$ ) (Eisenoxydulgehalt sinkt von ca. 30 bis auf ca. 2%<sub>0</sub>): Olivin — Talk — Augit — Hornblende.

f) *Nach dem Gehalt an Eisenoxyd* ( $Fe_2O_3$ ) (Eisenoxydgehalt sinkt von ca. 16 bis auf ca. 0,5%<sub>0</sub>): Epidot — Hornblende — Cordierit — Augit.

g) *Nach dem Gehalt an Tonerde* ( $Al_2O_3$ ) (Aluminiumoxydgehalt sinkt von ca. 40 bis auf ca. 4%<sub>0</sub>): Kaolin — Turmalin — Anorthit — Muscovit

<sup>1)</sup> Allermeist der „Allgemeinen und Chemischen Geologie“ von J. Roth Bd. 1 — Berlin 1879, entnommen.

Übersicht über die prozentische Zusammensetzung der wichtigsten bodenbildenden Silikate.

Bezeichnung des Silikates	Einfachster chemischer Ausdruck	Prozentischer Gehalt an						
		Wasser H <sub>2</sub> O	Kieselerde SiO <sub>3</sub>	Tonerde Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Kali K <sub>2</sub> O	Natron Na <sub>2</sub> O	Kalk CaO	Mag- nesia MgO
1. Feldspate:								
Orthoklas (Kalifeldspat), Sanidin, Mikroklin	K <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> (Si <sub>3</sub> O <sub>8</sub> ) <sub>2</sub>	—	64,6	18,59	16,9	—	—	—
			Kleine Mengen CaO, MgO, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> und 2–3% Na <sub>2</sub> O					
Albit	Na <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> (Si <sub>3</sub> O <sub>8</sub> ) <sub>2</sub>	—	68,6	19,6	—	11,8	—	—
			Außerdem CaO, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>					
Anorthit	CaAl <sub>2</sub> (SiO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>	—	43,0	36,9	—	—	20,1	—
			Außerdem Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , K <sub>2</sub> O und Na <sub>2</sub> O					
Oligoklas <sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	—	66,5–61,9	21,0–24,1	—	10,9–8,7	1,6–5,3	—
			Außerdem MgO, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , K <sub>2</sub> O					
Labrador <sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>	—	55,4–49,2	28,5–32,7	—	5,7–2,8	10,4–15,3	—
			Außerdem MgO, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , K <sub>2</sub> O					
2. Nephelin-u. Leucitgruppe:								
Leucit	K <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>4</sub>	—	54,9	23,6	21,5	—	—	—
			Außerdem stets Na <sub>2</sub> O, bisweilen CaO und FeO					
Nephelin	(NaK) <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> (SiO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	—	45,0–45,3	33,1–34,5	4,4–5,1	15,6–17,2	—	—
			Außerdem bisweilen CaO					
Sodalith	3Na <sub>2</sub> Al <sub>2</sub> (SiO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> + 2NaCl	—	37,0	31,8	—	19,2	—	—
			Außerdem 4,7% Na an 7,3% Cl geb. Oft kleine Mengen K <sub>2</sub> O, auch CaO, Na <sub>2</sub> O, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>					
3. Augit und Hornblende:								
Augit (Pyroxen)	CaMg(SiO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	—	47–52	4–9	—	—	20–23	13–16
			Enthält fast stets FeO, keine Alkalien					
Hornblende (Amphibol)	Ebenso	—	38–52	4–15	—	—	10–12	12–23
			Enthält meist FeO, Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> und Alkalien (bis 11%)					

4. Glimmergruppe: Kaliglimmer (Muscovit)	$K_2Al_2(SiO_3)_2$	46—50	25—35	8—12	—	—	—
		Daneben meist $Fe_2O_3$ (—88%), häufig etwas $Na_2O$ (—1,1%), bisweilen etwas $CaO$ , $MgO$					
Magnesiaglimmer (Biotit)	$MgAl_2(SiO_3)_2$	39—44	6—34	—	—	—	10—30
		Ausd. nat. $H_2O$ , $FeO$ (—23,4%), $Fe_2O_3$ (37,4%), häufig $K_2O$ (—10,6%), $Na_2O$ (—5,4%)					13,2
5. Cordierit (Dichroit)	$Mg_2Al_2(Si_2O_7)_4$	52,8	34,0	—	—	—	—
		Enthält stets etwas Eisenoxyd (—9%) und kleine Mengen $CaO$					—
6. Gemeiner Granat	$Ca_3Al_2(SiO_4)_3$	40,0	22,8	—	—	—	—
		Daneben fast immer $Fe_2O_3$ (—31,5%) und $MgO$					37,2
7. Olivin (Peridot)	$Mg_2SiO_4$	42,9	—	—	—	—	57,1
		Ein großer Teil der $MgO$ fast stets durch $FeO$ ersetzt (8—30% $FeO$ )					—
8. Epidot (Pistazit)		ca. 2	36—40	18—29	—	—	21—25
				Außerdem 7—17% $Fe_2O_3$			—
9. Turmalin		—	ca. 38	30—40	—	—	—
		Daneben meist grüße. Mengen (10—13%) $MgO$ , wenig $K_2O$ , $Na_2O$ , $CaO$ , $FeO$ u. $H_2O$					—
10. Chlorit		9—12	25—28	19—23	—	—	13—25
				Außerdem 15—28% $FeO$ und $MgO$			—
11. Talk und Serpentine: Talk (Speckstein)	$H_2Mg_3(SiO_4)_4$	4,8	63,5	—	—	—	31,7
				Außerdem bisweilen wenig $Al_2O_3$ und $FeO$			—
Serpentin	$H_2Mg_3(SiO_4)_2 + H_2O$	13,0	43,5	—	—	—	43,5
			Daneben meist $FeO$ (bis 10%), wenig $CaO$ , $Al_2O_3$ , $Fe_2O_3$				—
Glaukonit		5—15	47—58	—	3—9	—	—
		Ausd. 3—22% $FeO$ , oft $Al_2O_3$ (—10%), $Fe_2O_3$ (—22%) u. wenig $CaO$ (—2,4%)					—
12. Zeolithe: Mesotyp, a) Natrolith	$Na_2Al_2Si_3O_{10} + 2H_2O$	9,4	47,3	27,0	—	15,3	—
				Außerdem etwas $K_2O$ und $CaO$			—
b) Skolezit	$CaAl_2Si_3O_{10} + 3H_2O$	13,8	45,8	26,1	—	14,3	—
				Daneben etwas $K_2O$ und $Na_2O$			—
Analcim	$Na_2Al_2(SiO_2)_4 + 2H_2O$	8,2	54,4	23,3	—	14,1	—
				Daneben etwas $K_2O$ und $CaO$			—
Stilbit	$CaAl_2Si_3O_{10} + 5H_2O$	14,8	59,1	16,9	—	9,2	—
				Außerdem etwas $K_2O$ und $Na_2O$			—
13. Kaolin	$H_2Al_2(SiO_4)_2 + H_2O$	13,9	46,4	39,7	—	—	—
				Außerdem meist $K_2O$ , $Na_2O$ , $CaO$ , $MgO$ , $FeO$ , $Fe_2O_3$ und oft $CO_2$			—

1) 6—3 Moleküle Albit verbunden mit 1—2 Molekülen Anorthit.

2) 1 Molekül Albit verbunden mit 2—6 Molekülen Anorthit.

— Cordierit — Nephelin — Biotit — Sodalith — Labrador — Natrolith — Skolezit — Leucit — Analcim — Granat — Oligoklas — Epidot — Chlorit — Albit — Orthoklas — Stilbit — Augit — Hornblende.

h) *Nach dem Gehalt an Kieselerde* ( $\text{SiO}_2$ ) (Siliciumdioxidgehalt sinkt von ca. 68 bis auf ca. 25%): Albit — Orthoklas — Oligoklas — Talk — Stilbit — Leucit — Labrador — Analcim — Glauconit — Cordierit — Augit — Muscovit — Hornblende — Skolezit — Kaolin — Nephelin — Anorthit — Olivin — Biotit — Granat — Epidot — Turmalin — Chlorit.

### § 16.

**Das chemische Verhalten der Silikate.** In reinem Wasser leicht löslich sind nur gewisse Silikate, deren Vorkommen in der Natur noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen (wenn auch wahrscheinlich) ist, die sich aber auf künstlichem Wege leicht herstellen lassen: das *Kaliumsilikat* („Kaliwasserglas“) und das *Natriumsilikat* („Natronwasserglas“). Durch heißes Wasser wird aus den meisten *natürlichen Silikaten* etwas gelöst und dadurch dem ersteren eine alkalische Reaktion mitgeteilt. Erfolgt das Erhitzen mit Wasser unter Druck, so lösen sich die meisten Kristallwasser enthaltenden Silikate (Zeolithe, s. o.) auf, um beim Erkalten wieder auszukristallisieren; andere Silikate werden dadurch in einen in Wasser löslichen, alkalisch reagierenden, und in einen unlöslichen Teil zerspalten.

Auch gegen Säuren verhalten sich die verschiedenen Silikate sehr verschieden. Die in Wasser löslichen werden schon durch schwache Säuren, z. B. Kohlensäure, Weinsäure, Zitronensäure, mit Leichtigkeit zersetzt. Bei den übrigen erfolgt eine schnellere Zersetzung unter Abscheidung von Kieselsäure nur unter dem Einfluß stärkerer Säuren, z. B. von Salzsäure. Durch diese (im verdünnten Zustande) werden die Zeolithe schon bei gewöhnlicher Temperatur vollständig in Kieselsäure und Chlorverbindungen gespalten; auf Anorthit, Leucit u. a. wirkt erst konzentrierte Säure ein, während bei wieder anderen, z. B. bei Cordierit, Augit, Chlorit, Oligoklas, unter gewöhnlichem Druck die Zerlegung nur unvollständig erfolgt.

Trotz der Widerstandsfähigkeit der natürlichen Silikate gegen schwache Säuren bringt die *Kohlensäure* im Verein mit Wasser und Sauerstoff doch allmählich grofse Veränderungen in ihnen hervor. In den eisenoxydulhaltigen wird unter dem Einfluß des Luftsauerstoffs das Eisenoxydul in Eisenoxyd umgewandelt ( $2\text{FeO} + \text{O} = \text{Fe}_2\text{O}_3$ ) und dadurch der Zusammenhalt der Bestandteile gelockert. Kohlensäurehaltiges Wasser führt allmählich das Kalium und Natrium, das Calcium, Magnesium und Eisen der Silikate in lösliche Kohlensäure-Salze über, die dann durch das Wasser ausgewaschen und entfernt werden, während wasserhaltige Silikate (Zeolithe) zurückbleiben. Durch Berührung mit anderen Salzen werden ferner

Wechselzersetzungen herbeigeführt, die die Entstehung andersartiger Silikate zur Folge haben.

Diesen Vorgängen, deren Chemismus im folgenden noch eingehender besprochen werden wird, ist es zuzuschreiben, daß ein Teil der oben aufgeführten Silikate als Abkömmlinge eines anderen Teils derselben angesehen werden muß. So gehen z. B. der *Cordierit*, der *Turmalin* in *Glimmer* über. Von den Glimmern ist der *Kaliglimmer*, obwohl er bei seiner großen Spaltbarkeit durch mechanische Einflüsse in äußerst feine Blättchen zerteilt wird, äußerst widerstandsfähig, dagegen erleidet der *Magnesiaglimmer* eine Umwandlung in reine Magnesiumsilikate oder in Glieder der *Chloritgruppe*. Auch der *Chlorit* wird trotz seiner großen Spaltbarkeit nur schwer von den natürlichen Agentien angegriffen, wandelt sich jedoch allmählich unter Abscheidung von Kieselerde in Form von Quarz und Chaledon in Magnesiumkarbonat um. Im *Olivin* geht das Eisenoxydul durch Aufnahme von Sauerstoff in Eisenoxyd, der Rest in Serpentin, und dieser häufig in Magnesiumkarbonat oder in Magnesiumoxyd ( $MgO$ , „Brucit“) über.

Von den Gliedern der *Augitgruppe* zerfällt der gemeine *Augit* unter Abgabe von Calcium und Magnesium (in Form von Karbonaten, s. u.) und unter Aufnahme von Aluminium, Eisen und Kalium verhältnismäßig schnell in eine zerreibliche, meist Kaliumkarbonat und Calciumkarbonat enthaltende Masse, genannt „Grünerde“, die sich gewöhnlich in einen eisenreichen Ton umsetzt. Letzterer ist auch das schließliche Umwandlungsprodukt der an sich schwerer zersetzlichen *Hornblende*, aus der jedoch anfangs andere Silikate entstehen, als aus dem Augit (Epidot, Asbest, Glimmer, Chlorit).

Von den Feldspaten verhält sich der *Orthoklas* am widerstandsfähigsten, obwohl auch er unter dem Einfluß der natürlichen Agentien allmählich in Kaolin umgewandelt wird. Weit leichter verändern sich die *Plagioklase*, und zwar meist um so leichter, je mehr Calcium, um so schwieriger, je mehr Natrium sie enthalten. Besonders gern gehen sie in die wasserhaltigen *Zeolithe* über. Von allen natürlich vorkommenden Silikaten sind die Glieder der *Nephelingruppe* und die *Zeolithe* die unbeständigsten. Schon in trockener Luft geben sie einen Teil ihres Wassers ab, um ihn in feuchter Luft wieder aufzunehmen. Wasser und Kohlensäure entziehen ihnen leicht die Metalle der Alkalien und alkalischen Erden und lassen einfache Aluminiumsilikate (Tone) zurück. Unter dem Einfluß von Salzlösungen tauschen sie außerordentlich schnell ihre Metalle gegen die der Lösungen aus, ein Verhalten, das für die „Bodenabsorption“ von größter Bedeutung und bei deren Besprechung eingehender zu erörtern ist.

Die *Tonmineralien* entwickeln beim Anfeuchten einen eigentümlichen Geruch (Tongeruch). Im trockenen Zustande saugen sie sehr begierig Wasser auf. Mit Wasser angerührt bilden sie eine formbare (plastische) Masse, die beim Austrocknen hart und rissig wird. Der festen Zusammenlagerung der kleinen Tonteilchen wirkt die Anwesenheit gewisser Stoffe, namentlich von Pflanzenresten und von Calciumverbindungen entgegen. Auch lösliche Salze, z. B. Chlorverbindungen, können die dichte Lagerung zeitweilig, aber nicht auf die Dauer verhindern, weil sie der Auswaschung unterliegen, worauf dann ein um so festerer Zusammenschluß der Tonpartikel zu erfolgen pflegt. In reinem Wasser verteilt, bleiben die kleinen Tonteile außerordentlich lange schwebend. Ein Zusatz leicht löslicher Salze, z. B. von Sulfaten und Chloriden des Magnesiums, Calciums, Kaliums, Natriums, zu der trüben Flüssigkeit bewirkt das Zusammentreten der Teilchen zu Flocken, die unter Klärung des Gemisches sich dann schnell absetzen.

### § 17.

Die **kohlensauren Salze** oder **Karbonate** beteiligen sich gleichfalls in großem Umfang an der Bodenbildung, sowie auch an dem Aufbau tierischer Organismen. Die Knochen bestehen zu einem kleineren Teil, die Muschel- und Schneckengehäuse sowie die Eierschalen zum größeren Teil aus Calciumkarbonat.

**Kohlendioxyd, Kohlensäure, Karbonate. Chemischer Charakter.**  
*Chemisch* betrachtete man früher die *Karbonate* als Verbindungen von Metalloxyden mit Kohlendioxyd, die man als „Kohlensäure“ bezeichnete (§ 9). Das Kohlendioxyd, eine gasförmige Verbindung von 1 Atom Kohlenstoff mit 2 Atomen Sauerstoff:  $\text{CO}_2$ , wird bei der Verbrennung kohlenstoffhaltiger Körper, sowie bei deren Verwesung, Fäulnis und Gärung gebildet und ferner durch den tierischen Atmungsprozeß der atmosphärischen Luft zugeführt. Auf 1 Raumteil Sauerstoff + Stickstoff enthält die letztere 0,0003—0,0004 Raumteile Kohlendioxyd, oder es beträgt der Gehalt der atmosphärischen Luft an Kohlendioxyd 0,029 Volumprozent (0,044 Gewichtsprozent). Fast alle natürlichen Wässer enthalten Kohlendioxyd gelöst. Da die Bodenluft reicher an diesem Gase zu sein pflegt als die atmosphärische Luft, so ist auch der Kohlendioxydgehalt des unterirdischen Wassers größer als der des oberflächlich fließenden. Besonders reich an Kohlendioxyd sind gewisse Mineralquellen, die man als „Säuerlinge“ bezeichnet.

Da Wasser, worin Kohlendioxyd gelöst ist, einen säuerlichen Geschmack besitzt und blaue Pflanzenfarben in rote überführt, so ist man zu der Annahme berechtigt, daß es die wirkliche *Kohlensäure*  $\text{H}_2\text{CO}_3$  enthält, eine Verbindung von so geringer Beständigkeit, daß sie bereits beim Abdunsten des Wassers wieder in Kohlendioxyd und Wasser zerfällt:

$\text{H}_2\text{CO}_3 = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ . Als Salze dieser Säure sieht man die natürlich vorkommenden normalen und sauren (§ 9) Karbonate an.

Von den normalen Karbonaten lösen sich nur die der Alkalimetalle in reinem Wasser, die sauren sind sämtlich löslich.

1. *Karbonate der Alkalimetalle.* *Kaliumkarbonat* findet sich in der Natur als Bestandteil des Boden- und Flußwassers, *Natriumkarbonat* als Gemenge von normalem und saurem Salz, außerdem als Belag („Ausschwitzung“, „Efflorescenz“) auf natriumhaltigen Gesteinen und Böden und als („Trona“ genannter) Rückstand bei der Austrocknung der sogenannten „Natronseen“. *Ammoniumkarbonat*<sup>1)</sup> findet sich in manchen Guanos; es entsteht bei der Zersetzung des im tierischen Harn enthaltenen Harnstoffs (daher Bestandteil des Stalldüngers), wie auch bei der Fäulnis anderer stickstoffhaltiger Stoffe. Die atmosphärische Luft enthält Spuren dieses flüchtigen Körpers, die mit den atmosphärischen Niederschlägen dem Boden zugeführt werden. Das für die Bodenbildung weitaus bedeutsamste kohlen-saure Salz ist:

2. Das *normale Calciumkarbonat*  $\text{CaCO}_3$ . In völlig reinem Zustand liefert es bei seiner Zersetzung (§ 4) 56% Calciumoxyd ( $\text{CaO}$ ) und 44% Kohlendioxyd ( $\text{CO}_2$ ). In der Natur kommt es hauptsächlich in folgenden Mineralien vor: *Kalkspat* (kristallisiert), Marmor und Kalkstein (kristallinisch oder dicht), ferner Tropfstein, Kalktuff und Kreide. *Tropfstein* findet sich in Kalksteinhöhlen und hat sich hier aus wässriger Lösung in eigentümlichen Formen („Stalaktiten“ und „Stalagmiten“) ausgeschieden. Der *Kalktuff* ist als ein Absatz von Calciumkarbonat aus Wasser unter der Mitwirkung von Kohlensäure entziehenden Pflanzen anzusehen (s. u.), und die *Kreide* verdankt zum großen Teil mikroskopischen tierischen Wesen ihren Ursprung.

3. Des weiteren beteiligen sich an der Bodenbildung der *Magnesit* (Talkspat), ein normales *Magnesiumkarbonat*  $\text{MgCO}_3$ , im reinen Zustande 47,6% Magnesia ( $\text{MgO}$ ) und 52,4% Kohlendioxyd ( $\text{CO}_2$ ), meistens aber noch etwas Eisen und andere Metalle enthaltend. Größere Bedeutung besitzt ein Mineral, das als ein Doppelkarbonat von Magnesium und Calcium angesehen werden kann: der *Dolomit* („Bitterkalk“), gewöhnlich zusammen-

<sup>1)</sup> Das namentlich bei der Zersetzung stickstoffhaltiger pflanzlicher und tierischer Stoffe sich bildende Ammoniak vereinigt sich mit Säuren zu Salzen, in denen man das Vorhandensein einer festgefügten Atomgruppe (eines „Radikals“, § 8) genannt Ammonium ( $\text{NH}_4$ ) annimmt, z. B.:  $\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4\text{Cl}$  (Chlor-

Ammoniak Chlor-  
wasserstoffsäure

ammonium) oder  $\text{NH}_3 + \text{HNO}_3 = \text{NH}_4\text{NO}_3$  (Salpetersaures Ammonium). Die

Salpetersäure

Ammoniumverbindungen zeigen ein sehr ähnliches Verhalten wie die Kalium- und Natriumverbindungen.




gesetzt nach der Formel  $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{MgCO}_3$ , sehr oft aber auch mehr Calciumkarbonat enthaltend und dann als *dolomitischer Kalk* bezeichnet. Vielfach verbreitet ist endlich ein *Ferrokarbonat* (§ 9), der *Spateisenstein* oder *Eisenspat*  $\text{FeCO}_3$  (bei anderer Struktur *Sphärosiderit* genannt). In gewissen, durch Mangel an *Luftsauerstoff ausgezeichneten* Böden finden sich nicht selten weisse nester- oder schichtenförmige Ablagerungen von reinem Eisenkarbonat.

### § 18.

**Das chemische Verhalten der Karbonate.** In reinem Wasser sind die normalen Karbonate so gut wie unlöslich. Kohlensäurehaltiges Wasser löst dagegen auch den härtesten Kalkstein allmählich auf, indem dadurch das normale kohlensaure Salz in ein lösliches saures Karbonat übergeführt wird:  $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{H}_2\text{Ca}(\text{CO}_3)_2$ . Ein gleichzeitiger Gehalt des Wassers an gewissen Salzen, z. B. an Natrium- oder Magnesiumsulfat oder Magnesiumchlorid, kann die Löslichkeit noch dadurch erhöhen, daß diese zum Teil mit dem Karbonat eine chemische Umsetzung erleiden, wobei das auch in reinem Wasser weit leichter lösliche Calciumsulfat oder das sehr leicht lösliche Calciumchlorid entsteht:  $\text{MgSO}_4 + \text{CaCO}_3 = \text{CaSO}_4 + \text{MgCO}_3$ . (Umgekehrt aber kann aus Magnesiumkarbonat und Calciumsulfat durch Wechselzersetzung<sup>1)</sup> auch Calcium-

<sup>1)</sup> *Wechselzersetzung.* Wenn Salze verschiedener Säuren und Metalle miteinander in Berührung kommen, so gehen sie entweder vollständig oder teilweise in neue Salze über; *vollständig*, wenn eines der neu entstehenden Salze aus dem Bereich der chemischen Einwirkung entfernt wird, z. B. ein sich verflüchtiger oder ein von den vorhandenen Agentien nicht mehr angreifbarer, unlöslicher Körper ist, — *unvollständig*, wenn auch die neu entstandenen Salze in Lösung bleiben und daher fähig sind, sich gegenseitig und mit den ursprünglichen Salzen chemisch zu beeinflussen. Bringt man Lösungen von Natriumchlorid und Silbernitrat zusammen, so vollzieht sich eine vollständige Umsetzung nach der Gleichung:  $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 = \text{AgCl} + \text{NaNO}_3$ , weil das Silberchlorid  $\text{AgCl}$  ein unlöslicher Körper und daher der chemischen Einwirkung der vorhandenen Stoffe entzogen ist. Sind dagegen die neu entstehenden Salze löslich und daher chemischer Einwirkung unterworfen, so bleibt ein gewisser Teil der ursprünglichen Salze, dessen GröÙe sich nach dem Grade der chemischen Verwandtschaft und nach der vorhandenen Masse der verschiedenen Salzbestandteile richtet, unverändert. Tritt z. B. zu einer Lösung von Natriumchlorid eine solche von Calciumsulfat, so enthält die Flüssigkeit folgende vier Salze: Natriumchlorid, Natriumsulfat, Calciumchlorid, Calciumsulfat, die sich, wie man zu sagen pflegt, „im chemischen Gleichgewicht halten“. Wird durch Entfernung oder durch Unlöslichwerden eines Salzes dieses Gleichgewicht gestört, so schreitet die Umsetzung solange weiter, bis wieder Gleichgewicht herrscht. Dieses Verfahren ist, wie wir später erkennen werden, für die Bildung, die Eigenschaften und namentlich für das „Absorptionsvermögen“ des Bodens von großer Bedeutung.

karbonat und Magnesiumsulfat entstehen, wenn Calciumsulfat gegenüber dem Magnesiumkarbonat im Überschuss vorhanden ist.) Infolge der Löslichkeit der Karbonate in kohlensäurehaltigem Wasser enthalten alle mit Kalkgesteinen in Berührung kommenden natürlichen Wässer Karbonate; da aber das saure Calciumkarbonat schon beim Stehen seiner Lösung an der Luft unter Abscheiden von Kohlendioxyd und Wasser sich zersetzt, so bilden sich aus solchen Wässern leicht Absätze von normalem Calcium- (oder Magnesium-) Karbonat:  $\text{H}_2\text{Ca}(\text{CO}_3)_2 = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{CaCO}_3$ . Ferrokarbonat verhält sich gegen kohlensäurehaltiges Wasser ebenso wie Calcium- und Magnesiumkarbonat und findet sich daher gleichfalls als saures Salz sehr häufig in den natürlichen Wässern („Eisenquellen“), gelöst aber nur solange, als diese unterirdisch fließen. Sobald sie mit dem Luftsauerstoff in Berührung kommen, tritt eine Oxydation des Eisens und eine Spaltung des Salzes unter Abscheidung von Kohlendioxyd ein, die nach der Gleichung:



verläuft und sich durch die Bildung eines schillernden Häutchens auf der Oberfläche und durch einen rotgefärbten Absatz von Eisenschlamm („Eisenocker“) auf dem Grunde des Wassers bemerklich macht. Durch *starkes Erhitzen* werden die Karbonate zerlegt, indem Kohlendioxyd entweicht und Metalloxyd („gebrannter Kalk“, „gebrannte Magnesia“) zurückbleibt. Ferrokarbonat setzt sich schon bei gewöhnlicher Temperatur an der Luft unter Verlust von Kohlendioxyd in Eisenoxyd oder Eisenhydroxyd um  $2\text{FeCO}_3 + \text{O} = \text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{CO}_2$ ;  $2\text{FeCO}_3 + \text{O} + 3\text{H}_2\text{O} = \text{Fe}_2(\text{OH})_6 + 2\text{CO}_2$ .

Selbst schwache Säuren, wie Essigsäure, Zitronensäure, Humussäuren, sind imstande, die Karbonate unter Abscheidung von Kohlendioxyd und Bildung eines Salzes der einwirkenden Säure zu zerlegen. Dabei erweist sich das Magnesiumkarbonat schwerer zersetzbar als die Calciumkarbonate.<sup>1)</sup>

Die Wirkung, die die Karbonate, namentlich das Calciumkarbonat, auf organische Stoffe ausüben, wird später erörtert werden.

## § 19.

**Die phosphorsauren Salze oder Phosphate.** Die Phosphorsäure  $\text{H}_3\text{PO}_4$  oder  $\text{PO}(\text{OH})_3$ , nach früherer Anschauung  $\text{P}_2\text{O}_5$ ,  $3\text{H}_2\text{O}$  (§ 9), bildet drei Reihen von Salzen (Phosphaten).

<sup>1)</sup> Die Dolomite werden selbst von stärkeren Säuren, z. B. von Salzsäure, erst nach feinem Zerreiben oder bei höherer Temperatur unter Aufbrausen (Entweichen von Kohlendioxyd) zersetzt, was für die Erkennung der sogenannten dolomitischen Mergel wichtig ist.

Die in der Natur vorkommenden Phosphate sind fast ausnahmslos normale Salze.


1. Am verbreitetsten ist das *Calciumphosphat*  $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ , im reinen Zustande 45,8 % Kalk ( $\text{CaO}$ ) und 54,2 % Phosphorsäureanhydrid ( $\text{P}_2\text{O}_5$ ) enthaltend. Ein Doppelsalz von Calciumphosphat und Calciumchlorid (oder auch Calciumfluorid) ist der *Apatit*:  $3\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{CaCl}_2$ , mit einem durchschnittlichen Gehalt von 41–42 % Phosphorsäureanhydrid ( $\text{P}_2\text{O}_5$ ). Der Apatit ist als Nebenbestandteil zahlreicher Mineralien in mikroskopischer Verteilung außerordentlich verbreitet und kommt auch in selbständigen Ablagerungen von beträchtlicher Ausdehnung vor. Calciumphosphat, vielleicht stets aus dem Apatit als „Urphosphat“ mittelbar oder unmittelbar hervorgegangen, bildet ferner den Hauptbestandteil zahlreicher, den verschiedensten Schichten der Erdrinde angehöriger Mineralien, so der *Phosphorite von Estremadura*, von der *Lahn*, der sogenannten *Koprolithe*, der *Delme-* und *Lot-Phosphate*, der *Pseudokoprolithe*, der *Karolina-* und *Floridaphosphate*, der *Algierphosphate*, der *belgischen Phosphatkreide*, der *Sommephosphate*, der *Navassa-*, *Sombrero-*, *Curaçaophosphate*, endlich der *Guanoarten*: *Peru-*, *Baker-*, *Howland-*, *Malden-*, *Jarvis-Guano* u. a. m.

Der mineralische Teil der *Knochen*, *Gräten* und *Zähne* besteht fast ausschließlich aus Calciumphosphat, außerdem ist dieses Salz in anderen tierischen Körperteilen, sowie in den festen Ausscheidungen des Tierleibes in verhältnismäßig großen Mengen vertreten, und zweifellos ist ein Teil der soeben genannten Phosphatmineralien, namentlich die als „Guano“ und als „Koprolithe“ bezeichneten, unmittelbar aus der Verwesung von tierischen Stoffen hervorgegangen. Diesen verdanken auch die in den *Korallen*, in der *Kreide* und manchen *Mergeln* sich findenden Phosphate ihr Dasein. Als Nebenbestandteile finden sich meist Eisen, Aluminium, Magnesium als Oxyde, Karbonate oder Phosphate.

2. Ein Aluminiumphosphat ist das Mineral *Wawellit*. Sehr große Verbreitung besitzen weiterhin die Eisenphosphate, und zwar als *Vivianit* (Blaueisenerde), ein wasserhaltiges Ferrophosphat von der Zusammensetzung:  $\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2 + 8\text{H}_2\text{O}$ , welches namentlich in Niedermoorböden und in humosen Tonböden gefunden wird, ursprünglich eine weiße Farbe hat, aber beim Liegen an der Luft infolge teilweiser Oxydation sich bläut und ferner als Eisenoxydphosphat (Ferriphosphat)  $\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_3 + 4\text{H}_2\text{O}$  (auch die einfachere Formel  $\text{FePO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$  wird verwendet) oder „basisches“<sup>1)</sup> Ferriphosphat, z. B.:  $\text{Fe}_2(\text{PO}_4)_2$ ,  $\text{Fe}_2(\text{OH})_2$  (oder auch  $\text{FePO}_4$ ,  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ), namentlich als Bestandteil des Raseneisensteins (s. u.).

<sup>1)</sup> Die „basischen Salze“ (der neueren chemischen Ausdrucksweise) kann man als Verbindungen eines normalen Salzes mit einem Hydroxyd ansehen.

**§ 20. Chemisches Verhalten der natürlichen Phosphate.** In reinem Wasser lösen sich die natürlich vorkommenden Phosphate nur sehr schwierig. Ein Gehalt des Wassers an gewissen Salzen, z. B. an Natriumchlorid, Natriumnitrat, erhöht die Löslichkeit, noch mehr ein Gehalt des Wassers an Kohlensäure. Übrigens verhalten sich die verschiedenen Phosphate gegenüber diesen Lösungsmitteln sehr verschieden. Stärkere Mineralsäuren, wie Salzsäure und Schwefelsäure, lösen alle Phosphate leicht auf unter Bildung von saurem Phosphat und einem Salz der verwendeten Säure, z. B.:



In gleicher Weise wirken freie Humussäuren auf die normalen Phosphate ein, wenn sie in großer Menge vorhanden sind, wie das z. B. bei den sogenannten Hochmoorböden (s. u.) der Fall ist.

## § 21.

**Die schwefelsauren Salze oder Sulfate. Chemischer Charakter und Vorkommen.** Die Schwefelsäure  $\text{H}_2\text{SO}_4$  oder  $\text{SO}_2(\text{OH})_2$  bildet, da sie 2 durch Metalle vertretbare Wasserstoffatome enthält, normale und saure Salze. Nur die normalen Salze spielen in der Natur eine Rolle. An der Bodenbildung beteiligt sich nur das Calciumsulfat, während schwefelsaure Salze des Kaliums, Natriums und Magnesiums in natürlichen Wässern gelöst und in manchen Salzablagerungen angehäuft vorkommen. So finden sich über dem gewaltigen Steinsalzlager des Magdeburg-Harzer Beckens (Stassfurt) abgesehen von reinem Calciumsulfat die folgenden, zweifellos aus verdunstendem Meerwasser abgeschiedenen und durch chemische Einwirkung aufeinander allermeist in Doppelsalze und noch kompliziertere Verbindungen umgewandelten Sulfate: *Kieserit*, wasserhaltiges Magnesiumsulfat:  $\text{MgSO}_4, 2\text{H}_2\text{O}$ ; *Schönit*, ein wasserhaltiges Doppelsalz von Magnesiumsulfat und Kaliumsulfat:  $\text{MgSO}_4, \text{K}_2\text{SO}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$ ; *Krugit*, eine chemische Verbindung von Magnesiumsulfat, Calciumsulfat, Kaliumsulfat und Wasser:  $\text{MgSO}_4, 4\text{CaSO}_4, \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ; *Polyhalit*, eine Verbindung derselben Sulfate in etwas anderen Mengenverhältnissen:  $\text{MgSO}_4, 2\text{CaSO}_4, \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ; *Kainit*, eine chemische Verbindung von Magnesiumsulfat, Kaliumsulfat, Magnesiumchlorid und Wasser:  $\text{MgSO}_4, \text{K}_2\text{SO}_4, \text{MgCl}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ ; *Glauberit*, ein wasserfreies Doppelsalz von Natriumsulfat und Calciumsulfat:  $\text{Na}_2\text{SO}_4,$

<sup>1)</sup> Man nennt diesen Prozeß das „Aufschließen“ der Phosphate und benutzt ihn, um leicht lösliche Phosphorsäuredüngemittel zu gewinnen. Das Gemenge von Monocalciumphosphat und Calciumsulfat bezeichnet man in der Düngertechnik als „Superphosphat“.

$\text{CaSO}_4$  u. a.<sup>1)</sup> Das verbreitetste Sulfat ist das *Calciumsulfat*:  $\text{CaSO}_4$ , im wasserfreien Zustande als *Anhydrid*, im wasserhaltigen ( $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ ) als *Gips* (öfters im Gemenge mit Calciumkarbonat als „Gipsmergel“) auftretend. Im reinen Zustande enthält das Anhydrid 41,2 % Kalk ( $\text{CaO}$ ) und 58,8 % Schwefelsäure ( $\text{SO}_3$ ), der Gips 32,6 % Kalk und 46,5 % Schwefelsäure neben 20,9 % Wasser.

§ 22. *Chemisches Verhalten der Sulfate. — Reduktionsprozesse.*


Während die Sulfate des Kaliums, Natriums und Magnesiums durchweg leicht löslich sind, braucht das Calciumsulfat ziemlich große Mengen von Wasser — etwa 400 Teile auf 1 Teil Gips — zu seiner Lösung; die Gegenwart von freien Säuren und von gewissen Salzen, wie Natriumchlorid, Ammoniumsalze, befördert die Löslichkeit. Alle Sulfate sind schwer zersetzlich, die Kristallwasser enthaltenden verlieren jedoch dasselbe beim Glühen („Calcinieren“), der gelinde gebrannte und pulverisierte Gips nimmt bei Zusatz von Wasser dieses wieder auf und erhärtet damit steinartig; auch erleiden unter gewissen Verhältnissen die Sulfate unter dem Einfluß kohlenstoffhaltiger, pflanzlicher oder tierischer Stoffe eine eigentümliche Umwandlung, die man als *Reduktion* bezeichnet. Unter diesem Ausdruck faßt man eine große Anzahl von chemischen Vorgängen zusammen, die sämtlich auf dem Austritt von Sauerstoff aus seinen Verbindungen beruhen. In Zersetzung begriffene organische, d. i. kohlenstoff- und allermeist auch wasserstoffhaltige Körper, haben das Bestreben ihren Kohlenstoff in Kohlendioxyd, ihren Wasserstoff in Wasser umzusetzen. Geht die Zersetzung unter Abschlufs oder auch nur unter mangelhaftem Zutritt der atmosphärischen Luft vor sich, so entnehmen sie den zu jener Umwandlung nötigen Sauerstoff sauerstoffhaltigen Verbindungen ihrer Umgebung und führen dadurch eine „Reduktion“ der letzteren herbei. Befindet sich z. B. Calciumsulfat unter den erwähnten Bedingungen in Berührung mit verwesenden Pflanzenresten, so wird es durch Entziehung eines Sauerstoffgehaltes zu *Schwefelcalcium* oder *Calciumsulfid* reduziert:  $\text{CaSO}_4 - 4\text{O} = \text{CaS}$ . Die Sulfide erleiden schon in Berührung mit schwachen Säuren, z. B. mit Kohlensäure, eine weitere Umwandlung, deren Endprodukte Schwefelwasserstoff, jenes bekannte giftige, den Geruch faulender Eier besitzende Gas, und ein Karbonat sind, z. B.:  $\text{CaS} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{S}$ . Da bei der Zersetzung

Calcium- Schwefel-  
karbonat wasserstoff

---

<sup>1)</sup> Von diesen Sulfaten bildet besonders der Kainit ein sehr geschätztes Kalidüngemittel. Der in den Handel gebrachte Kainit ist jedoch nicht das reine Salz, sondern ein Gemenge von diesem und anderen Verbindungen, namentlich von Natriumchlorid. Er enthält daher durchschnittlich nur 12,5 % Kali ( $\text{K}_2\text{O}$ ) (entsprechend ungefähr 23 % Kaliumsulfat), während sich aus der Zusammensetzung des reinen Kainits ein Gehalt von ca. 23 % Kali berechnet.

pflanzlicher oder tierischer Stoffe regelmäfsig Kohlendioxyd bezw. Kohlensäure entsteht, so ist die Reduktion der Sulfate in der Natur fast stets mit dem Auftreten von Schwefelwasserstoff verbunden. Sind neben den verwesenden Stoffen und Sulfaten noch Eisenverbindungen zugegen, so kann sich anstatt des Schwefelwasserstoffs Schwefeleisen bilden, ein Vorgang, der sich durch folgende chemische Gleichung ausdrücken läfst:



Zweifach-  
Schwefeleisen

Von dieser Verbindung, die man auch *Schwefelkies* oder *Eisenkies* nennt, wird gleich noch die Rede sein. In Berührung mit anderen Salzen führen die Sulfate chemische Umsetzungen herbei, die für die Pflanzenernährung von hohem Wert sein können. Z. B. kann durch Einwirkung von Calciumsulfat auf das leicht flüchtige Ammoniumkarbonat das nicht flüchtige Ammoniumsulfat neben Calciumkarbonat entstehen:  $\text{CaSO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 = (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{CaCO}_3$ . (Andere Umwandlungen s. § 18.) Auf schwer lösliche Kaliumsilikate kann Calciumsulfat in der Weise einwirken, daß leicht lösliches Kaliumsulfat entsteht und das Calcium an die Stelle des Kaliums im Silikat tritt.


### § 23.

**Die Schwefelverbindungen oder Sulfide.** *Chemischer Charakter und Verhalten.* Der Schwefel verbindet sich in verschiedenen Mengenverhältnissen mit Wasserstoff und mit zahlreichen Metallen. Eine der bekanntesten Verbindungen ist das Wasserstoffsulfid  $\text{H}_2\text{S}$ , auch Schwefelwasserstoff genannt, ein brennbares, in Wasser ziemlich leicht lösliches, unangenehm (nach faulenden Eiern) riechendes Gas, das namentlich bei der Fäulnis schwefelhaltiger organischer Stoffe sich entwickelt (s. auch § 22). Von den Metall-Schwefel-Verbindungen besitzt für den Boden eine gröfsere Bedeutung nur das *Eisenbisulfid*  $\text{FeS}_2$ , auch „Zweifachschwefeleisen“ genannt. Es findet sich in der Natur als das Mineral *Pyrit* oder „Eisenkies“ (auch „Schwefelkies“) oder in anderer Kristallform als *Markasit* oder „Strahlkies“. Über seine Entstehung ist unmittelbar vorher gesprochen worden (§ 22). In Berührung mit feuchter Luft geht das Eisenbisulfid unter Aufnahme von Sauerstoff und Wasser in Ferrosulfat und freie Schwefelsäure über:  $\text{FeS}_2 + \text{H}_2\text{O} + 7\text{O} = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$ . Das Ferrosulfat, in Verbindung


Eisen-    Schwefel-  
oxydsulfat    säure

mit 7 Molekulan Kristallwasser auch „Eisenvitriol“ genannt, geht durch weitere Aufnahme von Sauerstoff bei Anwesenheit von freier Schwefelsäure in Ferrisulfat über:  $2\text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{O} = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$ . Kommen diese Oxydationsprodukte des Schwefeleisens mit Kalk ( $\text{CaO}$ ) oder

Calciumkarbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) zusammen, so finden weitere Umsetzungen statt, deren Endprodukte Calciumsulfat und Eisenoxyd sind:



Das Ferrokarbonat setzt sich an der Luft sehr bald in Kohlendioxyd und Ferrioxyd um (s. § 18):



Da sowohl die freie Schwefelsäure wie die Eisensulfate heftige Pflanzengifte sind, so ist das soeben beschriebene Verhalten für die landwirtschaftliche Benutzung eisensulfidhaltigen Bodens von großer Bedeutung.

## § 24.

**Oxyde und Hydroxyde.** In Betracht kommen hier nur die entsprechenden Verbindungen des Eisens. (Über ihre chemische Konstitution s. § 8, Anmerkung.) Als eine chemische Verbindung von Eisenoxydul ( $\text{FeO}$ ) und Eisenoxyd ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) läßt sich ein weit verbreitetes Mineral, das *Magneteisen*:  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  ( $= \text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3$ ) ansehen (S. 20). Durch Aufnahme von Sauerstoff geht es in Eisenoxyd, bei gleichzeitiger Gegenwart von Wasser auch in Eisenhydroxyd über.

Bereits früher (s. § 18) ist die Abscheidung von Eisenhydroxyd („Eisenoxydhydrat“) aus Wässern besprochen worden, die kohlen-saures Eisenoxydul enthalten. Derartige gewöhnlich nesterartig auftretende Absätze, die meist noch Calciumkarbonat, Tonmineralien und andere Silikate, außerdem etwas Eisenoxyd enthalten, bezeichnet man als *Ocker* oder *Eisenocker*. Ähnlichen Ursachen und wahrscheinlich auch der Lebenstätigkeit kleiner Algen verdanken zahlreiche Eisenhydroxyd-Ablagerungen ihre Entstehung, die man unter dem Namen *Limonit*, „Raseneisenstein“, „Wiesenerz“, „Sumpferz“ zusammenfaßt. Sie kommen als vereinzelte oder zu Knollen verwachsene, etwa erbsengroße Körner im Boden dicht unter der Oberfläche verteilt vor, bilden bisweilen aber auch feste Bänke von großer Ausdehnung. Neben ihrem Hauptbestandteil enthalten sie nicht selten recht beträchtliche Mengen von Eisenphosphat (s. auch § 19, 2), Eisensilikat, Tonmineralien und organischen Stoffen pflanzlichen Ursprungs.

Im Anschluß an die bisher besprochenen Mineralien, die man mit wenigen Ausnahmen zu den bodenbildenden rechnen darf, soll noch einiger Mineralgruppen Erwähnung geschehen, die zwar nicht zu den eigentlichen

Bodenbildnern zu rechnen sind, denen aber bei den innerhalb des Bodens sich abspielenden Vorgängen eine grofse Bedeutung zukommt, das sind die Chloride und Nitrate.

### § 25.

**Die Chlorverbindungen oder Chloride.** Das Element Chlor (Cl) vereinigt sich direkt mit Metallen zu Verbindungen, die man auch als Salze der Chlorwasserstoffsäure HCl (gewöhnlich „Salzsäure“ genannt), ansehen kann (§ 10). Die gröfste Verbreitung hat von den Chlorverbindungen das Chlornatrium oder Natriumchlorid NaCl mit 39,3% Natrium und 60,7% Chlor, unter dem Namen *Steinsalz* oder Kochsalz teils in mächtigen Lagern, teils in feiner Verteilung in allen Böden, teils aufgelöst in grofsen Mengen im Meereswasser, in geringeren wohl in allen natürlichen Gewässern vorkommend. Aufser Chlornatrium enthalten die letzteren noch andere Chloride, so namentlich *Kaliumchlorid*, *Magnesiumchlorid*, *Calciumchlorid*. Über dem Stäfsfurter Steinsalzlager finden sich neben Sulfaten (§ 21) auch Chloride, wie jene oftmals zu Doppelsalzen verbunden. Die wichtigsten sind die folgenden:

*Sylvin*, reines Kaliumchlorid: KCl mit 52,5% Kalium (entsprechend 68,2% Kali:  $K_2O$ ) und 47,5% Chlor, ferner

*Carnallit*, ein wasserhaltiges Doppelsalz von Kaliumchlorid und Magnesiumchlorid:  $KCl, MgCl_2 + 6H_2O$  mit 26,9% Kaliumchlorid,<sup>1)</sup> 34,2% Magnesiumchlorid und 38,9% Wasser.

**§ 26. Das chemische Verhalten der Chloride.** Sämtliche Chloride sind in Wasser leicht löslich. Einige von ihnen, wie das Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, sind sehr *hygroskopisch* (d. h. Wasser in flüssigem und dampfförmigem Zustande wird von ihnen mit grofser Begier angezogen und festgehalten).<sup>2)</sup> In Berührung mit anderen Salzen erleiden sie zahlreiche Wechsellagerungen, und hierauf ist es jedenfalls zurückzuführen,

<sup>1)</sup> Dieser Gehalt des *reinen* Salzes entspricht einem Gehalt an Kali ( $K_2O$ ) von 17,0%. Der Chlorkaliumgehalt des zu Düngungszwecken in den Handel kommenden, mit allerlei Nebensalzen (Magnesiumsulfat, Calciumsulfat, Natriumchlorid) verunreinigten Carnallits entspricht nur etwa 9% Kali ( $K_2O$ ).

<sup>2)</sup> Selbst ein geringer Gehalt der als Düngemittel verwendeten Salze (Carnallit, Kainit) an diesen hygroskopischen Chloriden führt ein Feuchtwerden derselben bei längerem Lagern herbei. Das aus der Luft aufgenommene Wasser geht dann unter steinartiger Erhärtung der gemahlenden Düngesalze mit anderen Bestandteilen derselben chemische Verbindungen ein. Diesem unliebsamen Verhalten wird nach einem von M. Fleischer angegebenen Verfahren durch Beimengung geringer Mengen von trockenem Torfmull (2,5 auf 100 Teile) wirksam entgegengewirkt („Torfkainit“, „Torfcarnallit“).




wenn manche Chlorverbindungen lösend auf schwerlösliche Stoffe einwirken. Unter der Einwirkung von Kochsalz auf Kaliumsilikat tritt Natrium aus dem Kochsalz an Stelle eines Teils des Silikatkaliums, während dieses als Kaliumchlorid in Lösung geht; Calciumphosphat wird durch Kaliumchlorid oder Natriumchlorid zum Teil in der Weise zerlegt, daß neben Calciumchlorid leicht lösliches Kalium- oder Natriumphosphat entsteht. Nicht anders ist die Wirkung dieser Chloride auf Calciumkarbonat:  $\text{CaCO}_3 + 2\text{NaCl} = \text{CaCl}_2 + \text{Na}_2\text{CO}_3$  u. s. w. Es ist aber hervorzuheben, daß alle diese Vorgänge nur sehr langsam und nie bis zur vollen Umsetzung zu erfolgen pflegen (§ 18, Anm.). Die mechanische Wirkung, die die Chloride auf Tonmineralien ausüben, ist früher (§ 16) besprochen worden.

### § 27.

**Die salpetersauren Salze oder Nitrate.** Die Salpetersäure  $\text{HNO}_3$  oder  $\text{NO}_2 \cdot \text{OH}$  bildet nur eine Reihe von Salzen (Nitrate). Von den bekannten Nitraten findet sich das *Natriumnitrat*  $\text{NaNO}_3$  („Natronsalpeter“) in einem in den regenlosen Landstrichen von Chile und Peru in großen Lagern vorkommenden Mineral, der „Caliche“, das wahrscheinlich aus der Verwesung gewaltiger Tangmassen unter Mitwirkung der Meersalze hervorgegangen ist. Neben ihrem Hauptbestandteil enthält die Caliche alle Meersalze und organische Substanzen. Das von diesen Beimengungen möglichst befreite Material kommt unter dem Namen *Chilisalpeter* in den Handel. Auch *Kaliumnitrat* (Kalisalpeter), ferner *Calciumnitrat* und *Magnesiumnitrat* finden sich stellenweise als Gesteinsausschwitzungen in Ostindien. Außerdem sind kleine Mengen von Nitraten in der Luft und in den allermeisten Böden und natürlichen Wässern enthalten.

**§ 28. Entstehung der Nitrate.** In der atmosphärischen Luft bilden sich bei jedem Blitzschlag durch direkte Vereinigung von Stickstoff, Sauerstoff und den Elementen des Wassers kleine Mengen von Salpetersäure, die mit dem gleichfalls in der Luft vorhandenen (aus der Zersetzung tierischer und pflanzlicher Stoffe stammenden) Ammoniak zu Ammoniumnitrat sich vereinigen:  $\text{HNO}_3 + \text{NH}_3 = \text{NH}_4\text{NO}_3$ . Durch die atmosphärischen Niederschläge wird das Salz dem Boden und den Gewässern zugeführt. Eine weit stärker fließende Quelle der für die Pflanzenernährung besonders wichtigen Nitrate bietet die Zersetzung stickstoffhaltiger pflanzlicher und tierischer Stoffe. Dieselben enthalten Stickstoff in organischer Verbindung, d. h. an Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff gebunden. Bei dem Zerfall, dem der pflanzliche und tierische Körper nach seinem Absterben unterliegt, wird der Stickstoff zum Teil als freier Stickstoff ausgeschieden, zum Teil in Ammoniak ( $\text{NH}_3$ ) oder in Salpetersäure ( $\text{HNO}_3$ ) umgewandelt. Nach dem jetzigen Stand unseres Wissens muß man annehmen,

dafs jene Zersetzungsvorgänge, die man auch als *Fäulnis* und *Verwesung* bezeichnet, durch kleinste Lebewesen (Mikroorganismen) und zwar durch Bakterien oder Spaltpilze hervorgerufen werden. Je nachdem die natürlichen Bedingungen der Entwicklung dieser oder jener Bakterienart besonders günstig sind, tritt höchstwahrscheinlich der Stickstoff vorwiegend oder ganz in dieser oder jener Form aus. Das Vorhandensein von Luftsaurestoff und von Karbonaten des Kaliums, Natriums, Calciums oder Magnesiums befördert die Entstehung von Nitraten, auch das bei Luftabschluß oder mangelhaftem Luftzutritt vornehmlich sich bildende Ammoniak kann unter diesen Bedingungen durch einen neuerdings entdeckten Spaltpilz<sup>1)</sup> oxydiert und in salpetersaures Salz übergeführt werden, z. B.:



**§ 29.** *Das chemische Verhalten der Nitrate.* Sämtliche Nitrate sind in Wasser leicht löslich. Auf andere Salze üben sie ähnliche Wirkungen aus wie die Chloride (s. o.) und sind daher wie diese imstande, schwer lösliche Stoffe, wenn auch immer nur in geringem Maße, in Lösung zu bringen. Unter dem Einfluß gewisser Bakterien, die auf die Nitrate sauerstoffentziehend („reduzierend“) wirken, kann die Salpetersäure der Nitrate unter Abscheidung freien Stickstoffs zersetzt werden:  $2\text{HNO}_3 - 5\text{O} = \text{H}_2\text{O} + 2\text{N}$ .

## B. Die bodenbildenden Gesteine.

### § 30.

**Einteilung.** Die im vorstehenden besprochenen Mineralien beteiligen sich zum größeren Teil an der Zusammensetzung der Gesteine, aus deren Umwandlung schliesslich der Boden hervorgeht. Unter gleichzeitiger Berücksichtigung ihrer Entstehungsweise und ihrer natürlichen Beschaffenheit teilen wir die Gesteine („Gebirgsarten“, „Felsarten“) ein in die *Urgebirgsarten* oder *kristallinen Massengesteine* und in die *Flöz- oder Sedimentärgesteine*. Die erstere Gruppe umfaßt die unmittelbar aus dem feurigflüssigen Zustande hervorgegangenen oder nachher nur wenig veränderten Gesteine, die andere alle die Felsarten, deren Masse aus der Zertrümmerung oder Zersetzung der Urgebirgsarten, namentlich unter dem Einfluß des Wassers, entstanden ist.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> „Nitrobakterium“, ein Spaltpilz von höchst eigentümlichen Eigenschaften; er besitzt ebenso wie die höheren, Blattgrün enthaltenden Pflanzen die Fähigkeit, das Kohlendioxyd der Luft zu spalten und daraus den zum Aufbau seines Körpers nötigen Kohlenstoff zu entnehmen.

<sup>2)</sup> Diese Gruppierung deckt sich mit der Einteilung der Gebirgsarten in „plutonische“ und „neptunische“ oder auch in „Primitiv-“ und „Sekundär-“  
Grundlehren der Kulturtechnik. Erster Band. I. Teil. 3. Auflage.

## § 31.

**Die kristallinen Massengesteine („Urgesteine“)** werden von kristallinen, untereinander verwachsenen Mineralien gebildet. Je nachdem diese staubfein oder in gröberen Körnern oder Kristallen oder in parallel übereinander gelagerten Blättchen oder Schuppen auftreten, nennt man das Gefüge (die „Struktur“) des Gesteins „dicht“, „körnig“ oder „schiefrig“. Die Urgebirgsarten bestehen stets aus verschiedenen Mineralien, unter denen die Kieselerdemineralien und Silikate die erste Stelle einnehmen. Je nachdem sie unverbundene Kieselerde ( $\text{SiO}_2$ ) enthalten oder nicht, lassen sie sich in zwei Untergruppen, in *saure* und *basische* Gesteine, einteilen. Die ersteren bezeichnet man wohl auch als kieseltonalkalische, die letzteren als Kiesel-Eisen-Kalk-Gesteine.

1. Zu den *sauren Gesteinen* gehören die folgenden: *Granit, Gneifs, Glimmerschiefer, Porphy, Trachyt*.

*Granit* und *Gneifs* enthalten als Hauptbestandteile die Mineralien Quarz, Glimmer (Kali- oder Magnesiaglimmer) und Kalifeldspat (Orthoklas). Der Granit pflegt etwas reicher an Kalifeldspat zu sein als der Gneifs (60—80 % gegen 50—70 %), auch ist im Gneifs der Orthoklas bisweilen durch Plagioklase ersetzt. Als Nebenbestandteile finden sich in beiden Gesteinen Zeolithe, Turmalin, Granat, Hornblende, Apatit u. a. Das Gefüge des Granits ist körnig, das des Gneisses schiefrig.

*Glimmerschiefer* ist ein ausgeprägt schiefriges Gemenge von Quarz und Glimmer (Kali- oder Magnesiaglimmer). Feldspat enthält er höchstens in sehr geringen Mengen. Andere Nebenbestandteile sind: Hornblende, Granat, Turmalin, Schwefelkies, Apatit u. a.

*Porphy*. In eine dichte, aus Orthoklas und Quarz bestehende Grundmasse („Felsit“) sind Körner oder Kristalle von Quarz und Orthoklas (als Nebenbestandteile bisweilen Plagioklase, Glimmer, Hornblende, Augit, Apatit u. a.) eingesprenkt.

*Trachyt* besteht aus einer feinkörnigen, etwas porösen Grundmasse von Sanidin und Plagioklas, in der Kristalle von Sanidin, als Nebenbestandteile außerdem Leucit, Granat, Cordierit, Augit, Hornblende und fast stets Apatit verteilt sind. Viele Trachyte („Quarztrachyte“) enthalten außerdem als regelmäßigen Bestandteil noch Quarz.<sup>1)</sup>

2. *Die basischen Gesteine*. Während die sauren Gesteine im wesentlichen als verschieden zusammengesetzte Gemenge von Quarz,

Bildungen. Sie ist insofern nicht ganz unanfechtbar, als die zu den Urgebirgsarten gerechneten Felsarten Gneifs und Glimmerschiefer wahrscheinlich bereits sekundäre, unter Mitwirkung des Wassers gebildete Gesteine sind.

<sup>1)</sup> Auch die Einteilung in saure und basische Gesteine ist also streng genommen nicht ganz scharf, weil manche Trachyte keine freie Kieselerde enthalten.

Glimmer und Feldspat anzusehen sind, von denen allerdings Feldspat oder Quarz bei einigen Felsarten sehr zurückbleibt, fehlt bei den basischen Gesteinen der Quarz als Hauptbestandteil. Sie enthalten durchweg Hornblende oder Augit und Feldspate (meist Plagioklas). In diese Gruppe gehören folgende Gesteine: *Syenit*, *Diorit*, *Diabas*, *Melaphyr*, *Basalt*, *Dolerit*.

*Syenit* ist ein Gemenge von Hornblende und Orthoklas. Letzterer ist bisweilen durch Plagioklas ersetzt. An Nebenbestandteilen finden sich Magnesiaglimmer, Olivin, Granat, Schwefelkies und fast immer Apatit.

*Diorit* besteht aus Hornblende und Plagioklas (Oligoklas, Labrador, Anorthit) und enthält als Nebenbestandteile nicht selten Augit, Orthoklas, Magnesiaglimmer, Eisen, Granat, Cordierit, Apatit.

Die folgenden Gesteine enthalten stets Augit.

*Diabas* enthält als Hauptbestandteil Hornblende und Plagioklas, dabei stets Apatit, als Nebenbestandteile nicht selten Orthoklas, Eisenkies, Olivin, Magnesiaglimmer. (In Hohlräumen finden sich bisweilen Kalkspat, Zeolithe und Quarz eingeschlossen.)

*Melaphyr*, ein Gemenge von Augit, Plagioklas (namentlich Labrador), Olivin, Magneteisen; außerdem enthält das Gestein stets Apatit und bisweilen Magnesiaglimmer, Orthoklas und Quarz.

*Basalt* bildet ein inniges, dicht erscheinendes Gemenge von Augit mit Plagioklas (meist Oligoklas) oder Nephelin oder Leucit. Als Nebenbestandteile finden sich Magneteisen, Olivin, meist unbeträchtliche Mengen Apatit u. a.

*Dolerit* enthält dieselben Bestandteile wie der Basalt, aber in deutlich kristallinisch-körnigem Gefüge.

§ 32. Der verschiedene mineralogische Charakter der sauren und basischen Gesteine muß natürlich auch in ihrer chemischen Zusammensetzung zum Ausdruck kommen. Die folgende Tabelle enthält den durchschnittlichen prozentischen Gehalt der hierher gehörigen Felsarten, wie er sich aus einer großen Anzahl von Gesteinsanalysen ergibt.

I. Saure Gesteine („Kiesel-ton-alkalische“ Gesteine).

	Granit %	Gneifs %	Glimmer- schiefer %	Porphyry %	Trachyt %
Kieselerde ( $\text{SiO}_2$ )	72	70—80	69,5—82	74	62—64
Tonerde ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )	16	14	12—14	12—14	16—19
Kali ( $\text{K}_2\text{O}$ )	6,5	3,0	0,8—4,7	3—4	3,6—5,4
Natron ( $\text{Na}_2\text{O}$ )	2,5	2,0	0,4—4,0	4—5	4,5
Kalk ( $\text{CaO}$ )	1,5	2,6	0,7—2,7	1,5	1,8—2,5
Magnesia ( $\text{MgO}$ )	0,5	1,5	1,0	0,5	0,8
Eisenoxyde ( $\text{FeO}$ u. $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )	1,5	6	3,9	2—3	6
Phosphorsäure ( $\text{P}_2\text{O}_5$ )	0,4—0,7	0,8	—	0,4	0,4—0,7

4\*

## II. Basische Gesteine („Kiesel-eisen-kalkige“ Gesteine).

	Syenit %	Diorit %	Diabas %	Melaphyr %	Basalt %	Dolerit %
Kieselerde ( $\text{SiO}_2$ )	60	51	47,5	56,8	43,0	50,6
Tonerde ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )	17	18,5	16,3	17,8	14,0	14,1
Kali ( $\text{K}_2\text{O}$ )	3,5	2,5	0,9	2,1	1,3	1,1
Natron ( $\text{Na}_2\text{O}$ )	2,6	3,0	3,1	2,6	3,8	2,2
Kalk ( $\text{CaO}$ )	5,3	7,5	11,0	7,0	12,1	9,2
Magnesia ( $\text{MgO}$ )	2,5	6,0	6,5	3,0	9,1	5,1
Eisenoxyde ( $\text{FeO}$ und $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )	8	11,0	12,5	6,6	15,3	16,0
Phosphorsäure ( $\text{P}_2\text{O}_5$ )	0,04—0,2	0,04—1,24	1,3	0,16—0,3	0,5—1,1	0,03

Die Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung der sauren und basischen Gesteine, die die vorstehende Tabelle aufweist, treten besonders deutlich in der folgenden Zusammenstellung hervor. Es schwankt nach zahlreichen Analysen der prozentische Gehalt:

	bei den <i>sauren</i> Gesteinen	bei den <i>basischen</i> Gesteinen
	zwischen	zwischen
an Kieselerde	54 und 79 %	42 und 63 %
„ Tonerde	10 „ 23 „	10 „ 21 „
„ Kali	1,3 „ 8,0 „	0,1 „ 8,0 „
„ Natron	0,4 „ 9,0 „	0,2 „ 8,0 „
„ Kalk	0,1 „ 4,0 „	1,8 „ 15 „
„ Magnesia	0,1 „ 1,5 „	1,1 „ 11 „
„ Eisenoxyden	0,8 „ 7,0 „	4 „ 17 „

Die Anwesenheit von Quarz in den sauren Gesteinen spricht sich in deren höherem Kieselerdegehalt, die von Orthoklas und Glimmer in dem fast immer höheren Reichtum an *Kali* aus. Dagegen machen sich bei den basischen Gesteinen deren wesentliche Bestandteile, Augit und Hornblende, durch ihren größeren *Kalk*- und *Magnesia*gehalt bemerklich. Auch die Plagioklase, die von den Feldspaten vornehmlich an der Zusammensetzung dieser Gesteinsgruppe sich beteiligen, enthalten allermeist grössere Mengen von Kalk und Magnesia, die den Gehalt der basischen Gesteine an diesen Stoffen noch vermehren.

## § 33.

**Die Sedimentär- oder Flözgesteine.** Unter dem Einfluß gewisser Kräfte, die wir bei den Erörterungen über die Vorgänge der Bodenbildung eingehender zu besprechen haben werden, und unter denen die Wirkungen des fließenden Wassers und des schiebenden Eises eine besonders wichtige Rolle spielen, erleiden die Urgesteine eingreifende Umwandlungen, teils mechanischer, teils chemischer Natur. Sie werden in größere und kleinere Bruchstücke zertrümmert, diese vom Wasser fortgeführt, durch Aneinanderreiben zu immer feineren Teilen zermahlen und je nach ihrer Größe und ihrem spezifischen Gewicht bald früher, bald später abgelagert. Gleichzeitig hiermit gehen die chemischen Umwandlungen der Gesteinsgemengteile vor sich, die bereits früher bei der Besprechung des chemischen Verhaltens der Mineralien (§§ 16—29) angedeutet wurden. Die mannigfaltigen Produkte dieser Vorgänge bezeichnen wir als „Sedimentär-“ oder „Flözgesteine“. Charakteristisch für dieselben ist namentlich ihr Aufbau aus einzelnen, bisweilen ganz verschiedenartigen, durch parallele Absonderungsflächen begrenzten *Schichten* oder *Bänken*, ferner das Vorkommen von Geröllen, die schon durch ihre Gestalt auf die Beteiligung des Wassers oder Eises an der Gesteinsbildung hindeuten, und das Auftreten von tierischen und pflanzlichen Resten. Je nachdem bei ihrer Entstehung hauptsächlich nur mechanische Kräfte in höherem oder geringerem Maße, oder außerdem noch chemische Umwandlungen wesentlich mitgewirkt haben, lassen sich die Flözgesteine in die folgenden Untergruppen einteilen.

**1. Schutt, Geröll und Kiesmassen.** Man versteht darunter Anhäufungen loser Gesteinstrümmen, die entweder als „Schutt“ noch in unmittelbarer Nähe ihres Muttergesteins lagern und in diesem Fall aus noch wenig veränderten, scharfkantigen Bruchstücken („Schutt“, „Schotter“) bestehen, oder, durch fließendes Wasser oder durch vorrückendes Eis (Gletscher, Moränen) von dem Ort ihrer Entstehung fortgeführt, noch weitere Zerkleinerung und eine äußere Abschleifung und Abrundung erfahren haben, ohne dadurch im Innern verändert zu sein (Geröll, Kies).

Soweit die Glieder dieser Gruppe der Tertiärformation angehören, bestehen sie nur aus wenigen Mineralien, unter denen Quarz, Glimmer, plastischer Ton vorwiegen. Eine außerordentliche Mannigfaltigkeit weisen dagegen, entsprechend ihrer Herkunft (s. u.), die zugehörigen Diluvialbildungen sowohl hinsichtlich der Gesteins- als der Mineral-Arten auf.

Werden die Gesteinstrümmen durch ein Bindemittel fest miteinander verkittet, so entstehen daraus *Konglomerate* (mehr aus Geröllen) oder *Breccien* (mehr aus Schutt).<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Wenn auch auf andere Weise entstanden, so schlossen sich diesen Gesteinen, ihrer äußeren Beschaffenheit nach, die Lava-Schlacken an, gröbere

2. *Sande, Grande, Sandstein.* Die Sande können ebenso wie die soeben besprochenen Gesteine aus Mineralien der verschiedensten Art bestehen und unterscheiden sich von jenen hauptsächlich nur dadurch, daß sie die Gesteins- und Mineralbruchstücke in weit kleineren Individuen enthalten und daher nach dem äußeren Ansehen gleichförmigere Massen bilden. Da über ihre Entstehung längere Zeit vergangen ist, so sind dem Muttergestein schon viele leichter angreifbare Bestandteile entzogen worden. Der widerstandsfähigste Gemengteil hat sich in dem Rückstand besonders stark angehäuft, und es sind daher die meisten Sande namentlich reich an Kieselerde („Quarzsand“). Neben dem Quarzsand enthalten aber fast alle Sande und namentlich, im Gegensatz zu den Tertiärsanden, die der Quartärformation (Alluvium und Diluvium, § 3) noch mehr oder weniger unzersetzte Gesteinstrümmer (*Grande*), nicht selten auch nachträglich eingeschlämmte mineralische Bestandteile (Aluminium-, Eisen-, Calcium-Verbindungen) oder auch Rückstände pflanzlicher oder tierischer Natur.

Die Diluvialgrande pflegen um so reicher an Kalk und Feldspatmineralien zu sein, je gröber ihr Korn ist. Dementsprechend enthalten auch die Sande des Diluviums bis zu einer gewissen Grenze um so mehr Quarz, aber um so weniger Feldspat und Kalk, je feinkörniger sie sind. Dagegen steigt der Kalkgehalt in den allerfeinsten Teilchen wieder bis zu beträchtlicher Höhe („Mergelsand“).

Als *Spatsand* bezeichnet man einen an Feldspatkörnchen reichen, meist etwas kalkhaltigen, groben bis sehr feinkörnigen, als *Mergelsand* einen aus feinstem Quarz und anderem Gesteinsstaub bestehenden, oft bis 15 und mehr Prozent Calciumkarbonat enthaltenden Sand, der in feuchtem Zustande große Ähnlichkeit mit Ton besitzt, beim Austrocknen zwar etwas erhärtet, aber schon bei leichtem Druck zu Staub zerfällt. Durch Auswaschung des Kalks geht er in den durch Eisen oder andere Beimengungen meist rötlich gefärbten „Schlepp“ oder „Schluffsand“ über. Aufnahme von Ton wandelt ihn in „Fayencemergel“ um. Beide Sande gehören dem *Diluvium* an.

Die Sande des *Alluviums*, sowohl die vom Winde als die durch die Tätigkeit des Wassers abgelagerten, unterscheiden sich von denen des Diluviums hauptsächlich durch das Fehlen von Kalk und durch gleichmäßigere Körnung.

---

vulkanische Ausbruchprodukte („Lapilli“), deren Muttergestein meist Basalt oder Trachyt ist. Gleichzeitig werden häufig von Vulkanen feinkörnigere Produkte ausgeworfen, deren gröbere man als *vulkanische Sande*, deren staubförmige Teile man als *vulkanische Aschen*, oder, wenn sie für sich oder durch ein Bindemittel verkittet sich zu festen Massen aneinander gelagert haben, als *Tuffe* bezeichnet.

Die vom Winde verwehten ton- und kalkarmen<sup>1)</sup> Sande, allermeist diluvialer Herkunft, werden *Flugsand* oder *Dünensand* genannt.

Vielfach gehen die Sande wieder in feste Gesteine über, indem ihre Körner durch ein Bindemittel verkittet werden. Das Produkt nennt man *Sandstein*. Derartige Rückbildungen der zertrümmerten Felsarten in feste Gesteine haben in den verschiedensten geologischen Perioden stattgefunden, und man findet daher Sandstein in zahlreichen Formationen vertreten (§ 3). Ihrem Vorkommen in den verschiedenen Formationen entsprechen z. B. die Benennungen: Silur-, Steinkohlensandstein, Buntsandstein, Keuper-, Lias-, Molassesandstein, während man den Sandstein der Kreideformation wegen seiner eigentümlichen Schichtung als „Quadersandstein“ bezeichnet. Neben dem Gehalt des Sandes an unzersetzten Gesteinstrümmern und nachträglich hinzugetretenen Stoffen (s. o.) ist die Art des Bindemittels, welches die Sandkörner zu Sandstein zusammenkittete, entscheidend für die Zusammensetzung des letzteren. Dasselbe kann aus Silicium-, Aluminium-, Eisen-, Calcium-Verbindungen und auch aus humosen Stoffen bestehen, und je nach seiner Natur unterscheidet man *kieseligen, tonigen, eisenschüssigen, kalkigen, Humus-Sandstein*. Eine Abart des Humussandsteins bildet der *Ortstein* („Ur“, „Ahl“, „Fuchserde“, „Knick“), eine meist wenig mächtige Sandsteinschicht von gröfserer oder geringerer Festigkeit, deren Entstehung darauf zurückzuführen ist, daß organische, aus abgestorbenen Gewächsen, namentlich aus heidekrautartigen Pflanzen ausgelaugte Stoffe in den darunter liegenden Sand eingedrungen sind und dessen Körner verkittet haben.

Die verschiedene Zusammensetzung der Sandsteine möge durch die folgenden Analysen belegt werden:

	Kieseliger Sandstein	Toniger Sandstein	Eisen- schüssiger Sandstein	Kalkiger u. toniger Sandstein	Ortstein
	%	%	%	%	%
Kieselerde ( $\text{SiO}_2$ )	98,5	80,6	70,3	61,2	84,9
Tonerde ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )	0,8	9,2	8,1	} 13,7	10,3
Eisenoxyde ( $\text{FeO}$ u. $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )	0,5	2,4	9,5		0,5
Kalk ( $\text{CaO}$ )	Spur	1,3	1,1	10,5	0,5
Magnesia ( $\text{MgO}$ )	0,24	1,3	0,3	0,6	0,2
Humose Stoffe	?	?	?	?	2,1
Kali ( $\text{K}_2\text{O}$ )	Spur	1,7	1,7	0,9	0,8
Natron ( $\text{Na}_2\text{O}$ )	Spur	1,4	1,9	0,8	1,0
Phosphorsäure ( $\text{P}_2\text{O}_5$ )	?	0,1	?	0,1	0,1
Kohlensäure ( $\text{CO}_2$ )	—	—	—	7,3	—

<sup>1)</sup> In Flugsandhügeln vorkommende kalkreiche Bildungen sind von aussen



3. *Die Tone und Tongesteine* unterscheiden sich von den bisher besprochenen Untergruppen namentlich dadurch, daß sie im wesentlichen aus den staubfein verteilten Produkten tief eingreifender chemischer Zersetzungen der ursprünglichen Gesteine bestehen. Ihr Hauptbestandteil ist stets Aluminiumsilikat, das aber fast immer von größeren oder geringeren Mengen unverbundener Kiesel Erde (Quarzsand) und anderen mehr oder weniger veränderten Bestandteilen des Muttergesteins begleitet ist. Je mehr die Nebenbestandteile, z. B. feiner Quarzsand, Glimmerblättchen, Eisenhydroxyd vorwiegen, um so mehr verliert der Ton die den Kaolin auszeichnende Eigenschaft der Plastizität (§ 16). Betragen die Nebenbestandteile 70—80 % der Gesteinsmasse, so bezeichnet man sie als *Lehm*. „Geschiebe“- oder „Block“-lehm nennt man einen durch Auswaschung des Kalks aus dem Geschiebemergel (s. u. No. 5a) hervorgegangenen, fast stets ungeschichteten, bisweilen mehr tonigen, meist aber stark sandigen, kleinere und größere Steine und Blöcke einschließenden; „Lößlehm“ einen ebenso aus ursprünglich kalkreichem Löß (s. u. No. 5b) entstandenen, sehr feinkörnigen Lehm. Tonablagerungen gehen sehr häufig, wahrscheinlich unter dem Druck darüber befindlicher Wasser- oder Gesteinsmassen, in feste Gebirgsarten (*Tongestein*) über, die man, wenn sie zwar ausgesprochen schiefrig, dabei aber noch nicht sehr fest sind, „Schiefer-ton“, wenn sie bei deutlich schiefrigem Gefüge große Härte besitzen, „Tonschiefer“ nennt. Nur schwache Schieferung zeigt der *Letten*, ein zäher, dabei häufig an sehr feinem Sande reicher, beim Austrocknen steinartig erhärtender, im Wasser allmählich zerfließender Ton. Tongestein findet sich in allen Formationen, namentlich vom Jura an; die Tone kommen hauptsächlich in der Tertiärformation, aber auch im Diluvium und Alluvium vor.

Unter den Tonen des Alluviums unterscheidet man zwischen dem aus *stehendem* Wasser abgeschiedenen, gröberen Sand kaum enthaltenden, an Calciumkarbonat oft reichen *Wiesenton* (im Untergrunde mancher Moore) und dem aus *langsam fließendem* Wasser abgesetzten *Flufston* oder *Schlick* in den Niederungen und Deltabildungen der norddeutschen Ströme. Mit der Flufsgeschwindigkeit der Gewässer, woraus der Absatz erfolgte, nimmt der Gehalt des Schlicks an gröberen Teilen zu. Grobsandige Schlicke bezeichnet man als *Fluf-lehm*. Die Flufstone und Lehme sind im Gegensatz zu dem Seeschlick (s. unter No. 5c) Nordwestdeutschlands frei von Calciumkarbonat, falls solches nicht aus den Talrändern nachträglich eingeschwemmt worden ist.

---

her eingeweht oder eingeschwemmt. (Reste von Schnecken- und Muschelgehäusen, ferner die sogenannten „Beinbruchsteine“, Überreste von Baumwurzeln, die das eingeschwemmte Calciumkarbonat in sich angehäuft und bei ihrer Vermoderung als eigentümliche röhrenförmige Gebilde zurückgelassen haben.)

Je nach dem Gehalt an Nebenbestandteilen schwankt die Zusammensetzung der Tone und Tongesteine in ziemlich weiten Grenzen, wie die folgenden, einer größeren Anzahl von Analysen entnommenen Grenzzahlen dartun.

	<i>Ton- schiefer</i> %	<i>Schiefer- ton</i> %	<i>Ton</i> %
Kieselerde ( $\text{SiO}_2$ )	46—75	59—73	49—77
Tonerde ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )	24—10	26—16	30—11
Kali ( $\text{K}_2\text{O}$ )	1,6—3,5	1,4—3,2	Spur—4,7
Natron ( $\text{Na}_2\text{O}$ )	0,5—3,4	0,3—0,8	Spur—2,7
Kalk ( $\text{CaO}$ )	0,2—5,2	0,1—1,2	0,4—4,4
Magnesia ( $\text{MgO}$ )	0,6—3,6	0,3—0,9	0,2—5,9
Eisenoxyde ( $\text{FeO}$ und $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )	19—1,7	1,0—5,6	7,2—1,0
Phosphorsäure ( $\text{P}_2\text{O}_5$ )	0,1—0,8	0,5	Spur—2,1

Je nach der geringeren oder größeren Beimengung von Nebenbestandteilen bezeichnet man den Ton als „fett“ oder „mager“.

4. *Die Kalkgesteine.* Auch diese Gesteine sind das Produkt einer weitgehenden Zersetzung der kristallinen Urgesteine. Wie früher (§ 31) dargelegt wurde, enthält eine Gruppe der Urgesteine, die wir als „basische“ Gesteine bezeichneten, größere Mengen von Calciumsilikat. Bei ihrer Verwitterung wandelt sich ein Teil des kieselsauren Calciums in kohlen-saures Salz um, das sich in kohlen-säurehaltigem Wasser als saures Karbonat löst und so in die natürlichen Gewässer gelangt. Sobald aus diesen Kohlendioxyd abdunstet oder von Wasserpflanzen aufgenommen wird, scheidet sich ein entsprechender Teil des Calciumsalzes als normales Karbonat ab (§ 18). Mannigfache tierische Wesen ferner, die kohlen-saures Calcium zum Aufbau ihres Knochengerüsts, ihrer Gehäuse u. s. w. gebrauchen, nehmen es aus seiner Lösung auf und hinterlassen es nach dem Absterben vermischt mit ihren sonstigen Resten. Da in dem Muttergestein der Kalksteine allermeist auch größere Mengen von *Magnesium* vorkommen, so findet neben der Abscheidung von Calciumkarbonat nicht selten auch eine solche von kohlen-saurem *Magnesium* statt, und es entsteht ein Absatz von *Dolomit* oder *dolomitischem Kalk* (§ 17, 3). Unter dem Druck darüberlagernder Wasser- oder Gebirgsmassen haben sich die zuerst breiigen Absätze zu *Kalkstein* verdichtet. Die wahrscheinlich ohne Mitwirkung lebender Organismen gebildeten Kalksteine gehören meist den ältesten Gebirgsformationen an und besitzen ein kristallinisch-körniges Gefüge (Marmor). Unter den Kalken des Alluviums ist der aus kleinsten Kalkspatkristallen bestehende

*pulvrige Wiesenkalk* gleichfalls das Erzeugnis eines rein chemischen Vorganges. Im übrigen haben an der Bildung der den jüngeren Formationen angehörigen Kalkablagerungen wohl allermeist pflanzliche oder tierische Lebewesen mittelbar oder unmittelbar mitgewirkt, indem sie dem calciumkarbonathaltigen Wasser Kohlendioxyd und damit das lösende Agens entzogen (§ 18) und so das normale Salz zum Absatz brachten oder das letztere in ihren Organen aufspeicherten.<sup>1)</sup> Sie pflegen sehr feinkörnig oder feinerdig zu sein und zahlreiche Reste der Lebewesen zu enthalten, die an ihrer Bildung tätig gewesen sind. Die Namen *Muschelkalk*, ferner „Terebratel-“, „Enkriniten-“, „Korallenkalk“ u. a. sind den Organismen entnommen, deren Überbleibsel man am häufigsten in ihnen findet, und die einst zur Anhäufung des Karbonates beigetragen haben. Auch die *Kreide*, ein erdiger, weicher Kalkstein, ist so reich an Schalen kleiner Tiere (Foraminiferen, Polythalamien), daß man sie vielfach als ein Produkt tierischer Tätigkeit ansieht. Der *Kalktuff* (in Italien als Travertin bezeichnet), ein Glied des Alluviums, bildet poröse, feste, oft in mächtigen und umfangreichen Lagern auftretende, nicht selten von Eisen- oder Manganbeimengungen mehr oder weniger intensiv gefärbte Massen von hohem, 90% erreichenden Calciumkarbonat-Gehalt, die auch als Baustein benutzt werden.

Zahlreiche an ihrer Entstehung beteiligte Organismen pflanzlicher und tierischer Natur pflegen die Ablagerungen von *kreidigem Wiesenkalk* (in Süddeutschland „Alm“ genannt) zu enthalten. Sie häufen sich vielerwärts auf dem Grunde von Landseen an und bilden nach deren Vertorfen den Untergrund der entstehenden Moore. Nicht selten ist der Wiesenkalk mit größeren Mengen von eingeschwemmtem Ton durchsetzt („Wiesenmergel“); auch kann die Beimengung von pflanzlichen Resten so stark sein, daß er dadurch eine dunkle Färbung erhält („Kalkmoor“, „Moormergel“).

*Zusammensetzung der Kalkgesteine.* Charakteristisch für die Beteiligung tierischer und pflanzlicher Lebewesen an der Bildung aller dieser Kalke ist auch deren größerer oder geringerer Gehalt an *Phosphorsäure*. Je nach dem Vorkommen in den verschiedenen Gebirgsformationen spricht man von „Uralk“, „Silur-“, „Devonkalk“, von Muschelkalk, Jurakalk, Kreide u. s. w. Über die prozentische Zusammensetzung verschiedener Kalkgesteine mögen die folgenden Zahlen Auskunft geben:

---

<sup>1)</sup> In hervorragendem Grade besitzen diese Fähigkeit die in stehenden Gewässern lebenden Characeen („Armleuchtergewächse“ oder „Wassersterne“), die in ihrer Trockenmasse bis zu 50% aus Calciumkarbonat bestehen können.

	Dolomit und dolomitischer Kalk %	Kalkstein aus verschiedenen Formationen %	Kreide (weifse) %	Wiesenkalk und Wiesen- mergel des Alluviums %
Calciumkarbonat	54—63	83—98	80—99	50—88
Magnesiumkarbonat	45—19	4—0,3	2,2—0,1	1,0—Spur
Ton	0,1—2,9	0,3—3,5	wenig	1—30
Phosphorsäure (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	—	0,1—0,8	0,1—0,2	Spur—0,3
Organische Stoffe	—	wenig	wenig	bis 9,5

Finden die Kalkausscheidungen aus natürlichen Wässern gleichzeitig mit der Ablagerung von Ton und Sand statt, oder setzt sich das Calciumkarbonat aus Wasser ab, welches tonige und sandige Massen durchströmt, so entstehen innige Gemische von kohlensaurem Calcium, Ton und Sand, die sogenannten

5. *Mergel*,<sup>1)</sup> die man, je nachdem dieser oder jener Bestandteil besonders stark vertreten ist, als *Kalkmergel*, *Tonmergel*, *Lehmmergel* oder *Sandmergel* bezeichnet. Bei den üblichen Benennungen ist die Abgrenzung der verschiedenen Mergelarten meist eine sehr willkürliche. Einen über 60 % Calciumkarbonat enthaltenden Mergel pflegt man als „Kalkmergel“ zu bezeichnen. Bei „Tonmergeln“ setzt man einen Tongehalt von mindestens 40 %, bei „Lehmmergeln“ einen solchen von etwa 20—40 % und einen hohen Sandgehalt voraus, während bei den „Sandmergeln“ der Tongehalt sehr zurück- und dafür der Sand in den Vordergrund tritt. Dabei kann bei den letztgenannten Mergeln der Gehalt an Calciumkarbonat auf 10 % und noch tiefer sinken.

5a. Unter den Mergeln nimmt, weniger durch seine chemische Zusammensetzung, als durch die besondere Art seiner Entstehung, der *Geschiebemergel*, auch „Diluvial-“ oder „Moränenmergel“, eine besondere Stellung ein. Er ist, wie unten (§ 37) näher dargelegt werden wird, die durch Verschwemmungs-, Verwehungs- und Verwitterungsvorgänge mehr oder weniger veränderte, aber noch nicht ihres ursprünglichen Kalk-

<sup>1)</sup> Auch die Mergel finden sich in vielen, namentlich aber in den mittleren und jüngeren Gesteinsformationen der Erdrinde (s. § 3). So der „bunte Mergel“ oder „Röt“ im Buntsandstein, der oft steinartig erhärtete, aber allmählich zerfallende „Keupermergel“, der „Mergelschiefer“ des Jura, die „Plänermergel“ der Kreide, die „Septarienmergel“ der Tertiärformation (das Muttergestein der wertvollen Weinbergsböden von Hattenheim, Eltville, Mechsbrunn, Hochheim), die Geschiebemergel des Diluviums (s. u.) u. s. f.

gehaltes beraubte<sup>1)</sup> Grundmoräne des Inlandeises der Diluvialzeit (s. außerdem § 3). Er besteht aus großen, kleineren und kleinsten Bruchstücken sämtlicher die Oberfläche Schwedens und Finnlands bildenden Gesteine, im Gemenge mit dem beim Vorrücken des Eises vom Küstengebiet der Ostsee mitgeschleppten Steingeröll aus den ältesten und aus den der Diluvialzeit unmittelbar vorhergehenden geologischen Perioden. Im Gegensatz zu den darunter anstehenden höchst einförmigen Bestandteilen des Tertiärs besteht also der Geschiebemergel aus Gebilden von größter Mannigfaltigkeit, nicht nur nach Korngröße, sondern auch nach mineralischem Charakter. Abweichend von den meisten Ablagerungen aus fließendem Wasser zeigt er keine geschichtete Lagerung.

So verschiedenartig seine Bestandteile unter sich sind, so weisen doch die Geschiebemergel der verschiedenen Örtlichkeiten, wenigstens in Norddeutschland, allermeist eine auffällige Gleichmäßigkeit in ihrem Gehalt an grandigen, sandigen und tonigen Teilen auf.

An ihrer Zusammensetzung beteiligen sich

	die grandigen Teile	die sandigen Teile	die tonigen Teile
mit etwa	1—5	60—70	30—40 %.

Die Hauptmasse bildet hiernach der Sand, der aber immer mit größeren oder geringeren Mengen von Ton durchsetzt ist.

Der Gehalt der Geschiebemergel an *Calciumkarbonat* schwankt gewöhnlich zwischen 6—12 %, kann aber bis auf 3 % heruntergehen und bis auf 20 % ansteigen. Er ist am größten in den weniger verwitterten grobgrandigen Gemengteilen, am kleinsten im Sand, und steigt dann wieder in den tonigen Teilen.

Der Gehalt an *Kieselerde* (Quarz) überwiegt in den sandigen Bildungen um so mehr, je feinkörniger sie sind.

Der *Feldspat* und die — stets in weit geringeren Mengen vorhandenen — sonstigen Silikate herrschen ebenso wie das kohlensaure Calcium in den grobgrandigen Teilen vor und sinken in den Sanden, aber nicht unter 2—3 %.

Diese Verhältnisse sind für die Beurteilung der aus dem Geschiebemergel hervorgegangenen Böden von größter Bedeutung (s. u.).

Auf den geologischen Karten des norddeutschen Flachlandes unterscheidet man zwischen *unterem* und *oberem* Geschiebemergel. Der untere Geschiebemergel ist durch beigemengte organische Bestandteile meist dunkelgrau und braun gefärbt, der obere erscheint gewöhnlich gelblich und ist infolge seiner geringeren Mächtigkeit durch stärkere Auswaschung kalk-

<sup>1)</sup> Der durch Auswaschung entkalkte, noch tonhaltige Rückstand des Geschiebemergels wird als *Geschiebelehm* (S. 56), der an Ton und meist auch an Kalk arme Rest des Geschiebemergels als *Geschiebesand* bezeichnet.

ärmer geworden. Unter der abschwemmenden Wirkung des Wassers ist aus dem nicht geschichteten Diluvialmergel bisweilen ein von Geschieben freier, an Kalk weit reicherer und Schichtung aufweisender Ton- oder Kalkmergel hervorgegangen (z. B. Mergel von Westerweihe im Lüneburgschen).

**5b.** Derselben geologischen Periode entstammt endlich noch ein hierher gehöriges Gestein, das seine Entstehung höchstwahrscheinlich zum Teil wässrigen Absätzen, zum Teil den durch die Gewalt des Windes aufgewirbelten Gesteinsstaubmassen verdankt, das ist der *Löss*. Er stellt das feinste Zerreibungsprodukt der norddeutschen Diluvialgletscher, ein hauptsächlich aus Calciumkarbonat, Quarzsand und Tonteilchen meist von sehr feiner und gleichmäßiger Verteilung<sup>1)</sup> bestehendes Gemenge dar, worin der Ton aber so weit zurücktritt, daß es dessen charakteristische Eigenschaft der Formbarkeit nicht besitzt.

Die folgende Tabelle gibt die *prozentische Zusammensetzung* einiger Mergelarten und Lösses wieder:

	Kalk- mergel	Ton- mergel (Westfalen Kreis Ahaus)	Lehm- mergel (Westfalen Kreis Herford)	Sand- mergel (Westfalen Kreis Borken)	Unterer Ge- schiebe- mergel <sup>2)</sup> (Mark)	Löss
	%	%	%	%	%	%
Calciumkarbonat	84,1	27,6	25,0	24,2	} 19,1	10—29
Magnesiumkarbonat	1,1	1,2	1,6	1,2		9—2
Ton	—	45,7	23,7	4,8	9,6	} 75—44
Sand	0,1	14,2	24,7	66,0	71,1	
Phosphorsäure (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	0,04	?	?	0,8	?	0,1—0,5

**5c.** Als einen Lehmmergel kann man den dem Alluvium angehörigen *Seeschlick* oder „Seeklei“, das Bildungsmaterial des „Marschbodens“ (s. u. Verschwemmung) und eines der vortrefflichsten Verbesserungsmittel für

<sup>1)</sup> In den tieferen Lössschichten bisweilen vorkommende eigentümliche Kalkgebilde tragen den Namen „Lössmännchen“ oder „Mergelnieren“.

<sup>2)</sup> Im Geschiebe-(Lehm-)mergel findet sich der Kalk zum Teil in Form von dichtem Kalkstein oder Kreide, zu einem sehr großen Teil aber in sehr feiner Verteilung. Diesem Umstand und dem hohen Gehalt des „Sandes“ an feinem kalireichen Gesteinsstaub ist vielleicht die besonders günstige Wirkung dieser Mergel als Meliorationsmittel zum Teil zuzuschreiben.

Sand- und Moorboden ansehen. Nach Untersuchungen der *Moor-Versuchs-Station* wurden gefunden in trockenem<sup>1)</sup> Seeschlick von der

	Emsmündung %	Wesermündung %	Elbmündung %
Calciumkarbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) . . . . .	10,45	8,25	7,72
Kali ( $\text{K}_2\text{O}$ ) . . . . .	2,60	1,97	2,22
Magnesia ( $\text{MgO}$ ) . . . . .	2,22	1,61	1,57
Eisenoxyd und Tonerde ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , $\text{Al}_2\text{O}_3$ )	19,72	?	16,74
Phosphorsäure ( $\text{P}_2\text{O}_5$ ) . . . . .	0,20	0,20	0,13
Kieselerde ( $\text{SiO}_2$ ) . . . . .	54,53	65,18	61,04
Stickstoff . . . . .	0,28	0,32	?

Abgesehen von der größeren oder geringeren Beimengung von Sand (Kieselerde) sind die an der Mündung der drei Flüsse abgesetzten Schlickmassen fast gleich zusammengesetzt.

Von zwei weiteren gleichfalls dem Alluvium zugehörigen Mergelarten, dem *Wiesenmergel* und dem *Moormergel*, ist bereits im Anschluß an den Wiesenkalk unter 4. die Rede gewesen.

Eine andere, von vielen Geologen gleichfalls den Flözgesteinen zugerechnete Bildung, der Torf, soll erst in einem späteren Kapitel abgehandelt werden.

---

<sup>1)</sup> Der frisch abgelagerte Schlick enthält sehr große Wassermengen (bis 70 %). Nach oberflächlichem Abtrocknen bildet er eine „speckige“ Masse. Bei stärkerem Austrocknen und namentlich unter der Einwirkung des Frostes zerfällt er zu kleinen Krümeln. Erst in diesem Zustand findet er als Meliorationsmittel Verwendung.

## Kapitel II.

### Die Vorgänge bei der Bodenbildung.

Schon bei der Besprechung der gesteinsbildenden Mineralien und mehr noch der sedimentären oder Flözgesteine wurden einige der mächtigsten Faktoren angedeutet, die unablässig an der Umwandlung der harten Erdrinde in eine lose, lockere, für die Hervorbringung von Pflanzen geeignete Erdmasse, mit einem Wort, in „Boden“ tätig sind. Ihre Natur und ihr Walten eingehender zu erörtern ist die Aufgabe dieses Kapitels.

*Die bei der Bodenbildung beteiligten Kräfte* sind teils mechanisch, teils chemisch wirkende, teils vegetative.

#### A. Mechanische Vorgänge bei der Bodenbildung.

##### § 34.

**Temperaturänderungen.** Bei steigender Temperatur vergrößern, bei sinkender vermindern mit wenigen Ausnahmen alle Körper ihr Volum, und zwar sowohl je nach dem stärkeren oder schwächeren Ansteigen und Sinken der Wärme, als auch nach ihrer verschiedenen Beschaffenheit in verschiedenem Maße. Bei gleichartigen Körpern dehnt sich die stärker erwärmte Oberfläche mehr aus, als das schwächer erwärmte Innere, in Körpern, deren Masse verschiedenartige Bestandteile enthält, auch bei gleichmäßiger Durchwärmung der eine Gemengteil mehr als der andere. Hierdurch werden bei Gesteinen, die sehr starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, im Innern Zerrungen und Pressungen hervorgerufen, die eine um so stärkere Lockerung des Zusammenhanges zur Folge haben, je ungleichmäßiger die Erwärmung derselben und je verschiedenartiger ihre Bestandteile sind. Es entstehen in dem festen Gestein Risse und Spalten, die anderen Agentien Zugang und Gelegenheit verschaffen, ihre zerstörende Tätigkeit auf das Innere des Gesteins auszudehnen.

**§ 35. Die Ausdehnung des Eises.** Haben sich erst durch irgendwelche Einwirkungen in einem Gestein Spalten gebildet, in denen Wasser sich ansammeln und zum Gefrieren kommen kann, so ist ein weiteres höchst wirksames Moment zur Zerstörung des festesten Gesteins gegeben. Beim Gefrieren dehnen sich 100 Raumteile Wasser auf 109 Raumteile Eis aus, und dadurch wird eine immer stärkere Erweiterung der Gesteinsspalten,



und schliesslich eine Loslösung gröfserer und kleinerer Bruchstücke vom Muttergestein herbeigeführt.

### § 36.

**Die mechanischen Wirkungen des bewegten Wassers und Eises, sowie des Windes.** Dieselben sind einerseits auf die *Zertrümmerung der festen Gesteinsrinde*, andererseits auf die Fortführung der Gesteinsbruchstücke nach anderen Stellen gerichtet. Die letzteren Vorgänge bezeichnet man als *Verschwemmung, Transport* und *Verwehung*. Wir betrachten zunächst die *zerstörende* Tätigkeit der drei Faktoren.

**Zertrümmerung.** Dafs dem unablässig fallenden Tropfen auch das härteste Gestein nicht widersteht, ist eine viel beobachtete und schon in alten Zeiten sprichwörtlich verwertete Erscheinung. Die dadurch hervorgerufenen napfartigen Aushöhlungen können sich unter dem Stofs gröfserer fallender Wassermassen zu tiefen Löchern und Höhlen erweitern, desgleichen nagt sich das fließende Wasser allmählich in den unterlagernden Fels hinein, Löcher, Rinnen und schliesslich Täler hervorbringend, die um so tiefer werden, je gröfser die Wassermasse, je stärker ihr Gefälle, je weicher das angegriffene Gesteinsmaterial ist. Die Rinnenbildung gibt dem hindurchströmenden Wasser Gelegenheit, seine erodierenden Wirkungen auf die Ufer des Rinnsals auszudehnen, das anstofsende Gestein zu unterwühlen, sein Nachstürzen und seine Zertrümmerung zu veranlassen.

Eine ähnliche Wirkung übt das durch Ebbe und Flut und durch Wind bewegte *Meereswasser* auf die küstenbildenden Gebirgsarten aus. Sie wird um so eingreifender sein, je höher der Wellenschlag (man hat Wellen von 18 m Höhe beobachtet), je steiler das Ufer, je weicher und zerklüfteter das Küstengestein ist. Während man an manchen, aus besonders widerstandsfähigem Gestein bestehenden Meeresküsten in absehbarer Zeit kaum eine Veränderung wahrnimmt, ist z. B. für die Küste von Norfolk und Suffolk (England) ein jährliches Abnagen von 1 m und mehr landeinwärts festgestellt worden. Ungleichmäfsige Beschaffenheit des Gesteins, namentlich Wechsel zwischen leichter und schwerer angreifbaren Gesteinsteilen begünstigt die Zerstörung. Durch Erosion der weicheren Parteen werden die widerstandsfähigeren in Form von Platten, Säulen, Nadeln blofsgelegt und unterliegen dann leichter dem nagenden Einflufs des Wassers (Küste von Helgoland).<sup>1)</sup>

Wesentlich verstärkt wird die zerstörende Wirkung des bewegten Wassers durch die losgelösten Gesteinsbruchstücke, Schutt, Geröll, Kies und Sand, die, vom Wasser fortgerissen, mit kräftigem Stofs auf das an-

<sup>1)</sup> Helgoland, dessen Gröfse jetzt etwa  $\frac{1}{100}$  Quadratmeile beträgt, soll vor etwa 1000 Jahren noch  $1\frac{1}{2}$  Quadratmeilen grofs gewesen sein.

stehende Gestein aufprallen oder dieses durch Reibung allmählich zerschleifen.<sup>1)</sup> Steinen, die durch fließendes Wasser in wirbelnder Bewegung gehalten werden, ist auch die Entstehung jener eigentümlichen, oft in das härteste Gestein eingebohrten Höhlungen zuzuschreiben, die man als „Riesentöpfe“ („Gletschertöpfe“, „Gletschermühlen“) zu bezeichnen pflegt.

Als ein nicht minder gewaltiges Werkzeug zur Zerstörung der Gesteinsmassen ist das Wasser im festen Zustande, das *Eis*, anzusehen. Die vom Wasser gegen den Felsen getragene Eisscholle höhlt diesen in gleicher Weise wie das vom Wasser getriebene Felsstück durch Stofs und Reibung. Weit mächtiger aber ist die Wirkung der großen Eisströme, die von den Kuppen unserer höchsten Gebirge unter dem Druck des sich immer erneuernden Firnschnees und Firneises<sup>2)</sup> unablässig den Tälern der Tiefe zu sich fortschieben und in ihrem Laufe Unterlage wie Ufer ritzen, zerschleifen und zerbröckeln. Diese Eisströme sind die *Gletscher*.

Endlich ist auch dem *Winde* ein bisweilen nicht unerheblicher Einfluß auf die Zernagung festen Gesteins zuzuerkennen. Wie es der neueren Technik gelingt, mittels feinen Sandes, der durch einen kräftigen Luftstrom gegen Glasplatten getrieben wird („Sandgebläse“), in diese die mannigfaltigsten Figuren hinein zu „nagen“, so wirken die vom heftigen Winde — er kann bis 28 m in der Sekunde zurücklegen — bewegten Sand- und Staubeilchen zerreibend zunächst auf die weichen Teile eines Gesteins ein, zerstören so seinen Zusammenhang und führen Zerklüftungen und Abstürze herbei.

Bisher war nur die Rede von der *zerstörenden* Wirkung, die bewegtes Wasser, Eis und Wind auf das anstehende, d. h. noch einen integrierenden Teil der festen Erdrinde bildende Gestein ausüben. Weit eingreifendere Veränderungen erleiden aber die vom Wasser und Eis mitgeführten Gesteinstrümmer. Je stärker das Gefälle des Wasserlaufes, um so mehr zerreiben sich die fortgerissenen Bruchstücke gegenseitig und an den Wänden des Flußbettes zu immer kleinerem Geröll und schließlich zu feinem Schlamm.

<sup>1)</sup> Auffällige Beispiele für die aushöhlende Gewalt des mit Steinschutt beladenen Wassers bieten die „Klammern“ der Bayrischen und Österreichischen Alpen, ferner die im nordamerikanischen Staate Columbia vorkommenden, tief in hartes Gestein eingeschnittenen alten Wasserläufe („Cañons“ und „Coulées“). Die „Grande-Coulée“ schneidet bei einer Breite von mehreren englischen Meilen mit fast senkrechten Wänden 800 Fuß tief in den Basalt ein.

<sup>2)</sup> *Firn* oder *Firnschnee* nennt man die aus den Flocken des Hochschnees durch Verschmelzung und nachfolgendes Zusammenfrieren entstandene, von zahlreichen Luftbläschen durchsetzte körnige Masse. Durch den Druck der oberen Firnmassen auf die darunter liegenden verdichten sich diese zu *Firneis* und schließlich zu *Gletschereis*.

Auch die Gletscher nehmen bei ihrem Vorrücken zahlreiche Gesteins-trümmer, nicht selten mächtige Blöcke mit sich, die entweder durch den Druck des Eises von der unebenen Gletschersohle losgelöst werden, oder, von den den Gletscher seitlich begrenzenden Felsmassen durch Spaltenfrost (s. o.) abgetrennt, auf den Gletscherrand stürzen und die *Seitenmoränen*<sup>1)</sup> des Gletschers bilden. Geraten diese, zunächst scharfkantigen Schutt-gesteine durch die bei verschiedenen Veranlassungen sich bildenden Gletscherspalten auf die Sohle des Gletschers oder zwischen diesen und seine felsigen Ufer, so werden sie allmählich zermalmt, in abgerundetes Geröll und in einen feinen Schlamm umgewandelt und von den aus dem Gletscher austretenden Schmelzwässern weiter fortgeführt.

§ 37. *Verschwemmung, Transport, Verwehung.* Die aus dem Gebirge in die Ebene eintretenden *Wasserläufe* verlieren allmählich immer mehr an Stromgeschwindigkeit und damit an Stofs- und Tragkraft für die mitgeführten Gesteinstrümmer. Je größer die letzteren sind, um so früher lagern sie sich ab, die Talsohle erhöhend, so lange, bis der Wasserlauf im alten Bette nicht mehr Platz findet, zudem aufgestaut durch selbstgeschaffene Gesteinsbarren, über seine natürlichen Ufer tritt und die angrenzenden Flächen mit Geröll, Kies und Sand überschüttet. Je *feiner* die im Wasser schwebenden Gesteinsreste sind, und je geringer ihr *spezifisches Gewicht*, um so länger werden sie im Wasser „schwebend“ („suspendiert“) erhalten, um so weiter können sie von ihrer Ursprungs-stätte fortgetragen werden, bis auch sie infolge der sich mehr und mehr verlangsamenden Stromgeschwindigkeit im Flußgebiete selbst oder in den den Fluß aufnehmenden Seen und Meeren zum Absatz gelangen. Den bei der Verschwemmung hauptsächlich in Betracht kommenden Gesteins-elementen kommt etwa folgendes *spezifische Gewicht* zu:

Eisenkies	Augit	Apatit	Glimmer	Feldspate	Zeolithe
	Olivin		Chlorit	Nephelin	Kaolin
	Epidot		Magnesit	Serpentin	
	Hornblende		Dolomit	Quarz	
				Kalkspat	
5—5,25	2,9—3,5	3—3,25	2,8—3,1	2,5—2,75	2—2,25.

1) Als „End-“ oder „Stirnmoräne“ pflegt man die Schutt- und Geröll-massen zu bezeichnen, die beim Abschmelzen des Gletschers an seiner tiefsten Grenzlinie auf das darunter liegende Gestein stürzen und oft mächtige Wälle bilden. „Mittelmoräne“ nennt man die bei der Vereinigung zweier Gletscher-ströme aus der beiden einander zugewandten Seitenmoränen sich zusammen-setzende Schuttinsel; „Grundmoräne“, die unter dem Gletscherstrom befindliche lose Gesteinsmasse.

Wenn hiernach die spezifischen Gewichte der Mineralien, abgesehen von dem Eisenkies, auch nicht in weiten Grenzen schwanken, so lassen obige Zahlen doch darauf schliessen, daß die *tonigen* Gesteinsreste sich länger im Wasser schwebend erhalten können, als die aus den übrigen Mineralien und namentlich aus Quarz bestehenden *Sande*.<sup>1)</sup> Ganz besonders aber wird die Ablagerung der ersteren erschwert durch die äußerst feine Verteilung der Tonteilchen. Dennoch kommen auch diese allmählich zum Absatz, wenn die Stromgeschwindigkeit durch irgend welche Umstände, z. B. durch Gegenströmungen oder durch gehinderten Rückfluß des Wassers nach Überschwemmungen, gemindert wird. Innerhalb des Flußgebietes bilden sich dann durch die stattfindenden Ablagerungen die *Flußmarsch*- oder *Aueböden*. An der Mündung der Flüsse in das Meer tritt zu der den Flußlauf zur Ruhe bringenden Wirkung der *Flut* noch der Einfluß, den die Salze des Meerwassers auf die Flockung und das Niederfallen der suspendierten Tonteilchen ausüben (§ 16). Die an der Mündung der Flüsse in die See sich ablagernden Sinkstoffe (Seeschlick § 33, 5c) bilden dort „Barren“, „Watten“, *Seemarschboden*<sup>2)</sup> und geben unter gewissen Umständen, deren Erörterung uns hier zu weit führen würde, Veranlassung zur Entstehung von „Flußdeltas“. Alle diese noch fortdauernd unter Mitwirkung der Flüsse (und des Windes, s. u.) sich bildenden Ablagerungen rechnet man zum *Alluvium* (§ 3).<sup>3)</sup>

Ebenso wie das fließende Wasser „transportiert“ das Gletschereis große Steinmassen verschiedenster Art von der Höhe der Berge in die Täler hinab, teils wenig verändert als scharfkantige Bruchstücke, teils zu feinem Staub und Schlamm zermahlen (s. o.), der dann von dem Schmelzwasser aufgenommen und weiter verschwemmt wird. Noch zu unserer Zeit ist diese abtragende Tätigkeit der Gletscher eine sehr be-

<sup>1)</sup> Eine Folge der durch das fließende Wasser bewirkten „Entmischung“ der Gemengteile eines Gesteins ist z. B. die Entstehung des Geschiebesandes aus dem Geschiebelehm (s. § 33, 5a).

<sup>2)</sup> Die Schlammabsätze, die den fruchtbaren Marschboden bilden, sucht man an der Nordseeküste künstlich dadurch zu befördern, daß man durch Anlage von Fangdämmen („Schlengen“), Zäunen, Gräben dem bei der Ebbe zurückweichenden Wasser Hindernisse bereitet, seine Ablaufgeschwindigkeit und damit seine Tragfähigkeit vermindert („Polder“anlage).

<sup>3)</sup> Als „Marsch“ im Gegensatz zur „Geest“ bezeichnet man im nordwestlichen Deutschland die äußerst fruchtbaren, völlig horizontalen Schlammablagerungen der Flüsse, die sich in größerer oder geringerer Breite am Meeresufer entlang ziehen und die Talniederungen der Flüsse ausfüllen. Die daran stossende, meist weit über dem Spiegel der höchsten Fluten belegene, mehr oder minder wellige „Geest“ besteht im wesentlichen aus Bildungen des Diluviums (s. u.), aus denen nur an einigen Stellen Gesteine älterer Formationen hervorragen.

deutende,<sup>1)</sup> weit gewaltiger war sie natürlich in jener als *Diluvialzeit* oder *Eiszeit* bezeichneten Bildungsperiode, da Nordeuropa und Nordamerika infolge erheblicher Temperaturniedrigung und demgemäß vermehrter Niederschlagsmengen zum größeren Teil von Eis bedeckt waren, das von gewissen Zentralpunkten im hohen Norden her dem tiefer liegenden Süden zudrängte und in gleicher Weise, aber in größerem Maße die gebirgszerstörenden und felsversetzenden Wirkungen ausübte, wie wir sie bei den noch heute vorhandenen Gletschern beobachten.

Die über den Gebirgen des nördlichen Skandinaviens und Finnlands angehäuften, vielleicht mehrere tausend Meter mächtigen Eismassen kamen auf ihrer geneigten Unterlage ins Gleiten und schoben sich, die vorhandenen Meerbecken ausfüllend und unter dem Druck des nachdrängenden Eises selbst beträchtliche Bodenerhebungen mit Leichtigkeit übersteigend, nach Süden bis in die Gegend der deutschen Mittelgebirge, im Westen bis nach Holland und England, im Südosten bis in die Flußgebiete des Schwarzen und des Kaspischen Meeres so lange vor, bis das zunehmende Abschmelzen in den wärmeren Landstrichen dem Vorrücken ein Ziel setzte. Soweit das vom vordringenden Eise berührte Gestein bereits durch den zerstörenden Einfluß der einwirkenden Naturkräfte zermürbt war, schlossen sich seine Bruchstücke als Grundmoräne (S. 66, Anm.) der Bewegung des Eises an. Sie halfen die noch feste Gesteinsunterlage zu flachen Buckeln abzurunden, die Oberfläche abzuschleifen und in eigentümlichen, vielfach noch jetzt deutlich erkennbaren parallelen Schrammen zu ritzen („Gletscherschliffe“)

Unter dem ungeheuren Druck des vorrückenden Eises wurden die großen mitgeschleppten Gesteinsblöcke allmählich zertrümmert, die kleineren Bruchstücke zu Geröll, Kies und endlich zu feinem und feinstem Sand und Schlamm zermahlen. Am Abschmelzrande des Eises lagerte sich der gröbere Gesteinsschutt als Endmoräne oft in langgestreckten Wällen oder Hügelketten über das Tertiär, während die kleineren Teile, die Grande und Sande, durch die Schmelzwasser weiter geführt wurden. Wichtiger infolge stärkerer Abschmelzung die Randlinie des Eises nach Norden zurück, so blieb das gesamte, seiner Zeit mitgeführte Steinmaterial als „Grundmoräne“ zu Tage liegen. Es bildet den „Geschiebemergel“ (s. o.), der mit seinen Abkömmlingen den größten Teil Norddeutschlands bedeckt.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> An einem Augusttag führt der aus den Firnmulden des Finsteraarhorns in das Haslital herabstürzende Aargletscher mehr als 280000 kg fester Stoffe allein den Gletscherbächen zu.

<sup>2)</sup> Die in den obigen Ausführungen kurz dargelegte Anschauung von der Bildung des Diluviums, die sogenannte „Glacial“-Theorie, ist zuerst von dem schwedischen Geologen Torell begründet worden und jetzt allgemein anerkannt. Sie trat an die Stelle der vorher herrschenden „Trift“-Theorie, die einen Transport der nordischen Gesteine auf schwimmendem Eise (durch „Trift“) annahm.

Das Vorkommen tierischer und pflanzlicher Reste, stellenweise von Moorbildungen in verschiedenen Bodentiefen des Diluviums läßt erkennen, daß es in Nordeuropa mehrere, und zwar mindestens drei Vereisungsperioden gegeben hat. Sie waren durch „Interglacialzeiten“ getrennt, während deren die vom Eise befreite Oberfläche einer auf größere Wärme angewiesenen Flora und Fauna geeignete Lebensbedingungen bot. (Vergl. die Einleitung, § 3, Anmerkung S. 7.)

Auch im südlichen Deutschland beobachtet man die Spuren einer ein- oder mehrmaligen, von den Alpen ausgehenden Vergletscherung der nördlich angrenzenden Landstriche.

Endlich ist noch der *transportierenden Tätigkeit des Windes* zu gedenken. Ist ein Gestein erst zu Staub oder Sand zerfallen, so unterliegen die feinen Körner, falls sie nicht durch natürliche oder künstliche Mittel festgelegt werden, in erheblichem Maße der Wirkung des Windes. Der Sand der Sahara wird durch heftige Südwinde über das Meer hinweg bis in das südliche Frankreich getragen, der *Löss* scheint in manchen Gegenden hauptsächlich der Tätigkeit des Windes seine Ablagerung zu verdanken, und mit Sicherheit wissen wir dies von einer noch fortwährend unter unseren Augen entstehenden Bildung, den *Dünen*. Wo der Meeresstrand aus feinem Sand besteht, oder der sandige Meeresgrund durch die Ebbe trocken gelegt wird, führt der Seewind das leichtbewegliche Material landeinwärts und türmt es zu Hügeln und langgestreckten Wällen von oft sehr bedeutender Höhe (bis 200 m und darüber) auf, deren äußere, dem Meere zugewandte Böschung flach ist, deren Landseite meist ziemlich starkes Einfallen und nicht selten Schichtung zeigt. Stellen sich nicht natürliche Hindernisse entgegen, oder wird nicht die Düne durch künstliche Maßnahmen, namentlich durch Bepflanzen mit anspruchslosen und widerstandsfähigen Gewächsen (z. B. Strandhafer, *Elymus avenarius*) befestigt, so wandert sie unter dem Druck des Windes, der den Sand an der Windseite in die Höhe treibt, ihn an der Landseite herabfallen läßt, meilenweit in das Land hinein, Kulturland und Häuser verschüttend und Flüsse aus ihrem Lauf verdrängend.

Auch im Binnenlande, häufig Flußläufe begleitend, finden sich nicht selten *Sandwehen* und ganze Dünenzüge, deren Material entweder den Ablagerungen des Flusses oder auch diluvialen Sanden entstammt.

#### B. Chemische Vorgänge bei der Bodenbildung.

Die Wirkungen der bisher in ihrem Walten geschilderten mechanischen Kräfte auf die Umwandlung der starren Erdrinde würden bei deren ursprünglicher Beschaffenheit nur außerordentlich langsame sein können, wenn ihnen nicht durch gewisse Vorgänge vorgearbeitet würde, die chemischen Kräften entspringen.

## § 38.

**Verwitterung.** Keines der die Erdkruste bildenden Gesteine widersteht auf die Dauer dem chemischen Angriff gewisser Stoffe, die in unerschöpflichen Mengen in der den Erdkörper umspülenden Atmosphäre vorhanden sind, dem *Sauerstoff*, der *Kohlensäure*<sup>1)</sup> und dem *Wasser*. Langsam, solange die Gesteinsoberfläche noch glatt und unverletzt ist, schneller, sobald erst feine und sich immer mehr erweiternde Risse und Spalten den Zugang zum Innern verstaten, bewirken diese Agentien eine chemische Umsetzung der Mineralbestandteile und führen dadurch die Zerstörung der ursprünglichen Gesteinsmasse herbei.<sup>2)</sup> Diese Vorgänge, an denen sich alle drei Faktoren fast immer gleichzeitig oder in schneller Aufeinanderfolge beteiligen, nennt man „Verwitterung im engeren Sinne“ oder: *Einfache Verwitterung*.

§ 39. Der *Sauerstoff* hat, ganz im Gegensatz zu dem anderen Hauptbestandteile der Atmosphäre, dem Stickstoff, ein hervorragendes Bestreben, mit anderen Elementen sich zu vereinigen, sie zu *oxydieren*. Seine Verwandtschaftsäußerungen sind besonders energisch, wenn er sich in dem „erregten“ Zustand befindet, in dem man ihn als „aktiven Sauerstoff“ oder als *Oson* bezeichnet. In diesen Zustand geht er unter der Einwirkung des elektrischen Funkens und ferner in Berührung mit Stoffen über, die in langsamer Oxydation oder Verbrennung begriffen sind. Infolgedessen enthält die atmosphärische Luft fast immer grössere oder kleinere Mengen von Ozon. Bei Gesteinen, die *Eisen* in niedrigen Oxydationsstufen, als Eisenoxydul oder Eisenoxydoxydul (Magnet Eisen, § 24) enthalten, äußert sich die Wirksamkeit des Sauerstoffs in der Weise, daß jene Verbindungen zu Oxyden oxydiert werden. Äußerlich macht sich dieser Vorgang meist durch Übergang der schwarzen, blauen oder grünen Farbe in rot oder gelb bemerklich.<sup>3)</sup> Zugleich aber wird dadurch der innere Zusammenhang zwischen den Mineralelementen zerstört und ein Zerfall der Mineralien und der Gesteine *herbeigeführt*. Eine Oxydation erleidet auch der in

<sup>1)</sup> Unter „Kohlensäure“ wird hier und im folgenden entweder das Kohlendioxyd ( $\text{CO}_2$ ) oder die wirkliche Kohlensäure ( $\text{H}_2\text{CO}_3$ ) verstanden (§ 17).

<sup>2)</sup> Auf die Verwitterung ist auch das Klima insofern von Einfluß, als höhere Temperaturen, starke Niederschläge, üppiger Pflanzenwuchs (s. u.) die chemischen Zersetzungs Vorgänge befördern. So pflegen die „*Lateritböden*“ der *Tropenländer*, stark eisenhaltige, aus Granit, Gneifs, Syenit und anderen Gesteinen hervorgegangene, poröse Lehm böden, infolge der energischen Verwitterung jener harten Gesteine sehr tiefgründig zu sein.

<sup>3)</sup> Eine derartige Oxydation beobachtet man z. B. oft an frisch ausgegrabenem, blauem oder grauem Ziegelton, der schon bei längerem Liegen an der Luft und mehr noch beim Brennen eine gelbe oder rote Farbe annimmt.

manchen Gesteinen vorhandene Eisenkies ( $\text{FeS}_2$ , § 23). Die dabei entstehende freie *Schwefelsäure*, eine der stärksten bekannten Säuren, wirkt auf die mit ihr in Berührung kommenden Karbonate und Silikate sehr energisch zersetzend ein, indem sie die kiesel-sauren Salze unter Abscheidung von Kieselsäure, die kohlen-sauren unter Austreibung von Kohlendioxyd in Sulfate (z. B. in Gips) umwandelt, die vom Wasser meist leichter gelöst werden, als die ursprünglichen Verbindungen. Enthält ein Gestein Beimengungen organischer Natur, wie z. B. der Ortstein (§ 33, 2), so werden diese durch den Sauerstoff unter Überführung ihres Kohlenstoffs in Kohlendioxyd, ihres Wasserstoffs in Wasser zerstört und dadurch der Gesteinszusammenhang gelockert. Ortstein zerfällt bei längerem Liegen an der Luft zu einzelnen Sandpartikeln.<sup>1)</sup> Weiteres über die zersetzenden Wirkungen, die der Sauerstoff auf organische Stoffe und deren Abkömmlinge ausübt, werden die Erörterungen über die „vegetativen Vorgänge“ bei der Bodenbildung bringen (s. u.).

§ 40. Das *Wasser* wirkt schon im reinen Zustande lösend und meist auch zersetzend auf die bodenbildenden Gesteine ein, in weit höherem Grade aber in Gemeinschaft mit Sauerstoff und *Kohlensäure*, die das natürliche Wasser in nicht unbeträchtlichen Mengen gelöst enthält. Bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Druck können 100 Maßteile Wasser ungefähr 3 Maßteile Sauerstoff und 100 Maßteile Kohlendioxyd aufnehmen.

§ 41. Sehr einfach verläuft unter der Einwirkung kohlensäurehaltigen Wassers die *Verwitterung der Karbonate* (§§ 17 u. 33, 4). 10000 Teile mit Kohlensäure gesättigten Wassers können in Lösung bringen:

Calciumkarbonat	Magnesiumkarbonat	Dolomit	Eisenoxydulkarbonat
( $\text{CaCO}_3$ )	( $\text{MgCO}_3$ )	( $\text{CaCO}_3, \text{MgCO}_3$ )	( $\text{FeCO}_3$ )
10	13	3	7 Teile.

Wirkt mithin kohlensäurehaltiges Wasser auf Gesteine ein, welche ganz oder zum Teil aus Karbonaten bestehen, so können diese allmählich gelöst und von ihrer ursprünglichen Lagerstätte ganz fortgeführt werden, während etwaige Nebenbestandteile, wie Quarz, Sand, Silikate, Ton, Eisenoxyd, meist in gelockertem Zusammenhange und gewöhnlich dunkler gefärbt zurückbleiben. Die Auslaugung des Calciumkarbonates aus kalkhaltigen Böden durch das Tagwasser erfolgt schichtenweise in der Art, daß die untere Schicht erst dann an die Reihe kommt, wenn die obere völlig von Kalk

<sup>1)</sup> Nach Emeis kann ein Zerfall dieser eigentümlichen Gesteinsbildung, falls es sich um wirklichen Ortstein, d. h. durch humose Stoffe und nicht durch Eisenverbindungen verkitteten Sand handelt, schon durch eine gründliche Entwässerung der ortsteinführenden Bodenschichten herbeigeführt werden.



befreit ist. Daher findet sich häufig z. B. eine ganz kalkarme Geschiebelehmsschicht unmittelbar auf kalkhaltigem, ja bisweilen durch den Oberflächenkalk noch über den ursprünglichen Gehalt hinaus angereicherten Geschiebemergel aufgelagert. Auf *Dolomit* (§ 33, 4) wirkt das kohlen-säurehaltige Wasser in der Weise zersetzend ein, daß es zunächst vornehmlich Calciumkarbonat entführt, also eine Masse zurückkläuft, die an Magnesiumkarbonat reicher ist. Die vom Wasser aufgelösten und fortgeschwemmten Karbonate gelangen unter geeigneten Verhältnissen an anderen Stellen wieder zum Absatz, wobei das Ferrokarbonat allermeist in Eisenoxyd und Eisenhydroxyd umgewandelt wird (§ 18).

§ 42. *Verwitterung der Sulfate.* Das an der Bodenbildung vornehmlich beteiligte *Sulfat*, das Calciumsulfat (Gips, Anhydrid), wird gleichfalls durch Wasser in Lösung gebracht (ein Gehalt des Wassers an Kohlensäure scheint die Löslichkeit nicht zu erhöhen), und zwar können 10 000 Teile Wasser ungefähr 25 Teile Calciumsulfat aufnehmen. Unter dem Einfluß organischer Stoffe erleiden die Sulfate eine Reduktion und gehen schließlic in Karbonate über (§ 22).

§ 43. *Verwitterung der Phosphate und der Kieselerdemineralien.* Auch die in vielen Gesteinen vorkommenden *Phosphate* werden durch kohlen-säurehaltiges Wasser gelöst. Die Löslichkeit ist bei den verschiedenen Phosphaten sehr verschieden, jedoch stets sehr gering. Noch schwerer löslich scheinen der *Quarz* und die übrigen *Kieselerdemineralien* zu sein; in weit größeren Mengen löst sich Kieselerde in kohlen-saurem Wasser, wenn sie aus sich zersetzenden Silikaten abgeschieden wird.

§ 44. *Die Verwitterung der kieselsauren Salze* unter dem Einfluß von Kohlensäure und Wasser verläuft sehr verschieden, je nach der physikalischen Beschaffenheit (Struktur) und chemischen Zusammensetzung des Minerals und je nach dem vorhandenen Vorrat an den genannten Lösungsmitteln. Je weniger Hindernisse die Struktur eines Minerals dem Eindringen der lösenden Agentien in den Weg stellt, je mehr Angriffspunkte die letzteren finden, um so energischer werden sie im allgemeinen ihr Zerstörungswerk vollbringen. Ihm wird wesentlich vorgearbeitet, wenn das Mineral Eisenoxydul enthält, das unter dem Einfluß des Sauerstoffs höher oxydiert wird und dadurch den Zusammenhang der Mineralelemente lockert.

Von den in den Silikaten enthaltenen *Metallen* unterliegt im allgemeinen am leichtesten das Calcium und das Eisen der Oxydulverbindungen dem Angriff der Kohlensäure, es folgt das Natrium, dann erst das Kalium und das Magnesium (letzteres ist meist noch schwerer angreifbar als das Kalium). Sie werden durch die Kohlensäure in Karbonate übergeführt

und, in Wasser gelöst, dem Mineral entzogen. An ihre Stelle tritt häufig etwas Wasser in das Silikat ein. Die entstandenen Karbonate können ferner lösend auf die Kieselsäure einwirken und einen Teil davon mitführen. Aluminium und das Eisen der Ferriverbindungen werden von der Kohlensäure gar nicht angegriffen und bleiben als wasserhaltiges Eisen- und Aluminiumsilikat zurück. Auf diese Weise kann z. B. der *Orthoklas* (Kalifeldspat) sich allmählich in *Kaolin* umwandeln, ein Vorgang, der sich durch folgende schematische Darstellung veranschaulichen läßt:

	Kali	Tonerde	Kieselerde	Wasser
In 100 Orthoklas $[K_2Al_2(Si_3O_8)_2]$ sind enthalten	$= K_2O$ 16,9	$+ Al_2O_3$ 18,5	$+ 6SiO_2$ 64,6	0
Es treten aus (—), ein (+)	— 16,9	0	— 43,1	+ 6,5
Es bleiben		18,5	+ 21,5	+ 6,5
$= 46,5$ Kaolin $[H_2Al_2(SiO_4)_2 + H_2O] =$		$Al_2O_3$	$+ 2SiO_2$	$+ 2H_2O$

Der in der Natur vorkommende Kaolin enthält immer noch Alkalien. Es geht also in Wirklichkeit die Zersetzung nie so vollständig vor sich, wie es nach obiger Darstellung scheinen möchte, und dasselbe gilt für die Verwitterung der übrigen Silikate und namentlich der an Magnesium reichen. So verwittert der *Olivin*<sup>1)</sup> infolge der meist vorhandenen feinen Sprünge und Spalten zuerst leicht, indem das stets darin enthaltene Eisenoxydul in Eisenoxyd übergeführt wird. Der an Magnesium reiche Rest aber wandelt sich unter Wasseraufnahme in ein schwer verwitterbares Magnesiumsilikat, meist in *Serpentin* um. Aus *Augit* und *Hornblende* treten leicht Calcium, Eisenoxydul und die etwa vorhandenen Alkalien als Karbonate aus, zurück aber bleiben an Magnesium reiche, schwer zersetzliche Silikate: *Serpentin*, *Talk*, *Chlorit* oder, wenn die Mutterminerale Aluminium enthielten, *Magnesiaglimmer*. Erst bei weiterem Fortschreiten der Verwitterung wird auch das Magnesium in Karbonat übergeführt, und es bleiben dann von den aluminiumhaltigen Mineralien *eisenhaltige Tone* als Endprodukt zurück. Wenn nach dem oben Gesagten im allgemeinen die an Calcium und Eisenoxydul reichen Silikate schneller als die an Natrium reichen, und diese schneller als die an Kalium und namentlich an Magnesium reichen der Verwitterung unterliegen, so wirken hierauf doch noch andere Umstände fördernd ein, unter deren Einfluß jene Gesetzmäßigkeiten modifiziert werden. Im Einklang mit den letzteren steht es, wenn die an Natrium und Calcium reichen *Plagioklase* schneller zu verwittern pflegen als der *Kalifeldspat*, daß die *Augite* sich schneller zersetzen als die an Aluminium und Magnesium reicheren, an Calcium ärmeren *Hornblend*en. Dagegen ist der an Kali reiche *Muscovit* (Kali-

<sup>1)</sup> Vergl. die Übersicht über die Zusammensetzung der wichtigsten Silikate (§ 15).

glimmer) fast unverwitterbar, während die Zersetzung des *Magnesia-glimmers* trotz seines hohen Magnesiumgehaltes verhältnismäßig leicht erfolgt. Diese und andere Tatsachen lassen vermuten, daß auch das Verhältnis zwischen Kieselsäure und Metall innerhalb der Silikate von Einfluß auf deren Zersetzlichkeit ist. Diese scheint sich mit Zunahme des Kieselsäuregehaltes zu verringern. (Vergl. auch die früheren Mitteilungen über das chemische Verhalten der Silikate, § 16.)

### § 45.

**Die komplizierte Verwitterung.** Bei den vorhin betrachteten Vorgängen der einfachen Verwitterung entstehen Lösungen von verschiedenen Salzen des Kaliums, Natriums, Calciums, Magnesiums, Eisenoxyduls, sowie von Kieselsäure, die aufeinander sowie auf die ursprünglichen oder bereits mehr oder weniger zersetzten Gesteinsbestandteile chemisch einwirken und die mannigfaltigsten Umwandlungen hervorbringen können. Diese Vorgänge faßt man unter dem Namen „komplizierte Verwitterung“ zusammen.

Wie bereits früher aneinandergesetzt ist (§ 18, Anm.), findet bei der Berührung zweier chemisch aufeinander einwirkenden Körper folgendes statt: Falls durch Vereinigung des einen mit dem andern, oder eines Bestandteils des einen mit einem Bestandteil des anderen Körpers eine Verbindung entstehen kann, die von den vorhandenen Agentien nicht mehr chemisch beeinflusst wird, so wird diese in einer Menge gebildet, die den vorhandenen aufeinander wirkenden Mengen der Bestandteile entspricht (die Umsetzung ist eine vollständige). Bleiben jedoch die möglichen Umsetzungsprodukte der chemischen Einwirkung der anwesenden Agentien zugänglich, so ist die Umsetzung nur eine beschränkte und in ihrer Größe abhängig von der Größe der chemischen Anziehungskraft, die die einzelnen Bestandteile aufeinander ausüben, und von den Mengen, in denen sie vorhanden sind. Dieses Gesetz gilt nicht nur für gelöste Stoffe, sondern auch dann, wenn ein gelöster mit einem festen Stoff in Berührung kommt, der seiner chemischen Einwirkung zugänglich ist. Da also die chemische Wirkung eines Stoffes nicht bloß von der chemischen Anziehung, die er auf einen anderen ausübt, sondern zugleich auch von der Masse abhängig ist, mit der er in die Reaktion eintritt, so kann unter Umständen ein mit schwächerer chemischer Verwandtschaft ausgestatteter Stoff einen mit stärkerer Anziehungskraft begabten aus seinen Verbindungen verdrängen, wenn er nur in genügender Menge vorhanden ist.

**§ 46. Beispiele für die komplizierte Verwitterung.** Obwohl das Calcium eine weit schwächere Verwandtschaft zu den Säuren hat als das Kalium, kann es, in ausreichender Menge (als gelöstes saures Calciumkarbonat) zugeführt, in Kaliumsilikaten an die Stelle des Kaliums treten.

So verwandelt sich unter Umständen der an Kalium reiche, Calcium nicht enthaltende *Orthoklas* in den an Calcium reichen, kaliumfreien *Epidot*, wobei zugleich Aluminium durch Eisen ersetzt wird. So kann ferner, je nach dem Mengenverhältnis der aufeinander chemisch einwirkenden Stoffe, die *Hornblende*  $\text{CaMg}(\text{SiO}_3)_2$  in den an Calcium reichen *Epidot* oder in den an Magnesium reichen *Chlorit* übergehen. Im ersteren Fall tritt an die Stelle des Magnesiums Calcium, im anderen an die Stelle des Calciums in der Hornblende Magnesium. Es liegt auf der Hand, daß bei diesem Verhalten der chemisch aufeinander einwirkenden Mineralbestandteile die mannigfaltigsten Umwandlungen eintreten können. Durch die komplizierte Verwitterung werden auch diejenigen Bestandteile der Silikate, die der einfachen Verwitterung am längsten widerstehen (s. o.), die Tonerde  $\text{Al}_2\text{O}_3$  und das Eisenoxyd  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  angegriffen und in Bewegung gebracht, indem sie sich in den Lösungen von Karbonaten, Sulfaten, Chloriden auflösen, wobei Kieselerde als Quarz oder Opal abgesetzt wird.

Ein wichtiges Produkt der komplizierten Verwitterung sind die *Zeolithe*. Sie können sich aus wasserfreien Silikaten durch Ersatz von Kalium durch Natrium und Aufnahme von Wasser bilden. So entsteht bei Einwirkung von Natriumkarbonat- oder Natriumchloridlösung auf *Leucit*  $\text{K}_2\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_4$  der zur Zeolithgruppe gehörige *Analcim*  $\text{Na}_2\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_4 + 2\text{H}_2\text{O}$  unter gleichzeitiger Bildung von Kaliumchlorid  $\text{KCl}$  oder Kaliumkarbonat  $\text{K}_2\text{CO}_3$ . Ferner entstehen Zeolithe durch Einwirkung der Lösung von Natrium- oder Calciumsalzen auf Ton oder auf Lösungen von Kieselsäure und Tonerde. Da sie neben Aluminium fast immer nur Natrium und Calcium, aber fast nie Kalium und Magnesium enthalten, so bilden sie sich fast nur in den aus Calcium-Natrium-Silikaten bestehenden, höchst selten in kalium- oder magnesiumreichen Gesteinen. Übrigens läßt sich, wie wir später sehen werden, durch Einwirkung von Kaliumsalzen das Natrium und das Calcium der Zeolithe sehr leicht durch Kalium und andere Stoffe ersetzen, wobei sie eigentümlicherweise ihr Wasser verlieren.

#### C. Umwandlung der Gesteine in Boden unter dem Einfluß der mechanisch und chemisch wirkenden Kräfte.

Für die Schnelligkeit, mit der unter dem Einfluß der oben geschilderten Kräfte aus den Gesteinen der festen Erdrinde Boden gebildet wird, und für die Beschaffenheit des letzteren sind im wesentlichen als Faktoren maßgebend: a) die Beschaffenheit der gesteinsbildenden Mineralien und b) die einwirkenden Wassermengen.

### § 47.

**Einfluß der Beschaffenheit der gesteinsbildenden Mineralien auf die Umwandlung.** 1. *Die Oberflächengestaltung des verwitternden*

*Gesteins.* Ist diese eben oder gar muldenförmig, so werden nur die durch den Verwitterungsprozefs löslich gewordenen Stoffe durch das Wasser fortgeführt; auf geneigten oder abschüssigen Flächen tritt dagegen zugleich auch die mechanische, auch ungelöste Stoffe verschwemmende Kraft des Wassers in Wirkung. *Granit* mit ebener oder muldenförmiger Oberfläche hinterläßt bei seiner Verwitterung einen an Ton und Glimmerteilchen reichen *Lehmboden*, auf stark abfallenden Flächen wird Ton und Glimmer fortgeschwemmt, und es bleibt tonarmer *Sandboden* zurück.

2. *Die Struktur des verwitternden Gesteins.* Je leichterem Zutritt ein Gestein den Verwitterungsagentien Wasser, Sauerstoff, Kohlensäure gewährt, um so energischer können diese bodenbildend einwirken. *Geschichtete* und *schiefrige* Gesteine werden im allgemeinen schneller der Verwitterung unterliegen, als *kompakte*: Gneifs schneller als Granit, die Flöz- oder Sedimentärgesteine schneller als die kristallinen Massengesteine. Sind die geschichteten Gesteine durch irgend welche im Erdinnern wirkenden Kräfte *aufgerichtet* worden, so wird dadurch das Eindringen des Wassers mit seinen zerstörenden Agentien, die sprengende Wirkung des Eises, und damit der Zerfall erheblich beschleunigt. In gleicher Richtung wirkt die eigentümliche regelmäßige *kugelige oder säulenförmige Absonderung*, die manche Gesteine, z. B. viele *Basalte*, aufweisen. Eine *dichte* Gesteinsstruktur, die mit einer feinen und gleichmäßigen Verteilung der Gemengteile verbunden ist (z. B. bei vielen *Porphy*-Arten), verlangsamt, eine mehr *grobkörnige* oder *grobkristallinische* Struktur beschleunigt im allgemeinen die Verwitterungsvorgänge. Denn die letztere ruft durch die verschiedenartige Ausdehnung der gesteinsbildenden Mineralien die Bildung zahlreicher Risse und Abspaltungen hervor, die die Verwitterung in das Gesteinsinnere tragen. So zerfällt der grobkörnige, große Quarz- und Feldspatkristalle enthaltende *Granit* verhältnismäßig leicht zu größeren und kleineren Trümmern, die bei weiterer Zersetzung einen tiefgründigen Boden liefern, während aus feinkörnigen Graniten und aus *Porphyren* mit sehr dichter Grundmasse („Hornsteinporphyr“), bei denen die Verwitterung nur von der Oberfläche des Gesteins ausgeht, meist flachgründige Böden entstehen.

3. *Die chemische Beschaffenheit der gesteinsbildenden Mineralien.* Sind die Gemengteile eines Gesteins in verschiedenem Grade der Verwitterung zugänglich, so folgt sie dem durch die Lage der leichter zerstörbaren Mineralien vorgezeichneten Weg, löst dadurch den Zusammenhang der Gesteinsmasse und führt ihren Zerfall zu „Grus“ herbei. *Granite*, die neben dem schwer verwitternden Orthoklas leicht zerfallenden Oligoklas oder gar Labrador enthalten, unterliegen daher schneller der Umwandlung, als die von Plagioklasen freien Glieder dieser Gesteinsart. Da die Horn-

blende schwieriger verwittert als der Augit (§ 44), so liefert der aus Plagioklas und Hornblende bestehende *Diorit* (§ 31, 2) einen an feinerdiger Masse armen steinigen Boden, während der aus Plagioklas und Augit gebildete *Diabas* (§ 31, 2) ziemlich schnell zu fruchtbarem, tiefergründigem Boden zerfällt.

Von großer Bedeutung für die leichtere oder schwerere Verwitterung eines Gesteins ist der Gehalt an *niederen Oxydationsstufen des Eisens*, an Eisenoxydul ( $\text{FeO}$ ) und Eisenoxydoxydul ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ). Sie werden entweder durch die im Wasser gelöste Kohlensäure in Eisenkarbonat übergeführt, das, in kohlensäurehaltigem Wasser sich lösend, aus dem Gestein austritt, oder unter dem Einfluß des zutretenden Sauerstoffs oxydiert. Beide Prozesse wirken lockernd auf den Gesteinsverband. Der Übergang der dunkel (grün) gefärbten Eisenoxydulverbindungen in gelbrotes Eisenoxyd oder in braunrotes Eisenhydroxyd macht sich äußerlich durch den Farbenwechsel bemerkbar, der beim Übergang des unverwitterten Gesteins in Boden sich vollzieht (§ 39). Von der Oberfläche nach unten hin geht die Farbe solcher Böden nicht selten von gelbrot in braunrot, in rot und grün gemengt und schließlich in das Grün des bodenbildenden Gesteins über, eine Aufeinanderfolge von Farben, die ein Urteil über die Tiefe zuläßt, bis zu der die Verwitterung sich erstreckt. An Eisenoxydul reich sind von den kristallinen Massengesteinen namentlich die „basischen“ (§ 31, 2), wie Basalt, Dolerit, Diabas, Melaphyr u. a. Die Sedimentärgesteine, die aus den kristallinen Gesteinen durch Verwitterung und Verschwemmung hervorgegangen sind, pflegen naturgemäß an niederen Oxydationsstufen des Eisens ärmer zu sein, falls solche nicht nachträglich durch Reduktionsprozesse innerhalb des neugebildeten Gesteins aus dessen Oxyden sich zurückgebildet haben (§ 22). Am häufigsten kommen sie hier in den *Tongesteinen* vor.

Ein hoher Gehalt der Gesteine an *Calciumverbindungen*, die durch Wasser und Kohlensäure in Karbonat umgewandelt und ausgewaschen werden, wirkt gleichfalls auf ihre rasche Umbildung zu Boden hin. Auch aus diesem Grunde zerfallen die kalkreichen *basischen* Urgesteine schneller als die *sauren*, und erstere liefern daher im allgemeinen einen tiefergründigeren Boden als die letzteren. Der an Calcium- und Magnesiumsilikat reiche *Basalt* wird bei der Verwitterung infolge der Bildung und Fortführung von Calcium- und Magnesiumkarbonat<sup>1)</sup> an Calcium und Magnesium immer ärmer, während andere schwerer lösliche Bestandteile sich anhäufen.

---

<sup>1)</sup> In einem gewissen Verwitterungsstadium weist der zu Boden zerfallende Basalt einen mehr oder weniger großen Gehalt an Karbonaten auf.

So fand man in hundert Teilen:

	des ursprüng- lichen Gesteins	der ersten Verwite- rungsstufe	der zweiten Verwite- rungsstufe
Kalk ( $\text{CaO}$ )	14,6	10,6	3,7
Magnesia ( $\text{MgO}$ )	7,3	7,1	1,3
Tonerde ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )	17,1	19,8	32,5
Eisenoxyd ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )	7,7	8,4	9,2

Schneller noch findet natürlich der Zerfall des Gesteins statt, wenn darin fertiggebildete *Karbonate* enthalten sind. Infolge der Auswaschung wird die Gesteinsmasse und der daraus entstehende Boden namentlich an Calciumkarbonat immer ärmer, an anderen Bestandteilen reicher. Von der Entkalkung der Geschiebemergel-Böden war schon früher die Rede (§ 33, 5 a). Ein sehr lehrreiches Beispiel liefern auch die Untersuchungen E. v. Wolffs über die Bodenbildung aus dolomitischem Muschelkalkstein.

Es enthielt:

	das ursprüng- liche Gestein ‰	die erste Verwite- rungsstufe ‰	die zweite Verwite- rungsstufe <sup>1)</sup> ‰
Calciumkarbonat ( $\text{CaCO}_3$ )	77,9	47,8	35,2
Magnesiumkarbonat ( $\text{MgCO}_3$ )	16,6	34,9	22,8 <sup>2)</sup>
Tonerde ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )	0,8	2,6	7,7
Kieselerde ( $\text{SiO}_2$ )	3,1	9,8	24,7
Kali ( $\text{K}_2\text{O}$ )	0,27	1,12	2,82
Phosphorsäure ( $\text{P}_2\text{O}_5$ )	0,08	0,16	0,42
Eisenoxyd ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ )	0,65	1,69	2,15

<sup>1)</sup> Das ursprüngliche Gestein war sehr fest, die „erste Verwitterungsstufe“ bereits ziemlich mürbe geworden, die „zweite Verwitterungsstufe“ zum Teil zu leicht zerreiblichen Gesteinsbröckeln, zum Teil zu lockerem Pulver auseinander gefallen, ohne schon den Zustand eines „Kulturbodens“ erlangt zu haben.

<sup>2)</sup> In diesen Zahlen macht sich zugleich die größere Widerstandsfähigkeit des Magnesiumkarbonates gegenüber dem Calciumkarbonat bemerklich. Erst wenn der größere Teil des Calciumkarbonates durch Auswaschung entfernt ist, unterliegt das Magnesiumkarbonat der Auflösung (§ 41).

Die Verarmung der äußersten Verwitterungsrinde der bodenbildenden Gesteine an Karbonaten kann so weit gehen, daß im Interesse der landwirtschaftlichen Kultur eine künstliche Zufuhr von Kalk oder Mergel nötig wird. Nicht selten kann das hierzu nötige Material dem tieferen Untergrund entnommen werden. So bringt man z. B. auf den Marschböden (§ 37), deren äußerst fein verteilte Karbonate der Auswaschung besonders leicht unterliegen, zum Ersatz die an Calciumkarbonat noch reiche Erde der tieferen Schichten („Kuhlerde“ oder „Wühlerde“) zur Oberfläche („Kuhlen“, „Wühlen“, „Überkleien“). — Auch die stellenweise über Marschboden als Untergrund aufgewachsenen Moore („Marschmoore“, s. u.) sucht man vielerwärts durch Aufbringen von Marscherde aus dem Untergrund, die man mittels besonderer Hebevorrichtungen („Kuhlmaschinen“) nicht selten aus sehr beträchtlicher Tiefe gewinnt, zu verbessern und namentlich mit Kalk anzureichern. Unter dem Einfluss der vermodernden Moorpflanzen haben jedoch die unmittelbar unter dem Moor liegenden oder auch die tieferen, stark mit Pflanzenresten durchsetzten Marschbodenschichten Veränderungen erlitten, die sie für den beregten Zweck völlig untauglich machen können. Aus schwefelsauren Salzen und Eisenoxyd ist durch Reduktion (§ 22) Zweifachschwefeleisen entstanden. Wird dieser an sich unschädliche Stoff an die Oberfläche gebracht, so geht er unter der Einwirkung des Luftsauerstoffs in zwei starke Pflanzengifte, nämlich in freie Schwefelsäure und Ferrosulfat (in wasserhaltigem Zustande „Eisenvitriol“ genannt) über (§ 23). Solange genügende Mengen von Calciumkarbonat vorhanden sind, erfahren, wie früher (a. a. O.) erörtert wurde, jene Schädlinge eine heilsame Umwandlung, ist aber das Calciumkarbonat aus der betreffenden Bodenschicht ausgelaugt (was unter der Einwirkung der aus pflanzlichen Resten reichlich entwickelten Kohlensäure häufig der Fall ist), so lassen sie ein Pflanzenwachstum nicht mehr aufkommen. Die schwefeleisenhaltige und dabei ihres Calciumkarbonates ganz oder fast ganz beraubte Marscherde bezeichnet man im nordwestlichen Deutschland als „Gifterde“, „Pulvererde“, „Bettelerde“ oder „Maibolt“.<sup>1)</sup> Man schützt sich vor ihr

<sup>1)</sup> Der Unterschied zwischen brauchbarer und der durch Reduktion und Auslaugung ungünstig veränderten Marscherde geht deutlich aus folgenden Untersuchungsergebnissen der Moor-Versuchsstation hervor. Es enthielten in 100 Teilen der von Wasser und von organischen Beimengungen frei gedachten Masse:

	Gute Marscherde	Maibolt
Calcium- und Magnesiumkarbonat	8,58 Teile	2,43 Teile
Schwefeleisen . . . . .	2,18 „	9,77 „
Ferrosulfat*) . . . . .	— „	1,50 ..
Freie Schwefelsäure*) . . . . .	— „	0,45 ..

\*) Bei längerem Liegen der Probe an der Luft aus Schwefeleisen entstanden.



dadurch, daß man den von den Kuhlmaschinen ausgehobenen Boden nur dann verwendet, wenn er beim Übergießen mit Salzsäure aufbraust. (Entweichen von Kohlendioxyd.) —

Infolge der starken Auswaschung, der die Karbonatminerale unterliegen, kann es vorkommen, daß von einem ursprünglich fast ausschließlich aus Kalkstein, Magnesit, Dolomit bestehenden Gestein bloß die beigemengten schwerlöslichen Mineralien wie Ton, Sand, Eisenoxyd zurückbleiben, und der Charakter des entstehenden Bodens sich ausschließlich nach dem Vorwiegen dieses oder jenes *zufälligen* Bestandteils des ursprünglichen Gesteins richtet.

#### § 48. Einfluß der bei der Verwitterung mitwirkenden Mengen von Wasser und der Art und Menge der im Wasser gelösten Stoffe.

Bei der verschiedenen Löslichkeit der einzelnen Gesteinsbestandteile in kohlensäurehaltigem Wasser können die aus einem und demselben Gestein hervorgehenden Böden sehr verschiedenartig sein, je nachdem der Verwitterungsprozeß in Anwesenheit von viel oder wenig Wasser sich vollzieht. Im ersteren Falle wird mit den leichter löslichen Bestandteilen auch ein größerer Teil der Kieselsäure in Lösung gebracht und entfernt, im anderen werden fast nur die leichter löslichen Bestandteile fortgeführt, und es bleibt ein an Kieselerde reicherer Boden zurück. Ebenso bewirkt ein größerer Gehalt des Wassers an Kohlensäure eine schnelle Verwitterung, bei der die in Karbonate umgewandelten Basen der Silikate rasch entführt werden und die schwer lösliche Kieselerde zurückbleibt, während bei geringerem Kohlensäuregehalt die Verwitterung langsam vorschreitet, und die geringen Mengen ausgeschiedener Kieselerde zugleich mit den entstandenen Karbonaten fortgespült werden. Die Art der Salze, die das Wasser gelöst enthält, ist bestimmend für die Gesteinsumwandlungen, die man als „komplizierte“ Verwitterung bezeichnet (§ 45), also auch für die Art des sich bildenden Bodens. Aus reinem *Kalkstein* kann ein an Magnesiumkarbonat reicher Boden entstehen, wenn Lösungen dieses Salzes auf jenen einwirken. Eine Lösung von Magnesiumkarbonat ist imstande, noch große Mengen von Calciumkarbonat aufzunehmen; beide Salze bilden schwerlöslichen *Dolomit*, der sich ausscheidet, während leichtlösliches saures Calciumkarbonat vom Wasser fortgeführt und an anderen Stellen abgelagert werden kann. Kommen *eisenreiche* Gesteine, z. B. Tone, mit den Lösungen von Calciumphosphat in kohlensäurehaltigem Wasser zusammen, so entsteht ein schwerlösliches Eisenphosphat, das im Boden zurückbleibt. *Kaliumreiche*, an Calciumverbindungen arme Gesteine können *calciumreiche* und kaliumarme Böden liefern, wenn sie mit großen Mengen calciumkarbonathaltigen Wassers in Berührung sind; denn Kaliumsilikat und saures Calciumkarbonat setzen sich zu leichtlöslichem Kaliumkarbonat um,

während Kieselerde und normales Calciumkarbonat ausgeschieden werden. Unter Einwirkung von *kaliumkarbonathaltigem* Wasser kann in *natriumsilikathaltigen* Gesteinen das Natrium durch Kalium ersetzt, also die Bildung eines an Kalium reichen Bodens hervorgerufen werden, während das entstandene Natriumkarbonat fortgewaschen wird. Lösungen von Kalium- und Natriumsilikat können Tonerde in Lösung bringen und so die Bildung eines tonärmeren Bodens aus einem an Aluminiumsilikat reichen Gestein veranlassen. Dahin gehört ferner die Bildung von Schwefel-eisen bei Einwirkung von eisenkarbonathaltigem Wasser auf Gips (§ 22). Weitere Umsetzungen s. § 46.

§ 49. Die vorausgegangenen Erörterungen lassen klar erkennen, daß ein und dasselbe Gestein sehr verschiedenartige Böden liefern kann, je nach den Umständen, unter denen seine Verwitterung sich vollzieht. Der *Granit* kann ebensowohl zu einem unfruchtbaren Sand-, wie zu einem fruchtbaren Leimboden sich zersetzen, aus *Tonschiefer* ein an Kali und Kalk reicher und in anderen Fällen ein Boden hervorgehen, der nur Spuren dieser Stoffe enthält. Aus *Basalt* kann unter Umständen ein Boden gebildet werden, der in seiner Zusammensetzung sich nur wenig von dem ursprünglichen Gestein unterscheidet, unter anderen Verhältnissen kann aus dem an Kalk, Kali, Phosphorsäure reichen Muttergestein ein von diesen Stoffen fast freier Boden entstehen. Bezeichnungen, die bloß die Herkunft eines Bodens erkennen lassen, wie *Granitboden*, *Gneißboden*, *Basaltboden*, *Porphyrboden* u. a., bieten mithin keinerlei Handhabe, um den landwirtschaftlichen Wert der fraglichen Bodenarten zu ermessen.

#### D. Die Umwandlung der festen Erdrinde unter dem Einfluß vegetativer Kräfte.

Die früheren Erörterungen haben dargetan, daß chemische und mechanische Vorgänge unablässig an der Zerstörung der festen Erdrinde arbeiten und dadurch zugleich das Material für die mannigfachsten Neugestaltungen schaffen. Ebenso führen die pflanzlichen und tierischen Organismen, welche die Erde bevölkern, sowohl durch ihre Lebenstätigkeit als durch ihre abgestorbenen und der Zersetzung anheimfallenden Leiber einerseits den Zerfall des Bestehenden und andererseits den Aufbau neuer Gebilde herbei. Der Beteiligung tierischer und pflanzlicher Wesen an der Entstehung des Kieselgurs, der Kreide, des Muschel- und Korallenkalkes, des Kalktuffs, Wiesenkalks und des Salpeters ist früher bereits gedacht worden (§§ 12; 17, 2; 33, 4, 5). Auch an der manchenorts vorkommenden Aufspeicherung von Phosphaten haben zweifellos vielfach Pflanzen und Tiere mitgewirkt. Den Resten von Seetieren verdanken höchstwahrscheinlich die *Petroleumansammlungen*, einer üppigen Pflanzenvegetation

die *Steinkohlen-* und *Braunkohlenlager* ihre Entstehung. Aber die Mitwirkung tierischer und pflanzlicher Wesen an der Umgestaltung der Erdrinde beschränkt sich nicht auf diese vereinzeltten Vorkommnisse, sie spielt vielmehr bei der Entstehung aller Bodenarten eine wichtige Rolle.

### § 50.

**Einfluss lebender Pflanzen auf die Bodenbildung.** Alle Pflanzen haben zu ihrer Ernährung gewisse Mineralstoffe, die wir als Bestandteile der die Erdrinde bildenden Gesteine kennen gelernt haben, und ferner Wasser, Stickstoff und Kohlenstoff nötig. Wasser, Stickstoff und Kohlenstoff sind die vornehmsten Bildner des verbrennlichen („organischen“) Teils der Pflanzenmasse. In unerschöpflichen Mengen bietet die Atmosphäre für alle Pflanzen leicht aufnehmbares Wasser. Der in ihr gleichfalls reichlich vorhandene Kohlenstoff ist mit Sauerstoff zu Kohlendioxyd ( $\text{CO}_2$ ) verbunden. Aber die höher organisierten, Blattgrün (Chlorophyll) enthaltenden Pflanzen besitzen die Fähigkeit, das Kohlendioxyd der Luft in ihren chlorophyllhaltigen Zellen mit Hilfe des Sonnenlichtes zu spalten und dessen Kohlenstoff zum Aufbau ihres Leibes zu benutzen. Einige von ihnen, die Schmetterlingsblütner (Papilionaceen), vermögen auch mit Hilfe kleinster Lebewesen („*Bacterium radicola*“, „*Rhizobium*“), die sich an ihren Wurzeln in eigentümlichen Anschwellungen (Wurzelknöllchen) ansiedeln, den freien Stickstoff der atmosphärischen bzw. der Bodenluft zur Bildung ihrer stickstoffhaltigen Bestandteile zu verwerten. Den übrigen höheren Pflanzen geht diese Fähigkeit ganz oder doch so weit ab, daß sie zu ihrer normalen Ernährung des Vorhandenseins von Stickstoffverbindungen bedürfen. Abgesehen von den verhältnismäßig geringen Mengen von Stickstoffverbindungen, die sich bei den früher erörterten Naturvorgängen (§ 28) bilden, stand aber zu der Zeit, in der auf der erkalteten Erdoberfläche das Pflanzenwachstum möglich wurde, den letzteren nur der ungebundene Stickstoff der Luft zur Verfügung. Dem Wachstum höherer Pflanzen, die wie die Schmetterlingsblütner den freien Luftstickstoff sich aneignen vermögen, war der ihrer Wurzelentwicklung ungünstige Zustand der harten Steinmassen hinderlich. Es konnten darauf naturgemäß nur höchst anspruchslose pflanzliche Organismen gedeihen, die zugleich die Fähigkeit besitzen, den zum Aufbau ihres Körpers nötigen Stickstoff und Kohlenstoff der atmosphärischen Luft zu entnehmen. Daß es derartige Organismen gibt, hat die Forschung der Neuzeit zweifellos dargetan. Es sind Bakterien, denen das kaum verwitterte Gestein genügende mineralische Nahrung bietet, und die aus dem freien Stickstoff und dem Kohlendioxyd der Luft ihren Bedarf an Kohlenstoff und Stickstoff zu decken instande sind (§ 28, Anm.). Mit ihren abgestorbenen Leibern ließen sie Stickstoffverbindungen zurück, die auch höheren, auf die Auf-

nahme gebundenen Stickstoffs angewiesenen Pflanzen die Ansiedelung ermöglichten, und die durch ihre Lebenstätigkeit eine nicht unbeträchtliche gesteinzersetzende und dadurch bodenbildende Wirkung ausübten. Dieser Vorgang lässt sich noch heutzutage vielfach auf fast unverwittertem Fels beobachten. Zunächst sind es die anspruchslosesten Pflanzen, Algen, Flechten, die das Gestein beziehen, Feuchtigkeit zurückhalten und so, im Verein mit der immer vorhandenen Kohlensäure, den Verwitterungsprozess beschleunigen und den Boden für das Wachstum immer anspruchsvollerer Gewächse vorbereiten. Die Pflanzenwurzeln in ihrem Bestreben, Nahrung aus dem Boden zu saugen, verzweigen sich über das Gestein, dringen in jedes noch so feine Spältchen und umklammern die entstandenen Gesteinsbrocken. Durch die von ihnen ausgeschiedene Kohlensäure befördern sie die Verwitterung der Mineralien, mit denen sie in Berührung kommen, und durch eigentümliche Vorgänge, die man als *diosmotische* oder als *Diffusion* bezeichnet, wirkt in gleicher Richtung der in ihren Zellen eingeschlossene saure Wurzelsaft. Gerade die feinsten, besonders dicht an die Gesteinspartikel sich anlegenden Wurzeln pflegen reich an organischen Säuren: Oxalsäure, Weinsäure, Zitronensäure u. a. zu sein. Diese sind sowohl im Zelleninhalt, als auch in der die Zellhaut durchsetzenden Flüssigkeit gelöst und imstande, durch die Zellwandungen hindurch auf die mit ihr in innige Berührung kommenden Gesteinselemente zersetzend und lösend einzuwirken. Die so entstandene Lösung mineralischer Stoffe „diffundiert“ durch die Zellhaut hindurch in die Wurzelzellen und dient zur Versorgung der Pflanzen mit mineralischen Nährstoffen.

Auch *mechanisch* können die in die Gesteinsspalten eindringenden, an Umfang immer mehr zunehmenden Pflanzenwurzeln auf die Zertrümmerung des Gesteins hinwirken, indem sie die Erweiterung der Risse befördern, den Zusammenhang lockern und so den zersetzenden Agentien: Luft, Wasser und Kohlensäure, den Weg bahnen.

Auf der andern Seite kann das natürliche Pflanzenwachstum einer weiteren Zerstörung der zertrümmerten Felsmassen dadurch vorbeugen, daß es deren Verschwemmung durch das Wasser hindert. Die den Boden beziehenden und mit ihren Wurzeln festigenden Moose, Gräser und Waldpflanzen mildern die zerstörende Kraft des auffallenden Regens und schützen das bereits entstandene Erdreich gegen den seitlichen Stoß des zuströmenden Wassers.

*Einfluss abgestorbener Pflanzen auf die Bodenbildung.* Von größter Bedeutung für die Entstehung des Bodens sind die Veränderungen, welche die Pflanzen nach ihrem Tode erleiden, und die Wirkung, die sie auf das umgebende Gestein ausüben.

## § 51.

**Verwesung.** Unter natürlichen Verhältnissen unterliegen die Bestandteile abgestorbener Pflanzen einer fortdauernden Umwandlung. Eingeleitet wird sie durch die Lebenstätigkeit niederer Organismen<sup>1)</sup> („Bakterien“, „Mikroben“), deren Art wahrscheinlich auch auf den Verlauf und die Endprodukte des Zersetzungs Vorganges von Einfluß ist. Beteiligt sich der *Sauerstoff* der Luft in hervorragendem Grade an dem Zersetzungs Vorgange, so bezeichnet man diesen als *Verwesung*. Die Verwesung ist als ein Oxydationsprozeß, eine langsame Verbrennung anzusehen, wobei, unter Aufnahme von Sauerstoff, schliesslich aller Kohlenstoff der organischen Pflanzenbestandteile in Kohlendioxyd, und aller Wasserstoff in Wasser sich umsetzt, also die einfachen Verbindungen zurückgebildet werden, aus denen die lebende Pflanze die verwickelt zusammengesetzten Bestandteile ihres Körpers formte. Der von den Pflanzen in organischen Verbindungen, namentlich als Eiweiß aufgespeicherte Stickstoff wird bei der Verwesung entweder als freies Gas ausgeschieden, oder in Ammoniak oder in Salpetersäure (§ 28) umgewandelt, während die durch die Wurzeln aufgenommenen Mineralstoffe als Karbonate, Nitrate, Sulfate, Phosphate, Silikate und Chloride zurückbleiben. Wie diese Mineralsalze die komplizierte Verwitterung (§ 45), so befördert das beim Verwesungsprozesse auftretende Kohlendioxyd in Verbindung mit Wasser die einfache Verwitterung (§ 38) der noch nicht völlig zersetzten Gesteinstrümmer. Andererseits tragen die von den verwesenden Pflanzen hinterlassenen Stickstoffverbindungen, sowie die Pflanzennährstoffe Kalk, Kali, Phosphorsäure u. a.; die von den Pflanzenwurzeln beim Eindringen in die tieferen Bodenschichten gesammelt und beim Verwesen der Pflanzen in den oberen Bodenschichten angehäuft zurückgelassen werden, erheblich dazu bei, die Bedingungen für das Wachstum anspruchsvollerer Gewächse günstiger zu gestalten, und zwar um so mehr, je vollständiger deren Überführung in Salpetersäure oder vielmehr in salpetersaure Salze erfolgt. Die Umstände, die hierfür besonders maßgebend sind, werden später noch näher erörtert werden.

§ 52. *Der Verlauf des Verwesungsprozesses* hängt im wesentlichen ab von den zur Verfügung stehenden *Sauerstoff- und Wassermengen*, von der *Temperatur*, der grösseren oder geringeren *Widerstandsfähigkeit* der der Zersetzung unterliegenden Pflanzenbestandteile und von der Anwesenheit oder Abwesenheit gewisser mineralischer Stoffe, die die Lebens-

<sup>1)</sup> In jedem Erdboden finden sich große Massen von kleinsten Lebewesen, die sich an der Zersetzung der höheren Organismen beteiligen können. So wurden bei annähernden Zählungen in 1 g Sandboden 380000, in 1 g Lehm-  
boden 500000 Spaltpilze gefunden.

tätigkeit der Verwesungsbakterien beeinflussen oder auf die pflanzlichen Stoffe eine chemische Wirkung ausüben.

Je leichter der Zutritt der *Luftsauerstoff* zu den abgestorbenen Pflanzenresten hat, um so energischer wird im allgemeinen die Oxydation von Kohlenstoff und Wasserstoff verlaufen. Die Anwesenheit von *Wasser* ist ferner eine durchaus nötige Vorbedingung für den Eintritt der Verwesung. Diese findet nicht statt bei völlig ausgetrockneten Stoffen, sie wird durch zunehmenden Wassergehalt der verwesenden Substanz so lange gesteigert, als dieser keinen hemmenden Einfluß auf den Zutritt des Luftsauerstoffs ausübt. Eine Anhäufung von verwesenden Pflanzenstoffen entwickelte bei einem Wassergehalt

von 6,8%	26,8%	46,8%
1,6 Raumteile	26,7 Raumteile	30,6 Raumteile Kohlendioxyd.

Die Intensität der Verwesung ist ferner in hohem Grade abhängig von der Höhe der *Temperatur*. Sie wird verlangsamt oder gehemmt, sobald die Temperatur unter eine gewisse Grenze sinkt oder gewisse Grade übersteigt. Wie groß deren Einfluß innerhalb der Grenzen, zwischen denen noch eine Verwesung erfolgt, auf die Energie der Oxydation ist, geht aus folgenden Zahlen hervor. Verwesende Pflanzenteile lieferten bei einer Temperatur

zwischen 0—7,2°	10,6—15,9°	17,7—27,3°
12,4	18,3	38,4 Gewichtsteile Kohlendioxyd.

Dafs die *besonders festen und dichten* Pflanzenteile, z. B. die verholzten Stengel länger der Verwesung widerstehen, als die weichen und porösen, die dem Eindringen der Zersetzungsagentien kein Hindernis bieten, liegt auf der Hand. Auch die *chemische Beschaffenheit* gewisser Pflanzenbestandteile spielt dabei eine Rolle. Sehr widerstandsfähig sind z. B. die mit Kieselerde imprägnierte Oberhaut vieler Gewächse, sowie die Wachs- und Harzstoffe der Pflanzen. Das aus eigentümlichen Umwandlungen von abgestorbenen Pflanzen (vielleicht auch von tierischen Körpern) hervorgegangene *Erdharz* („Erdwachs“, „Bitumen“) kann, indem es Gesteine durchdringt, diese auffällig lange vor der Verwitterung schützen. Befördert wird die Verwesung sehr erheblich durch die Anwesenheit *alkalisch reagierender* Stoffe, z. B. von Kalium- und Natriumkarbonat, von Calciumhydroxyd und auch von Calciumkarbonat, also von Stoffen, die auf die pflanzlichen Substanzen lösend einwirken und wahrscheinlich der Entwicklung und der Lebenstätigkeit der Verwesungsorganismen förderlich sind. *Verlangsamt* oder vollständig gehemmt wird sie dagegen durch andere Stoffe, welche die Entwicklung der Bakterien ungünstig beeinflussen, so durch grössere Mengen von Chloriden der Alkali- und Erdmetalle, z. B. von Kochsalz, Kaliumchlorid u. a., ferner durch lösliche Salze der schweren Metalle, z. B. Eisensulfat, Quecksilberchlorid, Kupfersulfat u. a. Auch das

Vorhandensein freier Säuren wirkt nachteilig auf die Verwesungsvorgänge ein.

Endlich beteiligen sich an der Zersetzung der Pflanzenreste im Boden noch die in dem letzteren lebenden *Tiere*, und unter diesen in hervorragendem Grade die Regenwürmer, mittelbar, indem sie durch ihre wühlenden und grabenden Bewegungen den Boden lockern und dadurch dem Luftsauerstoff Eingang verschaffen, unmittelbar dadurch, daß sie die als Nährmaterial aufgenommenen Pflanzenstoffe in ihren Verdauungsorganen zu einer der Verwesung leicht unterliegenden Masse verarbeiten. Beihilflich sind ihnen dabei gewisse, ihrem Darmkanal eigene Drüsen, die Calciumkarbonat absondern. Auch die Tätigkeit anderer im Boden hausender Würmer, ferner von Insekten (Engerlingen, Ameisen) und auch von höheren Tieren (namentlich von Maulwürfen) wirkt nach beiden Richtungen fördernd auf die Verwesung ein. Das Vorhandensein *freier Säuren* im Boden verschlechtert die Lebensbedingungen aller dieser Tiere.

### § 53.

**Humus.** Bisher war nur die Rede von den Endprodukten der Verwesung. Zwischen ihnen und den organisierten Pflanzegebilden, aus denen sie hervorgehen, liegt aber eine große Anzahl von *Mittelgliedern*, von dunkel gefärbten, in den verschiedensten Zersetzungsstadien befindlichen und sich fortwährend verändernden Substanzen, Produkten einer noch unvollständigen Verwesung. Diese Stoffe, die, solange sie sich nicht infolge weiterer Aufnahme von Sauerstoff in die letzten, zum Teil luftförmigen Produkte des Verwesungsprozesses umgewandelt haben, einen wichtigen Teil des Kulturbodens bilden, bezeichnet man als *Humus* oder als „Humusstoffe“, „Humussubstanzen“.

Obwohl die chemische Forschung mit der Untersuchung der *Humusstoffe* sich vielfach beschäftigt hat, ist es bisher nicht gelungen, deren chemische Natur befriedigend aufzuklären. Durch Einwirkung gewisser Reagentien lassen sich zwar aus dem Humus verschiedene Körper absondern, die aber bei verschiedener Darstellungsweise verschiedene Zusammensetzung und verschiedene Eigenschaften aufweisen und daher nicht als reine chemische Verbindungen, sondern wahrscheinlich als ein Gemenge von verschiedenen Körpern angesehen werden müssen. Nichtsdestoweniger hat man diesen Stoffen Namen beigelegt wie „Humin“, „Ulmin“, „Huminsäure“, „Ulminsäure“, „Quell-“ oder „Krensäure“, „Quellsatz-“ oder „Apokrensäure“, „Geinsäure“ u. a. m., ohne aber Gewißheit darüber schaffen zu können, ob sie vorgebildete Bestandteile des Humus oder erst bei seiner chemischen Verarbeitung entstanden sind. Durch Behandlung des natür-

lich vorkommenden Humus mit kalten alkalischen Flüssigkeiten (Kalilauge, Natronlauge, Ammoniak) lassen sich daraus Stoffe abtrennen, die in den angewandten Reagentien löslich sind, aus ihrer Lösung durch Zusatz von Säuren abgeschieden werden, also den Charakter von in Wasser schwer löslichen Säuren tragen. Ein anderer Teil des Humus wird von alkalischen Flüssigkeiten nicht in Lösung übergeführt. Die gelösten Stoffe bezeichnet man gewöhnlich als *Huminsäure*, die nicht löslichen als *Humin*. Beide Stoffe oder Stoffgruppen enthalten neben Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff noch Stickstoff und mineralische Stoffe, deren Abtrennung so schwer gelingt, daß es unklar bleibt, ob sie einen integrierenden Teil oder nur eine Verunreinigung der erstgenannten bilden. Zwar ist es gelungen, aus den in Alkalien löslichen Bestandteilen des Humus eine von Mineralstoffen und von Stickstoff fast freie Säure zu gewinnen (Detmers Huminsäure), aber es ist unentschieden, ob sie im natürlichen Humus vorhanden oder ein durch die vorgenommenen Manipulationen umgestaltetes Produkt ist.

Die durch Alkalien in Lösung gebrachten Stoffe, die wir schlechtweg als „Humussäure“ bezeichnen wollen, sind in reinem Wasser schwer löslich. Ein Gehalt des Wassers an freien Säuren und an gewissen Salzen: Chloriden, Nitraten, Sulfaten der Alkali- und Erdmetalle, erhöht die Schwerlöslichkeit, die Anwesenheit von löslichen Phosphaten vermindert sie. Aus einer wäßrigen Lösung werden die Humussäuren bei sehr niedriger Temperatur abgeschieden. So wenig die chemische Natur der natürlichen Humusstoffe erkannt ist, so läßt sich doch von allen sagen, daß sie aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und den Mineralstoffen bestehen, die den humusliefernden Pflanzen eigen waren, soweit sie nicht durch die lösenden Agentien des Bodens der Masse entzogen worden sind. An Kohlenstoff sind sie prozentisch reicher, an Wasserstoff und Sauerstoff prozentisch ärmer als der Pflanzenbestandteil, aus dem sie der Hauptmasse nach entstanden sind: die Pflanzenfaser oder *Cellulose*. Der letzteren kommt die chemische Formel:  $C_6H_{10}O_5$  zu und sie enthält demnach 44,4 % Kohlenstoff, 6,2 % Wasserstoff, 49,4 % Sauerstoff. Dagegen enthalten die von Mineralstoffen, Stickstoff und Wasser ganz frei gedachten Humusstoffe etwa 59—64 % Kohlenstoff, 4,4—4,6 % Wasserstoff und 35—36 % Sauerstoff. Bei der langsamen Oxydation der Pflanzenstoffe, die man als Verwesung bezeichnet, treten also von dem ursprünglich vorhandenen Wasserstoff und Sauerstoff größere Mengen in Form von Wasser aus, als von dem Kohlenstoff in Form von Kohlendioxyd. Man kann sich den Vorgang etwa in folgender Weise vorstellen. Nach der Formel der Cellulose (s. o.) kommen darin auf



72 G.-T. Kohlenst., 10 G.-T. Wasserst., 80 G.-T. Sauerst.

Infolge der Verwe-  
sung an Luftsauer-  
stoff aufgenommen: — " " — " " 32,6 " "

Summa: 72 G.-T. Kohlenst., 10 G.-T. Wasserst., 112,6 G.-T. Sauerst.

Zur Bildung von 45,1

Kohlendioxyd u. von

49,5 Wass. verwendet: 12,3 " " 5,5 " " 76,8 " "

Bleibt: 59,7 G.-T. Kohlenst., 4,5 G.-T. Wasserst., 35,8 G.-T. Sauerst.

d. i. die prozentische Zusammensetzung von Detmers „Huminsäure“ (s. o.).

Der *Stickstoff*gehalt der natürlichen Humusstoffe hängt zunächst ab von dem größeren oder geringeren Stickstoffreichtum der humusbildenden Pflanzen. Es ist anzunehmen, daß in den ersten Stadien der Verwesung nur sehr wenig Stickstoff austritt. Infolge der Oxydation des Kohlenstoffs und des Wasserstoffs zu Kohlendioxyd und Wasser, die zum Teil auf Kosten des Luftsauerstoffs, zum Teil auf Kosten des in der Masse selbst enthaltenen Sauerstoffs (s. o.) vor sich geht, muß sich der zurückbleibende Rest also prozentisch immer mehr mit Stickstoff anreichern. Er ist zum weitaus überwiegenden Teil fest an Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff gebunden und setzt sich erst bei weiterem Fortschreiten des Verwesungsvorganges und dem damit verbundenen völligen Zerfall der Pflanzenreste in Verbindungen um, die für die Kulturpflanzen aufnehmbar sind (Ammoniak, Salpetersäure). Weiteres darüber werden die Erörterungen über die Eigenschaften der verschiedenen Böden bringen. Der Stickstoffgehalt des von Wasser und Mineralstoffen frei gedachten Humus kann 1—6 % betragen.

Die natürlichen Humusstoffe besitzen in der Regel eine schwächer oder stärker saure Reaktion, d. h. sie röten in feuchtem Zustand blauen Lackmusfarbstoff. Sehr häufig beruht diese nur auf einem Gehalt an Kohlensäure, die sich bei der stetig fortschreitenden Verwesung der Humusstoffe bildet. In diesem Fall verschwindet beim Austrocknen der Masse mit der Verflüchtigung des Kohlendioxyds auch die saure Reaktion (§ 17). Nicht selten bleiben aber auch die Humussubstanzen nach dem Austreiben der anhaftenden Kohlensäure sauer, sie enthalten dann *freie Humussäuren*, und man kann in diesem Fall von „saurem Humus“ sprechen. Im andern Fall darf man annehmen, daß die im Humus enthaltenen Humussäuren an Metalle (namentlich an Calcium) gebunden, also in Form von Salzen vorhanden sind, und man nennt derartigen Humus wohl „milden“ Humus. Der letztere wird sich also namentlich aus Pflanzen und in Bodenarten bilden, die an basischen Stoffen und besonders an Kalk reich sind, während die Entstehung des sauren Humus an kalkarme Pflanzen und Böden ge-

bunden ist. Eigentümlich und noch nicht genügend aufgeklärt ist es, daß die humussaurer Salze weit leichter der *Verwesung* unterliegen als die freien Humussäuren,<sup>1)</sup> und hierauf dürfte zum Teil die zersetzende Wirkung zurückzuführen sein, die die Zufuhr von Kalk und von kohlensauren Salzen auf die sauren Humusstoffe ausübt. Die Humussäuren werden dadurch in humussaurer Salze („Humate“) umgewandelt, diese gehen durch langsame Oxydation in kohlensaure Salze über, die dann wieder fähig sind, mit Humussäuren Humate zu bilden.

Die freien Humussäuren haben nicht nur die Fähigkeit, kohlensaure Salze unter Austreibung von Kohlendioxyd zu zersetzen, sie wirken, wo sie in großen Massen vorhanden (§ 18, Anm.), auch zerlegend auf beständigere Verbindungen ein. Chloride, Sulfate, Phosphate, ja die schwer zersetzlichen Silikate werden durch sie unter Bildung von humussaurer Salzen und unter Abscheidung von freier Chlorwasserstoffsäure, Schwefelsäure, Kieselsäure, Phosphorsäure oder saurer phosphorsaurer Salze (§ 20), also von Stoffen zerlegt, die zum Teil die Zersetzung der vorhandenen Gesteine auf das lebhafteste befördern. An der letzteren beteiligt sich übrigens auch, wenn auch weniger energisch, der milde, freie Humussäuren nicht enthaltende Humus insofern, als er eine stetig fließende Quelle von Kohlensäure darstellt.


Abgesehen von den chemischen Wirkungen, die die Humusstoffe auf die mineralischen Bestandteile des Bodens ausüben, teilen sie dem letzteren wichtige Eigenschaften mit, von denen später ausführlich die Rede sein wird.

### § 54.

**Die Vermoderung und Verkohlung.** Sind die Bedingungen, z. B. die *Temperaturverhältnisse*, für eine schnelle Verwesung der abgestorbenen Pflanzenreste nicht günstig, wird namentlich durch irgend einen Umstand der Zutritt des *Luftsauerstoffs* erheblich gehemmt, so findet zwar auch eine Zersetzung der ersteren statt, aber sie verläuft dann weit langsamer, und die Zwischen- und Endprodukte sind von den bei reichlichem Luftzutritt entstehenden verschieden. Eine mangels ausreichenden Luftzutritts verzögerte und in ihren Produkten modifizierte Verwesung pflegt man als „Vermoderung“ zu bezeichnen. Auch bei der Vermoderung verlieren die Pflanzenteile allmählich ihre Struktur, sie werden „desorganisiert“, sie setzen sich in „Möder“ um. Die aus der Vermoderung der organischen Stoffe hervorgehenden Körper zeichnen sich vor den Verwesungsprodukten namentlich durch einen geringeren Sauerstoffgehalt aus. Bei mangelndem

<sup>1)</sup> Zu einem Teil hängt diese Tatsache allerdings damit zusammen, daß die Verwesung fördernden Organismen in sauren Stoffen ungünstigere Lebensbedingungen vorfinden (s. o.).

Luftzutritt oxydieren sich Kohlenstoff und Wasserstoff der organischen Pflanzenteile hauptsächlich auf Kosten des nur in beschränktem Maße vorhandenen Sauerstoffs der letzteren, es werden also auch nur beschränkte Mengen von Kohlendioxyd und Wasser gebildet, während ein größerer Teil des Kohlenstoffs zurückbleibt oder auch in Form von sauerstofffreien Kohlenstoff-Wasserstoffverbindungen sich verflüchtigt. Zur Veranschaulichung dieses Vorganges kann man wieder von dem hauptsächlichsten Pflanzenbestandteil, der Pflanzenfaser oder Cellulose ( $C_6H_{10}O_5$ ), ausgehen (vergl. § 53). Würde aller Sauerstoff der Cellulose zur Bildung von Kohlendioxyd und Wasser verbraucht, so ließe diese Umsetzung sich durch die folgende chemische Gleichung ausdrücken:



Verliefe die Umwandlung in dieser Weise, so würde als Endprodukt reiner Kohlenstoff zurückbleiben, der Wasserstoff aber sich verflüchtigen.<sup>1)</sup> Bei dem Vermoderungsprozeß tritt aber fast immer noch ein Kohlenwasserstoff von der Zusammensetzung  $CH_4$  auf: „*Sumpfgas*“, „*Grubengas*“, in der chemischen Sprache „*Methan*“ genannt, ein brennbares Gas, das beim Aufrühren stehender, an vermodernden Pflanzenstoffen reicher Gewässer leicht beobachtet werden kann und das den Hauptbestandteil der gefährlichen „*schlagenden Wetter*“ in den Steinkohlengruben bildet. Man kann also annehmen, daß ein Teil des Kohlenstoffs der vermodernden Pflanzenmasse mit dem Wasserstoff Methan bildet:  $2C + 8H = 2CH_4$ . Es würde also als letztes Produkt der Vermoderung nur Kohlenstoff zurückbleiben. Wenn die Vermoderungsvorgänge in der Natur auch schon deswegen nie so glatt verlaufen, wie es diese schematischen Gleichungen andeuten, weil die sich zersetzenden Pflanzenmassen neben Cellulose noch viele andere Stoffe von anderer Zusammensetzung enthalten, so tritt dabei doch stets eine erhebliche prozentische Anreicherung der Vermoderungsprodukte an Kohlenstoff auf, und man spricht daher bei weit fortgeschrittenen Vermoderungsprozessen mit Recht von einer „*Verkohlung*“.<sup>2)</sup>

### § 55.


**Reduktionsprozesse.** Charakteristisch für den Vermoderungsprozeß sind die Wirkungen, die die vermodernden Pflanzenreste auf sauerstoff-

<sup>1)</sup> Bei der Zersetzung organischer Stoffe unter Abschluß des Luftsauerstoffs wird regelmäßig auch freier Wasserstoff entwickelt.


<sup>2)</sup> Der Anthracit, die Steinkohlen und die Braunkohlen sind die bekannten Produkte der „*Verkohlung*“ von Pflanzenmassen. Infolge des Verkohlungsprozesses ist der Kohlenstoffgehalt bei dem ältesten Gebilde, dem Anthracit, bis auf etwa 94 %, bei den jüngeren Steinkohlen auf 80—90, bei den noch jüngeren Braunkohlen auf etwa 70 % gestiegen.

haltige Körper ausüben, mit denen sie in Berührung kommen. In ihrem Bestreben, ihren Kohlenstoff und Wasserstoff zu Kohlendioxyd und Wasser zu oxydieren, entziehen sie den letzteren Sauerstoff und bewirken so ihre „Reduktion“. Die Entstehung von Sulfiden aus Sulfaten, das Auftreten von Schwefelwasserstoffgas infolge von Reduktionsvorgängen ist bereits früher besprochen worden (§ 22).

*Eisenoxyd* und *Eisenhydroxyd* werden durch vermodernde Pflanzenreste zu Eisenoxydul und Eisenhydroxydul reduziert. Durch das infolge der Kohlenstoff-Oxydation gleichzeitig auftretende Kohlendioxyd können diese Verbindungen in kohlensaures Eisenoxydul übergeführt und, da dieses in dem kohlensäurehaltigen Bodenwasser löslich ist, beweglich gemacht werden:



Die *Salpetersäure der Nitate* kann bei Anwesenheit vermodernder Stoffe zu salpetriger Säure und zu Ammoniak reduziert werden. Ihre Überführung in Ammoniak ist bisweilen begleitet von einer Abspaltung freien Stickstoffgases. Die folgenden Gleichungen mögen den Vorgang veranschaulichen



## § 56.

**Moorbildung, Vertorfung. — Torf.** Überall, wo die Bedingungen für ein üppiges Pflanzenwachstum gegeben sind, und andererseits irgend welche Umstände der schnellen Verwesung der abgestorbenen Pflanzen im Wege stehen, wo z. B. grössere, die letzteren umgebende Wassermengen den Zutritt des Luftsauerstoffs verhindern oder doch stören, können sich allmählich so grosse Mengen ganz oder teilweise vermoderter Pflanzenreste ansammeln, daß sie ausschliesslich den Boden bilden, während der Charakter des darunter liegenden Gesteins oder Mineralbodens ganz zurücktritt. Derartige fast ganz aus den Resten abgestorbener Pflanzengenerationen bestehende Böden bezeichnet man als „Moor“.

Die Vorgänge, die die Umwandlung der Pflanzen in einen dem unbewaffneten Auge als völlig amorph erscheinenden Moder oder in ein Gemenge von formlosen und von solchen Pflanzenresten bewirken, welche infolge ihrer grösseren Widerstandsfähigkeit (§ 52) ihr ursprüngliches Gefüge noch deutlich erkennen lassen, werden gewöhnlich unter dem Ausdruck „*Vertorfung*“ zusammengefaßt. Das Zersetzungsprodukt selbst bezeichnet man als „*Torf*“, falls es die Fähigkeit besitzt, beim Austrocknen ein gutes

Brennmaterial zu liefern. Diese beruht — abgesehen von der Brennbarkeit — auf einem hohen Gehalt an stark vermoderter Pflanzenmasse, der eine erhebliche Volumverminderung, also Verdichtung beim Austrocknen zur Folge hat, und auf einem nicht unerheblichen Gehalt an weniger zersetzten pflanzlichen Fasern, die das Zerbröckeln, Zerkrümeln, Auseinanderfallen der getrockneten Masse verhindern.<sup>1)</sup>

Die Vertorfung vollzieht sich unter dem Einfluß des Wassers, das die abgestorbenen Pflanzen durchtränkt und den Zutritt des Luftsauerstoffs absperrt oder doch wesentlich einschränkt. Dadurch wird die Verwesung gehemmt, dagegen der Zersetzungs Vorgang gefördert, den wir früher (§ 54) als Vermoderung und Verkohlung bezeichnet haben. Mit ihm ist eine Dunkelfärbung der Pflanzenteile verbunden, die sich auch dem umgebenden Wasser mitteilt, ferner ein Zerfall der pflanzlichen Gewebe. Die vorher in ihrem organischen Zusammenhang vor der auswaschenden Kraft des Wassers geschützten Pflanzenbestandteile verfallen, soweit sie von vornherein leicht löslich sind oder infolge der Zersetzung in leicht lösliche Formen übergeführt werden, der Auslaugung durch die atmosphärischen Niederschläge und das Bodenwasser. Zu diesen Stoffen gehören insbesondere die *Kalium*verbindungen, an denen alle Torfarten außerordentlich arm sind. Auch ein beträchtlicher Teil der Phosphorverbindungen in den torfbildenden Pflanzen kann verloren gehen,<sup>2)</sup> wenn nicht die Anwesenheit eisenhaltigen Wassers die Entstehung schwerlöslicher Phosphorsäuresalze veranlaßt.

Ein charakteristisches Merkmal der fortschreitenden Vertorfung ist die Zunahme der Kontraktionsfähigkeit der Torfsubstanz. Je mehr die torfbildenden Pflanzenteile ihre organisierte Form verlieren, um so stärker ziehen sie sich beim Austrocknen zusammen. Fast amorph gewordene Torfarten (s. u.) können hierbei unter erheblicher Zunahme ihres spezifischen Gewichtes und ihrer Härte auf  $\frac{1}{10}$  des ursprünglichen Volums schwinden.

Im Verfolg des Vertorfungsprozesses häufen sich die abgestorbenen Pflanzenmassen zu Schichten an, die nicht selten die Mächtigkeit von 10 m und mehr erreichen.

<sup>1)</sup> Obige Erklärung entspricht dem gewöhnlichen Sprachgebrauch. Nach einer Vereinbarung zwischen der Geologischen Landes-Anstalt und der Moor-Versuchs-Station wird in Zukunft bei den Mooraufnahmen der ersteren die Bezeichnung „Moor“ als geologischer, die Bezeichnung „Torf“ als petrographischer Begriff angesehen. Die Moore bestehen aus Torf. Die Substanz der verschiedenen Torfschichten setzt sich aus den Resten verschiedener Pflanzengesellschaften zusammen, denen als zufällige Bestandteile Ton und Sand, durch Wasser oder Wind von außen zugeführt, beigemischt sein können, und die als Erzeugnis chemischer (oder biologischer) Vorgänge während ihrer Bildung nicht selten einen hohen Gehalt an Eisen- oder Calciumverbindungen aufweisen.

<sup>2)</sup> Diese Ansicht wird nicht von allen Forschern geteilt.

Entsprechend den äußerst mannigfaltigen Verhältnissen, unter denen Moor entstehen kann, weisen auch die verschiedenen Moore große Verschiedenheiten in ihrer Beschaffenheit und in ihren Eigenschaften auf. In erster Linie wird die für seine Kultivierung maßgebende Beschaffenheit eines Moores durch die Art der Pflanzen bedingt, die sich an seiner Bildung beteiligt haben, und weiter durch den Zersetzungszustand, in dem sich die abgestorbenen Reste dieser Pflanzen befinden. Letzterer steht einerseits wieder zu der natürlichen Beschaffenheit der moorbildenden Pflanzen (§ 52) und andererseits zu den der Vertorfung mehr oder weniger günstigen äußeren Verhältnissen in nahen Beziehungen. Ob sich aber an irgend einer Stelle diese oder jene Pflanzenarten besonders üppig entwickeln werden, hängt ganz wesentlich von der Beschaffenheit des Bodens, worin sie wurzeln, und des Wassers ab, das der Vegetation ihre Nährstoffe zuführt, und so kann man mit vielem Recht den Satz aufstellen: *Die Beschaffenheit einer Moorbildung richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes, worauf sie aufgewachsen ist, und nach der Beschaffenheit der Zuflüsse, die die moorbildenden Pflanzen von außen her erhalten haben.*

§ 57. *Einteilung der Moore.* Nach den vorstehenden Bemerkungen lassen sich die meisten der mannigfaltigen Moorbildungen in zwei Hauptgruppen ordnen. Die eine entstand unter Verhältnissen, die nur bezüglich ihrer Ernährung besonders anspruchslosen Pflanzen ein üppigeres Wachstum gestatteten, die andere bildete sich auf einem Boden, der entweder selbst an Nährstoffen reich war oder von außen her fruchtbares Wasser zugeführt erhielt. Im ersteren Fall beteiligen sich an der Torfzusammensetzung hauptsächlich Torfmoose (Sphagnaceen), heidekrautartige Gewächse (Erica, Calluna u. a.) und gewisse Riedgräser, namentlich „Wollgras“ (Eriophorum), im anderen treten als torfbildend weit zahlreichere Pflanzenarten auf, darunter in hervorragenden Mengen gewisse Süßgräser (Gramineen): das gemeine Dachrohr („Reet“, „Ried“ — Phragmites communis), Schilf (Calamagrostis), Poa aquatica u. a., dann zahlreiche Sauergräser (Halb-, Scheingräser — Cyperaceen): Riedgras (Segge — Carex), Binse (Scirpus), ferner Rohrkolben (Typha), Simse (Juncus), von Moosen nicht Sphagnaceen (Torfmoose), dagegen Hypneen, von Holzgewächsen besonders Erle (Alnus), aber auch Eiche, Esche, Linde, Fichte, Weide u. a.

Nach den an der Torfbildung vornehmlich beteiligten und noch jetzt in ihrer natürlichen Vegetation vorherrschenden Pflanzen bezeichnet man die eine Moorgruppe als *Torfmoos-Wollgras-Heidetorf* oder Sphagneto-Eriophoreto-Callunetum, die andere als *Grastorf* (auch Grünlands- oder Wiesen- oder Rasentorf) oder Hypneto-Cariceto-Graminetum.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Legt man als Unterscheidungsmerkmal die Art der moorbildenden

Da die zur ersten Gruppe gehörigen Moore auf einem über dem gewöhnlichen Grundwasserspiegel belegenen Boden, und nicht oder nur wenig vom Bodenwasser beeinflusst, entstanden, die Unterlage der Grasmoore aber entweder von Wasser bedeckt oder doch häufigen Überschwemmungen ausgesetzt war, so nennt man die Moore der ersten Gruppe auch „Überswassermoore“ (Supraaquatische) oder „Hochmoore“, die der anderen „Unterwassermoore“ (Infraaquatische) oder „Niederungsmoore“.<sup>1)</sup> Die Benennungen Hochmoor und Niederungsmoor sind die gebräuchlichsten Bezeichnungen, und ihrer werden wir uns bei den folgenden Erörterungen ausschließlich bedienen.<sup>2)</sup>

Zwischen diesen hinsichtlich ihrer natürlichen Vegetation, ihrer Bodenbeschaffenheit und ihres kulturellen Verhaltens streng geschiedenen Moorgruppen stehen zahlreiche Zwischenstufen, hervorgegangen aus Pflanzengesellschaften, deren einzelne Glieder zum Teil den niederungsmoorbildenden, zum Teil den hochmoorbildenden Gewächsen zuzurechnen sind. Man faßt sie zweckmäßig unter der Bezeichnung „Übergangsmoore“ zusammen. Über ihre Bildung wird später geredet werden.

### § 58.

Der den größten Teil Norddeutschlands bedeckende Diluvialboden bietet mit seinen zahlreichen, die Wasseransammlung befördernden Einsenkungen die denkbar günstigsten Vorbedingungen für die Moorbildung und ermöglicht zugleich durch die großen Verschiedenheiten in der Bodenzusammensetzung das Auftreten der verschiedensten Moorbodenarten.

**Die Bildung der Niederungsmoore.** Am ungestörtesten erfolgte die Moorbildung in tieferen oder flacheren Seebecken, die, von den atmosphärischen Niederschlägen und von unter- und seitwärts eintretenden Zuflüssen gespeist, sich längere Zeit mit Wasser gefüllt erhalten konnten.

Pflanzen zu Grunde, so kann man als eine Unterabteilung der genannten Gruppen den *Waldtorf* (Arboretum) ansehen, dessen Substanz neben den Bestandteilen des Moos-Heidetorfes oder des Grastorfes noch erhebliche Mengen von Holz- und Blattresten enthält, und zwar von Birken- und Kiefern- (Föhren-) Resten beim Moostorf-Waldtorf, von Erlen, Weiden, Eschen, Eichen, Linden u. a. beim Grastorf-Waldtorf.

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung „Hoch“moor wird auch dem Umstande zugeschrieben, daß diese Moore eine gewölbte, in ihrer Mitte sich weit über die Ränder erhebende Oberfläche besitzen, während die Oberfläche der Niederungsmoore meist flach (bisweilen auch in der Mitte etwas gesenkt) erscheint.

<sup>2)</sup> Die Hochmoore werden in Ostpreußen „*Moosbruch*“, in anderen Gegenden „*Moos*“ oder „*Mösse*“ genannt. Die Niederungsmoore bezeichnet man im nördlichen Deutschland auch als „*Bruch*“ (Bruchmoor) und als „*Luch*“. Weniger scharf unterscheidend braucht man für die verschiedenen Moore in Süddeutschland die Bezeichnungen „*Venn*“, „*Filz*“, „*Ried*“, „*Lohden*“, „*Wehr*“ u. a.

Als schwer durchlässige und dadurch das Aufwachsen des Moores erleichternde Unterlage finden sich auf dem Grunde dieser Mulden häufig alluviale Ablagerungen, die, je nach der Beschaffenheit des begrenzenden Gesteins und der zufließenden Wässer, toniger oder kalkiger Natur (Schlick, Wiesenmergel) sind, bisweilen auch aus Limonitbildungen (§ 24) oder aus Kieselgur (§ 12) bestehen und von zahlreichen Resten pflanzlichen und tierischen Ursprungs durchsetzt sind. Über ihnen oder auch unmittelbar dem Diluvium aufgelagert beobachtet man als älteste Torfschicht meist eine als „*Schlammtorf*“ zu bezeichnende, sehr gleichmäßige, zum überwiegenden Teil aus scheinbar völlig formlosen Pflanzenresten bestehende Ablagerung,<sup>1)</sup> seltener eine eigentümliche, gleichfalls keine erkennbaren pflanzlichen Formen aufweisende Torfbildung, die man ihrer mechanischen Beschaffenheit wegen „*Torfleber*“ oder „*Lebertorf*“ nennt.<sup>2)</sup>

Sobald diese Absätze aus überstehendem Wasser das Becken so weit ausgefüllt hatten, daß das Dachrohr (*Phragmites comm.*), Seggen und andere Gräser Fuß fassen konnten, traten diese Pflanzen im Gemisch mit einer größeren oder geringeren Anzahl anderer auf dem Wasser schwimmenden oder vom Ufer hineinwachsenden wasserliebenden Gewächse, wie gelbe und weiße Seerose (*Nymphaea* und *Nuphar*), Laichkraut (*Potamogeton*), Nixkraut (*Najas*) und viele andere, als Moorbildner auf und lieferten in ihren abgestorbenen Resten den an den wohl erhaltenen Rhizomen und Halmteilen auch dem bloßen Auge leicht erkennbaren *Rohr-* oder *Schilftorf* („*Phragmitestorf*“), den man in manchen Gegenden auch als „*Darg*“ oder „*Darf*“ bezeichnet, und *Seggentorf*, zwei Torfschichten, die man unter dem gemeinsamen Namen *Sumpfstorf* zusammenfassen kann.

<sup>1)</sup> Beim Ablassen von Seen bleibt der Schlammstorf nicht selten als einzige Torfbildung von wechselnder Mächtigkeit zurück. Beim Austrocknen kontrahiert er sich unter Bildung zahlreicher Risse außerordentlich stark und wandelt sich dabei in einen sehr harten, Wasser kaum noch aufnehmenden und der Kultivierung erhebliche Schwierigkeiten bietenden Boden um.

Soweit der unterlagernde Mineralboden von dunkel gefärbtem Moorschlamm durchsetzt ist, nennt man ihn in manchen Gegenden „*Sohlband*“.

<sup>2)</sup> Im nassen Zustande bildet der *Lebertorf* eine gelbliche, gelblich-grüne, hell- oder dunkelgrau gefärbte, elastische aber trotzdem leicht brechbare Masse. Er besteht aus äußerst fein zerriebenen, von einigen Forschern als Exkremente von Wassertieren angesprochenen Pflanzenteilen mit mineralischen Beimengungen (Quarz, Glimmer). Beim Trocknen verliert er die eigentümliche, an tierische Leber erinnernde Beschaffenheit und schwindet zu einer sehr harten Masse von blättrigem Gefüge zusammen. Im nordwestlichen Deutschland findet sich der Lebertorf in großer Ausdehnung auf dem Grunde des Dümmer Sees (Wesergebiet) und im Untergrunde der ihn umgebenden Moore; er wird hier als „*Meer-geil*“ bezeichnet.



Die fortschreitende Verlandung des Wasserbeckens schuf weiterhin günstige Bedingungen für das Wachstum von Holzpflanzen, von Waldbäumen. Solange sie von dem verhältnismäßig hohen Gehalt des Moorbodens an Pflanzennährstoffen und besonders an Kalk Nutzen ziehen konnten, waren es namentlich die Erlen, die, im Verein mit Eschen, Fichten, Eichen, Weiden, Faulbaum, Linden und mit zahlreichen anderen auf feuchtem und nassem, beschattetem Boden wachsenden Pflanzen, moorbildend auftraten und den als Kulturboden sehr wertvollen *Bruchwaldtorf*<sup>1)</sup> lieferten.

Ging der Bruchwald durch irgend eine Veranlassung, z. B. durch zunehmende Bodennässe zu Grunde, so gewannen zwischen und über den gefallenen Stämmen wiederum jene wasserliebenden Pflanzen, Hypnummoose, Sumpfgräser u. a., die Oberhand, deren vertorfende Reste den Bruchwaldtorf mit einer Schicht von *Gras-* (Rasen-, Wiesen-) *Torf* überlagerten.

Sehr viele in Seebecken entstandene Niederungsmoore weisen die soeben dargelegte Schichtenfolge: Schlamm- und Seggentorf, Bruchwaldtorf, Seggen- und Grastorf auf. Jedoch bildet diese durchaus nicht die Regel. War die Bodeneinsenkung so flach, daß von vornherein Rohr und Seggen auf ihrem Grunde wachsen konnten, so kann die Schlamm- und Seggentorfschicht ganz fehlen, und es lagert dann der Rohr- oder Seggentorf unmittelbar dem mineralischen Untergrunde auf. Auch Bruchwaldtorf findet sich nicht in allen Niederungsmooren. Wo z. B. die Wachstumsbedingungen für das Dachrohr besonders günstig waren, wie es auf den stets wassergetränkten Seemarschböden der Fall ist, so konnte ein fast ausschließlich aus den Resten dieser hervorragend moorbildenden Pflanze bestehendes Dargmoor sich bilden, dessen Oberfläche zu Tage liegt oder von einer aus Schein- und echten Gräsern entstandenen Rasentorfschicht bedeckt wird.

Übrigens scheint die Vertorfung von tieferen Bodeneinsenkungen sich oftmals auch in ganz anderer Weise, bisweilen auch von oben nach unten fortschreitend, vollzogen zu haben und noch zu vollziehen. Bei sanft abfallenden Ufern konnte sich deren Boden mit den früher genannten torfbildenden Wassergräsern, ferner mit Kalmus (*Acorus*), Rohrkolben, Wasserlilien u. a. besiedeln, deren abgestorbene Leiber im Verein mit schwimmenden Pflanzen, Seerosen, Krebscheren (*Stratiotes*), Wasserpest (*Elodea*), Froschbiss (*Hydrocharis*), Wassergarbe (*Myriophyllum*), Tannwedel (*Hippuris*), Wasserhahnenfuß (*Ranunculus aquatilis*) u. a. den Boden allmählich aufhühten

---

<sup>1)</sup> Die Bruchwaldmoore („Erlenbrüche“) pflegen sich durch einen besonders hohen Gehalt an Stickstoff und Kalk, bisweilen auch an Phosphorsäure (*Vivianit*) und durch einen, für die Kultivierung sehr willkommenen, vorgeschrittenen Zersetzungszustand auszuzeichnen.

und die Wasserfläche immer mehr einengten. Die trockener werdenden Ränder boten auch minder wasserliebenden torfbildenden Gewächsen einen zusagenden Standort, und so erhielt das neu entstehende Moor eine nach unten gewölbte Oberfläche, an deren tiefster Stelle sich vielfach noch blankes Wasser befindet. Oft hat sich in solchen Becken nur die Randzone am Ufer mit kompakter Torfmasse ausgefüllt, während im übrigen eine mehr oder minder mächtige Torfschicht auf dem Wasser schwimmt, die beim Betreten um so stärker in schwingende Bewegung gerät, je mehr man sich der Mitte der Mulde nähert. Durch Überwehung und Überschwemmung mit mineralischen Bodenarten, sowie durch die mit einer Vergrößerung des spezifischen Gewichtes verbundene Vertorfung der abgestorbenen Pflanzenmasse kann das Gewicht der schwimmenden Decke so groß werden, daß sie untersinkt. An ihre Stelle tritt eine Neubildung, die dasselbe Schicksal erleidet, und so fort, bis das ganze Wasserbecken mit Moorsubstanz ausgefüllt ist.

Nicht selten aber sinkt die Moordecke nur so tief ein, daß auf ihrer Oberfläche immer neue Pflanzen sich ansiedeln, deren abgestorbene Reste die Moorschicht so weit verstärken, daß sie betretbar wird und landwirtschaftlich genutzt werden kann. Auf zahlreichen Seen Ostpreussens, insbesondere Masurens, finden sich derartige *schwimmende* Rasenmoore. Auch die sogenannten „Quebben“ des Steinhuder Meeres, schwimmende, weit in die Wasserfläche vorgeschobene Moorzungen, sind dahin zu rechnen.

Hervorragend günstige Bedingungen für die Entstehung umfangreicher Niedermoores bietet ferner das Überschwemmungsgebiet natürlicher Wasserläufe, so namentlich weite Flusstäler, deren Gewässer häufig über ihre Ufer treten. Hierbei kommen die schwebenden festen Stoffe des ausufernden Flusses, insbesondere die grobkörnigeren, zum größeren Teil unmittelbar am Flußufer zur Ablagerung als ein natürlicher Wall, der mit dem das Tal begrenzenden Höhenboden eine langgestreckte Mulde bildet. Hierin konnte sich, besonders wenn die Absätze des Wassers den Boden erst mit einer schwer durchlässigen Schlackschicht bedeckt hatten, auch zu Zeiten von Niedrigwasser genügende Feuchtigkeit zur Speisung der gleichen niedermoorbildenden Flora erhalten, die wir bei der Vertorfung von Seebecken kennen gelernt haben. Bei wiederholten, durch die allmähliche Aufhöhung der Flußsohle beförderten Ausuferungen wurden die die Mulde allmählich ausfüllenden Torfbildungen nicht selten mit sandigen, tonigen, kalkigen Stoffen überschüttet, die sie bisweilen gleichmäßig durchsetzen, bisweilen durchschichten, bisweilen mehr oder weniger hoch bedecken.

Es liegt ferner auf der Hand, daß auch auf solchen Böden, die nicht unmittelbar von Flußläufen getränkt werden, die Gelegenheit zur

Grundlehren der Kulturtechnik. Erster Band. I. Teil. 3. Auflage. 7

Moorbildung sich findet, sobald durch irgend einen Umstand der freie Abfluß des Quellwassers oder der atmosphärischen Niederschläge gehemmt wird. So können durch Blitzschlag in Brand gesetzte oder durch pflanzliche oder tierische Schädlinge vernichtete Waldungen durch ihre vermodernden Stamm- und Laubmassen eine Versumpfung großer Gebiete herbeiführen und Veranlassung zur Entstehung ausgedehnter Niedermoores werden.

§ 59. *Niedermoores auf Bergen.* Auch auf den Höhen der Gebirge, unmittelbar über dem festen Gestein, konnten niedermoorartige Bildungen entstehen, wenn die Gelegenheit zur Aufspeicherung nährstoff- und namentlich kalkreicheren Wassers gegeben war oder auch nur atmosphärische Feuchtigkeit in den Höhlungen basischer Urgesteine (§ 31, 2) oder sedimentärer Kalkgesteine (§ 33, 4) sich ansammeln konnte. Sie pflegen hier aber nur selten eine größere Mächtigkeit zu erreichen.

Alle bisher geschilderten Torfbildungen sind den Niedermoores zuzurechnen. Sie entstehen unter dem Einfluß eines an Pflanzennährstoffen und namentlich an Calciumverbindungen nicht armen Bodens oder Wassers. Dementsprechend ist ihr Gehalt an Kalk und weiterhin an Stickstoff, nicht selten auch an Phosphorsäure,<sup>1)</sup> wesentlich höher als derjenige der demnächst zu besprechenden Moorbildungen. Sie enthalten (s. § 53) nicht freie Humussäuren, sondern neben anderen Bestandteilen Humate. Die Zersetzung der torfbildenden Pflanzenteile ist deswegen meist weiter vorgeschritten, oder sie tritt doch bei genügender Durchlüftung weit schneller ein als bei den Übergangs- und den Hochmoores, eine Eigenschaft, die für ihre Kultivierung von Bedeutung ist.

### § 60.

**Übergang von Niedermoor in Hochmoor.** Änderten sich während des Wachstums eines Moores die Bedingungen, unter denen die hochmoor- oder niedermoorbildenden Pflanzen gedeihen, so änderte sich mit der Art der moorbildenden Pflanzen auch der Charakter des Moores. Sobald die Oberfläche eines aufwachsenden Niedermoores dem Einfluß der Faktoren entzogen wird, die das Wachstum von niedermoores-

<sup>1)</sup> Die gar nicht seltenen Anhäufungen von phosphorsäurereichen Verbindungen in den Niedermoores sind für deren Fruchtbarkeitszustand von hohem Wert. Äußerlich erkennt man sie an der weissen, beim Liegen an der Luft in blau übergehenden Farbe des Vivianits oder an der rötlichen Färbung der Moorsubstanz an den Grabenböschungen und der vom Maulwurf aufgeworfenen Moorerde. Ihre Entstehung beruht auf der Schwerlöslichkeit der Eisenphosphorsäureverbindungen. Die bei der Zersetzung der moorbildenden Pflanzen löslich werdende Phosphorsäure wird durch das Eisen eisenhaltiger Quellen in Eisenphosphat übergeführt und so gleichsam festgelegt.

moorbildenden Pflanzen begünstigen, sobald sie z. B. sich so hoch über den mineralischen Untergrund erhoben hat, daß dessen Nährstoffreichtum, oder nährstoffreiche Zuflüsse von außen her für die jüngste Pflanzendecke nicht mehr zur Geltung kommen, andererseits aber noch genug Feuchtigkeit vorhanden ist, um hochmoorbildenden Pflanzen das Wachstum zu ermöglichen, so verdrängen diese die bisher gedeihenden Pflanzenarten, und es kann sich dann über dem Niedermoor ein Hochmoor aufbauen.

Natürlich vollzieht sich ein solcher Übergang nicht mit einem Schlage. Nur allmählich werden die Wachstumsbedingungen für die niedermoorbildenden Pflanzen schlechter, für die hochmoorbildenden günstiger. Zwischen beiden Pflanzengesellschaften beginnt ein Kampf, der endlich mit dem Sieg der hochmoorbildenden endet. Das Produkt des Ringens ist eine Torfbildung, die zum Teil niedermoorbildenden, zum Teil hochmoorbildenden Pflanzen ihre Entstehung verdankt. Sie wird als *Übergangstorf* bezeichnet.

Wächst z. B. ein Bruchwaldmoor (§ 58) so weit empor, daß die Nährstoffquelle nicht mehr die Oberfläche erreicht, das nährstoffreiche Wasser nicht mehr kapillar bis in die Wurzelschicht aufsteigen kann, so treten an die Stelle der Erlen, Eschen, Eichen u. s. w. die anspruchslosere Kiefer (Föhre) und Birke. Ihre verwesenden Reste bilden den *Übergangswaldtorf*. Auch die übrigen in den Erlenbrüchen üppig gedeihenden Pflanzen, darunter die Hypnummoose, werden unter solchen Verhältnissen allmählich verdrängt durch Gewächse, welche für den Hochmoortorf besonders charakteristisch sind: das *Wollgras* (*Eriophorum*), dessen wohlerhaltene, langfaserige Reste<sup>1)</sup> in den tieferen und höheren Schichten der Hochmoore nesterweise auftretende Lagen („Splittlagen“) von bisweilen nicht unerheblicher Mächtigkeit bilden, und ferner die *Torfmoose* (*Sphagnum*). Sehr häufig tritt hierzu noch eine Sumpfpflanze: *Scheuchzeria palustris*, die eine unter vielen Hochmooren liegende, gelb bis gelbbraun gefärbte, blättrig gelagerte Torfbildung, den *Scheuchzeriatorf*, liefert. Er tritt in sehr zahlreichen Fällen als letztes Übergangsglied zum eigentlichen Hochmoortorf auf.

## § 61.

**Der Aufbau der Hochmoore.** Soweit die in besonders großem Umfang im nordwestlichen und im nordöstlichen Deutschland vorkommenden Hochmoore eingehender erforscht sind, zeigen sie im Gegensatz zu den Niedermoorbildungen und entsprechend der weit geringeren an ihrer Entstehung beteiligten Anzahl von Pflanzen (s. o.) einen sehr gleichmäßigen Aufbau.

<sup>1)</sup> Wegen ihrer zähen, dem Torfspaten hinderlichen Beschaffenheit in manchen Gegenden als „Kuhfleisch“ bezeichnet und in neuerer Zeit mehrfach zur Herstellung von Geweben verwandt.

*Die natürliche Vegetation der Hochmoore.* Solange ihr Wachstum noch andauert, besteht ihre Pflanzendecke vornehmlich aus Torfmoosen (Sphagnum), durchmischt mit Rasensimsen (Scirpus caespitosus), scheidigem Wollgras (Eriophorum vaginatum), Sonnentau (Drosera rotundifolia). Vereinzelt finden sich gewisse, trockneren Boden liebende Gewächse: Gemeine Heide (Calluna vulgaris), Moor- oder Glockenheide (Erica tetralix), Rosmarinheide (Andromeda polifolia), Gagelstrauch (Myrica Gale), Krähenbeere (Empetrum nigrum), Porst (Ledum palustre), Moosbeere (Vaccinium Oxycoccus); von Holzpflanzen verkrüppelte Exemplare von Kiefern und Birken. Läßt der Wasserreichtum der Oberflächenschicht aus irgend einer Veranlassung nach,<sup>1)</sup> so sterben die Torfmoose ab, und die letztgenannten Pflanzen, darunter vor allem die Heidekräuter, gewinnen die Oberhand. In verhältnismäßig kurzer Zeit bedeckt sich die Oberfläche mit eigentümlichen heidebewachsenen Hügelchen („Heidebülten“),<sup>2)</sup> zwischen denen mit Moorschlamm ausgefüllte und von zahlreichen Algen, von Wollgras und Simsen bevölkerte Vertiefungen („Schlenken“) liegen.

Mit der reichlichen Ansiedelung dieser Pflanzen ist das Wachstum des Hochmoors im wesentlichen abgeschlossen.

*Der Hochmoortorf.* Wie die Torfmoose in der Flora eines mit Wasser gesättigten Hochmoors die erste Stelle einnehmen, so sind sie auch als die vornehmsten Bildner des Hochmoortorfes anzusehen. Sie gehören hinsichtlich ihres Bedarfs an mineralischen Nährstoffen zu den anspruchslosesten Pflanzen, können daher auch auf Böden, die arm an zugänglicher Pflanzennahrung sind, sich gut entwickeln. Sie bedürfen zwar zu üppiger Entwicklung außerordentlich großer Wassermengen, sind aber vermöge ihres eigentümlichen anatomischen Baues befähigt, aus Boden und Atmosphäre große Wassermassen aufzunehmen, festzuhalten und zur Speisung immer neuer Moosgenerationen zu verwenden. Infolge ihres schnellen Wachstums lassen sie nur wenig Pflanzen neben sich aufkommen, so vornehmlich die Wollgräser, die Rasensimse, den Sonnentau und einige

<sup>1)</sup> Nach dieser Richtung wirkt besonders die künstliche Entwässerung des Moores zu Kulturzwecken oder auch die Anlage von Torfstichen.

<sup>2)</sup> Die Entstehung der „Bülten“ ist noch nicht völlig geklärt. Auch das Torfmoos bildet auf den noch im Wachsen befindlichen Hochmooren flache Hügelchen, die man früher auf ein ungleichmäßiges Wachstum der verschiedenen an der Vegetation beteiligten Sphagnumarten zurückzuführen suchte. Nach dem Botaniker der Moor-Versuchs-Station, Dr. C. A. Weber, dürften sie Heidekraut-Sträuchern ihre Entstehung verdanken, die in trocknen Zeiten aufwuchsen und an denen in den nachfolgenden nassen Jahren die nun vorwiegenden Torfmoose „empor-klimmen“. Tritt eine Abtrocknung der Mooroberfläche ein, so bieten diese Moosbülten den Heidepflanzen die günstigsten Wachstumsbedingungen, sie verwandeln sich in Heidebülten, die nicht selten zu recht beträchtlicher Höhe ( $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  m) aufwachsen.

andere. Auf feuchtem Waldesgrund vordringend, bringen sie dessen Holzbestand binnen kurzem zu Fall. („Das Torfmoos frisst den Wald.“) Selbst die für die natürliche Vegetation der Hochmoore so charakteristischen Heidepflanzen (s. o.) werden, solange die Bedingungen für die Entwicklung der Sphagnaceen besonders günstig sind (große zur Verfügung stehende Mengen nährstoffarmen Wassers), von diesen leicht völlig unterdrückt. An der Hochmoorbildung sind besonders folgende Sphagnumarten beteiligt: *Sphagnum medium*, *Sph. fuscum*, *Sph. recurvum*, *Sph. obtusum*, *Sph. cuspidatum*, *Sph. rubellum*, *Sph. imbricatum*, *Sph. capillifolium*, *Sph. subsecundum*. In den oberen Schichten unserer Hochmoore lassen sich die wohl erhaltenen Reste dieser zierlichen Pflanzen auch mit bloßem Auge noch deutlich erkennen. Trotz der zarten, weichen Beschaffenheit ihrer Substanz unterliegen die abgestorbenen Torfmoose sehr schwer der Zersetzung. Eine eigentliche Vertorfung ist in den jüngeren Hochmoorbildungen kaum eingetreten und ihr *Moostorf* unterscheidet sich äußerlich vom *Torfmoos* fast nur dadurch, daß unter dem Druck der darüber lagernden Massen die Moosstengel und Blättchen sich zu filzartig verwebten blättrigen Schichten verdichtet haben, und daß das Blattgrün der lebenden Moose sich in einen gelb- oder rötlichbraunen Farbstoff umgesetzt hat. Der Widerstand, den die Torfmoose ihrer Vertorfung entgegensetzen, dürfte in erster Linie auf ihren anatomischen Bau zurückzuführen sein, der sie befähigt, so große Wassermengen aufzunehmen, daß selbst die am ersten der Einwirkung des Luftsauerstoffs ausgesetzten oberen Pflanzenteile möglichst wenig mit Luftsauerstoff in Berührung kommen. Erhöht wird ihre Widerstandsfähigkeit vielleicht auch durch die in ihren Zwischenräumen sich ansammelnde Kohlensäure und durch den Mangel an alkalisch reagierenden Substanzen, namentlich an Kalk, der die Entstehung freier Humussäuren zur Folge hat, sowie durch ihren Gehalt an schwer zersetzlichen Harzen und an Gerbsäure, Stoffen, die der Vermoderung entgegenwirken (§ 51).

Wird die Oberfläche des Moores so trocken, daß Torfmoose nicht mehr gedeihen können, und treten nun heidekrautartige Gewächse an ihre Stelle, so bieten die vom Wasser befreiten Moosreste dem Eindringen des Luftsauerstoffs nicht mehr genügenden Widerstand, und unter dessen Einfluß findet dann eine Humifizierung der obersten Moostorfschicht statt. Sie geht in eine schwarze, beim Austrocknen krümlig werdende, dem bloßen Auge kaum noch geformte Teile aufweisende „*Verwitterungsschicht*“<sup>1)</sup> über, die sich scharf von dem darunterliegenden, nicht ver-

<sup>1)</sup> Auf Grund der Angaben des Göttinger Botanikers Griesebach hielt man früher die Heidepflanzen für die wesentlichsten Bildner dieser Schicht und nannte sie demgemäß „*Heideerde*“. Nach C. A. Weber entsteht sie jedoch auch auf Moostorfflächen, auf denen der Heidewuchs völlig zerstört ist.

witterten Moostorf abgrenzt und sich allmählich mit einer von ihr äußerlich nicht zu unterscheidenden, meist sehr dünnen Heideerdeschicht bedeckt.

Bei der schwierigen Vertorfbarkeit der Torfmoose bedarf es jedenfalls sehr großer Zeiträume, bis sie sich in eine amorphe, nach ihrem äußeren Ansehen dem Grastorf ähnelnde Masse umwandeln. Daß eine solche Umwandlung schließlich stattfindet, beweisen die tieferen Schichten der älteren Hochmoore, z. B. im nordwestlichen Deutschland. Als älteste Hochmoorbildung findet sich hier, oft über Scheuchzeria- (s. o.) oder Eriophorumtorfschichten abgelagert, ein braun bis schwarz gefärbter, dem bloßen Auge amorph erscheinender Torf, der nur noch vereinzelt Heidestengel und nicht selten nesterförmig auftretende Lager von Wollgrasresten erkennen läßt. Neuere Untersuchungen haben im Gegensatz zu früheren Anschauungen<sup>1)</sup> ergeben, daß auch dieser Torf im wesentlichen Torfmoosen derselben Art seine Entstehung verdankt, aus denen der überlagernde *jüngere Moostorf* sich zusammensetzt, daß er also gleichfalls als Moostorf und zwar als *älterer Moostorf* bezeichnet werden muß. Er unterscheidet sich weniger durch seinen Gehalt an mineralischen Bestandteilen, als hinsichtlich seiner äußeren Eigenschaften sehr erheblich von dem jüngeren Moostorf. Während der letztere, wegen seiner helleren Farbe wohl als „weißer“ Torf bezeichnet, im trockenen Zustand einen elastischen, porösen Stoff von sehr geringem spezifischen Gewicht bildet, der Wasser in großen Mengen aufsaugt und festhält,<sup>2)</sup> bildet der ältere „schwarze“ Moostorf nach dem Austrocknen eine dichte, schwere, als Brenntorf geschätzte Masse, die vom Wasser kaum noch benetzt wird. Sie besitzt im Gegensatz zum Moostorf jüngerer Bildung ein bedeutendes Kontraktionsvermögen. 1000 Liter älteren Moostorfs verkleinern beim Austrocknen ihr Volum auf etwa 175 Liter, 1000 Liter jüngeren Moostorfs nur auf etwa 500 Liter, und ein bestimmtes Gewicht des letzteren nimmt einen 4—5 mal größeren Raum ein als ein gleiches Gewicht des ersteren.

Die zahlreichen Poren des jüngeren Moostorfes begünstigen die Ansammlung großer Mengen von Gasen, wie sie beim Vertorfungsprozeß

<sup>1)</sup> Gegen die Annahme Griesebachs, wonach die tieferen Schichten der Hochmoore vornehmlich aus den vertorften Resten von Heidekräutern bestehen sollen und daher als „*Heidetorf*“ zu bezeichnen seien, haben sich in neuerer Zeit gewichtige Bedenken erhoben. Sie sind von Früh, Tolf, und besonders scharf von Dr. C. A. Weber zum Ausdruck gebracht worden. Er unterscheidet zwischen Moostorf jüngerer und älterer Bildung.

<sup>2)</sup> Wegen dieser Eigenschaften wird der jüngere, noch nicht verwitterte Moostorf zur Herstellung eines ausgezeichneten Einstreumaterials für Viehställe verwendet („Torfstreu“). Es besitzt in hohem Maße die Fähigkeit, den tierischen Dünger vor Verlusten an wertvollen Stickstoffverbindungen zu schützen (ihn zu „konservieren“).

entstehen (Kohlendioxyd, Kohlenwasserstoffe, Schwefelwasserstoff), die, leichter als Wasser, das spezifische Gewicht des Moostorfs so weit erniedrigen können, daß er von seiner Unterlage sich ablöst, schwimmt und bei steigendem Wasser sich mit diesem hebt.<sup>1)</sup>

Wo in den tieferen Schichten des Hochmoors älterer Moostorf sich vorfindet, pflegt er von der überlagernden neueren Moostorfbildung durch eine Schicht von wechselnder, aber einige Decimeter wohl nicht übersteigender Mächtigkeit getrennt zu sein, die neben sehr wenig Torfmoosen vorwiegend die Reste von Wollgras, Heide, bisweilen auch von Nadelhölzern, also von Pflanzen aufweist, die mit einem weit geringeren Maß von Feuchtigkeit auskommen als die Torfmoose.<sup>2)</sup> Sie dürfte das Erzeugnis einer lange andauernden Trockenperiode sein, während deren die früher die Flora beherrschenden, gegen Feuchtigkeitsmangel sehr empfindlichen Torfmoose den genannten Gewächsen Platz machten.<sup>3)</sup> Als an die Stelle der trockenen Zeiträume lange anhaltende feuchte Perioden traten,<sup>4)</sup> wurden sie bald wieder von den üppig aufwachsenden Torfmoosen überwuchert, denen die jüngere Moostorfbildung ihre Entstehung verdankt.

Der Einfluß, den das Vorhandensein großer Mengen nährstoffarmen Wassers auf die Entwicklung der Sphagnummoose ausübt, ist wahrscheinlich die Ursache einer Erscheinung, die alle geschlossenen Hochmoorkomplexe aufweisen: der oft stark *gewölbten Form* ihrer Oberfläche.<sup>5)</sup> Während die auffallenden Niederschläge an den Rändern des über seine Unterlage emporwachsenden Hochmoors leichter Abfluß finden, befördern sie das Wachstum der Moose im Innern derartig, daß dieses bald über die Randzone emporsteigt. Die uhrglasartige Oberflächengestaltung läßt

---

<sup>1)</sup> Ein ausgezeichnetes Beispiel für ein derartiges schwimmendes Hochmoor bietet das „*Schwimmende Land*“ von Waakhausen, ein Teil des im Flußgebiet der Hamme (Weser) belegenen Teufelsmoores, eine bis 1½ m mächtige, mit Büschen und Bäumen bestandene Moorschicht, die mit dem Hochwasser steigt und fällt, und von der bei heftigen Winden nicht selten große Stücke sich ablösen und fortgetrieben werden, wenn es nicht gelingt, durch rechtzeitig in Tätigkeit gesetzte Winden sie in die frühere Stelle zurückzuholen.

<sup>2)</sup> Dr. C. A. Weber bezeichnet diese Schicht als „Grenztorf“.

<sup>3)</sup> Auch innerhalb des älteren und des jüngeren Moostorfes finden sich stellenweise als Zeugen kürzerer Trockenperioden dünne, aus Wollgras, Heide und Holzpflanzen hervorgegangene Torflagen.

<sup>4)</sup> Griesebach bringt das Aufwachsen des Moostorfes mit einer durch zahlreiche Beobachtungen wahrscheinlich gemachten zeitweiligen Senkung des norddeutschen Küstenstrichs in ursächlichen Zusammenhang.

<sup>5)</sup> Nach Sendtner läßt der nur etwa 125 ha umfassende Murner-Filz („Filz“ hier gleich Hochmoor) bei Wasserburg (Bayern) eine Wölbung von mehr als 7 m Höhe erkennen.



sich sowohl bei dem älteren Moostorf und dem Grenztorf, als bei der jüngeren Moostorfbildung erkennen.

Scheinen auch die meisten Hochmoore über Niedermoorbildungen aufgewachsen zu sein, so ist doch die Auflagerung eines Hochmoors unmittelbar auf mineralischem Untergrunde durchaus nicht ausgeschlossen. Die über Niedertorf sich ansiedelnden Torfmoose ziehen sich seitlich weit über die ursprünglichen Grenzen des Moores hinaus, wenn sie in der Umgebung die geeigneten Bedingungen zu üppigem Wachstum (Ansammlung von nährstoffarmem Wasser) vorfinden. Sie überdecken den angrenzenden Heideboden, unter Umständen auch fruchtbarere Bodenarten,<sup>1)</sup> kleine Hügel, Wälder, mit Moospolstern, und führen so eine bisweilen sehr beträchtliche peripherische Ausdehnung des Hochmoors herbei.

Unmittelbar auf mineralischem Untergrund lagernden Hochmoortorf weisen auch manche Gebirgshochmoore auf.

**§ 62. Gebirgshochmoore.** Auch auf den Gipfelplateaus und an den Abhängen von Gebirgen entstehen Hochmoore von ganz ähnlicher Beschaffenheit, wie die soeben beschriebenen der Ebene, falls hier nur die Gelegenheit zu zeitweiligen Wasseransammlungen gegeben ist und ein schwer verwitterbares, an Pflanzennährstoffen, namentlich an Kalk armen Boden lieferndes Gestein (z. B. Granit, Gneiss, Glimmerschiefer u. a.) die Unterlage bildet. Für die landwirtschaftliche Benutzung kommen diese Moore nur selten in Frage, dagegen sind sie wegen ihres hohen Wasseraufsaugungsvermögens<sup>2)</sup> für die Erhaltung der Vegetation an den Gebirgsabhängen von größter Bedeutung. Indem sie das auffallende Regenwasser, das von den nackten Gipfeln mit großer Gewalt in die Tiefe stürzen und den bereits gebildeten Verwitterungsboden nebst den darin wurzelnden Pflanzen mit sich reißen würde, aufsaugen, verhindern sie einerseits jene Zerstörungen und liefern andererseits in ihren langsam absickernden Wässern eine sparsam, aber stetig fließende Nährquelle für die Flora unserer Berge.

**§ 63.** Die geringen Ansprüche, welche die hochmoorbildenden Pflanzen an den Nährstoffgehalt von Boden und Wasser stellen, kommen

---

<sup>1)</sup> Auf versumpften Böden treten die vielleicht in reichem Maße vorhandenen wertvollen Bodenbestandteile nicht als Nährstoffe in Wirksamkeit. Anderenfalls würden die Torfmoose bald durch anspruchsvollere moorbildende Pflanzen verdrängt werden.

<sup>2)</sup> Untersuchungen der Moor-Versuchs-Station haben ergeben, daß die Wassermenge, die ein Hochmoor aufsaugt, dem Raume nach 80—85 % des Hochmoors ausmacht. Denkt man sich aus einem 4 m mächtigen Moor die moorbildenden festen Pflanzenreste herausgenommen, so würde das zurückbleibende Wasser eine 3,20—3,40 m hohe Schicht bilden.

in der *Zusammensetzung des Hochmoortorfes* deutlich zum Ausdruck. Er ist von Natur durchweg sehr arm an *mineralischen Bestandteilen*. Sein Gesamtaschengehalt kann bis auf 2 und weniger Prozent der Torftrockensubstanz herabgehen. Der durchschnittliche *Kalkgehalt* des trockengedachten Hochmoortorfes überschreitet nicht 0,2 % (während der durchschnittliche Gehalt der Niedermoorbildungen etwa auf 3 % anzusetzen ist). Damit hängt es zusammen, daß seine *Humussäuren* — im Gegensatz zum Niedermoorortorf — zum großen Teil in freiem Zustande vorhanden sind und behufs der Kultivierung dieser Moorbildungen durch Zufuhr von Kalk oder Mergel „abgestumpft“ (in humussaures Calcium übergeführt) werden müssen.<sup>1)</sup> Hierdurch wird zugleich die für den Kulturboden anzustrebende Umwandlung der schwer zersetzlichen Pflanzenteile in „milden“ Humus in auffälligem Maße gefördert.<sup>2)</sup>

Auch der *Stickstoffgehalt* des Hochmoortorfes bleibt weit hinter dem der Niedermoorbildungen zurück. Während bei den letzteren ein Stickstoffgehalt der Torftrockensubstanz von 3 % nichts Seltenes ist, bewegt sich der Stickstoffgehalt des Hochmoortorfes etwa um 1 %. Auch steht der Mangel an basischen Stoffen in dem letzteren einer Überführung des Torfstickstoffs in die wirksame Form, die im Salpeter, entgegen (§ 28).

Für die *landwirtschaftliche Kultur* ist bisher im wesentlichen nur die jüngere Moorstorfbildung in Frage gekommen. Bei einer auf ihre Eigenschaften genügende Rücksicht nehmenden Behandlung stellt sie, besonders wegen ihres Verhaltens zum Wasser, ein für zahlreiche Acker- und Wiesengewächse sehr geeignetes Kulturmedium dar. Dagegen bietet der ältere Moorstorf, besonders durch sein erhebliches Kontraktionsvermögen und seine Neigung zum Austrocknen, der landwirtschaftlichen Nutzung Schwierigkeiten.

---

<sup>1)</sup> Auf der anderen Seite wirkt die Anwesenheit freier Säuren insofern günstig, als sie den Hochmoorboden befähigt, die natürlich vorkommenden schwerlöslichen Phosphate „aufzuschließen“ (§ 20). Die vom Handel verhältnismäßig billig gelieferten Rohphosphate (Phosphorite, Koprolithe) äußern daher auf den Hochmoorböden eine Wirkung, die ihnen auf anderen Bodenarten nicht zukommt.

<sup>2)</sup> Solange der Hochmoorboden seine natürliche saure Beschaffenheit besitzt, ist er für die meisten Kulturpflanzen unzugänglich. Sie dringen mit ihren Wurzeln nur so weit in die Tiefe, als der Säureüberschuß an basische Stoffe gebunden ist. Um den landwirtschaftlichen Nutzpflanzen ein größeres Wurzelgebiet zu erschließen, hat man nach dem Vorgang der Moor-Versuchs-Station neuerdings angefangen, mittels eines Untergrund-Düngepfluges auch die Untergrundschichten der Hochmooräcker zu kalken.

## § 64.

**Übergang von Hochmoor in Niedermoor.** Nach den früheren Erörterungen über die Hochmoor- und Niedermoorbildung wird man voraussetzen dürfen, daß der Übergang von einer Moorbodenart in die andere allermeist in der Weise sich vollzieht, daß ein Niedermoor sich allmählich zu einer Hochmoorbildung auswächst. Doch kommen auch Beispiele vor, in denen das Umgekehrte stattgefunden hat. Wird z. B. ein aufwachsendes Hochmoor infolge einer Senkung des Gebietes oder durch Wegräumung natürlicher Schutzwälle mit nährstoffreichem Wasser überflutet, so kann an Stelle der Torfmoose eine niedermoorbildende Flora treten und über dem Hochmoortorf eine Niedermoor-schicht entstehen. Letztere geht dann wieder in eine Hochmoorbildung über, sobald infolge der Oberflächenerhöhung die moorbildenden Pflanzen dem Einfluß des fruchtbaren Wassers sich entziehen.

---

### Kapitel III.

#### Die Klassifikation des Bodens und die geognostisch-agronomische Bodenkartierung.

##### A. Die Klassifikation des Bodens.

Seit langer Zeit ist man bemüht gewesen, nach gewissen, einer größeren Anzahl von Böden gemeinsamen Eigenschaften die mannigfaltigen Bodenarten in Gruppen oder Klassen zusammenzuordnen. Je nachdem man dabei diese oder jene Eigenschaften oder Merkmale als maßgebend ansah, mußte die Einteilung natürlich sehr verschieden ausfallen.

##### § 65.

**Einteilung nach petrographischen und geologischen Kennzeichen.** Die Einteilung der Böden auf petrographischer Grundlage, d. h. nach der Art ihres Muttergesteins, wonach man z. B. zwischen „Granit-“, „Basalt-“, „Tonschieferböden“ u. s. w. unterscheiden würde, erscheint für unsere Zwecke untauglich, weil aus gleichnamigen Gesteinen sehr verschiedenartige Böden hervorgehen können (§§ 48, 49). Desgleichen verwerfen wir ein Einteilungssystem, das sich auf die geologische Abstammung des Bodens stützt, z. B. von Buntsandsteinboden, Keuperboden, „Diluvialboden“, „Alluvialboden“ (§ 3) spricht. Diese Bezeichnungen lassen höchstens Vermutungen über das *Alter* des Bodens zu, sagen aber nichts über dessen *Beschaffenheit* aus. Auf Buntsandstein finden sich ganz arme und wieder sehr fruchtbare Böden; „Diluvialböden“ können fast ausschließlich aus Quarzsand bestehen, aber auch große Mengen von Feldspat, Hornblende und andere ihre Fruchtbarkeit steigernde Bestandteile enthalten. Die „Alluvialböden“ umfassen den unfruchtbarsten Dünen sand, sowie die zu den reichsten Bodenarten gehörigen Marsch- und Aueböden.<sup>1)</sup>

##### § 66.

**Einteilung der Böden nach ihrer Entstehungsart.** Größere Berechtigung mit Rücksicht auf die landwirtschaftliche Bewertung der Böden zeigt eine Gruppierung der verschiedenen Bodenarten, die sich auf ihre *Entstehungsart*, also gleichfalls auf ein geologisches Prinzip gründet,

<sup>1)</sup> Über die Berücksichtigung der Herkunft eines Bodens bei seiner Kennzeichnung s. u. § 107.

d. i. die Einteilung in *Primitiv-* oder *Verwitterungsböden* und *Derivat-* oder *Schwemmböden*. Unter „Primitiv-“ oder „Verwitterungsböden“ versteht man solche Bodenarten, die, unmittelbar aus dem anstehenden Gestein durch Verwitterung hervorgegangen, noch über ihrem Muttergestein lagern. Soweit sie kristallinen Urgesteinen ihre Entstehung verdanken, kann man sie als *Verwitterungsböden der Urgesteine*, falls sie sich auf sedimentären Gesteinen bildeten, als *Verwitterungsböden der Sedimentär-gesteine* bezeichnen. „Derivat-“ oder „Schwemmböden“ nennt man die Bodenarten, die, durch irgend welche Umstände, namentlich durch Wasserkraft oder auch durch Eis oder durch den Wind von dem Ort ihrer Bildung fortgeführt, auf fremder Gesteinsunterlage sich abgelagert haben.

Beide Bodengruppen weisen hinsichtlich ihrer natürlichen Beschaffenheit gewisse Unterschiede auf, die für ihre landwirtschaftliche Beurteilung von Bedeutung sind. Die „Primitivböden“ befinden sich noch im Anfangsstadium der Gesteinsumwandlung. In verhältnismäßig geringer Tiefe liegt das noch unverwitterte feste Muttergestein, sie sind daher meist flachgründig und enthalten selbst noch vielfach gröbere, nicht oder wenig verwitterte Gesteinselemente. Dies ist namentlich der Fall bei dem Verwitterungsboden der Urgesteine, weniger bei denen der Sedimentär-gesteine, die ja nichts anderes sind, als die wieder verhärteten Produkte einer durchgreifenden Verwitterung der Urgesteine und der Verschwemmung der mehr oder weniger stark veränderten Gesteinselemente. Sie sind meist weniger hart als die ursprünglichen Massengesteine, auch erleichtert ihre Schichtung oder Schieferung den Zerfall zu erdiger Masse. Die „Schwemmböden“ haben vor ihrer Ablagerung bereits einen Transport durchgemacht, bei dem die gröberen, festen Gesteinstrümmer zu feinem Sand und Schlamm zerrieben wurden. Sie besitzen, soweit sie sich noch nicht wieder zu festem Gestein verhärtet haben, meist bis auf große Tiefe hin, bis auf das Gestein, über dem sie sich ablagern, von vornherein mehr den Charakter eines fertiggebildeten und tiefgründigen Bodens. Während aber die Verwitterungsböden durch ihre ganze Masse hindurch verhältnismäßig *gleichförmig* zu sein pflegen, ist eine Gleichartigkeit der verschiedenen Schichten bei den Schwemmböden weniger zu erwarten, weil bei ihrer Entstehung Ton, Sand, Geröll u. a. m. je nach ihrem spezifischen Gewicht wechselnd sich abgesetzt haben.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ein gleicher Prozess ging auch bei der Bildung der sedimentären Gesteine vor sich (§ 33), die ja nichts anderes sind, als wieder zu Gestein erhärteter Boden. Jedoch hat hier unter der Last der überlagernden Wasser- und Gesteinsmassen allermeist wieder eine Vermischung der verschiedenartigen Bestandteile stattgefunden. Es pflegen daher die Verwitterungsböden der Sedimentär-gesteine hinsichtlich ihrer Gleichartigkeit zwischen denen der Urgesteine und der Schwemmböden zu stehen.

So schätzenswerte Anhaltspunkte hiernach die aus der verschiedenen Entstehungsart sich ergebenden Merkmale für manche zu erwartenden Eigentümlichkeiten der verschiedenen Bodenklassen liefern, so reichen sie doch nicht entfernt zur Kennzeichnung ihrer landwirtschaftlich wichtigen Eigenschaften aus. Können doch nach ihrer ganzen Bildungsart Verwitterungsböden aus sedimentären Gesteinen den Schwemmböden hinsichtlich ihrer Zusammensetzung durchaus gleichartig sein. Und umgekehrt weisen die „Verwitterungsböden“ ebenso wie die „Schwemmböden“ untereinander in ihren Eigenschaften so gewaltige Verschiedenheiten auf, daß diese Bezeichnungen auf den landwirtschaftlichen Wert jener Bodenarten kaum einen Schluß zulassen. Soll eine Klassifikation der landwirtschaftlichen Beurteilung zu Hilfe kommen, so muß sie sich auf Eigenschaften stützen, die für die landwirtschaftliche Verwertung des Bodens von Bedeutung sind. Diesem Anspruch scheinen bei oberflächlicher Betrachtung am meisten die Gruppierungen zu entsprechen, die man als:

### § 67.

**Ökonomische Einteilungssysteme** zu bezeichnen pflegt. Dieselben richten sich zum Teil nach den *Fruchtgattungen*, die auf den verschiedenen Böden gut oder weniger gut gedeihen, und teilen die letzteren z. B. ein in „guten“, „mittleren“, „geringen“ „Weizen-“, „Gerste-“, „Roggen-“ u. s. w. Boden, oder auch in „kleefähigen“ und „nicht kleefähigen“ Boden, zum Teil nach den *Kornerträgen*, indem man unterscheidet zwischen Böden, die das Dreifache, Vierfache, Fünffache u. s. w. der Aussaat bringen, zum Teil nach den verschiedenen *Geldroh- oder Geldreinerträgen* der einzelnen Bodenarten. Der in irgend einer Weise ermittelte Reinertrag ist dem Bodenbewertungssystem zugrunde gelegt, das seitens des Preussischen Staates und anderer Länder zum Zweck der Grundsteuer-Veranlagung benutzt wird.<sup>1)</sup> Es ist aber leicht einzusehen, daß alle derartigen Systeme mehr versprechen, als sie halten können, weil sowohl die Art der anbau-

<sup>1)</sup> Das Preussische Gesetz vom 21. Mai 1861 (betr. die anderweitige Regelung der Grundsteuer) setzt folgendes fest. In jedem landrätlichen Kreise oder, falls dieser erhebliche Bodenverschiedenheiten aufweist, in den innerhalb des Kreises angenommenen „Klassifikationsdistrikten“ wird der vorhandene Grund und Boden je nach der Kulturart eingeteilt in:

Ackerland, Gärten, Wiesen, Weiden, Holzungen, Wasserflächen und Ödland.

In jedem Kreise oder Klassifikationsdistrikt wird, ganz unabhängig von den übrigen Kreisen und Distrikten, das Ackerland je nach seinem Kapitalwert oder der Höhe seines Reinertrages in nicht mehr als 8 Bodenklassen eingeteilt. Als Reinertrag wird die Summe (ausgedrückt in Silbergroschen pro Morgen) angesehen, die nach Abzug der Bewirtschaftungskosten (inkl. der Zinsen für Gebäude- und Inventarienkapital) bei gewöhnlicher Bewirtschaftungsweise nach

fähigen Früchte, als die von ihnen zu erwartenden Material-, Roh- und Reinerträge nicht bloß durch die Art des Bodens, sondern sehr wesentlich auch durch das Klima, die Art des Wirtschaftsbetriebes und durch die mannigfachsten wirtschaftlichen Verhältnisse bedingt werden.

Auch die von manchen vorgeschlagene und befürwortete Einteilung der Böden nach ihrer *natürlichen Vegetation* (die nach vielen Beobachtungen auf die Anwesenheit gewisser wichtiger Pflanzennährstoffe im Boden hindeuten kann) würde bei dem jetzigen Stande unserer Erkenntnis in hohem Grade unsicher sein, weil neben der Bodenbeschaffenheit noch viele andere Faktoren auf die Ansiedelung dieser oder jener Pflanzen hinwirken.<sup>1)</sup>

### § 68.

#### Die Klassifikation auf physikalisch-chemischer Grundlage.

Von der Erkenntnis ausgehend, daß der landwirtschaftliche Wert eines Bodens in erster Linie von den an seiner Zusammensetzung beteiligten Stoffen abhängt, hat schon Albrecht Thaer, der Begründer der Landbauwissenschaft, je nach dem Vorwalten gewisser für die landwirtschaftliche Benutzung besonders wichtiger Gemengteile die Böden in folgende Gruppen eingeteilt: „Tonböden“, „Lehmböden“, „sandige Lehm-“ und „lehmige Sandböden“, „Sandböden“, „humose Böden“, Kalkböden.<sup>2)</sup> Wenn auch derartige Systeme mit allen Versuchen, Naturgegenstände zu klassifizieren, den Übelstand gemein haben, daß sich zwischen den einzelnen Abteilungen zahlreiche Übergangsgebilde finden, wenn ferner auch die in eine Klasse

dem Urteil ortskundiger, landwirtschaftlicher Sachverständigen jährlich von der fraglichen Fläche dauernd erzielt werden kann.

Da die Einschätzung in jedem Kreise und Distrikt ganz selbständig erfolgt, so brauchen natürlich die in einem Kreise festgesetzten Bodenklassen durchaus nicht mit den entsprechenden Bodenklassen eines anderen Kreises gleichwertig zu sein. So erzielt z. B.

die Bodenklasse	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
im Kreise								
Kreuznach einen Reinertrag von	330	270	210	150	90	43	21	12 Sgr.
Lübben „ „ „	108	90	81	54	30	21	9	3 „

<sup>1)</sup> Siehe darüber weiteres im zweiten Abschnitt dieses Werkes „Botanik der Wiesenpflanzen“.

<sup>2)</sup> Thaer unterscheidet innerhalb der einzelnen Bodenarten, je nach den die Ertragsfähigkeit bestimmenden Verhältnissen (Bodenbestandteile, Tiefe der Ackerkrume und des Untergrundes, Klima, Lage u. a.), verschiedene Bodenklassen, deren Brutto- und Reinerträge in  $\frac{1}{4}$  Scheffel (= X) ausgedrückt werden. Die Differenz zwischen beiden Zahlen gibt die Höhe der Bewirtschaftungskosten. Seine Klassifikation ist die folgende:

zusammengeworfenen Böden nicht selten sehr verschiedenen landwirtschaftlichen Wert besitzen, und endlich die als Merkmale für die verschiedenen Bodenklassen aufgeführten Gemengteile *für sich allein* noch nicht den größeren oder geringeren Bodenwert bestimmen, so hängt dieser doch unzweifelhaft unter sonst gleichen (klimatischen, wirtschaftlichen u. a.) Verhältnissen in erster Linie von einem größeren Reichtum des Bodens an den Stoffen ab, die in dem Thaer'schen System Berücksichtigung gefunden haben.<sup>1)</sup> In enger Anlehnung an das letztere und in wesentlicher

Bodenart I: *Tonboden.*

	Bruttoertrag auf den Morgen	Reinertrag
Kl. 1. Schwarzer Klei-, fetter Weizen-Marsch-Polderboden . . . . .	75 X	48 X
" 2. Starker Weizenboden . . . . .	50 "	26 "
" 3. Schwacher Weizen-, zäher Letten-, träger, kalter Lehm Boden . . . . .	36 "	12 "
" 4. Magerer Weizen-, kalter Haferboden, Bergboden		0—3—6 X

Bodenart II: *Lehm Boden.*

Kl. 1. . . . .	46 X	26 X
" 2. . . . .	36 "	18 "
" 3. . . . .	38 "	21 "

Bodenart III: *Sandiger Lehm- und lehmiger Sandboden*, schwarzer Gersten- und trockener Haferboden.

Kl. 1. Sandiger Lehm Boden . . . . .	32 X	16 X
" 2. Ebenso, aber tadelhaft in einzelnen Punkten .	24 "	10 "
" 3. Lehmhaltiger Sandboden . . . . .	20 "	8 "
" 4. Ebenso, aber ungünstiger . . . . .	16 "	6 "

Bodenart IV: *Sandboden.* Drei- und sechsjähriges Roggenland.

(Ertrag mit Rücksicht auf Weidewert.)

Kl. 1. Nach Ruhe 5 Scheffel Roggen . . . . .	— X	4 X
" 2. " " 4 " " . . . . .	— "	3 "
" 3. " " 3 " " . . . . .	— "	2—1 X

Bodenart V: *Humoser Boden.*

Kl. 1. Milder, schwarzer Gerstenboden, Aueboden . .		30 X
" 2. Schwarzer Niederungs-Roggenboden oder schwarzer Haferboden . . . . .		18 "
" 3. Saurer Niederungsboden . . . . .		8—12 X
" 4. Mooriger Boden . . . . .		?

Bodenart VI: *Kalkboden.*

Wird, weil aus eigener Anschauung nicht bekannt, nicht näher erörtert.

<sup>1)</sup> Ein von W. Knop in seinen Grundzügen entworfenenes, aber noch nicht genügend entwickeltes System auf rein chemischer Grundlage teilt die Böden in die *Familie der Silikatböden* (Tonerdasilikat-, Eisenoxysilikat-, Monoxydsilikat-



Übereinstimmung mit dem Bodenklassifikationssystem, das bei der geognostisch-agronomischen Kartierung (s. u.) des norddeutschen Flachlands durch die Königlich Preussische Geologische Landesanstalt zur Anwendung kommt, teilen wir die Bodenarten ein in:

*Steinböden, Sandböden, Lehm Böden, Tonböden, Kalkböden, Humusböden und Moorböden.*<sup>1)</sup>

Bei den Moorböden unterscheiden wir als Untergruppen die *Hochmoorböden*, die *Niederungsmoorböden* und die *Übergangsmoorböden*.

#### B. Die geognostisch-agronomischen Bodenkarten.

Während die frühere geologische Landesaufnahme, hervorgewachsen aus rein wissenschaftlichen und aus bergbaulichen Interessen, fast ausschließlich das *Gebirgsland* behandelte, war die im Jahre 1873 begründete Königl. Preussische Geologische Landesanstalt von Anfang an bestrebt, durch eine geognostisch-agronomische Kartierung auch des *Flachlandes* zugleich den Bedürfnissen der Land- und Forstwirtschaft Rechnung zu tragen.

### § 69.

**Zweck der Karten und Art der Darstellung.** Die geognostisch-agronomischen Karten sollen nicht bloß die *Gesteins-Zusammensetzung*<sup>2)</sup> auf dem dargestellten Landesabschnitt, dessen „*petrographischen*“ Charakter, sondern gleichzeitig seine „*pedographische*“ Beschaffenheit, also die durch chemische und mechanische Analyse ermittelte Zusammensetzung seiner äußersten Verwitterungsrinde, d. i. des *Bodens*, zur Anschauung bringen und so die Grundlage für seine landwirtschaftliche und forstliche Bewertung liefern.


Zur Herstellung der Bodenkarten werden die Mefstischblätter<sup>3)</sup> der topographischen Abteilung des Preussischen Generalstabes im Maßstab böden und Sand- oder kieselsaure Böden), die *Familie der Karbonatböden* (Kalk- und Dolomitböden) und die *Familie der Sulfatböden* (Gips- und Anhydridböden). Je nach dem Gehalt an den verschiedenen Bestandteilen soll dann die weitere Einteilung erfolgen.


<sup>1)</sup> Gewöhnlich (auch bei den Aufnahmen der Geologischen Landes-Anstalt) werden die Moorböden den „Humusböden“ zugerechnet. Sie nehmen jedoch sowohl nach ihrer Entstehungsweise als nach ihren Eigenschaften eine gesonderte Stellung ein.

<sup>2)</sup> Der Ausdruck „Gestein“ (wie auch „Gebirge“, „Gebirgsart“) bedeutet im geognostischen Sinn nicht nur festen Stein, Fels, sondern jeden, auch den lockeren, losen, erdigen Teil der Erdrinde.

<sup>3)</sup> Die durch Druck vervielfältigten, mit dem Mefstisch, einem Feldmefss-  
apparat, hergestellten Geländeaufnahmen („Mefstischplatten“). Die Niveau-  
unterschiede im Gelände sind auf den Mefstischblättern durch Höhenlinien und  
eingeschriebene Zahlen zur Darstellung gebracht.









von 1:25000 der natürlichen GröÙe benutzt. Jede Karte umfaßt ein Gebiet von  $2\frac{1}{4}$  Quadratmeilen (ca. 12700 ha). Die Gebiete der verschiedenen zu Tage liegenden Gesteinsschichten oder der aus ihnen hervorgegangenen Bodenarten des Flachlandes — es kommt hier fast ausschließlich die Quartärformation in Betracht — werden durch Linien („Geologische Grenzen“) umzogen und ihre Zugehörigkeit zu dieser oder jener Formation durch gewisse Grundfarben, sowie durch eingetragene schwarze Buchstaben („Formationszeichen“) gekennzeichnet. Es erhalten (s. den beigegebenen Kartenausschnitt,<sup>1)</sup> Tafel I und II nach S. 112) die Schichten

des Alluviums . . . . . weiÙe Grundfarbe und das Formationszeichen a  
des oberen Diluviums

und zwar:

des Taldiluviums . .	blaugrüne	„	„	„	„	2a
des Höhendiluviums	blaugelbe	„	„	„	„	2
des unteren Diluviums	hellgrau	„	„	„	„	d.

Die *petrographische* Beschaffenheit der Formationsabteilungen wird durch Zusammenstellung der Formationszeichen mit gleichfalls schwarzgedruckten lateinischen Buchstaben kenntlich gemacht; z. B. bedeuten (s. Tafel II) die „Symbole“ as, asl, ak, ah, at (dem Alluvium angehörigen) Sand, Schlick, Kalk („Wiesenkalk“, § 33, 4), Humus, Torf, 2m oberen, dm unteren Diluvialmergel, 2s oberen, ds unteren Diluvialsand etc. Die gleichen Zeichen finden sich bei den auf den Kartenrändern angebrachten Farbenerklärungen.

Außerdem aber werden die petrographischen Unterschiede und damit zugleich die verschiedenen *Hauptbodengattungen* innerhalb der einzelnen Formationsabteilung durch besondere, für die verschiedenen Formationen gleichartige Signaturen meist in einem dunkleren Ton der geologischen Grundfarbe zusammengefaßt, und zwar die *Sandböden* durch Punktierung,<sup>2)</sup> die *Grandböden* durch Ringelung, die *Steinböden* durch Kreuzchen, die *tonigen Böden* durch wagerechte oder senkrechte, die *Geschiebemergel* durch schräge Reißung, die *Tone, Lehme* und *lehmigen Böden* durch schräge Schraffierung, die *Humus-* und *Moorböden* durch kurze Strichelung, die *Kalkböden* durch blaue Schraffierung (s. d. Karte).

§ 70. Um auch den Charakter der *tieferen Bodenschichten* und die *Grundwasserverhältnisse* auf den Karten zum Ausdruck bringen zu

<sup>1)</sup> Der Kartenausschnitt ist mit gütiger Erlaubnis des Herrn Prof. Dr. H. Gruner dem von ihm geognostisch und agronomisch bearbeiteten Blatt Lohm (Gradabteilung 43 No. 12) entnommen.

<sup>2)</sup> Die staubfeinen (Mergel- und Schluff-) Sande durch sehr feine, die mittel- und grobkörnigen durch lichter gestellte, gröbere Punktierung.

können, wurden bei der agronomischen Aufnahme zahlreiche Handbohrungen, früher bis auf 1,5 m, in neuerer Zeit bis auf 2 m Tiefe, ausgeführt (für jedes Blatt etwa 2000 und darüber), deren Anordnung aus einer besonderen Bohrkarte hervorgeht. Gehören die in der Bohrtiefe enthaltenen Schichten mehreren Formationen an, so deutet die Grundfarbe stets die geologische Zugehörigkeit der *oberen* Schicht an (falls diese nicht außerordentlich dünn ist oder nur eine „Durchtränkung“ der eigentlich obersten Schicht mit Elementen einer anderen Formation, z. B. mit Humus, darstellt). In die Grundfarbe werden dann die den verschiedenen Formationen beigelegten Signaturen in der Art eingetragen, daß die Signatur der unteren Schicht hinter die der oberen zurücktritt, daß z. B., wenn Sand unter Moor liegt, die Strichelung die Punktierung überwiegt. Auch die aufgedruckten Symbole lassen die Aufeinanderfolge mehrerer geologischer Schichten hervortreten und zwar dadurch, daß sie, durch Striche getrennt, untereinander gesetzt werden. So bedeutet der Ausdruck  $\frac{\partial m}{\partial s}$ , daß unter

oberem Diluvialmergel unterer Geschiebesand liegt, der Ausdruck  $\frac{as}{at}$ , daß

oberer Geschiebemergel von alluvialem Torf und dieser von alluvialem Sand überlagert wird. In einem dem Erläuterungsheft zur Karte angefügten *Bohrregister* wird die pedographische Beschaffenheit der durchteuften Schichten durch Buchstaben und andere Zeichen,<sup>1)</sup> ihre Mächtigkeit durch Zahlen angegeben, die immer Decimeter bedeuten, z. B.:

Teil der Karte <sup>2)</sup>	Bohrloch No.	Bodenprofil	
IA	8	$\frac{\check{K}SH}{S}$ 3 17	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Unter einer 3 dm mächtigen, schwach kalkhaltigen und schwach sandigen Humusschicht liegen (mindestens) 17 dm grob- und feinkörnigen Sandes.} \end{array} \right.$
oder IIC	66	$\frac{\overline{H}ET}{E\overline{S}T}$ 2 2 S 16	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Unter 2 dm stark humosen, sandigen (Sand unter 0,2 mm Korngröße) Tones folgen 2 dm eisenschüssigen, sandigen (wie oben) Tones, darauf (mindestens) 16 dm Sand (Korngröße über 0,2 mm).} \end{array} \right.$
u. s. w.			

<sup>1)</sup> Jedem Bohrregister geht eine Erklärung der benutzten Buchstaben und Zeichen voraus, wonach z. B. S Sand, G Grand, L Lehm, T Ton, M Mergel, K Kalk, H Humus, SL sandigen Lehm, SKH sandigen kalkhaltigen Humus etc. bedeutet.

<sup>2)</sup> Die Bohrkarten sind, um die Auffindung jeder Bohrstelle zu erleichtern, in 4 × 4 annähernd quadratische Felder geteilt, die in bekannter Weise durch Zahlen und Buchstaben kenntlich gemacht werden.

In den Karten selbst werden die auf einer größeren Fläche ermittelten Minimal- und Maximalzahlen für die Mächtigkeit der einzelnen Bodenbildungen in Rotdruck an einer Stelle eingetragen, die im Mittelpunkt der betreffenden Fläche steht. Gehören die *tieferen* Schichten einer anderen Formation oder Formationsabteilung an, als die Grundfarbe des Kartenteils für die oberen Schichten angibt, so wird dies durch Einzeichnung einzelner Bohrlochkreise von der Farbe der betreffenden Formation kenntlich gemacht.

Auf dem rechten Rande jedes Blattes finden sich die Erklärungen der in der Karte verwendeten Farben und geognostischen und agromischen Zeichen („Farben-Bezeichnung“), auf dem linken Zeichnungen der für die aufgenommene Gegend charakteristischen Bodenprofile, nach Bodengattungen geordnet. Der untere Rand enthält eine graphische Darstellung der daselbst übereinander oder zwischeneinander vorkommenden Bildungen (s. Tafel II).<sup>1)</sup>

### § 71.

**Das Kartenlesen.** Mit Hilfe der vorstehenden und der auf der Karte selbst (Tafel II) gegebenen Erläuterungen dürfte es nicht schwer sein, aus der Bodenkarte (Tafel I) den geognostischen und den pedographischen Charakter der dargestellten Gegend herauszulesen.

Die durch die Karte dargestellte Landschaft scheidet sich in zwei scharf voneinander abgesonderte geognostische Gebiete. Das nordwestliche gehört nach seinen grauen, gelben und grünen Grundfarben dem *Diluvium*, das südöstliche nach seiner weißen Grundfarbe dem *Alluvium* an.

Unter den diluvialen Bildungen auf dem nordwestlichen Kartenteil ist zunächst der *untere Diluvialmergel* („Unterer Geschiebemergel“), das Produkt der älteren Eiszeiten (§ 37), südlich und nördlich der Ortschaft Breddin leicht erkennbar an der hellgrauen Grundfarbe und an der Bezeichnung dm (s. Farbenbezeichnung ① Tafel II), die dunklere Reifung deutet den lehmigen oder tonigen Charakter der oberen Schicht an. Die Bohrungen auf dem übrigen Teil des Geländes zeigen, daß er oder der aus ihm hervorgegangene Geschiebesand (ds) sich auch im Untergrunde der jüngeren hier vertretenen Diluvialbildungen findet. Nach den in die Karte eingetragenen agromischen (roten) Buchstabenzeichen und nach der Profildarstellung ① Tafel II besteht er in seiner oberen 5—13 dm

<sup>1)</sup> In den obigen Erläuterungen konnten nur die wichtigsten Bezeichnungen des sinnreichen Systems berührt werden, welches bei der geologisch-agromischen Kartierung der Geologischen Landesanstalt sich allmählich herausgebildet hat. Einen eingehenderen Einblick erhält der Leser durch das Studium der höchst übersichtlichen und klaren Darlegungen des Prof. Dr. K. Keilhack. (S Literatur zum I. Abschnitt.)



mächtigen Verwitterungsschicht aus lehmigem Sand (LS) oder schwach lehmigem Sand (ŁS). Darauf folgt nach der Tiefe zu Lehm (L) oder sandiger Lehm (SL), und darunter wurde nördlich von Breddin Mergel (M) oder sandiger Mergel (SM) angetroffen.

*Unmittelbar* nördlich von Breddin, ferner in einigen Inseln in nordöstlicher und östlicher Richtung von Breddin, sowie in einem langen, schmalen, fast an der Grenze von Alluvium und Diluvium sich hinziehenden Streifen tritt der untere Diluvialsand oder Spatsand (§ 37) zu Tage, eine Ablagerung der Interglacialzeit, kenntlich an der hellgrauen Grundfarbe mit dunkelgrauen Punkten und dem Zeichen  $\delta s$ . Die in die Karte eingetragenen Bohrlochkreise  $\bigcirc$  und Nachgrabungszeichen  $\blacktriangleright$  (mit dem Gepräge des Diluvialmergels) und die Farbenbezeichnung ② Tafel II, sowie die in die Karte eingetragenen agronomischen (roten) Buchstaben und Zahlen lassen erkennen, daß schon bei Handbohrungen und Grubenanlagen unter einer 8—12 dm mächtigen Sandlage sandiger Lehm und sandiger Mergel, Glieder des unteren Diluvialmergels, aufgefunden wurden.

Bei Breddin und in der nordöstlichen Ecke des Blattes liegt der *obere Diluvialmergel* („Oberer Geschiebemergel“) an der Oberfläche, bezeichnet durch hellgelbe Grundfarbe mit dunkelgelber, enger, schräger Schraffierung von rechts nach links (s. Farbenbezeichnung ③ Tafel II) und die Buchstaben  $\partial m$ . Nach den agronomischen Eintragungen in die Karte und dem Profil ② Tafel II besteht er in seiner oberen (Verwitterungs-) Schicht aus lehmigem oder schwach lehmigem Sand (3—13 dm), der nach unten in sandigen Lehm und stellenweise weiter in sandigen Mergel übergeht. An manchen Stellen, kenntlich gemacht durch die gleiche Grundfarbe mit dunkelgelber, weiter Schraffierung und das Zeichen  $\frac{\partial m}{\delta s}$ , findet sich der Mergel nur noch in einzelnen Überresten, und die Hauptmasse besteht dann nur noch aus Lehm und lehmigem Sand, der unmittelbar auf dem unteren Diluvialsande aufliegt (s. Profil ③ Tafel II und Bez. ① daselbst, auf dem unteren Kartenrand), oder die Verwitterung ist noch weiter vorgeschritten, der Kalk völlig, der Lehm zum größten Teil fortgespült, sodaß von dem ursprünglichen Geschiebemergel nur noch lehmiger und schwach lehmiger Sand zurückgeblieben sind. Die betreffenden Flächen sind mit hellgrauer Grundfarbe, dunkler, weiter, schräger Schraffierung und mit eingestreuten, dunkelgrauen Punkten, sowie mit dem Zeichen  $\partial \delta s$  versehen (s. auch ② Tafel II, unterer Kartenrand). Auch hier weisen zwei mit dem Gepräge des unteren Diluvialmergels eingetragene Bohrlochkreise (unter dem Wort Breddin) darauf hin, daß Handbohrungen noch den unteren Geschiebemergel erreichten. Aus den agronomischen Zeichen erkennt man, daß die oberste Schicht dieses Bodens aus lehmigem oder schwach lehmigem Sand (3—13 dm), im Gemenge mit Steinen

(worauf die Kreuzchen hindeuten), die tiefere aus Sand oder Grand (G) besteht. In der nordwestlichen Ecke des Blattes befindet sich eine kleine, dem Alluvium angehörige Fläche (weiße Grundfarbe), die von einem jüngeren Gliede des Diluviums, dem *Talsand*, eingeschlossen wird. Letzterer wird durch hellgrüne Grundfarbe bezeichnet. Die eingestreuten Punkte zeigen an, daß es sich um Sand *hochgelegener* Becken und Rinnen handelt, um den am Schluß der Diluvialzeit von den Höhen herabgeschwemmten und in den von den Schmelzwässern ausgehöhlten Vertiefungen abgesetzten Sand. Nach der Farbenbezeichnung ④ Tafel II besteht der Alluvialboden aus reinem oder schwach humosem, meist trockenem Sand mit durchlässigem Sanduntergrund.

Größeren Umfang nimmt in der dargestellten Gegend die jüngste Diluvialbildung, der von den Schmelzwässern der Gletscher der letzten Eiszeit in die *Niederungen* geführte und hier zum Absatz gekommene *Talsand* ein (blafsgrüne Grundfarbe mit eingestreuten dunkelgrünen Punkten, 2as), wie er in der südwestlichen Ecke des Kartenblattes auf größerer Fläche zu Tage liegt und sich von hier in einem schmalen Streifen als „Vorterrasse“ der Diluvialgebilde in nordöstlicher Richtung über das ganze Blatt hinwegzieht, auch in kleinen Inseln aus dem Alluvium hervorragt). Nach der Farbenbezeichnung ⑤ Tafel II und dem in die Karte eingetragenen agronomischen Zeichen besteht der Boden an der Oberfläche aus reinem oder schwach humosem Sand, mit durchlässigem Sanduntergrund und meist nicht tiefem Grundwasserstand.

Der südöstliche Teil der Karte, der ausschließlich aus *Alluvialboden* besteht, ist leicht zu verstehen. Überall liegt, wie die einfache oder doppelte Strichelung andeutet, an der Oberfläche entweder Moorerde (ah) oder Torf<sup>1)</sup> (at), s. d. Farbenbezeichnung ⑥ und ⑦ Tafel II; beide werden unterlagert von schlickhaltigem Sand  $\frac{as1}{as}$  (s. d. Bezeichnung ③ Tafel II am unteren Rande der Karte). Letzterer bildet das vermittelnde Glied zwischen dem Talsand des oberen Diluviums und dem Schlick des Alluviums. Wie die agronomischen Eintragungen in die Karte und das Profil ④ Tafel II erkennen lassen, liegen hier unter einer 2—5 dm starken Schicht von sandigem Humus Ton oder humoser Ton, darunter bisweilen wieder reiner oder tonhaltiger Humus (H—TH), in größern Tiefen Sand.

<sup>1)</sup> Als „Moorerde“ werden die unter dem Einfluß größerer Entwässerung und Durchlüftung bereits stärker zersetzten, als „Torf“ die bei mangelndem Zutritt des Luftsauerstoffs noch wenig zersetzten, faserigen, sperrigen, pflanzlichen Bodenbildungen angesehen. Torf findet sich auf der Karte nur auf einer kleinen Fläche nordöstlich von dem blau schraffierten, zur Kolonie Sophiendorf gehörigen Gebiet.

Die blaue, schräge, unterbrochene Schraffierung auf einem großen Teil der Alluvialfläche deutet das Vorhandensein von Moormergel (§ 33, 5 d) a k h (s. Farbenbezeichnung ⑧ Tafel II) an. Die geognostische Bezeichnung (k h)

$\frac{(s l)}{(k)}$  in der Karte und am unteren Kartenrand Tafel II ④ (das Formations-

8

zeichen a ist fortgelassen) mit ihren eingeklammerten Buchstaben zeigt an, daß auf der betreffenden Fläche der Mergel in der oberen Schicht sich nur *nesterweise* vorfindet, daß ebenso in den tiefern Schichten Schlick und Wiesenkalk *nesterweise*, Sand überall angetroffen wird. Die agronomischen Zeichen sind namentlich mit Hilfe des Profils ⑤ Tafel II leicht verständlich.

§ 72. *Die Vorteile*, die bei eingehendem Studium die geognostisch-agronomischen Karten dem Landwirt, Forstwirt und dem Kulturtechniker gewähren können, sind zahlreich. Sie geben schnell einen Überblick über die Bodenbeschaffenheit eines größeren Gebietes und lassen unschwer die räumliche Ausdehnung des besseren und geringeren Bodens in der dargestellten Landschaft erkennen.

Aus den Karten läßt sich unmittelbar die Antwort auf die für die Begrenzung der Ackerschläge einer Wirtschaft hochwichtige Frage ablesen, ob verschiedenartige und verschiedene land- und forstwirtschaftliche Behandlung beanspruchende Bodenarten auf verhältnismäßig kleiner Fläche wechseln, oder ob große zusammenhängende Flächen gleichartigen Bodens eine große Ausdehnung des einzelnen Schläges gestatten. Der Aufschluß, den sie in gebirgigen Gegenden für die Flach- oder Tiefgründigkeit des Bodens geben, ist ausschlaggebend für die Wahl der anzubauenden Früchte und Holzarten. Ihre und die in den Erläuterungen beigegebenen Angaben über die Beschaffenheit der oberen, wie der tieferen, für die Pflanzen noch erreichbaren Schichten lassen von vornherein die wichtigsten Schlüsse zu, nicht nur hinsichtlich des vorhandenen Vorrats an Pflanzennährstoffen, sondern auch für die gleichfalls bei der Fruchtwahl sehr zu berücksichtigenden Wasserverhältnisse. Letztere werden in erster Linie durch die Lage und die petrographische Beschaffenheit der Untergrundschichten bedingt. So unterscheidet die Karte (s. Tafel I und II) zwischen Talsand im Haupttal und Talsand in der Hochfläche. Der erstere ist meist feucht, der letztere meist trocken. Das in der Mark sehr häufige Profil ① (Tafel II): — in der Oberfläche lehmiger Sand, worauf Lehm und dann Lehmmergel folgt — stellt eine starke Wasserhaltigkeit des Bodens in Aussicht. Sehr oft aber findet sich zwischen dem lehmigen Sand und dem Lehm eine mehr oder weniger mächtige, dann ebenfalls aus der Karte ersichtliche Sandschicht

eingelagert, wodurch die wasserhaltende Kraft des Bodens natürlich in hohem Grade vermindert wird.<sup>1)</sup> Dahin gehört auch, daß der Sand des *Alluviums* entsprechend seiner Lage in der Niederung allermeist mehr natürliche Frische besitzt, als der im übrigen ihm ähnliche *Diluvialsand* (Berendt). Auch nach anderer Richtung kann die geognostische Unterscheidung von Wichtigkeit sein. So weist Berendt darauf hin, daß die Sande des oberen und des unteren Diluviums *petrographisch* zwar fast gleich sind, *pedographisch* aber eine verschiedene Bedeutung besitzen, insofern als der *obere* Diluvialsand meist in verhältnismäßig *geringer* Mächtigkeit dem Lehm des oberen Diluviums aufliegt, der *untere* aber gewöhnlich sehr mächtig ist, sodaß die darunter liegenden wertvolleren Schichten keine Wirkung auf den Pflanzenwuchs ausüben können.

Endlich braucht nur noch hervorgehoben zu werden, daß die Karten auch davon Kunde geben, ob Kalk, Mergel, Kleiboden und andere Meliorationsmittel für den Boden im Untergrunde oder in erreichbarer Nähe vorhanden sind.

<sup>1)</sup> Die Bedeutung der durch die Karte dargestellten Bodenbeschaffenheit für die Gestaltung des Wasserhaushalts geht sehr anschaulich aus folgendem, den „Grundlagen des Ackerbaus“ von Hellriegel entnommenen Beispiel hervor. Von zwei Böden bestand der eine (A) in der für die Pflanzen noch erreichbaren Tiefe aus reinem Sand, der andere (B) in seinen oberen 30 cm aus lehmigem, mit Humus gemischtem Sande, in den folgenden 33 cm aus lehmigem Sand, darauf folgte reiner Sand. In beiden Böden vermochten die Pflanzenwurzeln bis auf eine Tiefe von 80 cm einzudringen. Beide Bodenarten mögen mit reichlicher Winterfeuchtigkeit getränkt zu Beginn der Vegetation noch bis zu 80% ihrer Wasserkapazität (s. u. § 78) an Feuchtigkeit enthalten. Sie können dann, wie wir unten sehen werden (§ 84), noch 80—30, d. i. 50% ihrer Wasserkapazität den Pflanzen zur Verfügung stellen. Nach den vorgenommenen Untersuchungen betrug das verfügbare Wasser für 1 ha bis zur Tiefe von 80 cm berechnet:

auf dem Boden A	rund 1 164 000 kg (entsprechend 116,4 mm Regen),
„ „ „ B „	418 000 „ „ 41,8 „ „ !

## Kapitel IV.

### Die Eigenschaften des Bodens und ihre Beeinflussung durch menschliches Eingreifen.

Nach der Begriffsbestimmung des Bodens (s. die Einleitung) soll er den Kulturpflanzen einen zusagenden Stand und die mineralischen Stoffe bieten, deren sie zu ihrer Ernährung bedürfen. Der Kulturwert eines Bodens wird also durch seinen Gehalt an Pflanzennährstoffen und durch das stärkere oder schwächere Vorhandensein gewisser Eigenschaften bedingt, die den Pflanzen erst die Nährstoffaufnahme und das Wachstum ermöglichen. Als „physikalische“ Eigenschaften lassen sie sich kurz bezeichnen.

#### A. Die physikalischen Bodeneigenschaften.

##### § 73.

**Allgemeines.** Auch der an Nährstoffen reichste Boden sichert den Pflanzen kein freudiges Gedeihen, wenn er nicht zugleich andere für das Pflanzenwachstum notwendige Bedingungen erfüllt. Um der Pflanze einen genügend *festen Stand* zu gewähren, muß er so tiefgründig und locker sein, daß die Pflanzenwurzeln bis zu einer gewissen Tiefe eindringen und sich verbreiten können; zugleich ist ein gewisser Zusammenhang der Bodenteilchen nötig, um ihr Fortwehen und das Umfallen der Pflanzen zu verhindern. Dabei darf der Zusammenhang der Bodenteilchen nicht so dicht sein, daß er die *Durchlüftung* des Bodens, das Eindringen der atmosphärischen Luft und das Austreten pflanzenschädlicher Bestandteile der Bodenluft stört. Die Bodenbeschaffenheit muß ferner der Bewegung des *Bodenwassers* nach oben, nach unten und nach den Seiten günstig sein, ohne ein zu schnelles Abfließen nach der Tiefe oder den Seiten hin hervorzurufen. Sie muß endlich eine *Erwärmung* des Bodens auf ein für das Pflanzenwachstum günstiges Maß ermöglichen. Alle diese Eigenschaften werden nur zum kleineren Teil durch die chemische Zusammensetzung der Bodengemengteile, in weit höherem Grade durch deren mechanische Beschaffenheit und das Mengenverhältnis beeinflusst, in dem sie zu einander stehen.

## § 74.

**Die festen Gemengteile des Bodens.** Sieht man vom Bodenwasser und der Bodenluft ab, so kann man den Boden als ein mechanisches Gemenge von *grandigen*, *sandigen*, *tonhaltigen* und *organischen* Stoffen<sup>1)</sup> betrachten, die man gewöhnlich als „Bodenkonstituenten“ bezeichnet. *Grand* und *Sand* nennt man die gröberen Gemengteile, die in Wasser schnell zu Boden sinken und meist überwiegend aus Kieselerde (Quarz) bestehen, aber häufig auch zahlreiche, weniger oder mehr zersetzte Gesteins- und Mineraltrümmer, wie Granit, Kalkstein, Kreide, Feldspat, Glimmer u. a. enthalten und so über den Ursprung, das geologische Alter, die geognostische Zugehörigkeit<sup>2)</sup> des Bodens Auskunft geben. Die Teile mit mehr als 2 mm Korngröße rechnet man zum Grand, die kleineren, aber noch mehr als 0,05 mm Korngröße besitzenden zum Sand. Die letzteren teilt man in Unterabteilungen von

2—1 mm, 1—0,5 mm, 0,5—0,2 mm, 0,2—0,1 mm, 0,1—0,05 mm

Korngröße. Unter *tonhaltigen* Stoffen werden die feinkörnigsten Bodengemengteile verstanden, die in Wasser sich lange schwebend erhalten und dadurch von den grobkörnigen Teilen leicht „abgeschlämmt“ werden können. Die tonhaltigen Stoffe (auch „Rohton“) bestehen der Hauptsache nach aus den letzten Verwitterungsprodukten der Mineralien, nämlich aus Ton und feinzerriebenem Quarz (Quarzmehl), enthalten aber fast immer noch größere oder geringere Beimengungen von Eisenoxyd und von weniger verwitterten Mineralien, namentlich von wasserhaltigen Silikaten (Zeolithen), also von den Stoffen, die für das Absorptionsvermögen der Böden von hervorragendem Einfluß sind (s. u.). Man trennt bei den Untersuchungen der Geologischen Landesanstalt die tonhaltigen Teile noch weiter in ‚Staub‘ mit einer Korngröße von 0,05—0,01 mm und in ‚Feinstes‘ unter 0,01 mm Korngröße. Die *humosen Stoffe* bestehen hauptsächlich aus pflanzlichen Resten in den verschiedensten Zersetzungsstadien (§ 53). Der Gehalt eines Bodens an humosen Stoffen entspricht etwa dem Gewichtsverlust, den völlig trockener Boden beim Glühen erleidet. Zur Ermittlung des Gehalts an sandigen und tonhaltigen Gemengteilen dient:

**§ 75. Die mechanische Bodenanalyse.** Durch Siebe von verschiedener Lochweite werden zunächst die grobkörnigeren Bestandteile von den feinkörnigeren abgetrennt. Die gröberen Bodenpartikel werden

<sup>1)</sup> Auch den der Hauptsache nach aus pflanzlichen Stoffen bestehenden Moorböden sind fast ausnahmslos sandige und tonhaltige Stoffe infolge von Überwehungen oder Überschwemmungen beigemischt.

<sup>2)</sup> So wird man z. B. den Sandboden des norddeutschen Flachlandes bei Anwesenheit nordischer Gesteinstrümmer ohne weiteres der Quartärformation, bei ihrer Abwesenheit hingegen einer älteren Formation zurechnen dürfen.

wohl als das „Skelett“ des Bodens, die feinkörnigeren Bodenteile als „Feinerde“<sup>1)</sup> bezeichnet. Das Bodenskelett kann man wieder, je nach der Gröfse seiner Bestandteile, in „Größere Steine“, „Kies“, „Grobsand“ einteilen. Soweit die Siebe zur weiteren Zerlegung der feinkörnigeren Bodenbestandteile nicht mehr ausreichen, bedient man sich der *Schlamm-analyse*. In Nachahmung der Naturvorgänge, die eine Scheidung der durch das Wasser verschwemmten Gesteinstrümmer je nach ihrer Gröfse, ihrer Form und ihrem spezifischen Gewicht herbeiführen (§ 37), benutzt man zur Scheidung der sandigen und tonhaltigen Stoffe das Wasser. In *stehendem Wasser* senken sich die darin verteilten Bodenteilchen um so schneller zu Boden, je gröber sie sind. Durch einen *aufsteigenden Wasserstrom* werden die kleineren Teilchen leichter gehoben als die schwereren. Man kann daher das ruhige wie das bewegte Wasser zu einer mechanischen Zerlegung des Bodens in feinere und gröbere Partikel verwenden.<sup>2)</sup> Namentlich mittels des letzteren gelingt es, mit grofser Sicher-

---

<sup>1)</sup> Hinsichtlich der Bezeichnung der Bodenteile von verschiedener Korngröfse herrscht bis jetzt keine Einmütigkeit, und namentlich wird der Ausdruck „Feinerde“ bald für die Bodenteilchen gebraucht, die ein 0,25 mm Sieb, bald für solche, die ein 2 oder 3 mm Sieb passieren. Am zweckmässigsten dürfte es sein, ihn und die übrigen in § 75 aufgeführten Bezeichnungen fallen zu lassen und allgemein die von der Preussischen Geologischen Landesanstalt bei ihrem grofsartigen Kartierungswerk benutzten (§ 69 ff.), im § 74 mitgeteilten Unterscheidungen einzuführen.

<sup>2)</sup> Zur Ausführung der Schlämmanalyse in stehendem Wasser dienen „Schlammzylinder“ (nach Knop, J. Kühn u. a.) oder „Schlammflaschen“ (nach v. Bennigsen-Förder), aus denen man entweder die nach einer bestimmten Zeit noch im Wasser schwebenden Bodenteilchen von den sich absetzenden gröberen Teilen abgiefst, oder in denen man, nach längerem Stehenlassen, die Schichten misst, worin die verschiedenen Bodenpartikel je nach ihrer Korngröfse sich abgesetzt haben. Auf dem andern Prinzip (bewegtes Wasser) beruht u. a. der auch seitens der Königl. Preussischen Geologischen Landesanstalt benutzte Schöne'sche Schlämmaparat, mittels dessen man die bei verschiedener Stromgeschwindigkeit aufgeschlämmten Bodenpartikel getrennt aufammelt. (Je geringer die Wassergeschwindigkeit, um so kleiner sind die Bodenteilchen, die dadurch aufgeschlämmt werden.) — Die Schlämmsgeschwindigkeit der im Wasser schwebenden Stoffe hängt nicht blofs von ihrer Korngröfse, sondern auch von ihrem spezifischen Gewicht und ihrer Form ab. Es besitzen daher die bei derselben Stromgeschwindigkeit schwebend gehaltenen Bodenteilchen, d. h. Bodenteilchen „von gleichem hydraulischen Wert“, bei verschiedenem Gewicht und bei verschiedener Form auch verschiedene Korngröfse. Bei den Angaben des Schöne'schen Schlämmaparates versteht man unter „Schlämmprodukten von dieser oder jener Korngröfse“ solche Körner, die runden Quarzkörnern desselben Durchmessers hydraulisch gleichwertig sind.

heit in Bodenproben die vorhandenen Mengen von tonhaltigen und feiner- und gröbersandigen Bestandteilen zu ermitteln. Ihre Art und GröÙe, sowie die Menge und Beschaffenheit der gleichfalls leicht zu bestimmenden Humusstoffe sind von größtem Einfluß auf die physikalischen Eigenschaften des Bodens, zunächst auf seine *Lagerungsverhältnisse*.

§ 76. *Lagerung, Struktur, Kohärenz*. Die Lagerungsweise der einzelnen Bodenteilchen („Bodenelemente“), m. a. W. die „Struktur“ oder das Gefüge des Bodens ist verschieden, je nachdem die *einzelnen* Partikel gleich wenig oder gleich fest aneinander gebunden sind („Einzelkornstruktur“), oder immer eine kleinere oder gröÙere Anzahl von Bodenteilchen sich untereinander zu kleinen Haufwerken (Krümeln, Flocken) fester miteinander *verbunden* hat (Krümelstruktur). Sandboden wie Tonboden können Einzelkornstruktur aufweisen. Im ersteren liegen die einzelnen Sandkörner (wenn sie trocken sind) lose, ohne jeden Zusammenhang, nebeneinander, im letzteren halten sich die Tonteilchen mit einer beträchtlichen Anziehungskraft aneinander gefesselt, die der mechanischen Trennung einen Widerstand entgegensetzt<sup>1)</sup> und die man „Kohärenz“ nennt. Bei beiden Bodenarten kann die Einzelkornstruktur in Krümelstruktur übergehen; bei der ersteren, wenn die Bodenelemente durch bindende Stoffe (Ton, Kieselsäure, Humus, Kalk u. a.) zu Krümelchen verkittet werden, bei den letzteren dadurch, daß auf irgend eine Weise der gleichmäßige Zusammenhang der Masse gelockert und die Bildung einzelner in sich fester gefügter, aber lose *nebeneinander* liegender Bodenteilchengruppen herbeigeführt wird. Hierdurch wird also die Kohärenz oder „Bindigkeit“ des Sandbodens *vermehrt*, die des Tonbodens *vermindert*. Die Überführung der Einzelkorn- in die Krümelstruktur ist für die landwirtschaftliche Verwertung des Bodens von hoher Bedeutung; daß sie seine Luft- und Wasserverhältnisse günstiger gestaltet, wird weiter unten erörtert werden. Ein Boden mit Krümelstruktur erleichtert das Eindringen der Pflanzenwurzeln und die Bearbeitung mit landwirtschaftlichen Werkzeugen. Sie verhindert ferner die Krustenbildung und das Rissigwerden der tonreichen Böden (s. unter Volumveränderungen, § 79). Auf die Krümelbildung wirken namentlich die folgenden Umstände ein. Wie früher bereits mitgeteilt wurde (§§ 16, 37), haben gewisse Stoffe, wie *Calciumsalze*, *Magnesium-*

<sup>1)</sup> Je nach der Zähigkeit, mit der die einzelnen Bodenteilchen aneinander haften, und die allermeist auch in der Zähigkeit ihres Anhaftens an Holz und Eisen sich ausspricht, unterscheidet der Landwirt zwischen „schweren“ oder „strengen“ (d. h. schwer zu bearbeitenden) und „leichten“ (leicht zu bearbeitenden) Böden, wobei allerdings an die Bezeichnung „schwer“ zugleich die Annahme eines gröÙeren, an die Bezeichnung „leicht“ die eines geringeren Reichtums an Pflanzennährstoffen geknüpft wird.



*salze* und, wenn auch in geringerem Grade, *Kalium-* und *Natriumsalze* die Fähigkeit, den Ton zu Flockenbildung („Koagulierung“) zu veranlassen; eine ähnliche Wirkung scheint den *Humusstoffen* zuzukommen. Auf mechanischem Wege wird die Krümelung eines tonreichen Bodens durch die grabende und wühlende Tätigkeit der im Boden lebenden Tiere,<sup>1)</sup> sowie durch das Eindringen, die Verbreitung und das Wachstum der Pflanzenwurzeln und ferner durch eine verständige Bodenbearbeitung (s. u.) befördert. Auch das in den Boden eindringende und gefrierende Wasser kann infolge seiner Ausdehnung eine lebhafte Krümelbildung, allerdings auch die unliebsame Erscheinung hervorrufen, die man als „*Auffrieren*“ des Bodens bezeichnet. Das Auffrieren des Bodens findet namentlich leicht auf stark humosen Bodenarten statt. Die Humusstoffe nehmen sehr viel Wasser auf (s. u.), das im Winter, zu Eis gefrierend, sich stark (um  $\frac{1}{10}$  seines ursprünglichen Volums) ausdehnt und die festen Bodenteile emporhebt oder voneinander schiebt. Hierbei werden die zarten Wurzeln der im Boden stockenden Pflanzen zerrissen oder nach dem Auftauen des Eises freigelegt, und ein Absterben der Pflanzen ist die Folge („Auswintern“ des Getreides). Der Krümelbildung entgegen wirkt kräftig auffallendes Regenwasser, indem es die koagulierenden Salze auswäscht, die Krümel mechanisch zerstört, den Boden „verschlämmt“.

§ 77. *Wirkung menschlichen Eingreifens auf die Krümelstruktur. „Bodengare“.* Die mechanische Bearbeitung des Bodens mittels der landwirtschaftlichen Werkzeuge hat zum großen Teil den Zweck, die Krümelstruktur herbeizuführen. Er wird aber bei tonreichen Böden verfehlt, wenn diese während der Bearbeitung sehr naß sind oder gleich nach der Bearbeitung viel Regen erhalten.<sup>2)</sup> In diesem Fall befördert die Bearbeitung nur die verschlämmende Kraft des Wassers. Von großem Einfluß ist die Zufuhr von Stoffen zu tonreichen Böden, die eine Flockung herbeiführen, also namentlich von *Kalk*, Kalkmergel und von *humosen Substanzen*, z. B. von Stalldünger, Moorerde. Auch die Vermischung ton-

<sup>1)</sup> Hierher ist namentlich auch die Arbeit der Regenwürmer zu rechnen, die nicht bloß durch die zahlreichen gegrabenen Gänge, sondern auch dadurch eine ausgezeichnete Krümelbildung veranlassen, daß sie mit ihrer Nahrung große Mengen von mineralischen Bodenteilchen aufnehmen und mit ihren Exkrementen vermischt zurücklassen. Nach Darwin besteht die Ackerkrume hauptsächlich aus Regenwurmerkrementen. Auch für manche Wiesenböden (auch Moorböden) läßt sich diese Behauptung aufrecht erhalten.

<sup>2)</sup> Auch die tonreichen Böden, die vom Meerwasser überschwemmt waren und dadurch mit löslichen Salzen durchsetzt sind, dürfen nur mit größter Vorsicht mechanisch bearbeitet werden, solange die Entsalzung durch die atmosphärischen Niederschläge in Gang, und damit die Neigung zur Einzelstrukturbildung vorhanden ist (§ 16, am Schlufs).

reichen Bodens mit grobem *Sand* ist geeignet, seine Kohärenz abzuschwächen. In gleicher Richtung wirkt der Anbau von Pflanzen mit stark entwickeltem Wurzelsystem (Klee). In sandreichen Böden wird man durch Aufbringen von humus- und von tonhaltigen Stoffen (z. B. von Tonmergel) auf eine *Verstärkung* der Kohärenz, also gleichfalls auf die Krümelbildung günstig einwirken können.

Die Krümelstruktur bildet einen wesentlichen Teil jenes Zustandes des Kulturbodens, dessen Herstellung eine Hauptaufgabe der landwirtschaftlichen Bodenbearbeitung ist und den man als *Bodengare* bezeichnet. Als äußere Merkmale für einen „garen“ Boden gelten folgende: Eine durchaus lockere, daher der Ansammlung übermäßiger Bodennässe hinderliche, dabei elastische Beschaffenheit; die in völlig amorphen Humus umgewandelten Pflanzenreste durchsetzen ihn gleichmäßig, färben ihn dunkel und befähigen ihn, auch in trockenen Zeiten sich feucht zu erhalten; endlich ein eigentümlicher Erdgeruch. Ein garer Boden verdankt diese Eigenschaften einer der Eigentümlichkeit der verschiedenen Bodenarten angepaßten, den Zutritt der Atmosphärien (Luft und Feuchtigkeit) regelnden und die Wirkung der nützlichen Bodenbakterien und sonstigen Lebewesen (§§ 50, 76) fördernden Behandlung.

### § 78.

**Das Verhalten des Bodens zum Wasser.** *Kapillarität, Porosität, Quellungsvermögen, Wasserkapazität.* Ein sehr enges Röhrchen (Haarröhrchen), das aus einem von Wasser benetzbaren Stoff besteht, hat, in Wasser getaucht, die Fähigkeit, Wasser entgegen der Schwerkraft um so höher emporzuheben, je enger es ist, und jenes nach dem Herausheben aus der Flüssigkeit in einer gewissen Höhe festzuhalten, die gleichfalls von seinem lichten Durchmesser abhängig ist. Die Kraft, mit der das Wasser gehoben und festgehalten wird, nennt man *Kapillarität*, „Kapillarkraft“, „Haarröhrchenkraft“. Bei der engen Zusammenlagerung der einzelnen Teilchen, wie sie im Boden statt hat, sind die zwischen ihnen bleibenden Hohlräume zum Teil so klein, daß sie ein weitverzweigtes Netz von verschiedenen gestalteten Kapillarröhren darstellen und den Boden befähigen, Wasser von unten aufzusaugen und sowohl dieses als das von oben eindringende festzuhalten. Die Größe der Kapillarkraft eines Bodens hängt von der Menge der kapillar wirkenden Zwischenräume, und diese von der Größe und Form der Bodenteilchen oder jener Teilchengruppen ab, die wir als Krümel bezeichnet haben (§ 76). Je kleiner die Bodenteilchen, um so größer ist im allgemeinen die Anzahl der Kapillarräume, um so größer das Aufsaugungsvermögen des Bodens. Bei sehr grobkörniger Bodenbeschaffenheit können die Zwischenräume so groß werden, daß sie nicht mehr kapillar wirken.

Bei Böden mit Einzelkornstruktur, deren Elemente aus *dichten*, massiven Stoffen bestehen, wird das Vermögen, Wasser aufzunehmen und festzuhalten, ausschließlich durch die Kapillarität bestimmt. Sind dagegen die Bodenelemente *porös* oder bilden sie poröse Krümel, so nehmen auch die Poren um so mehr Wasser auf, je zahlreicher sie sind, und halten es mit um so größerer Energie fest, je geringer ihr Durchmesser. Die aufgenommenen und festgehaltenen Wassermengen nehmen noch erheblich zu, wenn die Poren ausdehnungsfähig sind. Gewisse Stoffe, die man als „*quellungsfähige*“ Körper bezeichnet, sind imstande, besonders große Wassermengen einzusaugen, indem sie, infolge der Wasseraufnahme, etwa in gleicher Weise wie mit heißem Wasser begossene Stärkekörner, unter Vergrößerung ihrer Poren und ihres ganzen Volums „aufquellen“. Hierzu gehören namentlich die *humosen* Stoffe. Eine weniger ihrer Natur als ihrer Wirkung nach ähnliche Eigenschaft besitzen manche unorganische Stoffe. In hervorragendem Grade der Ton,<sup>1)</sup> die aus ihren Verbindungen gallertartig abgeschiedene Kieselsäure („Colloidale“ Kieselsäure, § 12) und in etwas geringerem Grade der Wiesenkalk (§ 38, 4). Bei Wasserverlust schwinden diese Stoffe wieder zusammen und werden hart (vergl. S. 95 Anm. 1 u. 2), ein Vorgang, der bei den humosen Substanzen wahrscheinlich mit einer chemischen Veränderung verbunden ist.<sup>2)</sup> Die Summe der Wirkungen, die Kapillarität, Porosität und Quellungsvermögen auf den Wassergehalt des Bodens ausüben, fassen wir zusammen unter der Bezeichnung *Wasserkapazität* („wasserhaltende Kraft“) des Bodens.

Ein Boden, der so *flachgründig* ist, daß nach seiner Befeuchtung die vorhandenen Kapillarräume sich ganz mit Wasser gefüllt erhalten können, wird von dem in ihn eindringenden Wasser so viel festzuhalten vermögen, als seinen Poren, dem Quellungsvermögen der vorhandenen quellungsfähigen Stoffe und den vorhandenen Kapillarrohräumen entspricht. Sobald dagegen die Mächtigkeit des Bodens die Höhe überschreitet, bis zu der die vorhandenen Kapillarräume das Wasser heben können, wird die Wasserkapazität der oberen Schichten in demselben Maße abnehmen, wie die Kapillarräume die Fähigkeit verlieren, das Wasser schwebend zu erhalten. Gleiche Unterschiede werden bei *tiefgründigen* Böden eintreten, wenn das

<sup>1)</sup> Bei den humosen Stoffen ist das Quellungsvermögen begrenzt, die Wasseraufnahme nie so groß, daß dadurch der Zusammenhang der festen Teilchen völlig gelockert würde. Bei den mineralischen quellungsfähigen Substanzen wird, wenn die Wasseraufnahme den Punkt überschreitet, bei dem die Plastizität (§ 16) des Körpers ihr Ende erreicht hat, durch weitere Wasserzufuhr ein Auseinanderfallen der Teilchen herbeigeführt.

<sup>2)</sup> So wurde durch die Moor-Versuchs-Station nachgewiesen, daß beim Austrocknen von Moorboden dessen Stickstoff- und Phosphorsäuregehalt in erheblichem Maße leichter löslich wird.

Grundwasser in dem einen Fall sehr nahe, in dem anderen sehr tief unter der Oberfläche ansteht. Im ersteren können sich die Kapillaren bis oben hin, im anderen nur bis zu einer gewissen Grenze unter der Oberfläche mit Wasser gefüllt erhalten. Die vom flachgründigen und von dem nur wenig über das Grundwasser hinausragenden Boden festgehaltenen Wassermengen stellen die „volle“ oder „größte“ *Wasserkapazität* eines Bodens dar, während man unter „kleinster“ oder „absoluter“ *Wasserkapazität* die Wassermengen versteht, die in den oberen, nicht mehr oder doch in weit geringerem Grade<sup>1)</sup> durch die Kapillarität gespeisten Schichten eines tiefgründigen, weit über den Grundwasserstand hinausragenden Bodens zurückgehalten werden. Die „absolute“ *Wasserkapazität* ist natürlich in allen Fällen, wo nicht sehr flachgründige oder tief im Grundwasser stehende Böden in Frage kommen, kleiner als die „volle“, und ferner ergibt sich aus dem vorstehenden der Satz: Bei tiefgründigem Boden mit tiefem Grundwasserstand ist die *Wasserkapazität* der tieferen Schichten größer als die der oberen.

Von den die *Wasserkapazität* des Bodens beeinflussenden Faktoren üben die *Porosität* und die *Quellungsfähigkeit* bei weitem die größte Wirkung aus, und es ist daher die *Wasserkapazität* eines Bodens im allgemeinen um so größer, je reicher er an Ton und an Humusstoffen ist. Die folgenden Zahlen mögen zum Beleg dienen. Es wurde gefunden bei:

	Quarzsand (Korngröße 0,3—0,9 mm)	Tonstein	Niederungsmoor
die volle <i>Wasserkapazität</i> zu	49,0	46,8	ca. 80 Volumprozent <sup>2)</sup>
die absolute <i>Wasserkapazität</i> zu	13,7	24,5	ca. 60 „

**§ 79. Einwirkung des Wassergehaltes des Bodens auf dessen Volumverhältnisse.** Bei der Aufnahme von Wasser erleiden die quellungsfähigen Bodenbestandteile (Humus, Ton, Wiesenalk) eine Vergrößerung, bei Wasserverlust eine entsprechende Verminderung ihres Volums. Bei humus- und tonreichen Böden kann die Veränderung sehr groß sein, während sie bei sandreichen Böden sehr zurücktritt. Reiner Sandboden

<sup>1)</sup> Es läßt sich denken, daß bei tiefgründigen Böden mit niedrigem Grundwasserstande die mit Wasser erfüllten Poren, namentlich der quellungsfähigen Substanzen, für die Kapillarräume der oberen Schichten Wasserreservoir bilden, die jene speisen und ihren Wasservorrat durch die Kapillaren der tieferen Schichten wieder ergänzen.

<sup>2)</sup> Häufig wird die *Wasserkapazität* in *Gewichtsprozenten* ausgedrückt. Namentlich im Interesse des Vergleichs der mineralischen mit den Humusböden, die ein sehr verschiedenes spezifisches Gewicht besitzen, empfiehlt es sich, den Wassergehalt auf das *Bodenvolum* zu beziehen.

veränderte beim Austrocknen sein Volum garnicht, dagegen schwand beim Verlust sämtlichen Wassers das Volum eines mit Wasser vollgesogenen

	Tonbodens <sup>1)</sup>	älteren Moostorfs	jüngeren Moostorfs
im Verhältnis von	1 : 0,50	1 : 0,17	1 : 0,48.

Bei *völligem* Austrocknen verminderte sich mithin das Volum des Tonbodens und des jüngeren Moostorf-Bodens auf die Hälfte, des älteren Moostorf-Bodens auf ein Fünftel des ursprünglichen Volums. Der Moorboden verdichtet sich um so stärker, je stärker desorganisiert die moorbildenden Pflanzenteile sind, je weiter die Vertorfung (§§ 54, 56) vorgeschritten ist. Wenn auch so starke Volumveränderungen, wie sie die vorstehenden Zahlen andeuten, in der Praxis nicht vorkommen, weil die in Frage kommenden Böden selbst bei starkem Austrocknen unter natürlichen Verhältnissen immer noch große Wassermengen enthalten, so ist doch zu berücksichtigen, daß die Kontraktion in den ersten Stadien des Trocknens am stärksten sein wird.<sup>2)</sup> Das Schwinden infolge Wasserverlustes macht sich bei Ton- und Moorböden durch die Entstehung von Rissen in der Oberfläche bemerklich, wenn das Austrocknen unter der Einwirkung der Sonnenstrahlen oder künstlichen Wasserentzuges sehr schnell erfolgt.<sup>3)</sup>

### § 80.

**Die Bewegung des Bodenwassers. Das Eindringen des Wassers in den Boden. Durchlässigkeit.** Das in den atmosphärischen Niederschlägen auffallende oder von höheren Stellen auf die Bodenoberfläche auffließende Wasser dringt in die letztere ein und sinkt, dem Gesetze der Schwere folgend, in die Tiefe, soweit es nicht durch die vorhandenen Kapillaren, Poren und quellungsfähigen Stoffe zurückgehalten wird. Das Vermögen des Bodens, das eintretende Wasser weiter zu leiten, bezeichnet man als seine *Durchlässigkeit*. Sie ist um so größer, je weiter die Zwischenräume zwischen den einzelnen Bodenpartikeln sind, je weniger nur langsam mit Wasser sich erfüllende Kapillaren, Poren und

<sup>1)</sup> Seemarschboden nach Untersuchungen der Moor-Versuchs-Station.

<sup>2)</sup> Auf den Verlust von 1 g Wasser kam beim Austrocknen des Tonbodens  
von 54,4 % auf 52,0 %, von 52,0 % auf 46,7 % Wassergehalt  
ein Volumverlust von 1,08 ccm 0,73 ccm  
von 46,7 % auf 3,0 %, von 3,0 % auf 1,3 % Wassergehalt  
ein Volumverlust von 0,61 ccm 0,24 ccm.

<sup>3)</sup> Bei der Ausführung von Gräben und Kanälen im Moor können die Anlagen durch Losreißen großer „Moorbänke“ unmittelbar an den Einschnitten auf das erheblichste geschädigt werden, wenn nicht durch geeignete Maßnahmen dafür gesorgt wird, daß das Bodenwasser nur *sehr langsam* aus dem Moor austritt.

quellungsfähige Stoffe dem Eindringen des Wassers in den Weg treten Grobkörnigkeit der Bodenpartikel, Krümelung und mechanische Auflockerung erhöhen die Durchlässigkeit. In gleicher Richtung wirkt das Eindringen von Tieren und von Pflanzenwurzeln in den Boden (Aufschließen des Bodens durch tiefwurzelnde Pflanzen! — s. auch § 85). Ganz oder fast undurchlässig für Wasser kann der Boden werden, wenn seine Partikel sehr klein sind, und besonders, wenn sie ausschließlich aus quellungsfähigen Stoffen bestehen oder durch irgend ein Bindemittel zu einer steinartigen Masse erhärtet sind, wie z. B. beim Ortstein, Raseneisenstein (§ 33, 2). Sehr feinkörnige, mehligte Sande, noch mehr Wiesenkalk und plastischer Ton und dichtgelagerte Moor- und Schlammböden werden, wenn sie einmal mit Wasser erfüllt sind, fast undurchlässig für Wasser. Selbst sehr dünne Lagen derartiger Stoffe innerhalb der Bodenschichten können das Durchfließen, sowie den kapillaren Aufstieg des Wassers völlig verhindern<sup>1)</sup> und so Wasseransammlungen im Boden veranlassen, die dessen natürliche Wasserkapazität weit übersteigen.

Das Hindernis, das sehr feinkörnige Böden dem Eindringen des Wassers bieten, wird noch bedeutend erhöht, wenn die Bodenpartikel an ihrer Oberfläche völlig abgetrocknet sind. Über einem stark ausgetrockneten, feinkörnigen Boden können sich (etwa wie auf einem mit Öl getränkten, engmaschigen Gewebe) große Wassermengen ansammeln, ohne in die Tiefe zu fließen.<sup>2)</sup> Diese eigentümliche Erscheinung ist zu einem Teil auf den *Widerstand* zurückzuführen, den die trockenen Bodenpartikel,

<sup>1)</sup> Fast undurchlässige, für den Pflanzenwuchs verhängnisvolle Schichten bilden sich namentlich leicht, wenn dichte, massive Bodenbestandteile (z. B. Sandkörner) mit quellungsfähigen Stoffen zusammenkommen. So bei der Rimpau'schen *Moordamnkultur*, bei der unter dem Druck der Sanddecke und der Bestellungs- und Erntegeräte die unterste Sandlage mit den obersten Mooredeteilchen zu einer äußerst dichten Schicht sich zusammenlagern kann.

Bei derselben Kulturmethode entsteht bisweilen zwischen dem Moor und der Sanddecke auch dadurch eine undurchlässige Schicht, daß die aus dem Moor austretenden Eisensalze (Eisenoxydulkarbonat) bei ihrer Oxydation die Sandkörner zu einer harten Masse verkitten.

Die Schwerdurchlässigkeit der Moorböden macht sich namentlich dadurch bemerkbar, daß die Entwässerungsgräben nur auf sehr kurze Entfernung wirken, und daß fast unmittelbar neben tief in das Moor eingeschnittenen Torfstichen der Wasserspiegel oft nur wenige Decimeter unter die Mooroberfläche gesenkt ist.

<sup>2)</sup> Die Erscheinung ist namentlich nach heftigen Platzregen auf staubig trocknen Wegen und Äckern zu beobachten. Die großen, in kurzer Zeit auf fallenden Wassermengen fließen oberflächlich ab, ohne dem Boden zu gute zu kommen, während weit geringere Regenmengen, die sich über einen *längeren* Zeitraum verteilen und so Zeit gewinnen, den „Benetzungswiderstand“ zu überwinden, ganz in den Boden eindringen können.

namentlich ausgetrocknete humose Stoffe, ihrer *Benetzung* mit Wasser entgegenzusetzen, zu einem anderen Teil beruht sie wahrscheinlich auf dem Widerstand, den die in die Kapillarräume eingedrungene Luft dem Eintreten des Wassers leistet. Erst nach Überwindung beider Widerstände vermag das Wasser in die freien Zwischenräume des Bodens einzusickern.

§ 81. *Der kapillare Aufstieg des Bodenwassers.* Die Tätigkeit der Kapillarrohr Räume des Bodens wirkt auf den Ausgleich des Wassergehaltes der tieferen wasserreicheren und der oberen wasserärmeren Schichten hin. Nach den vorliegenden Untersuchungen scheint sie erst zu beginnen, wenn der Wassergehalt der tieferen Schichten die Hälfte ihrer Wasserkapazität übersteigt, und sie ist im allgemeinen um so lebhafter, je größer der Wassergehalt der letzteren.

Die *Schnelligkeit*, mit der die Wasseraufsaugung geschieht, und die *Höhe*, bis zu der das Wasser kapillar gehoben wird, pflegen in umgekehrtem Verhältnis zu einander zu stehen. Je weiter die vorhandenen Kapillarräume sind, um so *schneller*, aber um so *weniger hoch* steigt in ihnen das Wasser, je kleiner sie sind, um so mehr ist der Aufstieg verlangsamt, die Steighöhe vergrößert. Man kann daher im allgemeinen sagen, daß bei geringem Umfang und bei dichter Lagerung der Bodenpartikel das Wasser langsam, aber um so höher steigen wird. Beimengungen von größeren Bodenpartikeln werden den Wasseraufstieg beschleunigen. In *grobkörnigem* Boden (z. B. in grobem Sand) erfolgt der Aufstieg schnell, aber nur bis zu geringer Höhe, Beimengungen von *feinkörnigen* Bodenbestandteilen (Ton, Kalkstaub) oder von humosen Stoffen verlangsamen die Geschwindigkeit, befördern aber die Höhe des Aufstiegs. Eine *Lockerung* des Bodens, durch die die Kapillarrohr Räume zum Teil zerstört werden, setzt das Aufsteigen des Wassers herab, ein *Festwalzen* lockerer Böden vermehrt und verkleinert zugleich die vorhandenen Kapillaren, bewirkt also ein langsames, aber um so höheres Aufsteigen des Wassers.

Daß das Vorhandensein von Steinen den Aufstieg verlangsamen, das Vorhandensein von undurchlässigen Schichten (§ 80) ihn ganz unterbrechen muß, liegt auf der Hand. Quellungsfähige Körper, auf die die Kapillarrzüge stoßen, können die Hebung des Wassers erheblich verstärken, indem sie selbst dann noch die oberhalb belegenen Kapillarräume mit Wasser erfüllen, wenn das Kapillarvermögen der tieferen bereits erschöpft ist. Sie verlangsamen aber den Aufstieg, indem sie sich erst mit Wasser füllen müssen, bis dieses weiter nach oben dringen kann.

Starke Austrocknung der bodenbildenden Partikel ist dem kapillaren Aufstieg des Wassers eben so hinderlich, als seinem Einsinken durch kapillare Hohlräume in die Tiefe (§ 80).

§ 82. *Die Verdunstung des Bodenwassers.* Solange die über dem Boden befindliche atmosphärische Luft nicht mit Feuchtigkeit gesättigt ist, unterliegt das in der Oberflächenschicht<sup>1)</sup> vorhandene Bodenwasser der Verdunstung. Das hierbei abgängig werdende Wasser kann aus den tieferen Schichten nur durch die Wirkung der Kapillarkraft ersetzt werden. Die Gröfse der Verdunstung hängt also, abgesehen von dem relativen Feuchtigkeitsgehalt<sup>2)</sup> der Luft, ab von der *Temperatur des Bodens*, den an der Oberfläche vorhandenen *Wassermengen* und der *Schnelligkeit*, mit der das verdunstende Wasser *ersetzt* werden kann.

Von den auf die Bodentemperatur einwirkenden Faktoren wird erst später die Rede sein. Die an der Oberfläche vorhandene Wassermenge wird von der *Gröfse der Oberfläche* und von der *Wasserkapazität* des Bodens beeinflusst. Die erstere ist durchaus nicht konstant, sie kann durch kulturelle Maßnahmen, durch Herstellung von Furchen und Hügeln erheblich vergrößert werden.<sup>3)</sup> In gleicher Richtung wirkt auch der Pflanzenbestand, der die verdunstende Fläche vervielfacht. Dagegen wird die Verdunstung herabgesetzt durch Maßregeln, die die verdunstende Fläche verkleinern, durch Bedecken des Bodens mit Steinen,<sup>4)</sup> grobem Sand und anderen Stoffen, die geringere Kapillarität besitzen als der Boden selbst (grobe Sägespäne, Gerberlohe u. dergl.). Ebenso kann eine Krustenbildung, wie sie namentlich leicht auf tonreichen Böden stattfindet, die Verdunstung fast ganz aufheben.

Böden, die mit Wasser völlig gesättigt sind, verdunsten unter gleichen Verhältnissen annähernd gleiche Wassermengen. Sinkt der Wassergehalt, so macht sich die gröfsere oder geringere Wasserkapazität der verschiedenen Bodenarten insofern bemerklich, als z. B. humose und tonreiche Böden stärker verdunsten als Sandböden. Ist die Austrocknung der Bodenoberfläche stärker geworden, so tritt die Kapillarität in Wirkung, und alle die kapillare Leitung im Boden fördernden Umstände erhöhen zugleich das Verdunstungsvermögen des Bodens. Nach den früheren Erörterungen

---

<sup>1)</sup> Gegenüber der Oberflächenverdunstung dürften die im Bodeninnern, innerhalb der mit Luft erfüllten Zwischenräume, verdunstenden Wassermengen nicht ins Gewicht fallen.

<sup>2)</sup> D. i. das Verhältnis des vorhandenen Wassergehaltes zu den Wassermengen, die die Luft bei dem augenblicklichen Thermometer- und Barometerstande aufnehmen kann.

<sup>3)</sup> Eine Fläche Boden, die mit Wasser völlig gesättigt ist, verliert mehr Wasser durch Verdunstung, als eine gleich grofse in Ruhe befindliche Wasseroberfläche, weil die raue, unebene Bodenoberfläche gröfser ist als die Wasseroberfläche. Sobald die Bodenoberfläche abgetrocknet ist, kehrt sich natürlich das Verhältnis um.

<sup>4)</sup> Hierbei wirkt zugleich die Abhaltung der erwärmenden Sonnenstrahlen erniedrigend auf die Verdunstung ein.



(§ 78) werden flachgründige Böden, deren Kapillarräume bei ihrer geringen Höhe sich bis oben hin mit Wasser füllen können, am schnellsten durch Verdunstung austrocknen, tiefgründige Böden um so weniger Wasser durch Verdunstung verlieren, je mächtiger sie sind, und je höher ihre Oberfläche über dem Grundwasser liegt.

**§ 83. Die Kondensation von Wasserdampf durch den Boden (Hygroskopizität) und die Taubildung.** Der an seiner Oberfläche völlig ausgetrocknete Boden hat wie alle festen Körper die Fähigkeit, Gase, also auch Wasserdampf an seiner Oberfläche zu verdichten. Man bezeichnet diese Eigenschaft als *Hygroskopizität*. Nach den bisherigen Untersuchungen ist ein Boden um so hygroskopischer, je mehr humose Stoffe und je mehr Eisenhydroxyd er enthält. Obwohl namentlich humose Böden nicht unbedeutliche Mengen Wasserdampf aus der Luft absorbieren können, lassen die neueren Untersuchungen es fraglich erscheinen, ob jener Fähigkeit für die Wasserversorgung der Pflanzen eine größere Bedeutung zukommt. Sie tritt nämlich erst dann in Wirkung, wenn der Boden so weit ausgetrocknet ist, daß die darin wurzelnden Pflanzen bereits zu welken anfangen.

Wichtiger ist die durch den Boden hervorgerufene *Taubildung*. Sie kann dann eintreten, wenn die Bodenoberfläche sich unter den Taupunkt der mit ihr in Berührung befindlichen Luftschicht abkühlt, aber auch, wenn die Oberflächentemperatur höher als die Lufttemperatur, dagegen niedriger als die der tieferen Bodenschichten ist. In diesem Fall kann die mit Wasserdampf gesättigte Bodenluft an die abgekühlte Oberfläche Wasser in tropfbar flüssiger Form abgeben. Wahrscheinlich ist diese Erscheinung in sehr lockeren und in grobkörnigen Böden mit geringer Kapillarkraft für die Versorgung der Bodenoberfläche mit Wasser nicht ohne Bedeutung.

### § 84.

**Bedeutung des Bodenwassers für die Vegetation und seine Beeinflussung durch menschliches Eingreifen.** Da die Pflanzen zum weitaus größten Teil (zu 70—90<sup>0</sup>/<sub>0</sub>) aus Wasser bestehen,<sup>1)</sup> das sie in überwiegender Menge durch die Wurzeln aufnehmen, so bedarf die Notwendigkeit eines genügenden Wasservorrates im Boden keiner besonderen Begründung. Zugleich ist das Bodenwasser der wichtigste Träger der mineralischen Pflanzennahrung, indem es die Bodennährstoffe, mit denen die Pflanzenwurzeln nicht in unmittelbare Berührung kommen, in Lösung bringt und ihren Übergang in die Pflanzen vermittelt. So wichtig es daher für die Pflanzen ist, daß der Boden nicht bis auf ein für ihr Ge-

<sup>1)</sup> Nach 6jährigen Beobachtungen von Hellriegel verbrauchen im norddeutschen Klima unsere wichtigsten Getreidearten für die Erzeugung von 1 kg oberirdischer, trockener Pflanzenmasse im Durchschnitt etwa 350 kg Wasser.

deihen verhängnisvolles Maß austrocknet, so kann auf der anderen Seite ein *Übermaß* von Bodenwasser die Fruchtbarkeit des reichsten Bodens völlig vernichten.<sup>1)</sup> Abgesehen davon, daß ein überreicher Wassergehalt die *Temperaturverhältnisse* des Bodens ungünstig beeinflusst, wirkt er namentlich dadurch verhängnisvoll, daß er das Eindringen des *Luftsauerstoffs* in den Boden verringert oder aufhebt. Da der der Pflanze zum Leben nötige Sauerstoff zu einem großen Teil durch die Wurzeln eingeatmet wird, so muß diese Not leiden, wenn die sauerstoffhaltige Bodenluft durch Wasser aus dem Boden verdrängt wird. Die vom Bodenwasser selbst gelösten Mengen Sauerstoff (s. u.) werden schnell verbraucht, wenn es nicht wenigstens von Zeit zu Zeit durch frisches Wasser ersetzt wird, das längere Zeit mit der atmosphärischen Luft in Berührung war. Die Bodennässe wird also dann besonders schädlich wirken, wenn es sich um „stehendes“ oder „stauendes“ Wasser handelt, und dies wird unter anderem der Fall sein, wenn im Boden oder unter dem Boden undurchlässige Schichten vorhanden sind, die die Bewegung des Bodenwassers verhindern.

Ein Mangel an Luftsauerstoff wirkt aber noch in anderer Richtung schädigend auf den Pflanzenwuchs, indem er die für die Bodenbildung und für das Gedeihen der Pflanzen nützlichen Oxydationsvorgänge verhindert und an ihrer Stelle Reduktionsprozesse (s. o.) hervorruft, deren Produkte zum Teil den Pflanzen unheilvoll sind. Ohne Sauerstoff kann die Humusbildung nur in unvollkommenem Grade vor sich gehen, namentlich werden die stickstoffhaltigen Bestandteile nicht in die vorteilhafteste Stickstoffverbindung (salpetersaure Salze) übergeführt, ja es werden die bereits gebildeten Nitrate unter Abscheidung von freiem Stickstoff wieder zerstört (§ 28). Während bei Anwesenheit von Sauerstoff der Kohlenstoff der organischen Bodenbestandteile in das nützliche Kohlendioxyd umgesetzt wird, tritt bei Sauerstoffmangel das vielleicht schädliche Sumpfgas ( $\text{CH}_4$ ) auf (§ 54), der Schwefel der Pflanzenreste wird in das giftige Schwefelwasserstoffgas umgewandelt, die der Pflanzenernährung dienenden schwefelsauren Salze zu Sulfiden reduziert, die Schwefelwasserstoff entwickeln und bei späterer Berührung mit Luftsauerstoff gefährliche Pflanzengifte (Schwefelsäure und Ferrosulfat) liefern können (§ 23).

Ein andauernder Wassergehalt des Bodens, der seiner vollen Wasserkapazität (s. o.) entspricht, schädigt unter allen Umständen das Gedeihen der Kulturpflanzen. Andererseits beginnen die Pflanzen bereits Not zu leiden, wenn der Wassergehalt des Bodens unter ein gewisses, bisweilen noch recht hohes Maß sinkt. Letzteres ist bei den verschiedenen Bodenarten sehr verschieden. Es steht offenbar in engster Beziehung zu ihrer

<sup>1)</sup> Ein kennzeichnendes Beispiel hierfür ist die Entstehung von Hochmoorbildungen über nährstoffreichen, aber versumpften Bodenarten.

Wasserkapazität (§ 78). Nach Untersuchungen der Moor-Versuchs-Station wurde das Wachstum von Roggen und Kartoffeln auf unbesandetem Hochmoorboden bereits erheblich geschädigt, als der Wassergehalt der 5 cm mächtigen obersten Bodenschicht auf 150 (!) Prozent der trocknen Bodenmasse gesunken war. Auf Gartenboden trat bei den Versuchen von Hellriegel ein Schlawfrwerden und Welken der Pflanzen ein, als der Boden nur noch 12—14 Prozent (der Bodentrockensubstanz) an Feuchtigkeit enthielt. Bei den meisten Böden scheint die obere Grenze, bis zu der das Bodenwasser noch nicht schädlich wirkt, und bei der andererseits den Pflanzen mit Sicherheit die nötige Wassermenge geboten wird, etwa bei 60 % der größten Wasserkapazität zu liegen. Ein Sinken des Wassergehaltes unter 20 % der Wasserkapazität ist dagegen von Übel.

§ 85. Auf die *Herstellung eines für das Gedeihen der Pflanzen förderlichen Bodenwassergehaltes* kann man durch verschiedene *Maßnahmen* hinwirken, deren eingehendere Erörterung in das Gebiet der Kulturtechnik fällt. Hier können nur ihre *Grundlagen* kurz angedeutet werden. Einem ungünstigen *Austrocknen* des Bodens wird entgegengewirkt durch Hinderung des seitlichen Wasserabflusses, durch Steigerung der Wasserkapazität und durch *Herabsetzung der Verdunstung*. Die letztere läßt sich durch möglichste Verkleinerung der verdunstenden Fläche, z. B. durch Ebnung der Oberfläche, und noch wirksamer durch Verminderung der kapillaren Tätigkeit des Bodens erreichen. Herbeiführung der Krümelstruktur (s. o.) setzt die kapillare Leitung herab. Ein Auflockern der obersten Bodenschicht vergrößert zwar zunächst die verdunstende Fläche, wirkt dann aber erhaltend auf die Bodenfeuchtigkeit, indem sie durch Zerstörung der Kapillaren das Aufsteigen des Wassers bis an die Oberfläche verhindert.<sup>1)</sup> Zugleich erleichtert es dem auffallenden Regen das Eindringen in den Boden und verhindert dadurch dessen Ablaufen und schnelle Verdunstung. Die Bedeckung der Bodenoberfläche mit nicht oder weniger kapillar wirkenden Stoffen (§ 78) übt denselben Einfluß aus. Bei der Rimpau'schen *Moordammkultur* (s. Kulturtechnik) macht man von dieser Maßregel ausgedehnten, segensreichen Gebrauch. Die aufgebrachte mineralische Bodendecke wirkt um so stärker feuchtigkeiterhaltend, je grobkörniger sie ist. Zugleich verhindert sie das Aufreißen der Bodenoberfläche unter dem Einfluß der Sonnenwärme (§ 79).

Eine Lockerung der Ackerschicht und des Untergrundes, wie sie beim Rajolen und Untergrundspflügen stattfindet, befähigt die Untergrundschichten zur Aufnahme von Niederschlägen, die auf flachgründigen Böden

<sup>1)</sup> Umgekehrt hat ein Festwalzen der Oberfläche ihre Versorgung mit kapillar aufsteigender Feuchtigkeit zur Folge, was zeitweilig z. B. für die Keimperiode des eingestreuten Samens von Nutzen sein kann.

seitlich abfließen würden, und erhöht auch sonst bei vielen Bodenarten die wasserhaltende Kraft um ein Beträchtliches. So vermochte bei Versuchen von H. Hellriegel Gartenboden in lockerem Zustande einhalbmals mehr Regen aufzunehmen und festzuhalten, als derselbe Boden festgedrückt, ein Verhalten, worauf die Erfolge der „Tiefkultur“ wahrscheinlich mit zurückzuführen sind.<sup>1)</sup>

Der Austrocknung des Bodens durch die die Verdunstung befördernden Winde sucht man in manchen Gegenden durch die Anlage von Hecken und von Baumanpflanzungen entgegen zu wirken.<sup>2)</sup>

Einer Übersättigung des Bodens mit Wasser kann man durch möglichstes Abfangen des Zuflusses, sowie durch Abführung des eingedrungenen Wassers nach der Tiefe oder nach den Seiten hin (durch Anlage von Brunnen, Gräben, Drains, wo nötig nach Durchbrechung undurchlässiger Bodenschichten) und ferner durch Begünstigung der Verdunstung entgegenarbeiten. Mafsregeln, die den kapillaren Aufstieg befördern, werden hier nützlich wirken, also auf der einen Seite möglichste Vergrößerung der Oberfläche (durch Anlage von Rücken, Rabatten), andererseits ein Dichtwalzen der obersten Schicht, Entfernung von nicht oder wenig kapillar leitenden Bodenbedeckungen.<sup>3)</sup>

**§ 86. Die künstliche Bewässerung.** Endlich bietet die direkte Zufuhr von Wasser, wie sie bei der künstlichen Bewässerung von Wiesen und Ackerland (s. d. Abschnitt „Kulturtechnik“) vielfach geübt wird, ein Mittel, um den Bodenwassergehalt günstiger zu gestalten. Allerdings hat man bei jener Mafsnahme allermeist nicht ausschliesslich die Anfeuchtung des Bodens, sondern noch andere Zwecke im Auge. So kann das Überstauen und Berieseln einer Wiese im Frühjahr deren *Temperaturverhältnisse* günstig beeinflussen, weil das Wasser zu dieser Zeit wärmer als der

---

<sup>1)</sup> Es liegt ferner auf der Hand, dafs jede Behandlung des Bodens, die den Pflanzenwurzeln ein tieferes Eindringen ermöglicht, ihnen zugleich gröfsere Wasservorräte erschliesst; dahin ist z. B. der Anbau von tiefwurzelnenden Pflanzen zu rechnen, die nicht nur die Fähigkeit besitzen, sich selbst aus den tieferen Bodenschichten mit Wasser zu versorgen, sondern die letzteren auch für die Nachfrucht zugänglich machen (Schultz-Lupitz).

<sup>2)</sup> Andererseits sind jedoch derartige Anlagen geeignet, die Gefahr der Spätfröste (s. § 90, Anmerkung) zu verstärken.

<sup>3)</sup> So hat sich bei Rimpau'schen Moordämmen, die ungenügend entwässert waren, ein zeitweiliges, streifenweises Blofslegen des Moores bewährt. Die obigen Erörterungen lassen zugleich erkennen, dafs auf Moorböden, die sich nicht genügend entwässern lassen, das Aufbringen von Bodenarten mit geringerem Kapillarvermögen, als es das Moor selbst besitzt, von Übel ist.

Boden zu sein pflegt.<sup>1)</sup> Nicht zu unterschätzen ist ferner die „bodenreinigende“ Tätigkeit des mit Luftsauerstoff beladenen Wassers, denn dieser verhindert die Bildung pflanzenschädlicher Reduktionsprodukte im Boden (§§ 55 und 84) oder zerstört sie, wo sie bereits entstanden sind. Es liegt auf der Hand, daß diese heilsamen („Oxydations“-) Vorgänge nur eintreten können, wenn das Wasser Gelegenheit hatte, reichliche Mengen von Sauerstoff aufzunehmen. Bereits zur Berieselung benutztes Wasser wirkt schwächer oder selbst ungünstig, weil es den gelösten Sauerstoff zum Teil oder ganz verloren und sich dafür mit Kohlendioxyd und mit schädlichen Zersetzungsprodukten des Bodens (z. B. mit Schwefelwasserstoff) angereichert hat. Die reinigende Wirkung des Wassers wird in solchem Fall wieder hergestellt, wenn bei ausgiebiger Berührung mit der atmosphärischen Luft das Kohlendioxyd entweichen kann, die schädlichen Zersetzungsprodukte durch Oxydation zerstört und neue Sauerstoffmengen aufgenommen werden. Man bezeichnet diesen (bereits den alten Römern bekannten) wichtigen Vorgang als die „Selbstreinigung der Wasserläufe“.

Eine *düngende* Wirkung kommt dem Bewässerungswasser zu, wenn es aus dem anstehenden Gestein, aus den Abgängen menschlicher Niederlassungen oder gewisser gewerblicher Betriebe<sup>2)</sup> größere Mengen von Pflanzennährstoffen in sich aufgenommen hat. Diese können im Wasser gelöst sein oder als Bestandteile ungelöster Schlamnteile vom *bewegten* Wasser schwebend erhalten werden („Schlick“, „Suspendierte“ oder „Sink“-stoffe).<sup>3)</sup> Letztere werden auf den bewässerten Böden zum größten Teil abgesetzt, die ersteren fließen, soweit sie nicht von den wachsenden

<sup>1)</sup> Nach Untersuchungen der *Landwirtschaftlichen Versuchs-Station zu Münster* (s. König, Literatur zum I. Abschn.) betrug z. B. die Durchschnittstemperatur bei 33 cm Tiefe:

	Vom 30. Nov. bis 10. Dezbr. 1880.	Vom 15. bis 17. März 1881.
Im berieselten Boden . .	4,8° C.	3,8° C.
Im nicht berieselten Boden	4,3° C.	3,5° C.

<sup>2)</sup> Nicht selten werden allerdings die natürlichen Wasserläufe auch mit schädlichen Abgängen aus technischen Betrieben derart angereichert, daß sie für landwirtschaftliche Nutzung ganz ungeeignet erscheinen, so namentlich mit freien Säuren, mit Salzen der schweren Metalle (Kupfer, Zink, Eisen u. a.), mit übergroßen Mengen von Natrium-, Magnesium-, Calcium-Chloriden und Sulfaten, die entweder als Pflanzengifte oder auch dadurch ungünstig wirken, daß sie unmittelbar oder durch Wechselzersetzung (§ 18, Anm. und § 46) wertvolle Bodenbestandteile in Lösung und damit leicht in Verlust bringen.

<sup>3)</sup> Nach Untersuchungen der Moor-Versuchs-Station (F. Seyfert: „Das Wasser im Flusgebiet der Weser“ — Bremen. M. Nöfeler, 1893) wurden in 1000 Liter Weserwasser im Durchschnitt der wärmeren Jahreszeit der Jahre 1888 bis 1890 bei einer Tiefe von 1½ m gefunden:

Pflanzen aufgenommen oder vom Boden absorbiert<sup>1)</sup> werden, mit dem ablaufenden Wasser wieder von dannen.

### § 87.

**Das Verhalten des Bodens gegen die Wärme.** Das Gedeihen der Pflanze ist an gewisse Wärmegrade gebunden, unterhalb und oberhalb deren ihre Lebenstätigkeit gefährdet wird und aufhört. Die ihr zur Verfügung stehende Wärmemenge richtet sich einerseits nach den klimatischen Verhältnissen, andererseits nach der Beschaffenheit des Bodens, den man als ein von den Sonnenstrahlen gespeistes Wärmereservoir<sup>2)</sup> ansehen kann. Je mehr Wärme dieses aufnimmt, je mehr es davon für die Pflanzen verfügbar hält, um so wohler werden sich die letzteren im allgemeinen befinden.

Etwa 20 km unterhalb der Stadt Bremen	Feste Stoffe g	Kali g	Kalk g	Magnesia g	Schwefel- säure g	Phosphor- säure g	Chlor g
Im Wasser gelöst	291,0	6,5	76,3	15,4	57,0	Spur	49,7
In Form von Schlick	14,5	0,4	0,7	0,8	0,2	0,3	0,3
Zusammen:	305,5	6,9	77,0	16,2	57,2	0,3	50,0

Etwa 60 km unterhalb der Stadt Bremen (Erheb- licher Einfluss des Seewassers!)							
Im Wasser gelöst	8561,3	143,6	176,0	413,1	454,5	Spur	4342,5
In Form von Schlick	258,6	5,5	12,8	6,9	2,2	1,3	7,3
Zusammen:	8819,9	149,1	188,8	420,0	456,7	1,3	4349,8.

<sup>1)</sup> Über Bodenabsorption s. u. Die Menge der absorbierten Stoffe richtet sich hauptsächlich nach der Beschaffenheit des Bodens. Besitzt dieser kein großes Absorptionsvermögen, so kann das Bewässerungswasser selbst reicher an gelösten Stoffen abfließen, als es aufgeflossen ist, sodass also die Bewässerung geradezu eine Verarmung des Bodens herbeiführt. Am ehesten kann man noch auf eine Absorption der allerdings meist nur in Spuren vorhandenen Phosphorsäure und des Kali rechnen.

<sup>2)</sup> Allerdings besitzt die Erde auch eine gewisse, nur zum Teil von den Sonnenstrahlen bedingte Eigenwärme, die sich in größeren Tiefen sehr bemerklich macht, aber den Pflanzen an der Oberfläche nur in Ausnahmefällen zu gute kommen dürfte. Ferner wird durch die unablässig im Boden sich vollziehenden chemischen Umsetzungen Wärme erzeugt, deren Mengen aber wahrscheinlich gleichfalls so unbedeutend sind, dass wir sie unberücksichtigt lassen können. Auch durch physikalische Vorgänge kann eine Erwärmung hervorgerufen werden. So entwickelt sich bei der Aufnahme von Wasser durch trockenen Boden infolge der Verdunstung des Wassers an der Oberfläche der Bodenbestandteile Wärme

*Absorption der Sonnenstrahlen.* Der Boden empfängt unter sonst gleichen Verhältnissen<sup>1)</sup> von der Sonne um so mehr Wärme, je günstiger seine Lage zu den auffallenden Sonnenstrahlen und je größer sein Absorptionsvermögen für die letzteren ist. Gegen *Süden* und *Osten* geneigte Flächen werden stärker von der Sonne bestrahlt, als *nördliche* und *westliche* Hänge, und müssen daher im allgemeinen wärmer sein als die letzteren. Die Strahlenmenge, die vom Boden aufgenommen und zu seiner Erwärmung verwendet wird, richtet sich nach der Beschaffenheit der Bodenoberfläche. Je *rauher* die Oberfläche, um so mehr Bodenteilchen können durch die Sonnenstrahlen Wärme empfangen, je *dunkler* ihre Farbe, um so mehr Strahlen werden von ihr absorbiert und in Wärme umgesetzt.<sup>2)</sup>

§ 88. Die von den Sonnenstrahlen der Erdoberfläche mitgeteilte Wärme pflanzt sich durch *Leitung* in die tieferen Bodenschichten fort, und zwar um so schneller, je größer das *Wärmeleitungsvermögen* des Bodens ist. Von den Bodenbestandteilen leitet die Bodenluft die Wärme bei weitem am schlechtesten (fast 30 mal schlechter als das Wasser). Das Leitungsvermögen der *festen* Bodenbestandteile scheint von dem des Wassers nicht sehr verschieden, aber etwas größer zu sein. Man wird daher im allgemeinen sagen können, daß sich die Wärme um so schneller fortpflanzen wird, je weniger luftfassende Hohlräume der Boden enthält, oder je mehr die vorhandenen Hohlräume mit Wasser erfüllt sind. Die Erwärmung des Bodens hängt aber nicht bloß von der durch die Sonnenstrahlen ihm zugeführten Wärmemenge und von deren Fortpflanzung, sondern in hohem Grade auch von der größeren oder geringeren Erwärmungsfähigkeit der Bodenbestandteile, von ihrer „spezifischen Wärme“ oder „Wärmekapazität“ ab.

(„Benetzungswärme“), deren Menge von der Art, Form und Größe der Bodenbestandteile abhängig ist. Dementsprechend scheint nach neuern Untersuchungen (A. Mitscherlich) die Benetzungswärme ein gewisses Maß für die den Fruchtbarkeitszustand eines Bodens bestimmenden Faktoren zu bieten. Sie dürfte jedoch an sich ohne Bedeutung für das Wachstum der Pflanzen sein.

<sup>1)</sup> Es wird hier von den Umständen abgesehen, die eine Verminderung der Bestrahlung herbeiführen, wie z. B. die Beschattung des Bodens, das Bedecken desselben mit schlechten Wärmeleitern, ein dichter Pflanzenbestand u. a. m.

<sup>2)</sup> Die von der Sonne ausgehenden Wärmestrahlen sind teils dunkel, teils hell. Die letzteren bezeichnet man auch als „Lichtstrahlen“. Von hellen Böden werden im wesentlichen nur die dunklen Wärmestrahlen aufgenommen, die hellen zurückgeworfen. (Nur deswegen erscheinen uns diese Böden hell.) Dunkle Böden nehmen nicht nur die dunklen, sondern auch die hellen Strahlen auf und verwerten beide Strahlengattungen zur Erwärmung ihrer Masse.

§ 89. *Die spezifische Wärme*<sup>1)</sup> der festen *mineralischen* Bodenbestandteile ist nach den vorliegenden Untersuchungen keine wesentlich verschiedene, dagegen weit größer als die des völlig trockenen Humus.<sup>2)</sup> Die Unterschiede kommen aber für die natürlichen Verhältnisse kaum in Betracht gegenüber der weit überwiegenden Wärmekapazität des flüssigen Bodenbestandteils, des *Bodenwassers*. Um Wasser um einen Grad zu erwärmen, bedarf es einer bis siebenmal größeren Wärmemenge, als zu gleicher Erwärmung des gleichen Volums von einem festen Bodenbestandteil erforderlich ist. Da nun gerade die Humusstoffe in hervorragendem Maße das Wasser aufzunehmen und festzuhalten vermögen, daher stets die wasserreichsten Bodenbestandteile sind, so kommt die geringe spezifische Wärme des *trockenen* Humus im Boden eigentlich nie zur Geltung, ja, man wird bei ihrer stetigen Vergesellschaftung mit großen Wassermengen geradezu sagen dürfen, daß unter natürlichen Verhältnissen die Humussubstanzen unter allen festen Bodenbestandteilen die höchste Wärmekapazität besitzen. Ganz allgemein aber gilt der Satz: Je nasser ein Boden ist, um so größerer Wärmezufuhr bedarf er zur Erhöhung seiner Temperatur, um so schwerer erwärmt er sich. Dazu kommt noch, daß bei nassen Böden die *Verdunstung* größer ist als bei trockneren, und stärkere Verdunstung stets mit einem größeren Wärmeverlust verbunden ist. Bei nassen Böden wird mithin ein größeres Quantum von Wärme zur Erhöhung der Bodentemperatur und zur Überführung von Wasser in Wasserdampf verbraucht, das für die Pflanzen verloren geht, und es erscheint der von der Praxis aufgestellte Satz: „*Nasse Böden sind kalle Böden*“ durchaus gerechtfertigt.

Wie aber bei Zufuhr gleicher Wärmemengen ein Raumteil Wasser nur etwa halb so stark erwärmt wird, als ein gleicher Raumteil fester Bodenbestandteile, so kühlt sich bei Entziehung gleicher Wärmemengen das Wasser auch nur halb so stark ab, als die trocknen Bodenbestandteile. Die Temperatur eines wasserreichen Bodens sinkt daher bei Abkühlung

---

<sup>1)</sup> *Spezifische Wärme* oder *Wärmekapazität* eines Körpers nennt man die Wärmemenge, die ihm zugeführt werden muß, um seine *Gewichts-* oder *Raumeinheit* (also 1 Gramm oder 1 Kubikcentimeter) um einen Grad des hundertteiligen Thermometers zu erwärmen. Beim Wasser ist es gleichgültig, ob man die spezifische Wärme auf Gewicht oder Raum bezieht, bei den übrigen Körpern liegen die einerseits auf Gewicht und andererseits auf Volum berechneten Zahlen um so weiter auseinander, je mehr ihr spezifisches Gewicht von dem des Wassers abweicht. Da für die Pflanzen das ihnen zur Verfügung stehende *Bodenvolum* wichtiger ist als das *Bodengewicht*, so ist es praktischer, die spezifische Wärme des Bodens und der Bodenbestandteile auf das Volum zu beziehen.

<sup>2)</sup> Die Wärmekapazität der „Heideerde“ (s. S. 101, Anm.) wurde z. B. (auf Volum bezogen) nur halb so groß als die von feinem Diluvialsand gefunden.



der Außenluft auch langsamer als die eines trocknen, und die *Temperaturschwankungen* sind mithin in dem ersteren geringer als in dem letzteren.<sup>1)</sup>

§ 90. *Wärmeausstrahlung.* Von der durch die Sonnenstrahlen dem Boden übermittelten Wärme geht durch Ausstrahlung in den Welt-raum ein Teil wieder verloren.<sup>2)</sup> Wie groß dieser ist, und inwieweit er durch die verschiedenen Bodenbestandteile, also durch die Beschaffenheit des Bodens beeinflusst wird, lässt sich aus den bisher ausgeführten Untersuchungen nicht mit Sicherheit erkennen. Nur scheint von vornherein festzustehen, daß der durch Strahlung herbeigeführte Verlust um so bedeutender sein wird, je größer die Bodenoberfläche, je rauher der Boden ist.

§ 91. *Beeinflussung der Bodenwärme durch menschliches Eingreifen.* Durch geeignete Erdarbeiten sucht man für besonders wertvolle Pflanzen (z. B. in Weinbergen) die *Neigung* der Bodenoberfläche für das Auffallen der Sonnenstrahlen günstiger zu gestalten. Das Aufbringen *dunkel gefärbter* mineralischer Bodenarten (z. B. dünner Lagen von Basaltschutt) begünstigt die Absorption der Wärmestrahlen. Die Bedeckung des Bodens mit lockeren *lufthaltigen* Materialien (Sägespänen, Gerberlohe, trockenen Torfstücken u. a.) in kalter Jahreszeit verringert die Wärmeleitung und damit die Wärmeabgabe an die Außenluft.<sup>3)</sup> Weit wichtiger als derartige, nur in kleinem Umfang ausführbare Operationen sind die Maßnahmen, die auf eine *günstigere Gestaltung der Wasserverhältnisse*, also auf die Verringerung der Wasserkapazität und der Verdunstungsgröße gerichtet sind. Dahin gehört in erster Linie eine genügende Wassersenkung und eine Verminderung der Bodenverdunstung, wie sie z. B. durch das Bedecken von Böden mit großem Kapillarvermögen

<sup>1)</sup> Der Gleichmäßigkeit des *Seeklimas* und den großen Temperaturschwankungen des *Kontinentalklimas* dürften dieselben Ursachen zugrunde liegen.

<sup>2)</sup> Auf die Wärmeausstrahlung des Bodens, die namentlich in klaren Nächten sehr groß sein kann und die den Boden und die mit ihm in unmittelbarer Berührung befindliche Luftschicht abkühlt, führt man die „Spät-“ oder „Nachtfröste“ zurück, die nicht selten in klaren Frühjahrs- und selbst in Sommernächten die Hoffnungen des Landwirts zu schanden machen. Trübe Atmosphäre vermindert die Wärmeausstrahlung und damit die Gefahr der Nachtfröste. (Entwicklung von Rauchwolken als Schutzmittel für die gefährdeten Flächen.) Auch Luftströmungen, die die unter 0° abgekühlte Luftschicht durch wärmere Luft ersetzen, wirken dem Erfrieren der Pflanzen entgegen. Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, daß die in Bodenvertiefungen oder im Schutz von höheren Gegenständen befindlichen Gewächse am stärksten gefährdet sind.

<sup>3)</sup> Aber auch die Fortpflanzung der von ihrer obersten Schicht absorbierten Sonnenwärme nach der Tiefe hin.

(Moorboden, Tonboden) mit grobkörnigem Sande und die übrigen in § 85 besprochenen Mafsregeln erzielt wird.

### § 92.

**Die Durchlüftbarkeit („Permeabilität“) des Bodens.** Alle nicht von Wasser eingenommenen Hohlräume des Bodens sind mit Luft erfüllt. Aus den früheren Erörterungen über die Bedeutung der Bodenluft und ihrer Zusammensetzung für die Kulturpflanzen geht hervor, dafs das Gedeihen der letzteren an einen häufigen Wechsel der Bodenluft, namentlich an den Ersatz ihres zu Oxydationsprozessen im Boden und zur Wurzelatmung der Pflanzen verbrauchten Sauerstoffs durch atmosphärischen Sauerstoff gebunden ist. Der Luftaustausch zwischen Boden und Atmosphäre wird im wesentlichen durch drei Faktoren vermittelt: durch *Temperaturunterschiede* der Bodenschichten und der Luft, durch die *Diffusion* der Gase und durch verdunstendes und *fließendes Wasser*. In der kälteren Jahreszeit steigt die wärmere Bodenluft nach oben und wird durch die kältere und daher schwerere atmosphärische Luft ersetzt. Die *Diffusion*, d. i. das allen gasförmigen Körpern eigene Bestreben, sich gegenseitig zu durchdringen und, unabhängig von ihrer spezifischen Schwere, sich gleichmäfsig miteinander zu vermischen, kommt in allen Jahreszeiten zur Geltung, sobald nur die Bodenbeschaffenheit den Ein- und Austritt von Luft gestattet. Sie vollzieht sich um so leichter, je gröfser und zahlreicher die Hohlräume im Boden sind. Sehr dicht gelagerte Bodenschichten, sowie die Erfüllung der Hohlräume mit Wasser können sie völlig verhindern. Nach dem Diffusionsgesetz diffundiert ein Gas um so schneller, je geringer sein spezifisches Gewicht ist. Das bei der Oxydation der humosen Bodenbestandteile sich bildende Kohlendioxyd ( $\text{CO}_2$ ) ist von allen hier in Frage kommenden Luftarten die schwerste; es vermischt sich am langsamsten mit den übrigen Luftbestandteilen, und es ist daher die Bodenluft stets reicher daran als die atmosphärische Luft. Endlich wird der Luftwechsel im Boden durch Verdunstung des Bodenwassers und durch Eindringen von atmosphärischem Wasser in den Boden gefördert. Durch die Bodenverdunstung wird ein grofser Teil der Bodenhohlräume dem Eindringen der atmosphärischen Luft geöffnet. Das auf den Boden fallende und einsickernde Regenwasser bereichert durch den eigenen Gehalt an Luftsauerstoff, namentlich aber dadurch den Boden, dafs es beim Einsickern eine saugende Wirkung auf die atmosphärischen Gase ausübt.

**§ 93. Einfluss menschlichen Eingreifens auf die Durchlüftung des Bodens.** Es liegt auf der Hand, dafs alle auf die Herstellung des Krümelzustandes und auf sonstige Lockerung des Bodens gerichteten Mafsnahmen, wie Pflügen, Hacken, das Einbringen von auflockernden

**Materialien** (von frischem strohigen Stalldünger, groben Torfstücken u. dergl.), ferner das Durchbrechen sehr dichtgelagerter Bodenschichten (z. B. des Tones, des Ortsteins, des Raseneisensteins), endlich eine tiefere Wassersenkung, das Eindringen der atmosphärischen Luft erleichtern müssen. In ähnlicher Weise, wie es durch den Regen geschieht, sucht man auch durch die seitliche Zufuhr von Wasser über die Bodenoberfläche („Berieselung“) den Boden mit Luftsauerstoff zu versorgen. Je mehr Luftsauerstoff das Rieselwasser vorher aufnehmen konnte, um so wohltätiger wird nach dieser Richtung hin seine Wirkung sein (§ 86).

#### B. Der Boden als Nährstoffbehälter für die Pflanzen.

### § 94.

**Allgemeines.** Die höhere Pflanze bedarf zum Aufbau ihres Leibes und zur Erfüllung ihrer sonstigen Lebensfunktionen einer Reihe von Stoffen, die sie zum Teil aus der Luft durch ihre oberirdischen Organe, zum Teil vermöge ihrer Wurzeln aus dem Boden aufzunehmen angewiesen ist. Die ersteren, die „Blattnährstoffe“, sind *Kohlendioxyd* (vulgo „Kohlensäure“) und *Sauerstoff*, die in unerschöpflichen Mengen die atmosphärische Luft bietet; die anderen, die „Wurzelnährstoffe“, sind neben *Wasser* und ungebundenem *Sauerstoff*: *Stickstoff*, *Kalium*, *Calcium*, *Magnesium*, *Eisen*, *Schwefel* und *Phosphor*. Alle diese Stoffe sind für die Ernährung der höheren Pflanzen unentbehrlich; ob sich ein Gleiches von anderen Bodenbestandteilen, z. B. vom Natrium, Aluminium, Chlor, Silicium, behaupten läßt, erscheint mindestens fraglich, nachdem Untersuchungen ergeben haben, daß sehr viele Pflanzen auch ohne Anwesenheit jener Stoffe sich normal entwickeln können. Während der in der Bodenluft vorhandene Sauerstoff im freien Zustande von der Pflanze aufgenommen und für ihre Lebenstätigkeit nutzbar gemacht wird, können die übrigen namhaft gemachten Elemente ausschließlich in Form von Verbindungen den höheren Pflanzen als Nahrung dienen. Nur der *Stickstoff* macht scheinbar eine Ausnahme insofern, als die zur Familie der Leguminosen gehörigen Pflanzen imstande sind, stickstoffhaltige Pflanzenstoffe zu bilden, selbst wenn ihnen der Stickstoff nur in unverbundener Form zu Gebote steht. Sie verdanken diese Fähigkeit der Vergesellschaftung mit einem pflanzlichen Organismus niederster Art (§ 50), der den freien Stickstoff der Luft in Verbindungen überführen und mit diesen die mit ihm zusammenlebenden Pflanzen versorgen kann. Zur Ernährung der höheren Pflanzen sind Kalium, Calcium, Magnesium, Schwefel und Phosphor in Form von *Karbonaten*, *Silikaten*, *Phosphaten*, *Nitrat*en, *Sulfaten*, *Chloriden* geeignet, *Humate* werden wahrscheinlich vor der Aufnahme in Karbonate umgewandelt; zur Ver-

sorgung mit *Stickstoff* dienen *Salpetersäure* und *Ammoniumsalze*<sup>1)</sup> und solche Stoffe, die bei ihrer Zersetzung im Boden jene Verbindungen liefern (humose Substanzen, Stalldung, Knochenmehl u. a.). Manche der genannten notwendigen Pflanzennährstoffe sind in vielen Böden in so geringer Menge enthalten, daß zur Erzeugung befriedigender Ernten ihre Zufuhr von außen her (z. B. durch die Düngung) erfolgen muß. Wir werden daher im folgenden nicht nur den natürlichen *Gehalt* des Bodens an wichtigen Stoffen, sondern auch sein *Verhalten* gegen die zur Vervollständigung seines Nährstoffvorrates künstlich zugeführten Substanzen zu betrachten haben.

### § 95.

**Die chemische Zusammensetzung des Bodens.** Der Boden setzt sich aus den Bestandteilen der an seiner Bildung beteiligten Gesteine, soweit sie nicht durch Wasser oder Wind fortgeführt wurden, den von außen her aus der Atmosphäre und durch die Düngung in ihn gelangten *festen* Stoffen, den Resten des tierischen und pflanzlichen Lebens, das sich in ihm abgespielt hat, dem *Bodenwasser* mit den darin gelösten festen und luftförmigen Stoffen und der *Bodenluft* zusammen; er besteht mithin aus einem Gemenge von *festen*, und zwar von *unorganischen* (mineralischen) und *organischen Stoffen*, *Wasser* und *Luftarten*.

§ 96. Die *Bodenluft* entstammt ihrer Hauptmasse nach der Atmosphäre, besitzt aber nicht dieselbe Zusammensetzung wie die atmosphärische Luft, weil ihr Sauerstoffgehalt in hohem Grade durch die im Boden sich vollziehenden Oxydationsprozesse in Anspruch genommen und namentlich zur Überführung des Kohlenstoffs und Wasserstoffs der organischen Substanzen in Kohlendioxyd und Wasser verbraucht wird. Während in der atmosphärischen Luft das Raumverhältnis von Stickstoff zu Sauerstoff sehr konstant, gleich 100:26,4 ist, wurde es in gut durchlüftetem Gartenboden z. B. gleich 100:17,2 gefunden, und in schlecht durchlüfteten Böden kann der Sauerstoffgehalt noch weit mehr sinken, ja unter Umständen ganz zum Verschwinden kommen. Dementsprechend erscheint der Gehalt der Bodenluft an Kohlendioxyd stark vermehrt. Während er in der freien atmosphärischen Luft nur 0,029—0,030 Volumprocente beträgt, fand man z. B. in der Bodenluft eines lange vorher gedüngten Sandbodens 2,17, in der eines frisch gedüngten Sandbodens sogar 9,74 Volumprozent Kohlendioxyd. Der Kohlendioxydgehalt der Bodenluft pflegt in umgekehrtem Verhältnis zu ihrem Sauerstoffgehalt zu stehen und ist abhängig von der im Boden enthaltenen Menge an organischen, leicht verweslichen Stoffen, von der Durchlüftung, die auf den Ausgleich der Boden- und der atmo-

<sup>1)</sup> Ob die Ammoniumverbindungen unmittelbar von den Pflanzen als Nährstoff verwendet werden, ist eine noch offene Frage. Wahrscheinlich geht eine Umwandlung in Salpetersäuresalze vorher.

sphärischen Luft hinwirkt, und von der Temperatur, deren Steigen die Oxydationsprozesse beschleunigt. Im allgemeinen ist die Luft der *tieferen* Bodenschichten reicher an Kohlendioxyd, weil diese durch ihren größeren Wassergehalt und ihre größere Entfernung von der Bodenoberfläche den Austausch mit der atmosphärischen Luft erschweren. Ein mit Pflanzen bestandener Boden enthält gewöhnlich eine an Kohlendioxyd ärmere Bodenluft als ein nackter, weil dieser sich unter dem Einfluß der Sonnenbestrahlung schneller erwärmt.

§ 97. Die festen Bodenbestandteile umfassen die oben genannten, für den Pflanzenwuchs unentbehrlichen, und andere Stoffe, die zwar für die Pflanzenernährung nicht notwendig zu sein scheinen, aber gewisse wichtige Bodeneigenschaften beeinflussen. Daß die festen Bodenbestandteile in den verschiedenen Böden in äußerst wechselnden Verhältnissen vertreten sind, kann bei der Verschiedenartigkeit der Muttergesteine und der Mannigfaltigkeit der Bodenentstehungsbedingungen nicht wundernehmen. Die folgende Übersicht, die das Ergebnis einer Reihe von Bodenanalysen wiedergibt, läßt die großen Unterschiede in der Zusammensetzung verschiedener Bodenarten deutlich erkennen.

Tabelle I.

In 100 Teilen trockenen Bodens wurden gefunden:

	Mineralböden:				Humusböden: humos. Tonböden <sup>5)</sup>	Moorböden:		
	Sandböden <sup>1)</sup>	Lehm Böden <sup>2)</sup>	Tonböden <sup>3)</sup>	Kalkböden <sup>4)</sup>		Hochmoorböden <sup>6)</sup>	Niederungsmoorböden <sup>6)</sup>	Übergangsmoorböden <sup>6)</sup>
Organische Stoffe . . .	0,47	4,63 <sup>7)</sup>	8,54	12,06	21,40	93,29	84,18	89,09
Stickstoff . . . . .	—	?	0,26	0,25	0,78	1,30	3,35	2,00
Mineralstoffe . . . .	99,53	95,37	91,46	87,94	78,60	6,71	15,82	10,91
Kali (K <sub>2</sub> O) . . . . .	0,97	1,06	2,60	0,85	1,96	0,05	0,06	0,06
Natron (Na <sub>2</sub> O) . . . .	0,47	0,37	1,17	0,22	1,16	0,05	0,04	0,08
Kalk (CaO) . . . . .	0,19	2,86	5,97	29,96	1,94	0,23	4,06	1,17
Magnesia (MgO) . . . .	0,05	0,88	2,22	0,48	1,71	0,23	0,25	0,19
Eisenoxyd (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) . .	0,20	5,20	4,60	1,16	4,11	} 0,60	4,68	2,45
Tonerde (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) . . .	3,10	7,04	15,12	6,82	15,20			
Kieselerde (SiO <sub>2</sub> ) . .	94,72	76,14	54,53	25,44	52,23	5,24	5,63	6,01
Schwefelsäure (SO <sub>3</sub> ) .	Spur	0,01	0,17	0,10	0,01	0,20	0,87	0,33
Phosphorsäure (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) .	0,05	0,18	0,20	0,22	0,20	0,08	0,29	0,20
Kohlendioxyd (CO <sub>2</sub> ) . .	0	1,63	4,63	23,54	0,03	0	0	0
Chlor (Cl) . . . . .	?	?	0,11	—	Spur	Spur	Spur	Spur

<sup>1)</sup> Diluvialsandböden (E. Ramann). — <sup>2)</sup> Diluviallehm Böden (E. Ramann).

— <sup>3)</sup> Wesermarschböden (Moor-Versuchs-Station). — <sup>4)</sup> Weißer-Jura-Kalkböden (E. v. Wolff). — <sup>5)</sup> Russische Schwarzerde (Tschernosem, C. Schmidt). —

<sup>6)</sup> Moor-Versuchs-Station. — <sup>7)</sup> Darunter etwas chemisch gebundenes Wasser.

§ 98. Die vorstehenden Zahlen spiegeln zwar die verschiedenartige Zusammensetzung der festen Masse verschiedenartiger Böden wieder, geben aber kein richtiges Bild von den Stoffmengen, die in einem *bestimmten Bodenvolum* der fraglichen Böden den Pflanzen geboten werden. Um hierüber Kunde zu erlangen, muß man das *Volumgewicht* der verschiedenen Böden kennen, d. h. wissen, wieviel Trockenmasse unter gewöhnlichen Verhältnissen in einem gewissen Raumteil Boden durchschnittlich enthalten ist.<sup>1)</sup> Bei einem dem Pflanzenwuchs zusagenden Feuchtigkeitsgehalt enthält 1 cbm an festen Stoffen:

	Sand- boden	Lehm- boden	Ton- boden	Kalk- boden	Humoser Tonboden	Hochmoor- boden	Niederungs- moorboden	Übergangs- moorboden
ca.	1500	1200	1000	800	600	120	250	175 kg
Wasser- gehalt:	10 %	20 %	35 %	20 %	40 %	70 %	65 %	68 % .

Aus diesen Daten und den Zahlen der vorstehenden Tabelle berechnet sich der „absolute“ Gehalt der verschiedenen Böden an wichtigeren Stoffen wie folgt:

Tabelle II.

1 cbm Boden enthält bei seinem durchschnittlichen Feuchtigkeitsgehalt:

	Mineralische Böden:				Humus- boden: humusreicher Tonboden	Moorböden:		
	Sand- boden	Lehm- boden	Ton- boden	Kalk- boden		Hoch- moorboden	Niederungs- moorboden	Übergangs- moorboden
	kg	kg	kg	kg		kg	kg	kg
Organische Stoffe	7	56	85	96	128	112	210	156
Stickstoff . . .	?	?	2,6	2,0	4,7	1,6	8,4	3,5
Mineralstoffe . .	1493	1144	915	704	472	8	40	19,0
Kali . . . . .	14,6	12,7	26,0	6,8	11,8	0,06	0,15	0,1
Kalk . . . . .	2,9	34,3	59,7	239,7	11,6	0,2	10,2	2,1
Phosphorsäure .	0,8	2,2	2,0	1,8	1,2	0,1	0,7	0,3

<sup>1)</sup> Unter „Volumgewicht des Bodens“ versteht man gewöhnlich das Gewicht eines Raumteils des *völlig trocknen* oder auch des *lufttrocknen* Bodens im Verhältnis zu dem Gewicht eines gleichen Raumteils reinen Wassers (von 4° C.). Da hierbei auch die Kontraktion, die manche Böden beim Austrocknen erleiden (§ 79), unberücksichtigt bleibt, ein Rückschluss aus dem Ergebnis der Ermittlung auf die unter natürlichen Verhältnissen, im feuchten Boden, vorhandene Trockenmasse also nicht möglich ist, so erscheint es zweckmäßiger, unter Volumgewicht das Gewicht der festen Stoffe zu verstehen, die ein gewisses Bodenvolum bei einem den natürlichen Verhältnissen entsprechenden durchschnittlichen Wassergehalt enthält.

§ 99. Die Zahlen der vorstehenden Tabelle berechtigen zu den folgenden, für alle Böden gültigen Schlussfolgerungen: Unter den festen Bodenbestandteilen überwiegt zwar bei den eigentlichen Moorböden die Menge der *organischen Stoffe* weit den Humusgehalt der *mineralischen* Böden (Tab. I), indessen bringt es das geringe Volumgewicht der ersteren mit sich, daß die in einem bestimmten Bodenraum enthaltenen Mengen an organischen Stoffen bei manchen Mineralböden hinter dem Gehalt mancher Moorböden (Hochmoorboden) kaum zurückstehen, ja in humusreichem Mineralboden den letzteren übertreffen können (Tab. II). Der *absolute* Gehalt an *Stickstoff*, der bei allen Böden fast ausschließlich als ein Teil der humosen Stoffe anzusehen ist, kann im Hochmoorboden sogar weit geringer sein als in den humoseren mineralischen Bodenarten.<sup>1)</sup>

Wie Tabelle I erkennen läßt, herrschen bei allen Böden ohne Ausnahme unter den mineralischen Stoffen *Silicium-* und *Aluminium-*Verbindungen, bei einigen auch Verbindungen von *Eisen* und *Calcium* vor, während der Gehalt an *Kalium-*, *Magnesium-*, *Schwefelsäure-* und *Phosphorsäuresalzen* weit geringer ist. Hinsichtlich des prozentischen, wie des absoluten Gehaltes an notwendigen Pflanzennährstoffen zeigen die verschiedenen Bodenarten die auffälligsten Unterschiede. (Man vergleiche den *Kaligehalt* der Moorböden mit dem der mineralischen, den *Kalkgehalt* des Sandbodens mit dem des Kalkbodens, den *Phosphorsäuregehalt* des Hochmoorbodens mit dem Gehalt des Niederungsmoores und der reicheren Mineralböden u. s. w.)

### § 100.

**Beurteilung der Bodenfruchtbarkeit nach der chemischen Zusammensetzung.** Die durch die Gesamtanalyse eines Bodens ermittelten Zahlen, wie sie die vorstehenden Tabellen enthalten, geben wohl Aufschluß über seinen Gehalt an den für die Ernährung der Kulturpflanzen nötigen Stoffen, nicht aber darüber, ob deren Menge ausreicht, um das Bedürfnis einer reichen Ernte zu decken. Zwar läßt sich unschwer feststellen, wieviel Stickstoff, Kali, Phosphor, Kalk u. s. w. die verschiedenen Pflanzen aufnehmen müssen, um zu reichlicher Produktion befähigt zu werden, aber es entzieht sich in den meisten Fällen unserer Kenntnis, wie weit sie imstande sind, die im Boden vorhandenen Nährstoffmengen zu ihren Zwecken nutzbar zu machen, denn die Stoffaufnahme durch die

<sup>1)</sup> Diese bei oberflächlicher Beurteilung des Bodengehalts auf Grund der chemischen Analyse allermeist übersehene Tatsache klärt es auf, warum die meisten Hochmoorböden trotz des hohen prozentischen Stickstoffgehalts ihrer festen Masse zur Hervorbringung einer befriedigenden Ernte der Stickstoffzufuhr im Dünger bedürfen, die bei den Niederungsmoores für gewöhnlich nicht nötig ist.

Pflanzen hängt nicht bloß von den vorhandenen *Stoffmengen*, sondern auch von dem *Löslichkeitszustande* der vorhandenen Stoffe ab. Die Pflanzenwurzel ist ohne Zweifel befähigt, mit Hilfe der in ihr enthaltenen lösenden Agentien (Säuren) selbst schwer lösliche Bestandteile der in unmittelbare Berührung mit ihr gelangenden Bodenpartikel sich anzueignen, aber die hierbei stattfindende Nährstoffaufnahme ist in den meisten Fällen nur eine beschränkte, weil die Wurzel auf dem Wege durch das Stoffgemenge, das wir „Boden“ nennen, immer nur auf eine beschränkte Anzahl von festen, zu ihrer Ernährung geeigneten Substanzen stößt. Die Ernährung kann daher allermeist nur dann eine vollständige sein, wenn auch der bewegliche, überall mit der Wurzel in Berührung kommende Bodenbestandteil, nämlich das Bodenwasser, die zur Speisung der Pflanzen nötigen Stoffe aufgelöst enthält.

Um über die Nährstoffmengen, die in den verschiedenen Böden den Pflanzen wirklich zur Verfügung stehen, den Aufschluß zu erhalten, den die Gesamtanalyse des Bodens nicht gibt, ist man seit langer Zeit bemüht gewesen, Lösungsmittel ausfindig zu machen, die etwa dasselbe leisten, wie die Pflanze selbst, also aus dem Boden die Nährstoffmengen in Lösung bringen, die für die Pflanzenwurzel unter günstigen Verhältnissen aufnehmbar sind. Derartige Versuche stoßen natürlich auf große Schwierigkeiten. Einmal sind die Mengen von Pflanzennährstoffen, die die verschiedenen Pflanzen in sich aufnehmen, sehr verschieden, sie hängen zum Teil von der Tiefe und Stärke ihrer Bewurzelung, zum Teil aber auch von dem jeder Pflanzengattung eigentümlichen, bei den verschiedenen Pflanzen verschieden großen Lösungs- und Aneignungsvermögen ab. Ferner erstreckt sich die natürliche Nährstoffaufnahme durch die Pflanzen über einen langen Zeitraum, innerhalb dessen die mannigfaltigsten, in ihrem Verlauf wiederum von den verschiedenartigsten Verhältnissen (Temperatur, Bodenfeuchtigkeit, mechanischer Zusammensetzung des Bodens u. a. m.) abhängigen, die Löslichkeit der Bodenbestandteile beeinflussenden Vorgänge im Boden sich vollziehen, während die chemische Analyse immer nur die im *Augenblick der Untersuchung* in irgend einem Lösungsmittel löslichen Stoffmengen nachweist u. a. m. Dennoch lassen Untersuchungen der neueren Zeit der Hoffnung Raum, daß es auf diesem Wege gelingen wird, wenigstens für gleichartige Böden hinsichtlich ihres Gehalts an leichter zugänglichen Nährstoffen wertvolle Aufschlüsse zu gewinnen. Auch die Gesamtanalyse in Verbindung mit der Feststellung des Gehalts an feinsten Teilchen und der mineralogischen Beschaffenheit der gröberen Gesteinstrümmer (gröberer Quarz, Kalk, Phosphate, schwerer oder leichter verwitternde Silikate u. a. m.) bietet nach mehr als einer Richtung schätzbare Anhaltspunkte für die Beurteilung des augenblicklichen und des dauernden Fruchtbarkeitszustandes mancher Bodenarten. Sie belehrt darüber, ob man von einem



Boden eine gewisse *Nachhaltigkeit* erwarten darf oder auf baldige *Er-schöpfung* rechnen muß. Sie läßt ferner mit größter Sicherheit erkennen, ob gewisse, für die Pflanzen notwendige Stoffe in so geringer Menge vorhanden sind, daß sie, selbst wenn völlig aufnehmbar, für die Erzielung größerer Ernten nicht ausreichen. So ist leicht zu berechnen, daß der *Kali-* und allermeist auch der *Phosphorsäuregehalt* der *Moorböden*, bis- weilen auch der *Sandböden*, nicht ausreichen würde, um normale Ernten weniger Jahre zu versorgen. Auch der durch die Analyse ermittelte *Kalk-* und *Stickstoffgehalt* der Sand- und *Moorböden* läßt in den aller- meisten Fällen einen zuverlässigen Schluß zu, ob ihnen in der Düngung diese Stoffe zugeführt werden müssen oder nicht. Weit schwieriger liegen die Verhältnisse bei den *Ton-* und *Lehmböden*.

Nach den vorstehenden Erörterungen erscheint in den meisten Böden ein reiches Gedeihen der Pflanzen nur dann gesichert, wenn diese die notwendigen Nährstoffe nicht bloß in Form der festen Bodenbestandteile, sondern auch im Bodenwasser gelöst vorfinden. Der Gehalt der Boden- flüssigkeit an Pflanzennährstoffen steht aber in innigster Beziehung zu einer allen Böden in größerem oder geringerem Maße eigentümlichen Fähigkeit, gewisse im Bodenwasser gelöste Stoffe aus ihrer Lösung aus- zuscheiden und bis zu einem gewissen Grade festzulegen. Diese Fähigkeit nennt man das *Absorptionsvermögen* des Bodens.

### § 101.

**Die Bodenabsorption.** Läßt man durch einen Boden eine Lösung von Kaliumchlorid hindurchsickern, so wird ein Teil des Kaliums von ihm festgehalten, das ablaufende Wasser enthält den anderen Teil des zu- geführten Kaliums, während das Chlor in ganzer Menge wieder erscheint, nun aber zu einem dem Kaliumdefizit entsprechenden Teil an ein anderes, aus dem Boden aufgenommenes Metall, z. B. an Natrium oder Calcium, gebunden ist. Diese Erscheinung bezeichnet man als *Bodenabsorption*. Das Absorptionsvermögen des Bodens macht sich, wie schon das obige Beispiel erkennen läßt, für verschiedene Stoffe in sehr verschiedenem Maße bemerklich. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß von den in Frage kommenden Stoffen *Phosphorsäure*, *Kalium* und *Ammonium* am stärksten, in geringerem Grade *Natrium*, noch schwächer *Calcium* und *Magnesium*, und gar nicht oder fast nicht *Chlor*, *Schwefelsäure* und *Salpetersäure* absorbiert werden. Am leichtesten verständlich ist die Absorption solcher Stoffe, die mit Bodenbestandteilen unlösliche oder schwerlösliche Verbindungen eingehen. Lösliche *Phosphorsäuresalze* finden im Boden Calcium- oder Eisenverbindungen, mit denen sie sich zu schwerlöslichem Calciumphosphat oder Eisenphosphat umsetzen, das dann als fester Bodenbestandteil zurückbleibt. In ähnlicher Weise kann die

Anwesenheit freier Humussäure, freier Kieselsäure (deren Vorkommen allerdings problematisch ist, § 12) auf die Abscheidung von gelöstem *Kalium, Calcium, Magnesium* u. a. in Form der schwer löslichen Humate und Silikate hinwirken. Der grössere Teil der Absorptionserscheinungen ist aber zweifellos auf Wechselzersetzen der im Boden vorkommenden Doppelsilikate mit den im Bodenwasser gelösten Salzen, also auf Wirkungen zurückzuführen, die wir früher als „komplizierte Verwitterung“ bezeichnet und eingehender erörtert haben (§§ 45, 46).

Namentlich sind es die in der *Feinerde* der Böden enthaltenen *wasserhaltigen*, leicht zersetzlichen *Doppelsilikate* und unter diesen besonders die Zeolithe,<sup>1)</sup> die mit den im Bodenwasser gelösten Verbindungen in Wechselwirkung treten, z. B. in der Weise, daß ein wasserhaltiges Natrium-Aluminiumsilikat in Berührung mit gelöstem Kaliumsulfat gegen einen Teil seines Natriums Kalium eintauscht (also Kalium „absorbiert“), während das ausgetretene Natrium mit der freigewordenen Schwefelsäure Natriumsulfat bildet und der Auswaschung durch das Bodenwasser verfällt. Das *Mafs* derartiger Umsetzungen und *die Art der Endprodukte* hängt, wie früher eingehend besprochen wurde, von der chemischen Affinität (Verwandschaft) und der Menge der in Wirkung tretenden Stoffe, so namentlich auch des Wassers ab. Sind die auf die festen Bodenbestandteile, z. B. auf den Zeolith einwirkenden Salze in *grofsen* Wassermengen gelöst, so wirkt auch immer nur eine geringe Menge von Salzpartikeln auf die festen Partikel des Zeoliths ein, die Umsetzung vollzieht sich langsam, es kann ein grofses Teil der absorptionsfähigen Stoffe durch das Bodenwasser aus dem Bereich des chemischen Vorganges entfernt, ja, wenn sich die Wassermenge noch vermehrt, der bereits absorbierte Stoff mit den absorbierenden Bodenbestandteilen wieder in Lösung gebracht und ausgewaschen werden. Umgekehrt wird, falls die absorptionsfähigen Salze in *kleinen* Wassermengen gelöst sind, der Angriff auf die festen Bodenbestandteile ein energischerer sein und die Absorption schnell erfolgen.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> In der Bodenkunde rechnet man gewöhnlich zu den „Zeolithen“ alle jene Doppelsilikate, denen eine besonders grofse Umsetzungsfähigkeit mit Salzen eigen ist (z. B. auch den Leucit). Daß diese Mineralien in erster Linie die Absorptionserscheinungen hervorrufen, geht namentlich daraus hervor, daß die Böden mit hervorragendem Absorptionsvermögen besonders reich an Zeolithen sind, und daß die Absorptionskraft durch die Zerstörung der letzteren, durch Einwirkung von starken Säuren (§ 16) oder durch Glühen vernichtet, durch Zusatz gewisser Silikate erhöht werden kann.

<sup>2)</sup> Mit diesen Erwägungen steht eine grofse Reihe von leicht zu beobachtenden Tatsachen in vollem Einklang. Die Menge der absorbierten Stoffe schwankt je nach den *Mengen*, in denen diese dem Boden zugeführt werden,

Die meisten Absorptionerscheinungen lassen sich ungezwungen auf chemische Vorgänge zurückführen, einige von ihnen scheinen aber durch die *mechanische* Beschaffenheit gewisser Bodenbestandteile beeinflusst zu werden. Wenn z. B. Ammoniak und Ammoniumkarbonat von Böden, die reich an sauren Humusstoffen sind, Zeolithe aber nicht enthalten, in besonders großer Menge festgehalten wird, so kann das nicht auf die Bildung schwerlöslicher Verbindungen zurückgeführt werden, da das Ammoniumhumat in Wasser leicht löslich ist, es lässt sich vielmehr nur durch eine *physikalische Anziehung* des Humus zum Ammoniak, also durch eine Wirkung erklären, wie sie z. B. die Holzkohle auf Gase oder auf Farbstoffe, der Ton auf Fettstoffe u. s. w. ausübt.<sup>1)</sup>

§ 102. *Bedeutung der Absorptionsvorgänge.* Das Absorptionsvermögen für gewisse wichtige Pflanzennährstoffe ist für den Haushalt des Bodens und in erster Linie für seine Aufgabe, den Pflanzen als Nährstoffbehälter zu dienen, von größter Bedeutung. Die Absorptionsvorgänge verhüten es, daß jene Nährstoffe, soweit sie von Natur im Boden enthalten sind und durch den unablässig fortschreitenden Verwitterungsprozeß löslich werden, und soweit sie durch den Dünger in die Acker- und Wiesenerde gelangen, dem auswaschenden Einfluß der atmosphärischen Niederschläge verfallen. Ferner stehen sie einer erheblichen *Konzentrierung der Bodenflüssigkeit* entgegen. Es ist festgestellt, daß Nährstofflösungen, die in 1000 Teilen mehr als wenige Teile gelöster Salze enthalten, auf das Gedeihen der Pflanzen unheilvoll wirken. Je mehr aber infolge der Verdunstung der prozentische Gehalt des Bodenwassers an gelösten Nährstoffen steigt, um so energischer wird die Absorption (s. o.), um so mehr wird durch die Bodenbestandteile festgelegt, also der Lösung entzogen. Aus der Bodenlösung nehmen die Pflanzen den größeren Teil ihrer Nahrung auf. Dadurch wird sie fortwährend verdünnt und somit fähig gemacht, die vorher absorbierten Stoffe wieder aufzulösen. Das Absorptionsvermögen übt mithin auf die *Verhinderung von Nährstoffverlusten* und auf die *gleichmäßige Ernährung* der Pflanzen den heilsamsten Einfluß aus.

und nach ihrer *Verbindungsform*. — Aus *konzentrierteren* Lösungen werden größere Mengen absorptionsfähiger Stoffe durch den Boden zurückgehalten als aus *verdünnteren*. — Starke Regengüsse oder seitlich in den Boden eindringende Wassermassen können dem Boden große Mengen von bereits absorbierten Stoffen *entziehen*. — Bei Bewässerungsanlagen werden durch das Rieselwasser nicht selten größere Nährstoffmengen aus dem Boden ausgelaugt als zugeführt, wenn dasselbe an Nährstoffen selbst sehr arm ist (§ 86) u. a. m.

<sup>1)</sup> Ostwald bezeichnet neuerdings die auf Flächenanziehung (Oberflächenenergie), also auf einem physikalischen Vorgang beruhende Absorption als „Adsorption“.

Auf der andern Seite kann sie einer *schnellen und reichen Versorgung* der Vegetation mit Nährstoffen im Wege stehen, weil die Wiederauflösung, namentlich der fester gebundenen Stoffe, eine gewisse Zeit erfordert und daher nicht immer in ausreichendem Maße gerade dann erfolgt, wenn die Pflanze nach besonders reicher Nahrung verlangt. Es ist daher von Wichtigkeit, daß gleiche Wechselwirkungen, wie sie die Absorption der Nährstoffe hervorrufen, die absorbierten Stoffe auch wieder in Lösung bringen können. Treten mit Zeolithen, die Kalium absorbiert hatten, *größere* Mengen von Natrium-, Calcium-, Magnesium-Verbindungen (Karbonate, Sulfate, Nitrate, Chloride) in Wechselwirkung, so erfolgt nach den früher erörterten Gesetzen wieder ein Austausch der Metalle in der Weise, daß ein Teil des Kaliums wieder in Lösung übergeführt und durch ein in überwiegender Menge vorhandenes Metall ersetzt wird.

Einer der wichtigsten Pflanzennährstoffe, die *Salpetersäure*, unterliegt nicht der Bodenabsorption. Daher kommt es, daß einerseits die Zufuhr von leichtlöslichen Nitraten zu stickstoffbedürftigen Pflanzen eine auffällig schnelle Wirkung ausübt, und daß andererseits die von den Pflanzen nicht aufgenommene Salpetersäure sehr bald dem auswaschenden Einfluß des Bodenwassers verfallen kann.

Das größte Absorptionsvermögen für Kalium- und Ammoniumverbindungen zeigen im allgemeinen die an leichtzersetzlichen Doppelsilikaten besonders reichen Bodenarten, und dahin gehören in erster Linie die *Ton- und Lehm Böden*, in zweiter erst die Kalkböden, weil hier die vorwiegenden Calciumverbindungen einer Wiederauflösung des festgelegten Kaliums und Ammoniums, sowie einer Überführung der Ammoniumsalze in nicht absorbierbare Salpetersäureverbindungen günstig sind. Die Phosphorsäure wird in allen drei Bodenarten etwa gleich stark absorbiert.

Durch ein besonders geringes Absorptionsvermögen zeichnen sich die Sand- und die Moorböden, und unter den letzteren namentlich die Hochmoorböden aus.

**§ 103. Beeinflussung der Bodenabsorption durch menschliches Eingreifen.** Während es bei den stark absorbierenden Böden (s. o.) im Interesse einer schnellen und ausgiebigen Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen eher darauf ankommen wird, das Absorptionsvermögen zu mäßigen, empfiehlt es sich bei den Sand- und Moorböden, zur Verhütung großer Nährstoffverluste, auf dessen Steigerung hinzuwirken. Im ersteren Fall bietet die Zufuhr von Natrium- und Calciumverbindungen (Kochsalz, Chilisalpeter, Gips, Kalkmergel),<sup>1)</sup> im letzteren das Aufbringen von tonigen

<sup>1)</sup> Soweit diese Substanzen nicht einen für die Pflanzen notwendigen Nährstoff zuführen sollen, bezeichnet man sie der lösenden Wirkung wegen, die sie auf die im Boden vorhandenen Pflanzennährstoffe ausüben, als *indirekte Düngemittel*.

Stoffen, z. B. von Tonmergel, Seeschlick u. dergl., ein wirksames Mittel, den gewünschten Zweck zu erreichen.

### § 104.

**Das Bodenwasser.** Das in den Boden eindringende und dessen Hohlräume erfüllende Wasser bringt aus der atmosphärischen Luft die aus dieser aufgenommenen Gase und festen Stoffe mit. Da das Lösungsvermögen des Wassers für Kohlendioxyd weit größer ist als für Sauerstoff, und für Sauerstoff größer als für Stickstoff, so ist das Verhältnis dieser drei Luftarten im Bodenwasser ein ganz anderes als in der Atmosphäre.<sup>1)</sup> Infolge des Sauerstoffverbrauchs innerhalb des Bodens und der Kohlendioxyd-Bildung bei der Oxydation der organischen Bodenbestandteile verschiebt es sich immer mehr zu ungunsten des Sauerstoff- und zu gunsten des Kohlendioxydgehalts. Ausser diesen gasförmigen Bestandteilen enthält das in den Boden eindringende Wasser stets etwas Ammoniak, das aus den Fäulnisvorgängen, die sich an der Erdoberfläche vollziehen, in die Atmosphäre gelangt, sowie salpetersaures und salpetrigsaures Ammonium. Die Menge dieser Stoffe ist sehr gering und sehr wechselnd.<sup>2)</sup> In Berührung mit den festen Bodenbestandteilen nimmt das Bodenwasser eine Reihe von Stoffen auf, deren Art und Menge im wesentlichen abhängig ist von der Beschaffenheit der ersteren, dem Gehalt des letzteren an Kohlendioxyd und von dem Mengenverhältnis, worin Wasser und Boden zu einander stehen. Über die Zusammensetzung des Bodenwassers sind wir deswegen im unklaren, weil es nur durch Zufuhr großer Wassermengen aus dem Boden sich herausdrängen läßt, hierbei aber infolge der Veränderung des Verhältnisses zwischen Wasser und festen und gelösten Bodenbestandteilen in seiner Zusammensetzung Veränderungen erleiden muß. Die Beschaffenheit des aus dem Boden fließenden Wassers, des „Sicker-“ oder „Drainwassers“, das nur bei einem Wasserüberschuß im Boden austritt, läßt daher nicht ohne weiteres auf den Gehalt der Bodenflüssigkeit unter normalen Verhältnissen, sondern höchstens darauf schließen, ob sie an diesem oder jenem Stoff hervorragend reich oder arm ist.

<sup>1)</sup> Auf 100 Raumteile Sauerstoff kommen

in der Atmosphäre . . .	378 Rtl. Stickstoff und ca. 0,15 Rtl. Kohlendioxyd
in einem mit diesen Gas-	
arten gesättigten Wasser	50     „     „     „     3333     „     „     .

<sup>2)</sup> Nach vielfachen Untersuchungen dürfte die jährlich auf 1 ha Bodenfläche in Form der genannten Stickstoffverbindungen gelangende Stickstoffmenge etwa 12 kg betragen.

§ 105. Das *Sicker-* oder *Drainwasser*. So wenig Aufschluss das aus den Böden absickernde Wasser über die Beschaffenheit des flüssigen Bodenbestandteils gibt (s. o.), so ist die Zusammensetzung der Drainwässer doch insofern von Wichtigkeit, als sie die Mengen von Nährstoffen beurteilen läßt, die durch das Wasser dem Boden entzogen werden, und als das Drainwasser unter Umständen dazu benutzt werden kann, um anderen Böden befruchtende Stoffe zuzuführen. Seine Beschaffenheit richtet sich unter sonst gleichen Verhältnissen nach der Art und Behandlung (Bodenbearbeitung, *Düngung*) des Bodens, dem es entstammt, und nach der Wassermenge, die darauf einwirkte. Drainwasser von Böden, die aus *säuren* Gesteinen (§ 31, 1) entspringen, pflegen an *Kalium-* und *Natrium-*verbindungen reich zu sein, während die aus *basischen* Gesteinen (§ 31, 2) gebildeten Böden an *Calcium-* und *Magnesiumsalzen* reiche Wässer liefern. Die ersteren nennt man (wegen ihres Verhaltens beim Waschen) „weiche“, die letzteren „harte“ Wässer. Starke Düngung des Bodens mit Kalisalzen erhöht den Gehalt der Drainwässer an Calciumverbindungen sehr beträchtlich (Wechselzersetzung). Bei starkem Humusgehalt des Bodens ist das Sickerwasser braun gefärbt, falls die Humusstoffe sauer reagieren oder weiches Wasser auf sie einwirkte, gelblich oder farblos, wenn die Humusstoffe in Form von humussäuren Salzen (Calciumhumat, Magnesiumhumat) vorhanden sind oder unter dem Einfluß von hartem Wasser stehen.

Ferner müssen die Stoffe, für die der Boden ein geringeres Absorptionsvermögen besitzt, im Sickerwasser reichlicher vertreten sein. Im allgemeinen wird dieses reicher an *Natrium-*, *Calcium-*, *Magnesium-*verbindungen sein als an *Kaliumverbindungen*. *Schwefelsäure* und *Chlor* werden in größeren Mengen aus dem Boden ausgelaugt, die *Phosphorsäure* dagegen, die mit Calcium und Eisen schwerlösliche Salze bildet, bleibt im Boden zurück, und die Drainwässer sind fast stets sehr arm daran. Aus Böden, in denen die Bedingungen für Bildung von *Salpetersäure* günstig liegen, oder denen diese im Dünger zugeführt wird, langen die Drainwässer große Mengen dieses wertvollen Stoffes aus, während das leicht absorbierbare Ammoniak (§ 101) nur in geringem Grade in das Drainwasser gelangt.

Höhere Bodentemperatur steigert den Gehalt der Sickerwässer an gewissen Stoffen, so an Nitraten: infolge der verstärkten Salpetersäurebildung (§ 52); an anderen Salzen: weil durch die vermehrte Kohlensäurebildung ein größerer Teil der Bodenbestandteile in Lösung gebracht wird.

In den allermeisten Fällen ist der Gehalt des Drainwassers an festen Stoffen sehr gering, er überschreitet nur selten ein Tausendstel der Wassermenge. Dennoch kann unter Umständen die durch das Drainwasser fortgeführte Menge an wichtigen Bodenbestandteilen sehr groß sein.

Nach Untersuchungen von v. Seelhorst, Kreydt und Wilms verlor ein auf 1,25 m Tiefe drainierter Lehm Boden in guter Kultur durch das abfließende Wasser auf ha und Jahr:

Stickstoff in Form von Salpetersäure, salpetriger Säure und Ammoniak	Kali	Kalk	Magnesia	Schwefelsäure	Phosphorsäure (geschätzt zu etwa)
4,4 kg	8,4 kg	630 kg	140 kg	182 kg	2 kg

An freiem Sauerstoff pflegen aus früher besprochenen Ursachen die Drainwässer ärmer, an Kohlendioxyd reicher zu sein, als die mit der atmosphärischen Luft in Berührung befindlichen Wässer. Auch können sie unter Umständen pflanzenschädliches Schwefelwasserstoffgas enthalten. Falls die Sickerwässer zur Befeuchtung anderer Böden benutzt werden sollen, empfiehlt es sich daher, sie vorher längere Zeit mit dem atmosphärischen Sauerstoff in Berührung zu bringen, wobei ein großer Teil des Kohlendioxyds entweicht, der Schwefelwasserstoff zerstört<sup>1)</sup> und freier Sauerstoff aufgenommen wird. (Vergleiche auch § 86.)

Auf einem mit Pflanzen bestandenen Boden sind infolge der gesteigerten Verdunstung die Sickerwassermengen kleiner als auf dem nackten Boden, und es wird durch das abfließende Wasser dem bewachsenen Boden an Stoffen weniger entzogen als dem nackten, obwohl die aus dem ersteren austretenden Lösungen unter Umständen konzentrierter sein können, als die Sickerwässer des nicht bewachsenen Bodens.<sup>2)</sup>

Die folgende Tabelle gibt die Zusammensetzung einiger Drainwässer aus verschiedenen Bodenarten wieder.

<sup>1)</sup> Der Schwefelwasserstoff scheidet hierbei häufig freien Schwefel aus: ( $\text{H}_2\text{S} + \text{O} = \text{H}_2\text{O} + \text{S}$ ).

<sup>2)</sup> Sehr deutlich wird dies durch Untersuchungen von Dr. J. Hanemann zur Anschauung gebracht. Aus 50 kg eines als calciumkarbonathaltiger Alluviallehm zu bezeichnenden Bodens traten an Sickerwasser und in diesem gelösten festen Stoffen (in g) aus:

Boden	Sickerwasser	Gelöste Stoffe:						
		Kohlen- säure	Salpeter- säure	Kali	Natron	Kalk	Magnesia	Schwefel- säure Chlor
Unbewachsen . . .	7080	0,42	0,21	0,17	0,19	0,57	0,11	0,39 0,09
Bewachsen mit Klee .	2650	0,24	0,09	0,05	0,05	0,38	0,05	0,20 0,05
Bewachsen m. Sommer- weizen . . . . .	2041	0,22	0,01	0,04	0,04	0,28	0,05	0,17 0,07.

Dabei waren enthalten in 100000 Teilen des Sickerwassers:

	in dem unbewachsenen	dem mit Klee	dem mit Weizen bewachs.
an festen Stoffen	46,4	53,0	50,7 Teile.

**Zusammensetzung einiger Drainwässer**  
(nach Wolff, Krockner, Moor-Versuchs-Station).

In 100 000 Teilen Wasser waren enthalten:

Bodenart	Organische Stoffe	Kohlensäure	Salpetersäure	Mineralstoffe	Kali	Natron	Kalk	Magnesia	Phosphorsäure	Schwefelsäure	Chlor	Kieselsäure
Lehmiger Sand . . .	2,6	12,4	Spur	32,1	0,2	2,4	12,3	1,5	Spur	0,6	1,4	0,7
Tonboden auf Kalk- unterlage . . . . .	2,5	7,2	0,1	39,1	0,2	1,4	13,4	3,5	0	12,2	0,5	0,7
Niederungs - Moor- boden (stark mit Kainit gedüngt) .	22,9	6,5	17,0	130,1	6,3	15,8	43,3	2,9	0,1	33,8	24,2	2,2
Hochmoorboden . . .	11,4	0,2	0,3	12,4	1,2	2,3	2,9	0,4	0,02	2,5	1,3	2,1



## Kapitel V.

### Kurze Charakteristik der Hauptbodenarten.<sup>1)</sup>

#### § 106.

**Die Steinböden** oder *Böden mit einem so hohen Gehalt an nicht oder nur wenig zersetzten gröberen Gesteinstrümmern, daß sie die wichtigsten Bodeneigenschaften wesentlich beeinflussen.* Bilden die Gesteinstrümmer nahezu die einzigen Bestandteile, so bezeichnet man diese Böden als eigentliche *Schuttböden* („Schotter-“, „Breccien-“, „Tuffböden“), falls sie noch auf dem Muttergestein aufliegen; als *Geröllböden*, wenn sie durch Wasser oder Eis von ihrer Bildungsstätte fortgeführt sind. Derartige Böden sind, gleichgültig welchem Gestein sie entstammen, höchstens zur Holzzucht geeignet.

Ist bereits ein Teil der Gesteinsbrocken zu *Feinerde* (§ 75) zerfallen, oder haben sich neben dem Geröll zugleich feinerdige Verschwemmungsmassen abgesetzt, so können diese Böden einen hohen Grad von Fruchtbarkeit besitzen. Dieser richtet sich namentlich nach der Beschaffenheit des Muttergesteins. Von ihr hängt es natürlich ab, ob die Steinböden unter dem Einfluß der Verwitterungsagentien in kürzerer oder längerer Zeit in Sandböden, Lehm-, Ton- oder Kalkböden übergehen.

Im allgemeinen sind die Steinböden den *trockenen* und *warmen* Böden zuzurechnen.

#### § 107.

**Die Sandböden.** (Vergl. auch § 32, 2.) Als Sandböden bezeichnet man solche *Böden, in denen mit dem bloßen Auge erkennbare, im Wasser schnell zu Boden sinkende sandige Gemengteile überwiegen und den Charakter des Bodens bestimmen.* Die Sandpartikel können aus reinem Quarz oder auch aus noch unzersetzten, feinkörnigen Gesteinselementen: Glimmer, Feldspat, Hornblende, ferner aus Eisenoxyd, Calciumkarbonat u. a. bestehen. Wenn auch die Sandböden, entsprechend ihrem überwiegenden Gehalt an reinem Quarzsand, durchweg zu den leichten (§ 76, Anm. 1), an Pflanzennährstoffen nicht besonders reichen Bodenarten gehören, so weisen sie doch je nach ihrer Zugehörigkeit zu dieser

---

<sup>1)</sup> Nach der eingehenden Behandlung der „bodenbildenden Gesteine“ (§§ 30 bis 33) und der „Vorgänge bei der Bodenbildung“ (§§ 34 bis 64) glaube ich mich hier kurz fassen und bezüglich zahlreicher Einzelheiten auf die genannten Kapitel verweisen zu können.

oder jener Formation,<sup>1)</sup> ihrer Herkunft von reicheren oder ärmeren Gesteinen sehr große Unterschiede in ihrem natürlichen Fruchtbarkeitszustande auf. Je nach dem Vorwalten gröberer oder feinerer Korngrößen unterscheidet man zwischen *Kies*, *Grand*, *grobem Sand*, *Perlsand* und *feinem Sand*. Nach den früheren Bemerkungen (§ 33, 2) über den Einfluss der Korngröße auf den Gehalt der diluvialen Sande und Grande an Quarz, Feldspat und Kalk wird man von vornherein in den Sandböden des Diluviums mit einem beträchtlicheren Gehalt an groben Körnern (2—0,5 mm) einen weit größeren Reichtum an Feldspat und Calciumkarbonat, also eine höhere Fruchtbarkeit zu suchen haben, als in den Sandböden, in denen die (fast nur aus Quarz bestehenden) Körner von 0,5—0,05 mm bei weitem vorwiegen. Den letzteren sind auch die Dünen- und Flugsandböden des Alluviums ähnlich, die zu über 95 % aus reiner Kieselerde zu bestehen pflegen. Dagegen wird man in den staubfeinen Sandböden häufig einen hohen Kalkgehalt erwarten dürfen.<sup>2)</sup> Beimengungen von Ton und Humus werden durch die Bezeichnungen: *Lehmiger Sand*, *humoser* (oder auch „*anmooriger*“) *Sand*, größere Beimengungen von Eisenoxyd oder Eisenhydroxyd durch die Bezeichnung „eisenschüssig“ oder „eisenstreifig“ angedeutet. Falls sie nicht tonige oder humose Stoffe enthalten, besitzen die Sandböden meist Einzelkornstruktur, ihre Wasserkapazität ist in diesem Fall sehr gering, und zwar um so geringer, je grobkörniger sie sind. Mit dem gröberen Korn nimmt auch das Wasserdurchlassungsvermögen zu. Die Sandböden gehören daher im allgemeinen zu den *trockenen* Böden. Ihre Durchlüftbarkeit ist infolgedessen groß, ihre spezifische Wärme, entsprechend dem geringen Wassergehalt, klein. Sie erwärmen sich schnell, kühlen sich aber auch rasch ab. Bei ihrem geringen Wassergehalt, ihrer guten Durchlüftung und starken Erwärmung zersetzen sich in den Sandböden die humusbildenden Stoffe sehr rasch (daher die Bezeichnung: „*tätige*“ oder auch „*warme*“ Böden).

Bei dem geringen Absorptionsvermögen der Sandböden werden die infolge der fortschreitenden Verwitterung löslich werdenden und die in der Düngung zugeführten Nährstoffe leicht ausgewaschen. Die Düngung wirkt schnell, aber nicht nachhaltig.

Zufuhr von tonreichen und humusbildenden Stoffen (z. B. von Moorerde, Stalldung, Ton- und Lehmmergel, Seeschlick, Teichschlamm, Be-

<sup>1)</sup> Beispielsweise zeichnen sich die Keuper-Sandböden vor den Böden der Buntsandsteinformation meist durch einen höheren Gehalt an Kalk und Ton aus. (S. ferner das verschiedene Verhalten der Alluvial- und der Diluvialsande S. 104.) Es empfiehlt sich daher, bei der Kennzeichnung eines Sandbodens seine Zugehörigkeit zu dieser oder jener Gesteinsformation zum Ausdruck zu bringen. Ein Gleiches gilt auch für die Ton-, Lehm- und Kalkböden.

<sup>2)</sup> In der Tat sind die „Mergelsande“ (§ 33, 2) nicht selten gute Weizenböden.

wässerung mit schlickreichem Wasser u. a.) ist das beste Mittel, um die der Kultivierung der Sandböden ungünstigen Eigenschaften abzuschwächen. Ton- und humushaltige Sandböden in feuchter Lage sind vom landwirtschaftlichen Standpunkt aus den dankbareren Böden zuzurechnen.

Im entschiedensten Gegensatz zu den Sandböden stehen:

### § 108.

**Die Tonböden.** (Vergl. auch § 33, 3.) Das sind *Bodenarten, die zu mindestens 50 Prozent aus abschlämmbaren festen Teilen bestehen*, deren Menge aber auch auf 75 Prozent steigen kann. Steinige und grobsandige Beimengungen fehlen in den eigentlichen Tonböden (Unterschied von den „Lehmböden“). Die Eigenschaften der Tonböden können je nach ihrer Struktur und nach dem Vorhandensein oder Fehlen von Beimengungen, die auf die Eigentümlichkeiten der Tongesteine mildernd einwirken, sehr verschieden sein. Je freier der Ton von derartigen Beimengungen ist, umso mehr tritt die *Einzelkornstruktur* mit ihren für den Pflanzenwuchs ungünstigen Folgen hervor (§ 76). Die Bezeichnungen: „bindig“, „zäh“, „steif“, „streng“, „verschlossen“ sind charakteristisch für den reinen Tonboden.<sup>1)</sup> Er besitzt eine sehr hohe *Wasserkapazität*, geringe *Durchlässigkeit* für Wasser und ist daher, namentlich wenn auch seine Unterlage von schwerdurchlässigen Schichten gebildet wird, den *nassesten* Bodenarten zuzurechnen. Auf der anderen Seite ist seine *Kapillarität* und daher auch sein *Verdunstungsvermögen* sehr groß. Beim Austrocknen vermindert er sein *Volum*, er wird hart und rissig, und die verkleinerten Bodenkapillaren setzen dem Eindringen des Wassers große Schwierigkeiten entgegen. Bei der sehr geringen Anzahl nicht kapillar wirkender Hohlräume ist die *Durchlüftung* des Tonbodens von Natur eine sehr mangelhafte, und da auch wegen des meist vorhandenen Wasserreichtums seine *spezifische Wärme* sehr hoch, seine Erwärmbarkeit also gering ist, so erfolgt die Zersetzung der humusbildenden Pflanzenteile langsam und nimmt nicht selten einen für das Gedeihen der Kulturpflanzen ungünstigen Verlauf.

Alle diese für die Kultivierung des Tonbodens wenig günstigen Eigenschaften werden erheblich abgeschwächt, wenn er unter geeigneter Behandlung *Krümelstruktur* annimmt, oder wenn ihm von Natur Stoffe beigemischt sind, die die *Plastizität* des Tons vermindern (Sand, Kies, Steine), oder den Eintritt der Krümelstruktur befördern (Calciumverbindungen, humose Stoffe u. a.).

An *Pflanzennährstoffen* pflegen die Tonböden hervorragend reich zu sein. Ihr *Absorptionsvermögen* ist besonders groß; deswegen und

<sup>1)</sup> Zu den reinsten Tonböden sind die der Tertiärformation angehörigen zu rechnen.

wegen der oben angedeuteten Eigenschaften gehören sie zu den *wenig tätigen* oder *trägen* Böden. Aus allen diesen Ursachen kann kaum eine andere Bodenart für zweckmäßige Kulturmafsregeln sich so dankbar erweisen, als der Tonboden. Diese haben vor allem die *Beseitigung des schädlichen Wasserüberflusses*, die Beförderung der *Durchlüftung* durch Wasserentziehung, durch mechanische *Auflockerung* und Zufuhr lockernder Stoffe, durch Herbeiführung der *Krümelform*, Herabminderung der *Absorption* durch Calciumverbindungen und andere geeignete Stoffe („indirekte Düngemittel“) ins Auge zu fassen.<sup>1)</sup>

Auf der anderen Seite aber setzt keine andere Bodenart der Kultivierung so grofse Schwierigkeiten entgegen, als die reinen Tonböden, und die jeweiligen *Witterungsverhältnisse* sind so ausschlaggebend für das Gelingen der Kulturmafsnahmen (*Verschlämmung*, *Rissigwerden!*), daß selbst bei vorsichtigster Behandlung die Tonböden den *unsichersten* Bodenarten zuzurechnen sind.

### § 109.

**Die Lehm Böden** (vgl. auch § 33, 3) bestehen aus einem meist eisen- und kalkhaltigen *Gemisch von tonigen und sandigen Teilen*, *worin die letzteren überwiegen*. Sie enthalten im Gegensatz zu den Tonböden auch grobkörnigere Bestandteile. Der Gehalt an feinsten abschlämmbaren Teilchen kann etwa 20—30% betragen. Die Lehm Böden mit größerem Sandgehalt bezeichnet man als *sandige* (auch „milde“ oder „mürbe“), die mit geringerem als *tonige* (auch „strenge“, „zähe“ oder „schwere“) Lehme. Der Sand läfst sich beim Anföhlen und mit dem Auge bei den ersteren deutlich, bei den letzteren nur beim Aufschlämmen in Wasser erkennen. Je nach dem größeren oder geringeren Sandgehalt sind die Eigenschaften der Lehm Böden sehr verschieden. Während die „strengen“ Lehm Böden hinsichtlich ihres Verhaltens zum *Wasser*, zur *Durchlüftung* und *Erwärmung* den Tonböden nahe kommen, erscheinen die charakteristischen Eigenschaften des Tones bei den sandigen Lehm Böden in hohem Grade abgeschwächt. Diese sind weniger „*bindig*“ und der *Krümbildung* günstiger, ihre *Wasserkapazität* ist geringer, ihre *Durchlässigkeit* größer. Sie trocknen daher leichter aus, sind aber dem eindringenden Wasser zugänglicher. Sie erwärmen sich schneller, die Durchlüftung stöfst auf geringere Schwierigkeiten, die Zersetzung der humusbildenden Pflanzenreste geht in ihnen schneller vor sich. An *Pflanzennährstoffen* pflegen die Lehm Böden nicht so reich zu sein als die Tonböden, auch ist ihr *Absorptionsvermögen* im allgemeinen geringer, den

<sup>1)</sup> Zu den wertvollsten Tonböden gehören die Seemarschböden des nord-westlichen Deutschlands, ferner die Flufsmarschböden in den Tälern der Elbe, Oder, Weichsel, Memel.


gewöhnlichen Sandböden sind sie nach beiden Richtungen erheblich überlegen. Besonders geschätzt sind die Lösslehmböden, wie sie sich in großer Ausdehnung im Oder-, Elbe- und im Rheingebiet finden.

### § 110.

**Kalk- und Mergelböden** (vergl. § 33, 4 und 5) nennt man solche Böden, die neben wechselnden Mengen von tonigen und sandigen Bestandteilen einen erheblichen Gehalt an Calciumkarbonat oder an Calciumkarbonat und Magnesiumkarbonat aufweisen. Bilden diese Karbonate den Hauptbestandteil des Bodens, so daß sandige und tonige Beimengungen ganz zurücktreten, so hat man es mit *eigentlichen Kalkböden* oder, wenn neben Calciumkarbonat auch Magnesiumkarbonat in etwa gleicher Menge vorhanden ist, mit *Dolomitböden* zu tun. Sind in einem Boden erheblichere Mengen von Calciumkarbonat gleichmäßig in einer sandigen oder tonigen oder sandig-tonigen Grundmasse verteilt, so wird er als *Mergelboden* (oder, bei gleichzeitiger Anwesenheit größerer Mengen Magnesiumkarbonat, als „dolomitischer Mergel“) bezeichnet.

Die *eigentlichen Kalkböden* gehören nicht bloß wegen ihrer Armut an wichtigen Pflanzennährstoffen, sondern auch wegen ihrer ungünstigen physikalischen Eigenschaften (namentlich wegen ihrer Trockenheit) zu den unfruchtbarsten Bodenarten. Dagegen sind die *Mergelböden* landwirtschaftlich von hoher Bedeutung. Je nach dem größeren oder geringeren Gehalt an Calcium- (bzw. Magnesium-) Karbonat<sup>1)</sup> unterscheidet man zwischen *tonigem* oder *lehmigem Mergelboden* und *mergeligem Ton- oder Lehm-boden*. Der erstere enthält 30 bis 80 %, der letztere 2 bis höchstens 30 % Calciumkarbonat. In den Mergelböden mit mittlerem Ton- und Kalkgehalt sind die charakteristischen Eigenschaften des Tones durch die

<sup>1)</sup> Von der An- oder Abwesenheit von Karbonaten kann man sich leicht dadurch überzeugen, daß man auf eine Probe des Bodens verdünnte Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure, § 10) gießt. Karbonate werden dadurch z. B. nach folgender Gleichung zersetzt:



Das entweichende Kohlendioxyd macht sich durch „Aufbrausen“ bemerklich, dessen größere oder geringere Stärke auf einen größeren oder schwächeren Gehalt an Karbonaten schließen läßt. Ein Aufbrausen durch die ganze mit Säure benetzte Masse hindurch deutet auf eine gleichmäßige Verteilung des Karbonates. Ist letzteres nur in größeren Partikeln dem Boden beigemengt, so findet das Aufbrausen auch nur stellenweise statt. Calciumkarbonat kann in dieser Weise mit Salzsäure schon in der Kälte, ja auch mit starkem Essig (Verdünnte Essigsäure) nachgewiesen werden. Die Zersetzung von Magnesiumkarbonat (Dolomitböden) erfolgt meist erst beim Erwärmen des mit Säure übergossenen Bodens.

Beimengung von Calciumkarbonat in glücklichster Weise gemäsigst. Die Mergelböden sind zur *Krümelbildung* sehr geneigt, die *Wasserkapazität* des Tons ist auf ein für die *Durchlüftung* und *Erwärmung* günstiges Maß herabgedrückt. Die *Humusbildung* erfolgt unter diesen Verhältnissen, befördert durch die Anwesenheit des Karbonates, leicht; zugleich ist das letztere der Überführung des *Pflanzenstickstoffs* in *Salpetersäure* günstig. Der Gehalt an Pflanzennährstoffen ist häufig ein sehr hoher, das *Absorptionsvermögen* für Phosphorsäure ist hoch, für Kali nicht so hoch, daß es einer schnellen Verwertung des Bodenkali durch die Pflanzen im Wege steht. Die Mergelböden gehören mithin zu den „tätigen“ Böden. Am günstigsten für die Kultur verhält sich der zu den mergeligen Ton- und Lehmböden gehörige, oft bis auf große Tiefe stark humose *Löfsboden* (z. B. Magdeburger-Börde); ferner die gleichfalls dem Diluvium angehörige *Russische Schwarzerde* („Tschernosem“), sowie der ihm nach Entstehung und Aussehen verwandte „Cujavische“ Boden im östlichen Teil der Provinz Posen und der im übrigen dem Löfs nahe stehende, aber ebenso wie Tschernosem und Cujavischer Boden an Humus, den Rückständen einer üppigen Grasvegetation, besonders reiche Steppenboden des mittleren und südlichen Rußlands. Dagegen nehmen mit steigendem Kalkgehalt die kulturellen Vorzüge der Mergelböden um so mehr ab, je mehr sie sich den eigentlichen Kalkböden nähern, und je mehr der Tongehalt durch sandige Teile ersetzt ist.

Eine bemerkenswerte Eigenschaft aller Kalkböden ist es, daß das Calciumkarbonat verhältnismäßig schnell aus den oberen Schichten in die Tiefe gewaschen wird (§§ 41 und 47, 3).

### § 111.

**Die Humusböden** (vergl. § 53) sind *Sand-, Ton-, Lehm- und Kalkböden*, die durch größere Beimengungen von humosen Stoffen dunkel gefärbt und auch in ihren übrigen Eigenschaften, nicht selten zum Vorteil für ihre landwirtschaftliche Verwertung, erheblich verändert sind. Wie früher erörtert worden ist, befördert eine Beimengung von Humusstoffen bei den meisten Böden den Eintritt der *Krümelstruktur*, bei den Sandböden (auch bei den sehr kalkreichen Kalkböden), indem sie die Einzelkörner zu Kornaggregaten „verkitten“, bei den Tonböden und Lehmböden, indem sie deren Kohärenz verringern. Hierdurch wird zum Nutzen für den Pflanzenwuchs die *Wasserkapazität* der Sandböden vergrößert, die der Tonböden verringert, in allen Fällen die *Durchlüftung* des Bodens erleichtert und seine *Erwärmungsfähigkeit* erhöht, falls nicht seine Wasserverhältnisse dadurch in ungünstiger Weise verändert worden sind. Sehr wesentlich ist der Humusgehalt insofern, als durch ihn der Boden zugleich mit *Stickstoff* angereichert wird (s. die

Tabelle S. 144). Der große Stickstoffgehalt in Verbindung mit der vorhandenen Bodenfeuchtigkeit ist allerdings zugleich die Ursache für die starke Unkrautwüchsigkeit der humosen Böden. Ungünstig können die Humusstoffe auf den Kulturwert der Böden auch insofern wirken, als sie die Erscheinung der Spätfröste und des Auffrierens (§ 90, Anm. und § 76) fördern. Endlich sind sie namentlich bei mangelhafter Durchlüftung der Entstehung schädlicher Reduktionsvorgänge günstig.<sup>1)</sup>

### § 112.

**Die Moorböden.** (Vergl. §§ 56 bis 64.) Nach den früheren eingehenden Erörterungen über die Moorbildung versteht man unter Moorböden solche Böden, die im wesentlichen nur aus den Resten abgestorbener Pflanzen bestehen. Von den Mineralböden unterscheiden sich die Moorböden also dadurch, daß ihre mineralischen Bestandteile weit hinter den verbrennlichen zurücktreten (Tab. I, S. 144), durch ihr sehr geringes Volumgewicht (Anm. S. 145) und ihren unter natürlichen Verhältnissen auffällig hohen Wassergehalt. Bei ihrer hervorragenden Wasserkapazität sind die Moorböden im Naturzustande den „nassen“ und „kalten“ Böden zuzurechnen. Sie sind schwer durchlässig, daher auch schwer durchlüftbar und zu ungünstigen Zersetzungsprozessen geneigt. Mit Wasser vollgesogen, erwärmen sie sich nur langsam und unterliegen sehr leicht im Winter dem „Auffrieren“, im Frühjahr den „Spätfrösten“. Beim Austrocknen erleiden sie erhebliche Volumänderungen (§ 79). Eine kräftige Wasserentziehung gestaltet jedoch ihr Verhalten zum Pflanzenwuchs so günstig, daß man zweckmäßig behandelte Moorböden zu den dankbarsten Kulturmedien rechnen darf. Eine allzu starke Wasserabzapfung wirkt — abgesehen von anderen schlechten Folgen — besonders deswegen ungünstig, weil Moor, das bis zu einem bestimmten Grad ausgetrocknet ist, nur äußerst schwer sich wieder benetzt.<sup>2)</sup> Ist ein Moorboden auf das richtige Maß entwässert, so erwärmt er sich zufolge seiner dunklen Färbung schnell, und sein hohes Kapillarvermögen, das ihn befähigt, in trocknen Zeiten die den Pflanzen nötige Feuchtigkeit aus den

<sup>1)</sup> Die Formen der Humusböden sind so mannigfaltig, daß eine eingehendere Beschreibung hier nicht möglich ist. Es sind dahin zu rechnen die sogenannten „anmoorigen“ Böden, d. s. Sandböden in feuchterer Lage, die von den Resten abgestorbener Heidepflanzen durchsetzt sind, ferner die meisten See- und Teichschlamm Böden, der See- und Flufsmarschboden („Kleiboden“), die Schwarzerden (s. o.).

<sup>2)</sup> Wird eine Moorfläche durch irgend einen Vorgang von ihrer natürlichen Pflanzendecke entblößt, so kann sie unter dem Einfluß der Sonnenstrahlen an der Oberfläche zu einer pulvrigen Masse austrocknen, die Wasser nicht mehr aufnimmt und gleichwie feiner Dünenand vom Winde bewegt wird. („Moorwehen“ oder „Mullwehen“.)

tieferen Schichten heraufzuholen, gewährt ihm vor den meisten Mineralböden einen erheblichen Vorzug.

Der Gehalt der verschiedenen Moorböden an *Pflanzennährstoffen* richtet sich in erster Linie nach der Art der Pflanzen, aus denen sie entstanden sind, und weiterhin nach den Umständen, die bei ihrer Entstehung mitgewirkt haben (§ 56 u. ff.). Alle Moorböden sind arm an *Kaliumverbindungen*. Die *Hochmoorböden* enthalten gewöhnlich auch so wenig *Calcium-* und *Stickstoffverbindungen*, daß für die Erzielung befriedigender Ernten diese Stoffe ihnen zugeführt werden müssen. Dagegen zeichnen sich die *Niederungsmoorböden* allermeist durch einen hohen Gehalt an *Calcium-* und *Stickstoffverbindungen*, bisweilen auch an *phosphorsauren Salzen* aus. Während die Hochmoorböden an zufälligen Bestandteilen höchstens geringe Mengen von übergewehem *Sand-* oder *Tonstaub* enthalten, finden sich in den Niederungsmooren nicht selten größere Beimengungen von *Sand, Ton, Wiesenkalk, Eisenerzen*. Die Übergangsmoore stehen hinsichtlich ihres Gehaltes an mineralischen Bestandteilen und an Stickstoffverbindungen zwischen Hoch- und Niederungsmoorböden. Sie sind daran um so ärmer, je mehr hochmoorbildende Pflanzen sich an ihrer Entstehung beteiligt haben.

Die in den Moorböden enthaltenen Pflanzennährstoffe, und namentlich ihr Stickstoff, sind den Kulturpflanzen um so leichter zugänglich, je vollkommener humifiziert die moorbildenden Pflanzenreste sind. Noch schneller werden die Mineralstoffe des Moorbodens für die Pflanzen aufnehmbar, wenn er gebrannt wird („Brennkultur“, s. Kulturtechnik); hierbei gehen die humussaurer Salze in Karbonate über, ein Teil des Moorstickstoffs wird in Ammoniak übergeführt, auch erleiden die Phosphorverbindungen heilsame, ihre Aufnahme durch die Pflanzen erleichternde Umwandlungen, deren Natur noch nicht klar erkannt ist. — Im allgemeinen unterliegen die moorbildenden Pflanzen der Niederungsmoore der Zersetzung leichter, als die der Übergangsmoore, und diese leichter, als die der Hochmoore. Kräftige *Durchlüftung* und, bei den Hochmooren, Zufuhr *kalkreicher* Stoffe wirken energisch auf die Humusbildung ein. Sobald die Pflanzenreste ihre pflanzliche Struktur verloren haben, stellt sich auf beiden Moorbodenarten unter dem Einfluß geeigneter Behandlung bald *Krümelstruktur* mit ihren heilsamen Folgen ein.

Die physikalischen Eigenschaften der Moorböden werden auf das günstigste beeinflusst durch Bedeckung oder Vermischung ihrer oberen Schichten mit geeigneten mineralischen Bodenarten. Das erstere geschieht bei der Rimpau'schen *Dammkultur* („Sanddeckkultur“), das letztere bei der *Niederländischen „Moorkultur“* („Sandmischkultur“) s. (Kulturtechnik). Beide Kulturverfahren haben zunächst die Wirkung, daß der lose, weiche Moorboden an seiner Oberfläche *fester* und dem Zugvieh und schwerem



Ackerwerkzeug zugänglich wird. Ferner wird das *Kapillarvermögen* des Bodens und damit die *Verdunstung* wesentlich herabgesetzt. Untersuchungen der Moor-Versuchs-Station ergaben, daß von dem im Verlauf eines Jahres auf den Boden fallenden Regenmengen verdunsteten:

Auf dem nackten Moor	Auf dem an der Oberfläche mit Sand gemischten Moor	Auf dem mit grobem Sand bedeckten Moor
29,3%	25,5%	11,6%

Die Vermischung und mehr noch die Bedeckung der Mooroberfläche mit mineralischem Boden wirkt mithin *feuchtigkeiterhaltend* auf den Moorboden.<sup>1)</sup> Einen so behandelten Moorboden wird man daher ohne Gefahr, daß er zu stark austrockne, weit tiefer entwässern *dürfen*, als das nackte Moor, aber auch weit tiefer entwässern *müssen*, wenn er nicht für die Kulturgewächse zu naß bleiben soll.<sup>2)</sup>

Infolge der geringeren Verdunstungsgröße und der geringeren Wasserkapazität der oberen Bodenschicht besitzt der mit Sand bedeckte Moorboden in den wärmeren, für die Vegetation besonders wichtigen Jahreszeiten eine höhere *Durchschnittstemperatur*, als der an der Oberfläche mit Sand gemischte, und dieser eine höhere als der nackte Moorboden.<sup>3)</sup> Im Durchschnitt eines Jahres wurde die Temperatur bei 11 cm Tiefe wie folgt gefunden:

<sup>1)</sup> Die Ursache dieser Erscheinung liegt nahe. Auf dem nackten Moor wird das an der Oberfläche verdunstende Wasser immer wieder vermöge der starken Kapillarkraft des Moorbodens von unten her ersetzt. Bei dem mit Sand bedeckten Moor erfolgt der Ersatz weit langsamer, der Boden trocknet an der Oberfläche fast ganz aus, wodurch die Verdunstung erheblich herabgesetzt wird. Bei dem an der Oberfläche mit Sand gemischten Moor kann zwar der vorhandenen Moorteilchen wegen mehr Wasser an die Oberfläche gelangen, immerhin sind aber die aufsaugenden Kapillaren durch die Sandkörner derartig unterbrochen, daß der kapillare Aufstieg ein langsamerer, die Verdunstung also vermindert wird. Es kommt hinzu, daß auch das im Regen auffallende Wasser, das vom nackten Moor schon an der Oberfläche zurückgehalten wird und hier der Verdunstung anheimfällt, durch die durchlässigere Moor-Sand-Mischung und noch mehr durch die reine Sanddecke rasch hindurchdringt und so der Verdunstung entzogen wird.

<sup>2)</sup> Die Gefahr der übermäßigen Bodennässe ist beim Moorboden besonders groß. Um den Pflanzen zu gute zu kommen, müssen dessen Bestandteile erst Umwandlungen erleiden (s. o.), die nur bei kräftiger Durchlüftung sich vollziehen. Fehlt die letztere, so finden bei keinem Boden leichter als hier andersartige, dem Pflanzenwuchs verhängnisvolle Umsetzungen statt (§ 84).

<sup>3)</sup> Ob die niedrigere Durchschnittstemperatur des nackten Moores zu einem Teil auch auf ein stärkeres Wärmeausstrahlungsvermögen der rauhen und dunklen Oberfläche zurückzuführen ist, wird durch die bisher vorliegenden Versuche noch nicht entschieden.

Im nackten Moorboden	In dem an der Oberfläche mit Sand gemischten Moor	In dem mit Sand be- deckten Moor
7,92°	8,41°	9,01°
Differenz: 0,5°		Differenz: 0,6°

An Stelle des von dem Erfinder der Moordammkultur Th. H. Rimpau zum Bedecken des Moores benutzten, ziemlich grobkörnigen Sandes sind mit mehr oder weniger gutem Erfolg auch andere mineralische Bodenarten verwendet worden. Überschreitet die *Grobkörnigkeit* des Sandes ein gewisses Maß, so wirkt er überhaupt nicht mehr kapillar, die Verdunstung wird völlig gehemmt, und es liegt die Gefahr vor, daß der Boden zu naß bleibt.<sup>1)</sup> Sehr *feinkörniger* Sand begünstigt zwar die Verdunstung, beschränkt aber durch dichte Zusammenlagerung das Eindringen der Luft. Dasselbe läßt sich von sehr *tonreichen* Bodenarten sagen. So gut eine schwache Beimengung von tonigen Bestandteilen insofern wirken kann, als sie den losen Sand befestigt und vor dem Verwehen schützt, so unheilvoll verhält sich eine an Ton sehr reiche Decke. Sie stört die Durchlüftung und wird beim Austrocknen hart und rissig. Eine Beimengung von *Kalk* ist der Entstehung der Krümelstruktur in der Bodendecke und dadurch dem Pflanzenwuchs sehr günstig. Außerdem macht er die aus etwa vorhandenem Eisenkies entstehenden Pflanzengifte unschädlich (§ 23). Falls diese in größerer Menge im Bedeckungsmaterial oder im Moor vorhanden sind, können sie das Gedeihen der Moordammkulturen auf das äußerste gefährden.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Siehe darüber auch § 81.

<sup>2)</sup> Von dem etwaigen Vorhandensein schädlicher Stoffe im Boden kann man sich leicht durch folgenden kleinen Versuch überzeugen. Der verdächtige Boden wird in kleine Blumentöpfe gefüllt, diese mit einigen keimfähigen Haferkörnern besät und an einen luftigen, hellen Ort gestellt. Die jungen Pflänzchen sind reichlich mit Feuchtigkeit zu versehen. Ist Schwefeleisen im Boden vorhanden, so geht dieses allmählich in Schwefelsäure und Ferrosulfat (§ 23) über, die Pflanzen fangen an zu kränkeln und sterben ab. Zweckmäßig läßt man einen Parallelversuch mit zweifellos giftfreiem Boden nebenher laufen.

Um zu prüfen, ob Fehlstellen auf einer Moordammkultur auf die Anwesenheit schädlicher Schwefelverbindungen zurückzuführen sind, mischt man eine Probe des Sandes in einem Wasserglas mit einer Messerspitze fein zerriebenen „roten Blutlaugensalzes“ (aus Drogenhandlungen zu beziehen) und durchfeuchtet dann das Gemenge mit wenig Wasser; die Anwesenheit von Ferrosulfat macht sich dann durch Blaufärbung der ganzen Masse oder durch das Auftreten blauer Punkte bemerklich. (Das rote Blutlaugensalz, eine Verbindung von Kalium, Eisen und dem Radikal Cyan (CN oder Cy) von der Zusammensetzung  $K_3FeCy_6$ , gibt beim Zusammentreffen mit Ferroverbindungen, z. B. mit Ferrosulfat, eine tiefblau gefärbte Verbindung, genannt Turnbolls Blau.)

## Literatur zum I. Abschnitt.

- Appelt, E., Pflanze und Boden. Breslau, W. G. Korn, 1889.
- Berendt, G., Abhandlungen zur geologischen Spezialkarte, Bd. II, Heft 3; Bd. III, Heft 3, u. a.
- Biedermann, B., Beiträge zu der Frage der Bodenabsorption. Chemnitz, E. Focke, 1869.
- Braungart, R., Die Wissenschaft in der Bodenkunde. Berlin u. Leipzig 1876.
- Credner, Elemente der Geologie. Leipzig und Heidelberg 1876.
- Detmer, W., Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der allgemeinen landwirtschaftlichen Bodenkunde.
- Fesca, M., Die agronomische Bodenuntersuchung und -kartierung. Berlin. Wiegandt, Hempel und Parey. 1879.
- Beiträge zur agronomischen Bodenuntersuchung und -kartierung. Berlin, P. Parey, 1882.
- von Fischer-Benzon, Die Moore der Provinz Schleswig-Holstein. Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Hamburg, Bd. XI, Heft III.
- Fleischer, M., Mitteilungen über die Arbeiten der Moor-Versuchs-Station in Bremen, I, II, III. Berlin, P. Parey, 1883, 1886, 1891.
- Die Torfstreu, ihre Herstellung und Verwendung. Bremen, M. Heinsius Nachf., 1890.
- Zahlreiche Berichte in den Protokollen der Central-Moor-Kommission und in den Mitteilungen des Vereins zur Förderung der Moorkultur. Berlin, P. Parey.
- Früh, J., Torf und Dopplerit. Zürich, J. Wurster, 1883.
- Griesebach, Über die Bildung des Torfs in den Emsmooren. Göttinger Studien 1845. Göttingen 1846.
- Gruner, H., Grundriss der Gesteins- und Bodenkunde. Berlin, P. Parey, 1896.
- Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte. Blatt Lohm. Berlin, P. Parey, 1896.
- Hellriegel, H., Grundlagen des Ackerbaues. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn, 1883.
- Jentzsch, A., Die Moore der Provinz Ostpreußen. Protokoll der 5. Sitzung der Central-Moor-Kommission. Berlin 1878.
- Keilhack, K., Einführung in das Verständnis der geologisch-agronomischen Spezialkarten des norddeutschen Flachlandes. Berlin 1901.
- Knop, Der Kreislauf des Stoffs. Leipzig, H. Haessel, 1868.
- Die Bonitierung der Ackererde. Leipzig, H. Haessel, 1872.
- Kohlenberg, A., Das schwimmende Land von Waakhausen. Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, Bd. XV, 1897.
- König, J., Die Pflege der Wiesen. Berlin, P. Parey, 1893.

- König, J., und Böhmer, C., Über die Veränderungen und Wirkungen des Rieselwassers bei der Berieselung. Landwirtschaftl. Jahrbücher 1882—1885.
- Krause, H. L., Die Existenzbedingungen der nordwestdeutschen Heidefelder. Globus 1897.
- Lemberg, J., Über Silikat-Umwandlungen. Inaugural-Dissertation. Dorpat 1877.
- Lorenz, J. B., Über Torfbildung. Entstehung, Verwendung, Wiedererzeugung des Torfs. Salzburg 1854.
- Mayer, Ad., Lehrbuch der Agrikulturchemie. Heidelberg, C. Winter.
- Meitzen, A., Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des Preussischen Staates, Bd. V. Berlin, P. Parey, 1894.
- Mitscherlich, A., Untersuchungen über die physikalischen Bodeneigenschaften. Habilitationsschrift. Merseburg 1901.
- Noeggerath, J., Der Torf. -Virchow und v. Holtzendorff, Sammlung wissenschaftlicher Vorträge. Berlin 1875, Ser. X, Heft 230.
- Orth, A., Beiträge zur Bodenuntersuchung. Berlin, S. Calvary & Co., 1868.
- Kalk- und Mergeldüngung. Berlin, Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, 1896.
- Ramann, E., Forstliche Bodenkunde und Standortslehre. Berlin 1893.
- Die v. Post'schen Arbeiten über Schlamm, Moor, Torf und Humus. Landwirtschaftliche Jahrbücher, Berlin 1888.
- Anzahl und Bedeutung der niederen Organismen im Wald- und Moorboden. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, Berlin 1899.
- Organogene Ablagerungen der Jetztzeit. Neues Jahrbuch für Mineralogie etc., Band X.
- Roth, J., Allgemeine und chemische Geologie.
- Flusswasser, Meerwasser, Steinsalz. Virchow und v. Holtzendorff, Sammlung wissenschaftlicher Vorträge, Serie XIII, Heft 306.
- Sachse, R., Lehrbuch der Agrikulturchemie. Leipzig, H. Haessel, 1888.
- Salfeld, A., Die Kultur der Heideflächen. Hildesheim, Gerstenberg, 1882.
- Die Bodenimpfung. Bremen, M. Heinsius Nachf., 1896.
- Schacht, T., Einiges über die Entstehung der Moore. Blätter für Moorkultur, Torfverwertung und Meliorationswesen. Deutsche Landwirtschaftliche Presse, Jahrg. X, No. 50.
- Schmidt, C., Chemische Untersuchung der Schwarzerden. Baltische Wochenschrift, Dorpat 1880, 1881.
- Schmoeger, M., Über den Phosphor im Moorboden. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, Jahrg. XXVI, Heft 3.
- Untersuchungen über einige Bestandteile des Moores. Landwirtschaftliche Jahrbücher, Berlin 1896.
- Sendtner, O., Die Vegetationsverhältnisse Süd-Bayerns. München 1854.
- Senfft, F., Die Humus-, Marsch-, Torf- und Limonitbildungen. Leipzig, W. Engelmann, 1862.
- Der Erdboden nach Entstehung, Eigenschaften und Verhalten zur Pflanzenwelt. Hannover, Hahn, 1888.
- Stierner, Über Moosbrühe. Vortrag in der Kurländischen Ökonomischen Gesellschaft. Mitau 1880.

- Tacke, Br., Mitteilungen über die Arbeiten der Moor-Versuchs-Station in Bremen, IV. Berlin, P. Parey, 1898.
- Zahlreiche Berichte und Abhandlungen in den Protokollen der Central-Moor-Kommission, Mitteilungen des Vereins zur Förderung der Moorkultur (Berlin, P. Parey) u. a.
- Vofslor, O., Die Begründung der landwirtschaftlichen Bodenkunde durch die heutige Geognosie. Festrede. Hohenheim 1868.
- Wahnschaffe, F., Anleitung zur wissenschaftlichen Bodenuntersuchung. Berlin, P. Parey, 1887.
- Weber, C. A., Über die Vegetation und Entstehung des Hochmoors von Augstumal im Memeldelta. Berlin, P. Parey, 1902.
- Bericht über die Tätigkeit des Botanikers der Moor-Versuchs-Station. Protokoll der 29. Sitzung der Central-Moor-Kommission. Berlin, P. Parey, 1897.
- Über die Vegetation zweier Moore bei Sassenberg in Westfalen. Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, Bd. XIV, Heft 2.
- Über die fossile Flora von Honerdingen etc. Zur Kritik interglacialer Pflanzenablagerungen. Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, Bd. XIII, Heft 3.
- Wicke, H., Eine Exkursion nach dem schwimmenden Lande von Waakhausen. Journal für Landwirtschaft, Jahrg. 1868.
- Wohltmann, F., Die chemische Untersuchung des Bodens und ihre Bedeutung für die Bonitierung des Ackers. Illustr. Landw. Zeitung, 19. Jahrg., 1899, No. 84 u. 85.
- Wolff, E., Der grobsandige Liaskalkstein von Ellwangen. Stuttgart, E. Schweizer, 1871.
- Der weisse Jura. Stuttgart, E. Schweizer, 1878.
- Wollny, E., Zahlreiche Abhandlungen in der Zeitschrift „Forschungen auf dem Gebiete der Agrikulturphysik.
-

## Zweiter Abschnitt.

# Botanik der kulturtechnisch wichtigen Pflanzen.

## EINLEITUNG.

§ 1. **Übersicht des Pflanzenreichs.** Alle Pflanzen zusammen bilden das Pflanzenreich. Dieses zerfällt in zwei große Haupt-Abteilungen:

- I. *Kryptogamae*, blütenlose oder Sporenpflanzen, niedere Pflanzen.<sup>1)</sup>
- II. *Phanerogamae*, Blüten- oder Samenpflanzen, höhere Pflanzen.

Eine Spore unterscheidet sich vom Samen dadurch, daß in ihr kein Keim, kein Embryo enthalten, während in einem Samen die künftige Pflanze als kleines Gebilde, Embryo, bereits vorhanden ist.

Die Kryptogamae zerfallen wieder in folgende Abteilungen:

- I. *Myxothallophyta*, Schleim-Lagerpflanzen.
- II. *Thallophyta*, Lagerpflanzen.
  - I. Klasse: *Schizophyta*, Spaltpflanzen.
  - II. „ *Algae*, Wasserfäden, Algen.
  - III. „ *Fungi*, Pilze.
- III. *Archegoniatae*.
  - I. Klasse: *Bryophyta*, Moospflanzen.
  - II. „ *Pteridophyta*, Farnpflanzen im weiteren Sinne.

Die Phanerogamae zerfallen in:

- I. Klasse: *Gymnospermae*, Nacktsamige (Samen *nicht* in einem Fruchtknoten.)
- II. „ *Angiospermae*, Bedecktsamige (Samen in einem Fruchtknoten.)

Die letztere Klasse umfaßt fast alle Bäume, Sträucher und Kräuter.

Sie zerfällt in:

- I. Unterklasse: *Monocotyledones*, Einkeimblättrige.
- II. „ *Dicotyledones*, Zweikeimblättrige.

§ 2. **Hauptabteilung I. Kryptogamae.** *Erläuterung zu ihren einzelnen Abteilungen.*

<sup>1)</sup> Nur beim *ersten* Vorkommen der Pflanzennamen wird, wo es zweckmäßig erscheint, die Betonung angedeutet.

Zur **I. Abtheilung, Myxothallophyta**, gehören nur die *Myxomycetes* oder Schleimpilze. Es sind Pflanzen ohne Chlorophyll (Blattgrün), deren Vegetationskörper eine membranlose Protoplasmamasse ist. Die Sporen entstehen meist im Innern von Behältern (Sporangien). Hierher die Lohblüte, bildet dottergelbe Schleimmassen auf Lohe. Die Schleimpilze haben oft eine amöbenartige Bewegung und stehen an der Grenze zwischen den niedersten Pflanzen und niedersten Tieren; man bezeichnet sie auch als Pilztiere.

**II. Thallophyta** oder Lagerpflanzen haben einen Vegetationskörper, der meist noch nicht in Stamm und Blatt gegliedert ist und deshalb als Thallus oder Lager bezeichnet wird. Sie haben niemals echte Wurzeln und auch keine Gefäßbündel (Adern oder Nerven).

1. Klasse: *Schizophyta* sind meist sehr kleine, einzellige Pflanzen, die sich durch Zweiteilung vermehren. Sie zerfallen in zwei Unterklassen:

1. *Schizomycetes*, Spaltpilze oder Bakterien. Meist farblos.
2. *Schizophyceae* oder *Cyanophyceae*, Spaltalgen. Meist blaugrün.

Die 2. Klasse, *Algae*, umfaßt teils einzellige, teils vielzellige, meist im Wasser lebende, gewöhnlich rein grün, auch gelb, braun oder rot gefärbte Pflanzen. Hierher die kieselschaligen Algen oder Diatomeen (Kieselgur, Infusorien-Erde), die Wasserfäden, die braunen Tange etc.; vor allem auch die Gattung *Chara*, Armleuchter, die einem Schachtelhalm ähnlich sieht und sich in kalkhaltigen Gewässern mit Kalk inkrustiert, z. B. *C. fragilis*, zerbrechliche *Chara*. (Ähnlich *Nitella*, ohne Kalkinkrustation.) Beide meist in gutem Rieselwasser, obwohl der Geruch unangenehm, phosphorartig.

Die 3. Klasse *Fungi*, Pilze sind in mancher Beziehung den Algen ähnlich, haben aber kein Chlorophyll und müssen sich deshalb von anderen Pflanzen oder Tieren als Parasiten oder von organischen Verbindungen als Saprophyten (Fäulnisbewohner) ernähren.

**III. Archegoniatae.** Meist in Stamm und Blatt gegliedert, mit zwei verschiedenen Generationen (Generationswechsel).

1. Klasse, *Bryophyta*, *Moospflanzen*. Ohne echte Wurzeln und ohne Gefäßbündel (Adern), bei den niedersten Formen noch ein Thallus. Aus der Spore entwickelt sich eine Moospflanze. Diese trägt Archegonien und Antheridien. Die Archegonien sind die weiblichen (♀) Organe, sie haben die Gestalt einer Flasche oder eines Kochkolbens; im bauchigen Teil dieses Archegoniums bildet sich eine Zelle zur Eizelle aus. — Die Antheridien, die männlichen (♂) Organe, sind kugelige, ei- oder keulenförmige Körper, in deren Innern sich spiralig gewundene Samenfäden, Spermatozoiden bilden. Diese dringen in den Hals des Archegoniums ein und befruchten die Eizelle. Aus dieser Eizelle wird nun eine zweite Generation,

nämlich eine Mooskapsel mit einem Stiel, und diese Kapsel erzeugt auf ungeschlechtlichem Wege in ihrem Innern Sporen. — Die Moose zerfallen in Lebermoose und Laubmoose, zu letzteren gehören auch die Torfmoose, die Sphagnum-Arten.

2. Klasse: *Pteridophyta*, *Farnpflanzen* oder Gefäßkryptogamen. Mit echten Wurzeln und mit Gefäßbündeln. Aus der Spore entsteht nicht gleich eine neue Pflanze, sondern ein sog. Prothallium, d. h. ein Thallus, meist ein flaches, grünes, auf der Erde sitzendes Gebilde. Dieses Prothallium trägt die Geschlechtsorgane, Archegonien und Antheridien, welche im Prinzip ähnlich wie die der Moose gebaut sind. Aus der Eizelle des Archegoniums entsteht nach der Befruchtung die neue Pflanze.

Sie zerfallen in 3 Unterklassen: *Farnkräuter*, *Schachtelhalme* und *Bärlappgewächse*.

Uns interessiert besonders die Familie *Equisetaceae*, Schachtelhalme. Einzige Gattung *Equisetum* (Name bei Plinius, wörtlich Pferdehaar). Blätter klein, in Quirlen. Die unfruchtbaren Blätter der einzelnen Quirle miteinander zu einer Scheide verwachsen. Die fruchtbaren Blätter schildförmig, einem Hufnagel ähnlich, am Gipfel der Stengel einen *ährenförmigen* Sporangienstand (Blüte) bildend. Sporen grün, ihre Außenschicht in 2 spiralig aufgerollte hygroskopische Fäden (Schleudern) aufgeschlitzt. Unterirdischer Stengel, Rhizom (Wurzelstock oder Grundachse) sehr tiefliegend, meist schwarz, sehr verzweigt, seine Zweige bei manchen Arten zu rundlichen, rosenkranzförmig angeordneten Knollen angeschwollen. Oberirdischer Stengel hohl, mit Längsleisten und Rillen. Zellwände der Oberhaut oft stark mit *Kieselsäure* inkrustiert.



Fig. 1. *Equisetum arvense*.  
a Laubspros; b Quirl der Fruchtlähre;  
c ein Schildchen von oben, bei d von  
unten, bei e von der Seite mit den  
ausgebreiteten Sporenbehältern; f, g je  
eine Spore mit ihren Schleudern.  
(Nach Garcke.)

a) Ährentragende und unfruchtbare Stengel verschieden.

*Equisetum arvense* (Fig. 1), Acker-Schachtelhalm, Kannenkraut, Zinnkraut (dient zum Polieren, noch mehr wird *E. hiemale* dazu benutzt). Ährentragender Stengel bleich, unverzweigt, im ersten Frühjahr *vor* dem grünen erscheinend, nach der Sporenreife, die sehr bald erfolgt, absterbend.



Äste der grünen Stengel meist 4—5- (selten 3-)kantig, meist unverzweigt. Auf lehmigem Sandboden lästiges Unkraut.

*E. silvaticum*. Fruchtbare und unfruchtbare Stengel gleichzeitig, ersterer bräunlich, nach der Sporenreife grün, dann Seitenzweige erzeugend. Unfruchtbarer Stengel hellgrün, Äste sehr fein, bogenförmig herabhängend, 4—5 kantig. Zweige 3 kantig. Scheidenzähne lanzettlich, pfriemlich zugespitzt, oft mehrere verschmolzen, Ähre rotbraun. — *E. pratense*, grüngrün, Äste fein, horizontal oder überhängend, Scheidenzähne eiförmig, spitz. Ähre gelbbraun, Scheiden zierlich, bunt. — Nicht auf Wiesen, sondern in Wäldern. Sonst wie voriger.

b) Ährentragende und unfruchtbare Stengel gleichzeitig und gleichgestaltet.

*E. palustre*, Sumpf-Schachtelhalm, Katzensteert, Duwock. Stengel gelblich- oder grasgrün, gefurcht, meist ästig, Zentralhöhle eng, innere und äußere Partie des Stengels leicht trennbar. Scheiden grün, zylindrisch, locker anliegend, oberwärts trichterförmig, die obersten glockenförmig, Zähne 6—10, 3eckig lanzettlich, oberwärts schwarzbraun, breit weiß berandet. Äste meist 5 kantig, ihre Scheidenzähne 3eckig, aufrecht. Ähre dünn, schwarz. Sumpfwiesen. Sehr lästiges und dem Vieh, auch den Pferden, oft sehr schädliches Unkraut. Enthält (wie die andern Schachtelhalme) Aconitsäure und ein noch nicht näher untersuchtes Alkaloid. ♀. Mai, Juni. 30—60 cm. Von *E. arvense* nach Ascherson und Graebner meist durch die glänzend schwarzen Astscheiden leicht zu unterscheiden.

*E. limosum* (limosus schlammig), *E. heleócharis* (ἔλος Sumpf, χάρις Anmut, Zierde), Schlamm-Schachtelhalm. Weniger in Sümpfen als in Teichen und fließendem Wasser. Stengel hoch, 30—120 cm, ziemlich dick, einfach, seltener ästig, glatt, nur gestreift, nicht gefurcht, Zentralhöhle sehr weit, innere und äußere Partie des Stengels nicht trennbar. Scheiden aufrecht, anliegend, Zähne 15—18, schwarz, mit sehr schmalen weißem Rande. — Meist viel größer als voriger. Soll von Pferden gern gefressen werden.

*E. hiemale*, Winter-Schachtelhalm. Stengel 1- oder 2jährig, hart, rau, meist einfach. Scheiden eng, Zähne mit aufgesetzter, schnell abfallender häntiger Spitze. Feuchte, schattige Waldplätze, Brüche, nicht häufig. Die harten Stengel dienen des Kieselerdegehalts wegen als Poliermittel für Zinn, Holz etc., daher Zinnkraut, Scheuerkraut, Polierkraut.

Die Schachtelhalme lassen sich am besten durch Entwässerung und durch dichten Bestand guter Gräser oder Kleegeewächse etc. vertilgen.

### § 3. Hauptabteilung II. Phanerogamae, Blüten- oder Samenpflanzen. Erläuterung zu ihrer Einteilung in zwei Klassen.

Die Phanerogamen haben echte Wurzeln und einen beblätterten Stamm (Spross). Die Blüte der Phanerogamen ist aufzufassen als ein be-

grenzter Sproß, dessen obere Blätter die Geschlechtsorgane tragen. Spermatozoiden kommen nur bei sehr wenigen vor, meist werden Pollenkörner (d. h. Blütenstaub) in den männlichen Organen, den Staubbeuteln, erzeugt. In dem weiblichen Organ befinden sich nur bei den Gymnospermen noch mehrere Archegonien, sonst nur eins. Diese Archegonien sind aber sehr reduziert, haben z. B. keinen deutlichen Hals mehr. Aus der Eizelle des Archegoniums entwickelt sich eine neue Pflanze, wie bei den Farnpflanzen, aber diese tritt nicht wie dort gleich hervor, sondern bleibt vorläufig klein und liegt im Samen als *Embryo* verborgen. Dieser entwickelt sich gewöhnlich erst nach der Aussaat des Samens.

**I. Klasse: *Gymnospermae*, *Nachtsamige*.** Sie schliessen sich insofern näher an die Farne an, als sie noch Archegonien haben. Sie besitzen aber schon Fruchtblätter, indes diese schliessen sich nicht zu einem geschlossenen Behälter (Fruchtknoten) zusammen, sondern tragen an ihren Rändern oder an ihrer freien Oberfläche die jungen Samen, die in diesem jugendlichen Zustande Samenanlagen oder ovula genannt werden.

Hierzu gehören besonders die Familien der *Cycadaceae*, mit gefiederten Blättern, z. B. *Cycas revoluta*, deren Blätter man als sog. Palmenwedel auf die Särge legt, und die *Coniferae*, Zapfenträger oder Nadelhölzer, mit einfachen Blättern.

**II. Klasse: *Angiospermae*, *Bedecktsamige*,** d. h. Pflanzen mit Fruchtknoten. Diese Klasse ist in der Jetztzeit viel größer als die vorige. Die Fruchtblätter bilden einen geschlossenen Behälter, den *Fruchtknoten*, welcher die Samenanlagen einschließt und mit einer Narbe versehen ist, auf welche die Pollenkörner aus den Staubbeuteln gelangen. Sie zerfallen nach § 1 in die 2 Unterklassen *Monocotyledones* und *Dicotyledones*.

In den folgenden Kapiteln sollen von deren Pflanzen einige nach dem Maßstab ihrer kulturtechnischen Wichtigkeit herausgehoben werden, jedoch unter Wahrung der botanischen Übersicht.

### Erklärung der Abkürzungen und Zeichen.

A = Androeum, männl. Organ,	0 = Null, fehlend.
Staubgefäße.	S = Same.
B = Blatt.	St = Stengel, Halm.
Bl = Blume, Blüte.	Stbb = Staubblätter, Staubgefäße.
Blb = Blumenblatt.	⊙ = einjährig.
C = Corolla, Blumenkrone.	⊗ = zweijährig.
Fr = Frucht.	♂ = ausdauernd.
Frb = Fruchtblätter.	♂ = männlich.
Frk = Fruchtknoten.	♀ = weiblich.
G = Gynoeum, weibliches Organ,	♂♀ = zwitterig.
Fruchtknoten, Griffel, Narbe.	♂, ♀ = getrennten Geschlechts.
K = Kalyx, Kelch.	

## Kapitel I.

### Monokotyledonen, Einkeimblättrige.

#### § 4.

**Allgemeines.** Embryo mit *einem* Keimblatt. Blätter meist mit *parallelen* Adern oder Gefäßbündeln, Nerven. Stamm mit geschlossenen Gefäßbündeln, d. h. die Gefäßbündel haben kein Kambium, kein Bildungsgewebe und können sich daher nicht verdicken. In manchen Fällen treten aber neue Gefäßbündel hinzu und der Stamm wird dadurch dicker, z. B. bei Palmen. Falls die Blüten seitlich stehen, was meist zutrifft, so entstehen sie im Winkel eines Deckblattes (Deckspelze) und haben meist *ein* hintenstehendes Vorblatt (Vorspelze), nicht zwei, wie die Dikotyledonen. Daher fällt dann ein äußeres B der Bl nach vorn. Die Blüten zeigen meist 5 Quirle, von denen jeder 3zählig ist, d. h. 1) Kelch (K) 3blättrig, 2) Krone oder Corolla (C) 3blättrig, 3) u. 4) Staubgefäße oder Andröceum (A) in 2 übereinanderstehenden Quirlen zu je 3, 5) Fruchtknoten oder Gynöceum, 3blättrig. Man kann dies durch folgende Formel, Blütenformel, ausdrücken:

$$\text{K } 3, \text{ C } 3, \text{ A } 3 + 3, \text{ G } 3.$$

Sind die Fruchtblätter verwachsen zu einer Kapsel oder dergl., so setzt man die betr. Zahl in Klammern, z. B. G (3). Ist der Fruchtknoten oberständig, wie gewöhnlich, so setzt man einen Strich darunter G (3); ist er unterständig, so schreibt man G (3). Kelch und Kronenblätter sind bei den Monokotyledonen oft gleich gefärbt, der Kelch ist z. B. oft nicht grün, sondern bunt, so scheint es dann, als wenn die Blüten 6 Blumenblätter hätten, z. B. die Liliaceen; oder beide Teile, Kelch und Krone, sind grünlich, wie z. B. bei den Juncaceen, Binsen. Wenn man zwischen Kelch und Blumenkrone nicht unterscheiden kann oder nur ein einziger Kreis vorhanden ist, spricht man von einem *Perigon* oder *Perianth* oder einer *Blütenhülle*.

**§ 5. Übersicht** der hier in Betracht kommenden *Monocotyledones* nach Engler:

A. Vorherrschende Unbeständigkeit in der Zahl der Blütenteile:

1. Reihe: *Pandanäles* (wörtlich Schraubenbaumblütige).

Familie 1. *Typhaceae*, Rohrkolbengewächse.

„ 2. *Sparganiaceae*, Igelkolbengewächse.

2. Reihe: *Helóbiae* (wörtlich: im Sumpf lebende).Familie 3. *Potamogetonáceae*, Laichkrautgewächse." 4. *Juncagináceae*." 5. *Alismáceae*, Froschlöffelgewächse." 6. *Butomáceae*, Blumenbinsen." 7. *Hydrocharitáceae*, Froschbifsgewächse.3. Reihe: *Glumiflorae*, Spelzblütige.Familie 8. *Gramíneae*, *Grámina*, echte oder süße Gräser." 9. *Cyperáceae*, Riedgräser, Sauergräser.4. Reihe: *Spathiflorae*, Scheidenblütige.Familie 10. *Aráceae*, Arongewächse." 11. *Lemnáceae*, Wasserlinsen.

## B. Typisch 5 Quirle in der Bl, jeder meist 3 zählig:

5. Reihe: *Liliiflorae*, Lilienblütige.Familie 12. *Juncáceae*, Binsengewächse." 13. *Liliáceae*, Liliengewächse." 14. *Iridáceae*, Schwertliliengewächse.6. Reihe: *Microspérmae*, Kleinsamige.Familie 15. *Orchidáceae*, Orchideen, Knabenkrautgewächse.

## § 6.

**Erste Reihe: Pandanales** (Pandanus, Schraubenbaum, in den Tropen). Blüten nackt oder mit Perigon, ♂ und ♀ getrennt. Same mit Nährgewebe.

**Fam. 1. Typhaceae**, Rohrkolbengewächse. Blüten nackt. ♂ mit 2—5 Staubblättern, ♀ 1 Fruchtb auf zylindrischer, behaarter Achse. Kräuter mit meist dickem kriechendem Rhizom (Wurzelstock), 2 zeiligen, linealischen Blättern und zylindrischen, unten ♀, oben ♂, kolbigen Blütenständen.

*Typha*, Rohrkolben (*τύφη* Pflanzennamen bei Theophrastos etc.). Blätter 2 zeilig. Windblüher, protogynisch, d. h. Narben eher entwickelt als die Staubgefäße.

*Typha latifolia*, breitblättriger Rohrkolben (Lieschkolben, Bumskeule, Schmackedutschke). Blätter meist blaugrün, breit-linealisch, Kolben dick, schwarz, ♂ und ♀ Teil dicht beisammen. ♀. 1,5—2,5 m. Juli, August. An Ufern von Seen und Flüssen, in seichten Gewässern und Wiesenmooren.

*Typha angustifolia*, schmalblättriger Rohrkolben (Fig. 2). B *schmal-linealisch*, ♂ Ähre von der ♀ meist 2—4 mm entfernt, ♀ Bl in der Achsel eines Deckblattes. Kolben weit *dünn*er, braun. ♀. 1—3 m. Juli, August. An Ufern, in Teichen und Sümpfen, auch in Heidemooren (Hochmooren).

**Fam. 2. Sparganiaceae**, Igelkolbengewächse, Bl ♂, ♀, mit häutigem Perigon. 4. Sumpf- oder Wasserpflanzen, Ausläufer treibend. B breit, grasartig. Fr eine Steinfrucht. Samen mit mehligem Nährgewebe. Protogynische Windblüher.

*Sparganium* (Pflanzenname bei Dioskorides), Igelkolben. Laubblätter aufrecht oder im Wasser flutend. Bl in kugeligen Köpfen, untere Köpfe ♀, obere ♂. *S. ramosum*, Ästiger I. Blütenstand rispig verzweigt. *S. simplex* (Fig. 3), Blütenstand einfach; var. *longissimum*, flutende Blätter oft über 1 m lang, trocken meist sehr zerbrechlich. Beide *Sparganium*-Arten in Teichen, Seen und Wasserläufen, seltener in Sümpfen. Zeigen gutes Rieselwasser an.




Fig. 2. *Typha angustifolia*.  
a männliche, b weibliche Blüte, bei c  
längs durchschnitten, links mit einem  
Stützblättchen.  
(Nach Garcke.)




Fig. 3. *Sparganium simplex*.  
a männl., c weibl. Blütenstand; b Staub-  
gefäß mit einem Schüppchen; d weibl.  
Blüte; e Früchtchen mit, bei f ohne  
Hülle, bei g querdurchschnitten.  
(Nach Garcke.)

## § 7.

**Zweite Reihe: Helobiæ** (ἑλος Sumpf, βίωω ich lebe), auch *Fluviales* genannt. Bl meist cyklisch, d. h. in deutlich voneinander getrennten Quirlen: 1. Quirl Kelch, 2. Quirl Krone etc. Nährgewebe im Samen meist 0.

### 1. Unterreihe.

Bl unterständig, d. h. unter dem Frk, was überhaupt bei den meisten höheren Pflanzenfamilien der Fall. Meist ohne Hülle oder mit Perigon.

**Fam. 3. Potamogetonaceae**, Laichkrautgewächse. Bl ♂ oder ♀, mit 1—4 zähligen Quirlen. Untergetauchte oder schwimmende Wasserpflanzen.

**Blütenstand eine Ähre.** Bl ohne Perigon.

I. Ähre mit *flach* gedrückter Achse, zur Blütezeit in der Scheide des obersten Laubblattes. *Zostera marina*, Seegras (ζωστήρ Gürtel). Ganz untergetauchte Meeresbewohner, Pollen fadenförmig.

II. Ähre mit *stielrunder* Achse. Hierher die große Gattung *Potamogeton* (ποταμός Fluß, γείτων Nachbar). Stbb 4, mit *perigonartigen* rückenständigen Anhängseln des Mittelbandes. — Flutende Wassergewächse, meist *gutes Rieselwasser* anzeigend, in der Regel untergetaucht oder die oberen Blätter schwimmend. *P. natans*, schwimmendes Laichkraut (Fig. 4). Stengel 60—150 cm lang, untergetaucht. Blätter lanzettlich, schwimmende oval oder länglich, oft bräunlich, am Grunde meist schwach herzförmig, langgestielt. Teiche, Seen, Gräben. *P. lucens*, spiegelndes L. B oval, alle untergetaucht, lebhaft grün, glänzend, kurzgestielt. *P. crispus*, krauses L. Blätter sitzend, lineal-länglich, wellig, kraus. *P. pectinatus*, kammförmiges. B grasartig, alle untergetaucht. St  $\frac{1}{3}$ —3 m. Dauert durch kurze Ausläufer aus, deren Endglieder knollig anschwellen. Diese Ausläufer entstehen sowohl an den unterirdischen wie an den im Wasser befindlichen Zweigen. *P. perfoliatus*. B stengelumfassend, eiförmig, alle untergetaucht. Blüht, wie die meisten Arten, Juni—August.



Fig. 4. *Potamogeton natans*.  
a Blüte, bei b von oben gesehen;  
c Fruchtknoten; d die Früchtchen, bei  
e eins gesondert.  
(Nach Garcke.)

**Fam. 4. Juncaginaceae** (Juncago bei Tournefort der Name für Triglochin). Bl bei uns ♀. P 3 + 3, A 3 + 3, G 3 + 3, auch 4—1gliedrig, in Ähren.

*Triglochin*, Dreizackbinse (τρεις drei, γλῶχis Spitze). Perigon abfallend, Fruchtblätter sich von einem stehen bleibenden Mittelsäulchen ablösend. Blätter grundständig, schmal, linealisch. *T. maritima*, Meeresstrand-Dreizack. Traube dicht, Fr eiförmig, unter der Narbe eingeschnürt, alle 6 Früchtchen ausgebildet. H. 15—75 cm. Juni—Aug. Moorbiesen

besonders auf *Salzboden*, an der See häufig. — *T. palustris*. Traube locker, Fr linealisch-keulenförmig, am Grunde verschmälert, nur 3 Früchtchen ausgebildet. Moorbiesen, Ufer.  $\varnothing$ . 15—60 cm. Juni—Sept.

*Scheuchzeria* (nach Joh. Jak. Scheuchzer, Stadtphysikus zu Zürich um 1800, und nach seinem Bruder Johann, einem tüchtigen Gräserkenner). Perigon bleibend. Frb nur am Grunde verbunden, bei der Reife abstehehend. *S. palustris*; Moorstorfsümpfe. Fr gelbgrün, groß. Juni-Juli.

## 2. Unterreihe.

Bl unterständig, meist mit Kelch und Krone. Samenanlagen an der Bauchnaht.



Fig. 5. *Alisma Plantago*.  
a Blüte, bei b Längsschnitt; c die im Kreise vereinigten Trockenfrüchtchen (Samen).  
(Nach Garcke.)




Fig. 6. *Sagittaria sagittifolia*.  
a Fruchtknoten; b reifes Früchtchen; c Fruchtboden mit vielen Früchtchen.  
(Nach Garcke.)

**Fam. 5. Alismaceae.** K 3, C 3, A 6— $\infty$ , G 6— $\infty$ , jedes Frb von dem anderen getrennt (wie bei den Ranunculaceae).

*Alisma* (Name einer Wasserpflanze bei Dioskorides). Wurzelstock (Grundachse) senkrecht, kurz, mit vielen Wurzeln. Blätter in grundständiger Rosette. Blütenachse flach. Stbb 6. — *A. Plantago*, gemeiner Froschlöffel (Fig. 5). Wurzelstock knollig-verdickt. Schaft aufrecht, bis 1 m hoch. Blätter langgestielt, eiförmig oder lanzettlich, einem Wegerichblatt (*Plantago*) ähnlich, die untersten aber, bei jungen Pflanzen alle,

langflutend, linealisch. Rispe sehr groß, pyramidenförmig. Blumenblätter weiß oder rötlich. Früchtchen *zahlreich*. ♀. Ufer, Sümpfe, Gräben. Juni—Herbst. Enthält giftigen, weißen Milchsafte.

*Sagittaria*, Pfeilkraut (sagitta Pfeil, wegen der Blattform). Blütenachse gewölbt. Stbb und Frb zahlreich. Früchtchen geflügelt und geschnäbelt. Laubblätter in grundständiger Rosette, meist pfeilförmig, mit langem Stiel. Blütenstand endständig, öfter in der Achsel des obersten Laubblattes ein seitenständiger. In den Achseln der andern Blätter bilden sich öfter verlängerte *Ausläufer*, deren Spitze zu einer *eichelförmigen* Knolle anschwillt. Diese wird im Herbst frei und treibt im Frühjahr abermals einen Ausläufer, an dessen Spitze sich eine neue Rosette bildet. Bl gestielt, in entfernten meist 3zähligen Quirlen.

*S. sagittifolia*, gemeines Pfeilkraut (Fig. 6). ♀. 30—90 cm hoch, in tiefem Wasser noch höher. Blb weiß mit purpurnem Nagel. Stehende und langsam fließende Gewässer. In tiefen, besonders fließenden Gewässern bilden sich die Pfeilblätter gar nicht aus, sondern nur linealisch flutende, gitterartig geaderte Blätter. Die bis walnufsgroßen Knollen werden mitunter (nicht bei uns) gegessen; als „Bruch-Eicheln“ finden sie sich nicht selten in den Kröpfen der Enten (Ascherson und Graebner, Flora des nordostdeutschen Flachlandes, S. 68).

### 3. Unterreihe.

Bl unter- oder oberständig. Samenanlagen an der *Innenfläche* der Fruchtblätter.

**Fam. 6. Butomaceae.** Bl ♀, 3gliedrig. Bei unserer Pflanze nach der Formel  $K\ 3, C\ 3, A\ 6 + 3, G\ 6$ . Fruchtblätter *getrennt*, mit vielen Samenanlagen an der Innenfläche. Balgfrüchte, d. h. auf einer Längsseite, hier innen, aufspringend. Blütenstand meist doldenähnlich.

*Butomus* (Name einer Sumpfpflanze bei Aristophanes). *B. umbellatus*, Blumenbinse, Schwanenblume, Wasserliesch. Wurzelstock fast horizontal, unbegrenzt. Laubblätter zahlreich in grundständiger Rosette, linealisch, 3kantig, steif aufrecht. Schaft trägt eine Scheindolde (aus doldenförmigen Schraubeln). Blütenstiele ungleich lang, Perigonblätter *rosenrot*. Stehende und langsam fließende Gewässer. ♀. 90—150 cm. Juli, August.

**Fam. 7. Hydrocharitaceae.** Bl meist ♂, ♀ mit K und C, 3gliedrig.  $K\ 3, C\ 3, A\ 3 + (3 + 3 + 3 + 3), G\ (3 + \dots)$  oder 2—15. Die inneren oder äußeren Stbb bisweilen in Staminodien umgewandelt. Frb verwachsen, unterständig, mit wandständigen Samenträgern und zahlreichen Samenanlagen. Fr 1fährig, etwas fleischig, unregelmäßig zerreißend.

**Unterfamilie 1. Vallnerioidae.** ♂ Bl sich vor der Entfaltung ablösend, entfaltet auf dem Wasser schwimmend. Frb 3. Blätter sitzend (bei unserer Pflanze in Quirlen). Hierher u. a. *Vallisneria spiralis*



aus Südeuropa, mit spiralig gewundenem, langem Stiele der ♀ Bl, bei uns in Aquarien, und die kalkhaltigen Boden liebende, nachstehend näher beschriebene

*Elodea*, richtiger *Helódea* (ἑλώδης sumpfig) *canadensis*, Wasserpest (Fig. 7). ♂. St 30—90 cm lang, flutend oft 1½ m lang. Blätter zu 3—4, länglich bis lineal-lanzettlich, spitz, klein gesägt. Bei uns nur die ♀ Pflanze mit 6blättrigem Perigon, 3 Staminodien und 3 Narben. In Flüssen Nordamerikas, bei uns aus dem botan. Garten in Berlin an 2 Stellen verpflanzt, Potsdam: Sanssouci seit 1859, Eberswalde beim alten Wasserfall seit 1860, von hier aus überall hin verbreitet. Wurde zuerst



Fig. 7. *Elodea canadensis*.

a Stück eines Blattes; b Blüte;  
c Fruchtknoten; d dreisamige  
Schlauchfrucht, geöffnet.

(Nach Garcke.)

in Europa 1836 in einem Teiche zu Warrington in Irland, 1841 in Schottland, 1847 im mittleren England bemerkt. Eine Zeit lang allgemein gefürchtet, weil sie Schifffahrt und Fischfang hindert, sowie den Abfluß des Wassers hemmt, gilt sie jetzt meist als weniger schädlich. Sie bietet den Fischen etc. gute Laichplätze. Da nur ♀ Pflanzen bei uns vorhanden sind, vermehrt sie sich nur auf vegetativem Wege, durch Seitensprosse, und überwintert durch Winterknospen, d. h. kurze, dicht beblätterte Sprosse.

#### Unterfamilie 2. *Stratiotoideae*.

Laubblätter wechselständig. ♂ Bl sich nicht ablösend. Frb 6—15.

*Stratiotes aloides*, Wasseraloe, aloeblättrige Krebschere (στρατιώτης, ägypt. Wasserpflanze bei Dioskorides). Bl 2häusig, d. h. ♂ und ♀ auf verschiedenen Pflanzen. Stamm mit Ausläufern. Blätter starr, breit lineal, zugespitzt, unten 3kantig, oben flach, stachelig gesägt, zu

einer dichten Rosette vereinigt, größtenteils untergetaucht. Blütenstände gestielt, ihr Stiel zusammengedrückt, Scheide 2blättrig, derb, bleibend, platt, daher Krebschere. Bl weiß, über dem Wasser. Samen auch in diluvialen Ablagerungen. Stehende Gewässer, tiefe Sümpfe. Bei uns ♀ Exemplare seltener. ♂. 15—50 cm. Mai—August. Schweinefutter.

*Hydrocharis* (ὕδωρ Wasser, χάρις Freude, Zierde), Froschbifs. 2häusig, ♂ mit 12 Stbb, ♀ mit 6 Staminodien. Stamm mit Ausläufern. Honigblumen.

*H. Morsus ranae*, Gemeiner Froschbifs. Blätter schwimmend, gestielt, kreisrund, am Grunde tief herzförmig, mit 2 großen, durchscheinenden,

innerhalb des Blattstiels übereinandergreifenden Anhängen. Bl weiß. 4. Stehende Gewässer. Juli, August.

### § 8.

**Dritte Reihe: Glumiflorae** (Spelzblütige).

**Fam. 8. Gramineae oder Gramina**, echte oder Süßgräser. Bl mit 1 Deck- und 1 Vorspelze.

**Fam. 9. Cyperaceae**, Schein-, Halb- oder Sauergräser. Bl meist nur mit 1 Deckspelze, ohne Vorspelze.

Diese beiden Familien werden ihrer Wichtigkeit wegen in den Kapiteln III bis V noch besonders besprochen werden. (S. 258, 304.)

### § 9.

**Vierte Reihe: Spathiflorae.** Blüten in Scheiden.

**Fam. 10. Araceae** (Aroideae). Blüten sehr klein, in Kolben.

*Acorus* (Name einer Pflanze mit aromatischen Wurzeln bei Theophrastos). Blütenhülle 6blättrig, bleibend. Frk 3fächerig. Bl an einem scheinbar seitenständigen Kolben. Blätter schwertförmig, d. h. mit der schmalen Kante gegen den Himmel gerichtet (wie bei Iris). Scheinachse (Wurzelstock) dick, kriechend.

*A. Calamus* (= gewürztes Schilfrohr; calamus Rohr, Schilf), Kalmus. B linealisch, zugespitzt, am Rande wellig, am Grunde wie der Blütenstiel rötlich. Schaft blattartig, zusammengedrückt, mit einer scharfen und einer rinnenförmigen Kante, in welcher sich ein walzenförmiger Kolben befindet. Hüllblatt (Spatha) den Laubblättern ähnlich, grün, vielmal länger als der gelbliche Kolben. Ufer von Seen und Flüssen. Ganze Pflanze aromatisch riechend. Bei uns nebst den Birken Symbol des Pfingstfestes. Blüht bei uns selten und bringt nie Früchte.

*Calla* (Pflanzenname bei Plinius). Hüllblatt oder Blütenscheide bleibend, flach, innen weiß. Stbb meist 6. Frk 1fächerig. Scheinachse kriechend, grün. B 2zeilig. Bl endständig.

*C. palustris*, Sumpf-Schweinekraut, Schweineuhr, (Schweineohr) (Fig. 8). Laubblätter herzförmig, langgestielt. Kolben zylindrisch. Beeren korallenrot. Waldsümpfe. 15—50 cm. Mai—Juli. Wurzelstock frisch scharf giftig.

Hierher auch *Arum maculatum*, gefleckter Aron. Schattige Laubwälder. Giftig, besonders die Knollen sehr scharf.

**Fam. 11. Lemnaceae**, Wasserlinsen. Schwimmende Pflanzen mit niedergedrücktem, oft linsenförmigem, thallusartigem St, ohne Blätter. Bl 1häusig. 2 oder 1 ♂ Bl, nur aus 1 Stbb bestehend und 1 ♀, nur aus 1 Frk bestehend, finden sich zusammengestellt in einer seitlichen Ausbuchtung des Thallus.

*Lemna* (Name einer Wasserpflanze bei Theophrastos), Wasserlinse, Entengrütze. Thallus 2zeilig verzweigt. Wurzeln vorhanden. ♀. *L. minor*, kl. W. Thallus rundlich verkehrt eiförmig, mit einer Wurzel. *L. gibba*, buckelige W. Thallus unterseits kugelförmig gewölbt, sonst wie vorige. *L. polyrrhiza*, vielwurzelige W. Thallus rundlich verkehrt eiförmig, dick, beiderseits flach, mit zahlreichen Wurzeln. *L. trisulca*, dreifurchige W. Thallus länglich-lanzettlich, vorn ausgeschweift-gezähnt, dünn, zuletzt langgestielt, meist mehrere Spross-Generationen zusammenhängend, hellgrün oder rötlich. *L. arrhiza* (*Wolffia arrhiza*). Thallus sehr klein, ohne Wurzeln. Fast alle, mit Ausnahme der letzteren, häufig, namentlich *L. minor*. Teiche und Seen ganz überziehend. Zeigen meist *gutes Rieselwasser* an.



Fig. 8. *Calla palustris*.  
a Blütenkolben, längs durchschnitten;  
b Blüte mit halbgeöffnetem Fruchtknoten;  
c Fruchtkolben.  
(Nach Garcke.)

*Anmerkung:* Die *Wasserblüte*, welche zu gewissen Zeiten das Wasser oft ganz grün färbt, wird durch mehrere blaugrüne Algenarten gebildet, namentlich *Anabaena flos aquae* und *Aphanizomenon flos aquae*.

## § 10.

**Fünfte Reihe: Liliiflorae.** Diese zeigen meist den typischen Charakter der Monokotyledonenblüte: P 3 + 3, A 3 + 3, G (3). Die beiden Perigonkreise meist gleichartig gefärbt, korollinisch. (Eine Ausnahme machen die Juncaceae.) Same mit mehligem, knorpeligem oder fleischigem Nährgewebe.

**Fam. 12. Juncaceae, Binsen.** Perigon 3 + 3, nicht korollinisch, sondern spelzenartig. Stbb 6. Laubblätter meist schmal oder stielrund, dann einem St ähnlich. Blüten einzeln oder in Köpfchen, die wieder zusammengesetzte Blütenstände (Spirren)

bilden. Windblüher; dichogam, d. h. ♂ und ♀ Geschlechtsorgane nicht gleichzeitig entwickelt.

### Übersicht der Gattungen.

Kapsel 3fächerig, Fächer mehrsamig, Blätter meist pfriemenförmig, kahl (Binse) . . . . . *Juncus*.  
Kapsel 1fächerig, 3samig, Blätter flach, am Rande meist behaart *Luzula*.

*Juncus* (Name bei Vergilius), Binse. Die unterirdischen Scheinachsen (Wurzelstöcke) bestehen aus den unteren Gliedern der meist Blüten tragenden St. Diese St tragen am Grunde eine Anzahl an ihren Rändern

sich deckender Schuppenblätter. Die Hauptknospe steht meist in der Achsel des 2. Blattes.

A. St vom Grunde bis zum Blütenstande unbeblättert. Trag- oder Hüllblatt des untersten Spirrenastes aufrecht, stielrund, scheinbar den St fortsetzend, daher die *Spirre scheinbar seitenständig*. — Unfruchtbarer St kurz, oberhalb der Schuppenblätter nur ein sehr langes, dem Hüllblatt ähnliches stielrundes Laubblatt tragend, welches früher für einen unfruchtbaren St gehalten wurde. (Ascherson u. Graebner, Flora etc. S. 172.)

*J. maritimus*, Meerstrands-Binse. Rasenbildend. Grundständige Blätter stielrund, stechend, mit brauner Scheide. Tragblatt des untersten Spirrenastes wenig länger als die Spirre. Same mit Anhängsel. 30—100 cm. Juli, August. Wiesen an der Ostsee, östl. bis Usedom; ostfries. Inseln.

*J. conglomeratus* (*J. Leersii*), geknäuelte Binse. Stengel fein gestreift, grasgrün, mit zusammenhängendem Mark. Tragblatt des untersten Spirrenastes viel länger als die Spirre. Samen ohne Anhängsel. Stbb nur 3. Graugrün. Spirre meist gedrängt. Kapsel verkehrt eiförmig, gestutzt, Griffelrest auf einer kleinen Erhöhung. Perigon und Kapsel meist braun. Feuchte Triften, Gräben. 30—60 cm. ♀. Wuchs rasenförmig. Scheiden gelbbraun.

*J. effusus*, flatterige Binse. St weniger gestreift. Spirre meist locker. Kapsel an der Spitze eingedrückt, Griffelrest in der Vertiefung. Perigon und Kapsel meist gelbgrün. Scheiden rotbraun. Sonst wie vorige. Beide allbekannte Arten werden auch vereinigt als *J. communis*.

B. Spirre endständig, meist viel länger als ihre Hüllblätter. Unfruchtbarer St, wenn vorhanden, mehrere Laubblätter tragend.

#### I. Laubblätter nicht fächerig-röhrig.

a) Ausdauernd. 1. Wuchs dicht rasenförmig. *J. squarrosus*, sperrige Binse. Halm blattlos. Torfige Orte. 30 cm. Juli, August.

2. Scheinachse kriechend. *J. compressus*, Halm etwas zusammengedrückt, in der Mitte mit 1 rinnigen B. Nasse Triften. ♀. 15—30 cm. Juli, August. — *J. Gerardi*, ähnlich, auf Salzboden.

b) Einjährig. *J. bufonius*, Kröten-Binse. St mit 1—2 Laubblättern. Spirre wenigästig. Äste aufrecht. Blüten entfernt. Kapsel länglich. Feuchter Sand und Schlamm, gemein. 3—30 cm. Juni—Herbst.

#### II. Laubblätter quersächerig-röhrig.

(Getrocknet mit vorspringenden Querwänden; auch an den frischen rinnigen, fast stielrunden Blättern spürt man die Querwände, wenn man sie durch die Finger zieht.)

Hierher besonders *J. lampocarpus*, glanzfrüchtige Binse. Stengelblätter 2—4. Spirrenäste abstehend. Äußere Perigonblätter spitz, innere stumpf.

Scheinachse kriechend. Feuchte Wiesen, Triften, gemein. ♀. 20—60 cm. Juli, August.

Alle Binsen sind schlechte, harte Futterpflanzen. Sie sind nicht zu verwechseln mit den Simsen, *Scirpus*, welche zu den Cyperaceen gehören und *keine Kapseln* haben. (Diese s. S. 305.)

*Luzula* (zuerst bei Anguillara, herba *Luzulae*) Hainbinse, Hainsimse, Marbel. Habitus meist grasähnlich. Stengel beblättert. Blätter am Rande lang bewimpert. Blüten in Spirren, deren letzte Verzweigung oft köpfchenartig. Von Gräsern durch die Bl und Kapseln unterschieden.

*L. campestris*, Feld-, Hainsimse, gemeine Marbel, Hasenbrot (Fig. 9). Blüten in kopfförmigen Ähren, die eine Spirre bilden. Lockerrasig mit kurzen Ausläufern. Blätter linealisch, am Rande schwach behaart, zuletzt kahl. Ähren 2—5, eiförmig, doldig, die seitlichen Köpfchen langgestielt, zuletzt überhängend. Perigonblätter fast gleich lang, dunkelbraun. Samen mit großem Anhängsel. ♀. Triften, Heiden, Wälder, trockene Grasplätze, meist gemein. März, April. 10—25 cm.



Fig. 9. *Luzula campestris*.  
a offene Blüte; b Fruchtknoten mit dem Griffel; c Fruchtsproß; d unreife, e aufgesprungene, reife Frucht.  
(Nach Garcke.)

*Var. multiflora*. Dichtrasig. Stengelhöhe 30—45 cm. Perigon hellbraun.

Die *Luzula*-Arten gelten als schlechte Futterpflanzen (ob mit Recht?).

**Fam. 13. Liliaceae.** Meist Zwiebel-, seltener Knollengewächse. Bl meist regelmäsig. Perigon meist blumenblattartig, unterständig. Stbb 6. Frk 3 fächerig.

*Allium*, Lauch. Einige Arten machen sich durch ihre vielen Brutzwiebeln auf Grasplätzen lästig. Solche blühen fast nie, sondern treiben nur

röhrenförmige Blätter. Viel gefährlicher ist für Wiesen:

*Colchicum autumnale* (*Κολχικόν*, Name eines giftigen Zwiebelgewächses bei Dioskorides), Herbstzeitlose. Die schöne, glockig-trichterförmige, fleischrote Blume erscheint von Aug.—Oktb. in Mittel- und Süddeutschland oft zu Tausenden auf den Wiesen. Ihre lange Röhre sitzt einer Furche der flachen Seite der großen braunhäutigen Knolle an, unterhalb derselben kleine unentwickelte Blättchen. Erst im nächsten Frühjahr wachsen diese Laubblätter aus, das Stengelglied zwischen dem 2. und 3. Laubblatt streckt

sich und hebt die Kapsel über den Boden. Das Stengelglied zwischen dem 1. und 2. Laubblatt wird dann zur neuen Knolle, welche am Grunde die Hauptknospe trägt, die im nächsten Herbste blüht (Filius ante patrem der alten Botaniker, weil die Bl vor den Blättern erscheint). 4. *Giftig*, besonders die Samen. Man vertilgt die Herbstzeitlose einmal durch Sammeln der Blüten, zweitens durch Ausheben der tiefliegenden Knollen mittelst geeigneter Werkzeuge oder durch Zerstoßen der Knollen mit einer spitzen Eisenstange, die man in die Erde schlägt. Die Vertilgung ist leider sehr schwierig. — Zum Ausgraben der Herbstzeitlose werden die Klauenstecher von J. Heinemann Söhne, Langenau bei Creuzthal (Westfalen) und G. Mödig Söhne, Marchegg, Nieder-Österreich, empfohlen.

**Fam. 14. Iridaceae**, so wie die Liliaceae, aber der 2. Staubblattkreis abortiert und Frk unterständig, also  $P\ 3 + 3$ ,  $A\ 3 + 0$ ,  $G\ (\bar{3})$ .

*Iris* (Regenbogen), Schwertlilie. Wurzelstock verzweigt, beblätterte Blütenstengel und kurze Triebe mit Laubblättern treibend. Blätter 2zeilig, schwertförmig (reitend), d. h. in der Medianebene ausgebreitet, mit der schmalen Kante gen Himmel schauend. Blüten 2—mehrere, von einem Tragblatt umschlossen. Griffeläste *blumenblattartig*, mit ihrer konkaven Außenfläche die vor ihnen stehenden Stbb schützend. Narbenpapillen an der Unterlippe der an der Spitze 2lappigen Narbe. Hummelblumen.

*Iris pseudacorus*, ( $\psi\epsilon\upsilon\delta\omicron\varsigma$  falsch,  $\acute{\alpha}\chi\omicron\omicron\varsigma$  Kalmus), Schellblume. 4. Blätter breit. Perigon hellgelb, äußere Abschnitte ohne Bart, in der Mitte am Grunde goldgelb. Stehende Gewässer. — *I. sibirica*. Laubblätter schmal. Perigon blau. Feuchte Wiesen und Waldgebüsche, zerstreut.

## § 11.

**Sechste Reihe: Microspermae.** Kleinsamige.

**Fam. 15. Orchidaceae.** Blüten zygomorph oder dorsiventral, d. h. nur durch eine Medianebene in 2 symmetrische Hälften teilbar.  $P\ 3 + 3$ ,  $A\ 1$  (oder 2)  $G\ (\bar{3})$ . Blüten meist schön gefärbt; durch Drehung des unterständigen Frk kommt ein größeres Blatt des inneren Perigonkreises nach unten und bildet die oft gespornte Lippe (Labellum). Stbb meist nur 1 (bei *Cypripedium* 2), auf einer Verlängerung der hohlen Blütenachse, des sogenannten Gynostemiums, oder Griffelsäule eingefügt. Auf Wiesen kommen besonders vor:

*Orchis* (bei Dioskorides Name einer Pflanze mit Knollen von der Form eines Hoden [ $\delta\omicron\omicron\chi\iota\varsigma$ ]); *O. latifolia*, breitblättriges Knabenkraut. Lippe gespornt. Knollen *handförmig* geteilt. St *hohl*. B meist 5 (4—6), länglich-eiförmig, meist schwarzbraun gefleckt, das oberste oft den Grund der Ähre überragend. Blütenblätter alle, außer der Lippe, helmartig zu-

sammengeneigt. Lilapurpurn. Feuchte Wiesen, gemein. 4. Mai, Juni. — *O. maculata*. Ähnlich, aber St *voll*. B 6—9, die unteren länglich, das oberste meist weit unter der Ähre. Trocknere Wiesen. Juni, anfangs Juli. — *O. incarnata*. B an der Spitze kappenförmig zusammengezogen. Bl hell-, seltener dunkelpurpurn, sonst wie *latifolia*. — *O. militaris*. Knolle *ungeteilt*. Helm außen *weislich-rosa*. Lippe mit plötzlich vorn verbreitertem Mittelabschnitt. Fruchtbare, nicht zu feuchte Wiesen mit *Mergelgrund*, also *Kalk* anzeigend. Die schönste Art. Noch viele andere Orchideen zieren unsere Wiesen, doch sind sie als Futter ohne Bedeutung.

*Kalk* anzeigend sind noch: *Orchis purpurea*, Laubwälder; *Ophrys muscifera*, Wiesen; *Ophrys fuciflora*, Hügel; *Anacamptis pyramidalis*, Bergabhänge, Wiesen; *Cephalanthéra grandiflora*, Laubwälder; *Epipáctis microphylla*, Bergwälder; *Cypripédium* (*Cypripedilum*) *Calcéolus*, Frauenschuh, Laubwälder; alles mehr oder weniger seltene Arten.

---

## Kapitel II.

### Dikotyledonen, Zweikeimblättrige.

#### § 12.

**Allgemeines.** Zwei Keimblätter. Laubblätter meist *netzaderig*. Samen oft mit großem Nährgewebe und kleinem Embryo (z. B. Doldengewächse, Umbelliferen), oder mit großem Embryo und fast fehlendem Nährgewebe (z. B. Hülsenfrüchte und Kompositen). Die Blüten stehen bei seitlicher Stellung in der Achsel eines Deckblattes (*bractea*, kurz als *b* bezeichnet), haben aber nicht 1 Vorblatt wie die Monokotyledonen, sondern 2 ( $\alpha$  und  $\beta$ ). Sowohl Deckblatt wie Vorblätter können aber fehlen. Blüten meist nach der 5-Zahl oder 2- oder 4-Zahl. Blütenformel also z. B.  $K\ 5, C\ 5, A\ 5, G\ 5$ . Die *Dikotyledonen* lassen sich nicht so gut nach einzelnen Merkmalen einteilen wie die Monokotyledonen. Sie sind auch viel zahlreicher an Arten.

Am einfachsten ist die frühere Einteilung in:

*Apetalae*, Blumenblätter fehlend,

*Polypetalae*, Blumenblätter frei,<sup>1)</sup>

*Sympetalae*, Blumenblätter verwachsen.

Erstere beiden faßt Engler als *Archichlamydeae* (Ersthüllige) zusammen. Wir geben zunächst eine Übersicht über die für uns wichtigsten Reihen und Familien.

#### § 13.

### Übersicht der hier in Betracht kommenden Dikotyledonen, nach Engler.

**I. Unterklasse: *Archichlamydeae*** (*Apetalae* und *Polypetalae*). Ohne Perigon, oder mit Perigon, oder mit Kelch und Blumenkrone, im letzteren Falle die Blumenblätter frei, nicht verwachsen.

7. Reihe: *Polygonales*.

Familie 16. *Polygonaceae*, Knöterichgewächse.

8. Reihe: *Centrospermae*, Zentralsamige.

Familie 17. *Chenopodiaceae*, Gänsefuß- (Melden-) Gewächse.

„ 18. *Amarantaceae*.

„ 19. *Portulacaceae*, Portulakgewächse.

„ 20. *Caryophyllaceae*, Nelkengewächse.

<sup>1)</sup> Mitunter fehlen auch den Poly- und Sympetalae die Blumenblätter.



9. Reihe: *Ranáles*.  
 Familie 21. *Nymphaeaceae*, Seerosengewächse.  
 „ 22. *Ceratophyllaceae*, Hornblattgewächse.  
 „ 23. *Ranunculaceae*, Hahnenfußgewächse.
10. Reihe: *Rhoeadales*.  
 Familie 24. *Papaveraceae*, Mohngewächse.  
 „ 25. *Cruciferae*, Kreuzblütler.
11. Reihe: *Rosales*.  
 Familie 26. *Saxifragaceae*, Steinbrechgewächse.  
 „ 27. *Rosaceae*, Rosengewächse.  
 „ 28. *Leguminosae*, Hülsenfrüchte.
12. Reihe: *Geraniales*.  
 Familie 29. *Geraniaceae*, Storchschnabelgewächse.  
 „ 30. *Polygalaceae*.  
 „ 31. *Euphorbiaceae*, Wolfsmilchgewächse.  
 „ 32. *Callitrichaceae*, Tännelgewächse.
13. Reihe: *Parietales*, Wandständige.  
 Familie 33. *Violaceae*, Veilchengewächse.
14. Reihe: *Myrtiflorae*.  
 Familie 34. *Lythraceae*.  
 „ 35. *Oenotheraceae*, Nachtkerzengewächse.  
 „ 36. *Halorrhagidaceae*, Tausendblattgewächse.
15. Reihe: *Umbelliflorae*, Doldenblütler.  
 Familie 37. *Umbelliferae*, Doldengewächse.

**II. Unterklasse: Metachlamydeae** oder Sympetalae. Blumenblätter meist verwachsen, selten frei oder fehlend.

16. Reihe: *Ericales*.  
 Familie 38. *Ericaceae*, Heidekrautgewächse.
17. Reihe: *Primulales*.  
 Familie 39. *Primulaceae*, Primelgewächse.  
 „ 40. *Plumbaginaceae*.
18. Reihe: *Contortae*, Bl in der Knospe meist gedreht.  
 Familie 41. *Gentianaceae*, Enziangewächse.  
 „ 42. *Asclepiadaceae*.
19. Reihe: *Tubiflorae*.  
 Familie 43. *Convolvulaceae*, Windengewächse.  
 „ 44. *Boraginaceae*, Rauhblättrige Gewächse.  
 „ 45. *Labiatae*, Lippenblütler.  
 „ 46. *Solanaceae*, Nachtschattengewächse.  
 „ 47. *Scrophulariaceae*, Rachenblütler.  
 „ 48. *Lentibulariaceae*.

20. Reihe: *Plantagináles*.Familie 49. *Plantagináceae*, Wegerichgewächse.21. Reihe: *Rubiales*.Familie 50. *Rubiáceae*, Krappgewächse.„ 51. *Valerianáceae*, Baldriangewächse.„ 52. *Dipsáceae*, Kardengewächse.22. Reihe: *Campanulátæ*.Familie 53. *Campanuláceae*, Glockenblumengewächse.„ 54. *Compósitæ*, Korbblütler.

## A. Erste Reihengruppe: Archichlamydeæ.

## § 14.

Siebente Reihe: **Polygonales**.

**Fam. 16. Polygonaceæ.** Perigon kelch- oder kronenartig. Blüten meist nach der Formel  $P\ 3 + 3$ ,  $A\ 3 + 3$ ,  $G\ 3$ , doch kommen auch Perigone mit 4 und 5 Blättern vor, und die Zahl der Stbb kann auch 9, 8 oder 5 sein. Frk 1fächerig, mit 1 grundständigen, geraden Samenanlage. Same mit reichlichem Nährgewebe. Blätter mit stark entwickelter Scheide und zu einer *Röhre* (Tute, ochrea) verwachsenen Nebenblättern.

*Rumex* (Pflanzenname bei Plantus und Plinius), Ampfer. Perigon meist 6teilig, die 3 inneren Abschnitte grösser, nach der Blüte zusammenneigend und die 3kantige Fr bedeckend, häufig alle 3 oder 1—2 aufsen mit einer gelblichen oder rötlichen Schwiele.

1. *Blätter pfeil- oder spiefsförmig*, Bl 2häusig, d. h. auf einer Pflanze nur ♂, auf der andern nur ♀. Geschmack sauer, wegen des Gehalts an Kaliumbioxalat.

*R. Acetosa* (zuerst bei Camerarius, acetum = Essig, wegen des sauren Geschmacks), (wilder) Sauerampfer. St aufrecht, untere Blätter langgestielt, groß, meist stumpf, obere kleiner, kurzgestielt, spitz. Tuten gezähnt oder fransig eingeschnitten, äussere Perigonabschnitte klein, zur Fruchtzeit herabgebogen, innere zur Fruchtzeit vergrößert, rundlich-eiförmig, mit einer herabgebogenen Schwiele. Fruchtsiele meist rot. — 4. 30—90 cm. Mai, Juni. Wiesen, gemein; dieselben oft mit einem weithin sichtbaren roten Schleier überziehend. (Ascherson; ähnlich wie *Agrostis vulgaris*.)

*R. Acetosella* (Diminutivform von *acetosa*), kleiner Sauerampfer. 2häusig. Wurzel Adventivknospen treibend. St aufrecht oder aufsteigend. B spiefsförmig, mit wagerecht abstehenden oder aufwärts gerichteten Spiefs-ecken. Tuten in eine lanzettliche, zuletzt fransig zerschlitzte Spitze ausgehend. Äussere Perigonblätter angedrückt, innere nicht vergrößert, *ohne Schwiele*. Trockene Wälder, Brachen, auf Sand. *Kalkmangel* anzeigend. Mai, Juni. In allen Teilen viel kleiner als *R. Acetosa*, aber ähnlich.

2. *Blätter nicht pfeil- oder spießförmig*. Bl zwitterig.

*R. obtusifolius*, *crispus*, *conglomeratus*, *Hydrolápathum* etc. Alle auf feuchten Wiesen; letzterer der größte, fast 2 m hoch; untere Blätter sehr groß.

*Polygonum* (Name bei Dioskorides), Knöterich. Perigon meist 5 teilig, meist blumenkronenartig gefärbt. Stbb 4—8. Frk oft mit einem eingeschnittenen drüsigen Ringe umgeben (Nektarium).

1. *Stengel einfach*.

*P. Bistorta* (bis doppelt, tortus gekrümmt, wegen der oft ~ gekrümmten Grundachse). Grundblätter groß, länglich-eiförmig oder länglich-lanzettlich, am Grunde gestutzt oder herzförmig, in einen langen geflügelten Blattstiel übergehend; obere Stengelblätter lanzettlich bis linealisch, sitzend. Scheinähre endständig, schön rosa oder rötlich-weiß. 4. 30—90 cm. Juni, Juli. Mäßig feuchte Wiesen, zerstreut, aber sehr gesellig und oft lästig, besonders im Gebirge.

2. *Stengel ästig, jeder Ast mit 1 Ähre endend*. Ähren dicht.

*Polygonum amphibium*, Ortwechselnder Knöterich. Wurzelstock kriechend. B länglich bis lanzettlich. Stbb 5. Fr linsenförmig, beiderseits gewölbt, scharfkantig. 4. Feuchte Orte. Ändert sehr nach dem Standort. a) natans, St flutend, obere B schwimmend, langgestielt, kahl. b) terrestre, St aufrecht, drüsig, B steifhaarig.

*P. Persicaria*, Pfirsichblättriger Knöterich. ☉. Blattstiele unter der Mitte der Tuten abgehend. Diese Gesamtart zerfällt in 3 Arten: 1. *P. tomentosum*, filziger Knöterich. Blütenstiel und Perigon drüsig-rauh. Perigon an der Fr mit hervortretenden Nerven. B eiförmig, länglich bis lanzettlich, oft in der Mitte mit schwarzem Fleck, unterseits drüsig punktiert. Scheinähren kurz, stumpf, meist grün. Fr beiderseits vertieft. 2. *P. nodosum (lapathifolium)*, knotiger oder ampferblättriger Knöterich. Blütenstiel und Perigon drüsenlos, Perigon ohne starke Adern. St an den Knoten stark verdickt. B unterseits drüsig punktiert. Scheinähren am Grunde rispig, nach oben verschmälert, rosa und weiß, nickend. Fr wie vorige. — 3. *P. Persicaria* (im engeren Sinne) gemeiner Knöterich. B lanzettlich, schwarz gefleckt. Tuten eng anliegend, ziemlich lang gewimpert. Blüten rosa, seltener weiß, stumpf. Fr beiderseits flach oder auf einer Seite gewölbt.

*P. aviculäre*, Vogelknöterich. Blüten blattwinkelständig. St meist niederliegend. Tuten oberwärts silberweiß. Eins der gemeinsten Unkräuter, besonders auf Wegen.

*Fagopyrum*, Buchweizen, (fagus Buche, *πυρός* Weizen). Perigon 5 teilig, blumenkronenartig. Stbb 8. Frk von einem drüsigen Ringe umgeben. Griffel 3. Fr 3kantig. Blüten in sog. Wickeln in den Achseln von Hochblättern, Scheintrauben bildend.

*F. esculentum*. St. zuletzt meist rot. B so lang als breit, 3eckig-herzförmig. Perigon weiß oder rötlich. Fr mit scharfen Kanten. Aus Mittelasien; bei uns auf leichtem Boden, doch jetzt immer weniger angebaut.

*P. tataricum*, tatarischer K. B meist breiter als lang. Fr länglich-dreikantig, ausgeschweift. Perigon und St meist grün. Beides Honigblumen. Griffel verschieden lang (Heterostylie).

### § 15.

**Achte Reihe: Centrospermae.** Mit zentraler oder grundständiger Placenta (Samenträger), d. h. Fruchtknoten ohne Scheidewände, von unten her mehr oder weniger eingestülpt, wie der Boden einer Flasche, und an dieser Einstülpung die gekrümmten Samenanlagen.

**Fam. 17. Chenopodiaceae, Gänsefußgewächse.** B meist spiralig, d. h. wechselständig, zuweilen unentwickelt. Blüten mit 2 perigonartigen Vorblättern, Blumenkrone fehlt, also ein Perigon, meist nach der Formel  $K\ 5, C\ 0, A\ 5, G\ (2)$ . Fruchtknoten mit 1 grundständigen Samenanlage. Blüten klein, meist in dichten, begrenzten (cymösen) Blütenständen.

*Beta*, (Pflanzenname bei Plinius), Runkelrübe. Perigon 5spaltig, am Grunde mit dem Fruchtknoten verwachsen. Stbb 5, einem fleischigen, den Fruchtknoten umgebenden Ringe eingefügt. Narben 2 oder 3, selten bis 5. Kapsel mit Deckel aufspringend. Same wagrecht, mit gekrümmtem peripherischem Embryo, der das stärkereiche Nährgewebe (hier Perisperm) umgibt. Grundblätter eine Rosette bildend, langgestielt, ei-herzförmig, stumpf, obere klein, länglich bis lanzettlich. St aufrecht, sehr ästig. Blütenstände in anfangs dichten, sehr langen Scheinähren, die aus einzelnen 2—3 (selten 4—5)-blütigen geknäuelten Trugdöldchen bestehen. Deckblätter der Trugdöldchen lineal-lanzettlich. Vorblätter fehlen. Narben meist 2 (od. 3), länglich-oval. Die 2—5 Perigone verwachsen zur Fruchtzeit miteinander und bilden die Rübenkerne. An den Küsten Südeuropas wild. Var. *Cicla*, rot oder gelb, Futterrunkelrübe und Speiserübe. Var. *Rapa*, Wurzel spindeelförmig, weiß. Zuckerrübe.

*Chenopodium* (von  $\chi\eta\nu$  Gans, podium Füßchen bei de l'Ecluse). Wie *Beta*, aber Perigon 5teilig, kein fleischiger Ring. Narben 2—5. Fruchtperigone nicht verwachsend. *Ch. album*, weißer Gänsefuß, gewöhnlich Melde genannt, lästiges Unkraut. Alle *Chenopodium*-Arten wie überhaupt die *Chenopodiaceae* lieben Düngerstätten (Chlornatrium u. Stickstoff).

*Atriplex*, Melde. Blüten bei uns einhäusig. *A. hastatum*, spießblättrige Melde. Blütenhülle zur Fruchtzeit 3eckig, ganzrandig oder gezähnt. Wege, Schutt.

*Spinacia oleracea* L., Spinat. Zweihäusig.

*Salsola Kali*, gemeines Salzkraut. Blätter lineal-pfriemlich, stechend stachelspitz. Am sandigen Meeresstrande, im Binnenlande sehr zerstreut.

*Salicornia herbacea* (zuerst bei Dodoens, wohl nach dem französischen Namen *salicor*), krautartiges Glasschmalz, Queller. Blätter fehlen, Stengel ästig, saftig, gegliedert. Blüten fleischige Ähren. Am Meeresufer, besonders auf den Watten, selten im Binnenlande an salzigen Stellen.

**Fam. 18. Amarantaceae.** Perigon trockenhäutig, öfter gefärbt. Frk (bei uns) mit einem grundständigen Samen.

*Amarantus* (bei Ovid), Amarant. Perigon meist 5zählig, Fr quer aufspringend. *A. retroflexus*, rauhaariger A. Rispe. Blätter hellgrün, eiförmig, kurz stachelspitz. Perigonblatt stachelspitz. Äcker und Gärten.

*Albérzia* (nach dem Direktor der Tierarzneischule Berlin, Albers, † 1857, benannt). Blüten meist 3zählig. Fr nicht aufspringend. *A. blitum* (bliton, ein Küchengewächs bei Theophrastos), roter Heinrich. St oft rötlich. B dunkelgrün, eiförmig, vorn ausgerandet. An Straßen, Rinnsteinen etc.

*Polycnëmum* (πολύκνημον, Pflanzenname bei Nikandros), Knorpelkraut. Perigon 5blättrig, wie die 2 Vorblätter trockenhäutig. Stbb meist 3. Bl einzeln, achselständig. *P. arvense*. ☉. B linealisch-pfriemlich, stachelspitz. Äste niederliegend, dünn, 3—30 cm lang. Vorblätter so lang als das Perigon. Sandig-lehmige Äcker. Juli — Herbst. *P. majus*. ☉. Äste 5—15 cm lang, ziemlich dick, steif. B und Bl größer. Vorblätter länger als das Perigon. Fr groß, sonst wie vorige. Sonnige Hügel, Brachäcker, gern auf Kalk, nur in Mittel- und Süddeutschland. Oft von der Tracht der *Salsola Kali*. (S. oben.)

**Fam. 19. Portulacaceae.** Kelch 2spaltig. Bl 5blättrig, bei *Montia* trichterförmig.

*Montia* (nach G. Monti, Prof. der Botanik zu Bologna, Anfang des 18. Jahrh.). Meist Wasserpflanzen. *M. minor*. B gegenständig, spatelförmig, fleischig. ☉. Feuchte Sandfelder, Ufer, zerstreut. *M. rivularis*. 4. Stengel untergetaucht, flutend. Sehr zerstreut, besonders in Gebirgsbächen, dort fußlang. Auch im Winter grün. Zeigt gutes Rieselswasser an. Bl klein, weiß. Röhre gespalten.

**Fam. 20. Caryophyllaceae,** Nelkengewächse. Blätter meist gegenständig. Bl meist in Trugdolden (cymös). Meist mit Kelch und Krone. K 5, C 5, A 5 + 5 (oder 5), G (5 — 2). Frk meist mit zentraler Placenta.

Unterfamilien:

- A. Kelchblätter *verwachsen*, Blumen meist groß und schön, Narben getrennt . . . . . 1. *Silenoideae*.
- B. Kelchblätter *frei*, Griffel bzw. Narben frei oder verbunden:

- I. Fr vielsamig, Kapsel meist an der Spitze mit Zähnen sich öffnend. Bl kleiner, meist weifs **2. *Alstnoideae*.**
- II. Fr bei uns 1samig, nicht mit Zähnen aufspringend, Pflanzen klein:
- a) B wechselsständig (spiralig) oder gegenständig, mit trockenhäutigen Nebenblättern **3. *Paronychioideae*.**
- b) B gegenständig, ohne Nebenblätter . . **4. *Scleranthoideae*.**

1. Von den schön blühenden Gattungen der *Silenoideae*, der eigentlichen Nelkengewächse, kommen hier besonders in Betracht:

*Silene* (Name bei de l'Obel). Narben 3. Kapsel am Grunde 3(—5)-fächerig. *S. vulgaris* (*S. venosa*, *S. inflata*), gemeiner oder aufgeblasener Taubenkropf. Kelch eiförmig, aufgeblasen, netzaderig, kahl. Krone weifs. 4. 25—50 cm. Laubwälder, trockene Wiesen etc. Juni—September.

*Melandryum* (Pflanzenname bei Plinius, μέλας schwarz, δρῦς Eiche). Blumenblätter mit 2 Zähnen (Krönchen) am oberen Ende des Nagels, Platte 2spaltig. *M. album*, weisse Lichtnelke. Stengel zottig, obere Blätter ei-lanzettlich, nebst den Blütenstielen und Kelchen drüsenhaarig. Narben 3. ☺ und 4. Blüten weifs, öffnen sich am Nachmittag oder gegen Abend, wohlriechend. 2häusig. Wegränder, sonnige Hügel.

*Coronaria*. Narben 5. Blumenblätter mit Krönchen. *C. flos cuculi*, Kuckucksblume. Untere Blätter spatelförmig, obere linealisch-lanzettlich. Kronenblätter bis über die Mitte 4spaltig, rosenrot, selten weifs. 4. Feuchte Wiesen, gemein. Mai, Juni.

*Agrostemma* (ἀγρός Acker, στέμμα Kranz). Narben 5. Blumenblätter ohne Krönchen, ungeteilt, mit Flügelleisten. Kelch mit verlängerten laubartigen Zähnen. *A. Githago* (gith Schwarzkümmel, wegen der Ähnlichkeit der Samen), Kornrade. Graufilzig und zottig. Blumenblätter kürzer als die Kelchzähne, purpurn. Unter der Saat. Die grossen, schwarzen, nierenförmig 3eckigen Samen sollen giftig sein, doch haben Hagemann's Versuche an Tieren das nicht ergeben. Nach Winkelmann sollen sie das Brot wasserstreifig machen.

*Dianthus*, Nelke (Δίος des Zeus, ἄνθος Blume). Kelch von Kelchschuppen umgeben. Narben 2. *D. Carthusianorum*, Karthäusernelke. Blüten meist zu 6 in einem büscheligen Köpfchen. Kelchschuppen braun. Grasige Hügel. Purpurn. 4. 30—45 cm. Juni—August. Fehlt im grössten Teil des nordwestlichen Deutschlands. *D. deltoides*, deltafleckige Nelke. Blüten einzeln, purpurn mit weissen Flecken, die ein Dreieck, das griechische grosse Delta Δ, bilden. Kelchschuppen grün. Trockene Wiesen und Wälder, gern auf Sand. Juni—Herbst.

2. Unterfamilie *Alstnoideae*. Wichtigste Gattungen: *Stellaria*, *Cerastium* und *Spérgula*.

*Stellaria* (Pflanzenname bei Brunfels), Sternmiere. Griffel 3. *S. media*, Vogelmiere. Auf Kulturland überall. St rund, *einreihig* behaart. *S. glauca* (*S. palustris*), meergrüne S. St kantig, aufrecht. Blätter etwas fleischig, lineal-lanzettlich, die unteren eiförmig. Deckblätter trockenhäutig. Blütenstand armbühtig. ♀. Feuchte Wiesen. *S. graminea*. St kantig, schlaff. B lanzettlich, spitz, am *Grunde gewimpert*. Blütenstand weitschweifig-ästig, reichblühtig. Deckblätter *gewimpert*. Bl meist kleiner, sonst wie vorige. Wiesen, Grasplätze etc.

*Cerastium*, Hornkraut. Griffel meist 5. *C. arvense* (κέρας Horn, wegen der Gestalt der Kapsel). Blühende St aufsteigend, St und B kurzhaarig. B länglich-lineal-lanzettlich. Blumenblätter doppelt so lang als der Kelch, groß, weiß. ♀. 10—20 cm. April, Mai.

*Spergula* (zuerst bei de l'Obel), Spark oder Spürgel. Blätter mit häutigen Nebenblättern. Blätter in ihren Achseln Zweige mit verkürzten Gliedern tragend, wodurch die Blätter scheinbar quirlständig werden. Bl in lockeren Trugdolden, ihre Stiele nach dem Verblühen heruntergeschlagen. *S. arvensis*. B unterseits mit einer Furche, lineal. Same schwarz, linsenförmig, mit sehr schmalen glatten Flügelrande. Auf Sand; häufig kultiviert unter dem Namen *S. maxima*. Gutes Milchfutter. ☉. 10—15 cm. Juni—Sept.

3. Unterfamilie *Paronychioideae*. *Herniaria glabra* (zuerst bei Dodoens; hernia Bruch, wogegen diese Pflanze früher Anwendung fand), glattes Ferkel- oder Bruchkraut. St gelbgrün, niederliegend, ganz mit kleinkörnigen Blüten bedeckt. B gegenständig, elliptisch. St 5—15 cm. ♀. Sandfelder, trockene Grasplätze. Juli—Herbst.

#### 4. Unterfamilie *Scleranthoideae*.

*Scleranthus annuus* (σκληρός hart, ἄνθος Blume), einjähriger Knäuel. Klein. Trugdolden achsel- und endständig. Kelchzipfel spitzlich, schmalhautrandig, zur Fruchtzeit abstehend. Juli—Herbst. *S. perennis*, ausdauernder Knäuel. Trugdolden fast nur endständig. Kelchzipfel stumpf, *breit*-hautrandig, zur Fruchtzeit anliegend. Mai—Herbst. Beide auf sandigen Äckern, Grasplätzen etc.

### § 16.

**Neunte Reihe: Ranales** (dies Wort gebildet aus Ranunculaceae) oder Polycarpicae. Stbb zahlreich. Frb meist apokarp, d. h. nicht miteinander zu einer Kapsel etc. verwachsen, sondern jedes für sich bleibend, wie z. B. bei den Ranunkeln, noch deutlicher bei *Caltha palustris*.

**Fam. 21. Nymphaeaceae.** Seerosengewächse. Hierher *Nymphaea alba*, weiße Seerose, und *Nuphar luteum*, gelbe Seerose; beide mit sehr dickem, kriechendem Rhizom, erstere in bis 2 m, letztere in bis 1 m Wassertiefe. Gutes Rieselswasser anzeigend.

**Fam. 22. Ceratophyllaceae**, untergetauchte Wasserpflanzen mit vielgliederigen Quirlen durchscheinender, später knorpeliger, doppelt- oder mehrfach-gabeliger Blätter. Einhäusig. Blüten ohne Blumenblätter, einzeln in den Blattachseln. *Ceratophyllum* (κέρας Horn, φύλλον Blatt), Hornblatt. *C. demersum* und *submersum*. Erstere gemein. B 1—2 mal gabelspaltig mit 2—4 Zipfeln, dicht stachelig gezähnt.

**Fam. 23. Ranunculaceae** (ranunculus = kleiner Frosch). Blüten-  
teile oft nicht in deutlich geschiedenen Quirlen, sondern spiralig angeordnet.  
Blüten mit Kelch und Krone oder gefärbtem Perigon; dem letzteren



Fig. 10. *Caltha palustris*.  
a Rückseite der Blüte; b Staubgefäße;  
c die Fruchtknoten; d die Früchtchen;  
e Einzelfrüchtchen.  
(Nach Garcke.)



Fig. 11. *Ranunculus acer*.  
a Fruchtköpfchen; b Früchtchen,  
längsdurchschnitten.  
(Nach Garcke.)

schließen sich meist Honigblätter, d. h. Staminodien (umgewandelte Stbb) an, welche Nektarien tragen und zuweilen kronenblattartig entwickelt sind. Stbb zahlreich, meistens mehrere Spiralumgänge einnehmend. Frk (Frb) zahlreich, spiralig angeordnet. Samenanlagen entweder in 1 oder 2 Zeilen längs der Bauchnaht (z. B. bei *Caltha palustris*, wo sie 1 reihig) oder einzeln am Grunde der Bauchnaht. Meist Stauden ohne Nebenblätter, aber mit entwickelten Blattscheiden. Insektenblüher.

Auf Wiesen sind häufig:

*Caltha palustris* (bei Vergilius und Plinius eine gelbe Blume), Kuh- oder Dotterblume (Fig. 10). Blumenkrone fehlt. Die 5 Kelchblätter



schön dottergelb gefärbt, ohne Honigblätter. Untere Blätter gestielt, herzförmig, obere nierenförmig. Sumpfwiesen, gemein. April, Mai. *Giftig*. Wiesen mit viel *C. palustris* rechnet Hüser in seinem sehr empfehlenswerten Buch „Die Zusammenlegung der Grundstücke“, Berlin 1890, S. 47, zur 9. Klasse.

*Ranunculus*, Hahnenfuß. Mit Kelch und Krone, beide meist 5 blättrig. Blumenblätter mit Honiggrube, meist hinter einer Schuppe. *R. acer*, scharfer H. (Fig. 11). Untere Blätter handförmig tief geteilt. Blütenstiel stielrund. Wiesen, gemein. Frisch giftig. *R. repens*. Mit kriechenden oberirdischen Ausläufern. Blütenstiel *gefurcht*. Wiesen. *R. bulbosus*. St am Grunde knollig verdickt. Blütenstiel gefurcht, Kelchblätter zurückgeschlagen. Trockene Grasplätze. Giftig. *R. arvensis*. Früchtchen 4—8, groß, seitlich zusammengedrückt, netzig, meist stachelig. Auf *lehmigen* Äckern, besonders in Mittel- und Süddeutschland. *R. sceleratus*, Gift-H. ☉. Blütenachse zur Fruchtzeit zylindrisch. St hohl. B fleischig, glänzend. Am Wasser. *Sehr giftig*. — Ungeteilte elliptische Blätter besitzen: *R. Flammula* und *Lingua*, beide am Wasser, ersterer 30—45, letzterer 60—120 cm.

Mehrere Arten sind *Wasserpflanzen*; besonders häufig: *R. aquatilis*, Wasser-H. Untere B untergetaucht, vielteilig, mit borstlichen Zipfeln, obere B meist schwimmend, dann *herzförmig*, 3- oder 5lappig. ♀. Mai bis August. Stehende und fließende Gewässer. Bl weiß. Zeigt gutes Rieselwasser an, sofern er nicht im Salzwasser vorkommt.

### § 17.

**Zehnte Reihe: Rhoeadales, Mohnreihe**, im weiteren Sinne. Meist Kräuter, meist nach der Zwei- oder Vierzahl.

**Fam. 24. Papaveraceae.** K 2, C 4, A 4—∞, G (2—16). Meist mit Milchsaft.

*Papáver* (Pflanzenname bei den Römern.) ☉ oder ☺. Kapsel 4—20fächerig, sich unter der 4—20strahligen Narbe mit eben so viel kleinen Klappen öffnend. Blumenblätter bei uns rot.

1. Staubfäden oberwärts verbreitert, Kapsel mit Borsten, Narbenscheibe am Rande ausgebuchtet.

*P. Argemone*, Sand-Mohn. St steifhaarig. Kapsel *verlängert keulenförmig*, mit zerstreuten *aufrechten* Borsten (die mitunter fehlen). Blb dunkel-scharlachrot, am Grunde schwarz gefleckt. ☉ und ☺. Sandige und lehmige Äcker. Mai—Juli. *P. hybridum*. Kapsel *rundlich*, mit gekrümmten, weit abstehenden Borsten. Blb scharlachrot, sonst wie voriger. Äcker, zerstreut.

2. Staubfäden pfriemenförmig, Kapsel kahl, Narbenscheibe kerbig gelappt.

*P. Rhoeas* (ῥοιὰ, wahrscheinlich wegen der Ähnlichkeit der Blütenfarbe mit der des Granatapfels), Klatschrose. Abstehend borstig be-

haart. Blumen grösser als bei beiden vorigen, scharlachrot, oft am Grunde schwarz gefleckt. Kapsel verkehrt-eiförmig, kahl. Narbenlappen 7—12, sich deckend. Äcker, besonders auf besserem (*lehmigem*) Boden, im Osten seltener. Juni, Juli. *P. dubium*. Blütenstiel von anliegenden Haaren rauh. Blb scharlachrot. Kapsel länglich-keulenförmig. Narbenlappen 7—9, sich nicht deckend. Sandige Äcker, weniger häufig als voriger.

**Fam. 25. Cruciferae**, Kreuzblütler. K 2 + 2, C 4, diagonal, A 2 kurze + 2 × 2 lange, G (2). Blüten in Trauben. Fr eine Schote oder, wenn kurz, ein Schötchen. Häufig Honigdrüsen an der Basis des Frk.

*Nasturtium* (Name einer scharfen Gemüsepflanze bei Plinius). Blumen gelb oder (bei *N. officinale*, Brunnenkresse) weifs. Fr kugelig bis linealisch. Meist am Wasser. *N. amphibium* (*ἀμφίβιον*, doppeltebig). Blätter länglich, untere oft kammförmig eingeschnitten, obere gezähnt. Schötchen fast kugelig. *N. silvestre*. B. fiederspaltig oder gefiedert. Schoten linealisch. *N. palustre*. Bl blafsgelb, klein, so lang als der Kelch. B fiederspaltig. Schoten länglich, gedunsen.

*Barbarea*, Winterkresse. Schote linealisch, abgerundet, 4kantig. Narbe stumpf oder ausgerandet. *B. vulgaris*. ☉. Untere Blätter leierförmig, Endlappen sehr gross, rundlich-eiförmig. Bl gelb, fast doppelt so lang als der Kelch. Schoten aufrecht abstehend. Wiesen, feuchte Äcker. 30—60 cm. Mai—Juli.

*Turritis glabra*, glattes Turmkrant. St einfach, bis 1,25 m hoch. Obere Blätter tief herzpfeilförmig, stengelumfassend. Bl klein, gelblich-weifs. Steinige Orte, Gebüsche etc.

*Arabis*, Gänsekresse. Schoten linealisch, meist zusammengedrückt. *A. hirsuta*, rauhhaarige Gänsekresse. Stengelblätter länglich-eiförmig, am Grunde kurz pfeilförmig, mit *abstehenden* Öhrchen. ☉. Trockene Wiesen, Waldränder, zerstreut. Bl klein, weifs. Mai, Juni. *A. arenosa*. ☉. Oft 4. Untere Blätter langgestielt, leierförmig-fiederspaltig; die obersten kurzgestielt, länglich-lanzettlich. Bl mittelgross, weifs oder lila. Schoten abstehend. Wiesen, auf Sand, Lehm und Humus. April—Sept.

*Cardamine* (*καρδαμίνη* bei Paulos Aiginetes Pflanzennamen), Schaumkrant. Schote linealisch (Fig. 12). *C. pratensis*, Wiesen-Schaumkrant. St rund, hohl. B gefiedert, Grundblätter rosettig, mit rundlichen Blättchen. Stengelblätter mit linealischen Blättchen. Blumenblätter 2 mal so lang als die Staubblätter. Antheren gelb. 4. Feuchte, besonders saure Wiesen, gemein. März—Mai. 30 cm. *C. amara*, bitteres Schaumkrant. Wurzelstock kriechend, ausläufertreibend. St kantig, nicht hohl. Untere Blätter nicht rosettig, Blättchen eckig gezähnt. 4. Quellen, Gräben. April, Mai. Staubbeutel violett. Blumenblätter wenig länger als die Staubblätter.

*Sisymbrium officinale*, gebräuchlicher Raukensenf. Bl klein, gelb, in langen, blattlosen Trauben. Schoten steif, der Achse angedrückt. An Wegen.

*Stenophragma Thalianum*. Bl klein, weiß. Grundblätter rosettig, länglich. Sandfelder, Brachäcker, gemein. ☉, auch ☉. April, Mai, seltener Herbst.

*Erysimum* (Pflanzenname bei Theophrastos), Schotendotter. *E. cheiranthoides*. Bl goldgelb. Blätter länglich-lanzettlich. Schoten scharf vierkantig, doppelt so lang als ihr Stiel. Äcker, Flusssufer, häufig. ☉ oder ☉. Mai bis Herbst. 30—60 cm. *E. odoratum*, wohlriechender S. Blütenstielchen kürzer als der Kelch, Bl ansehnlich, zitronengelb. Schoten grau mit grünen Kanten. ☉. Kalkberge, fast nur in Mittel- und Süddeutschland.




Fig. 12. *Cardamine pratensis*.  
a Vorderseite der Blüte; b Staubgefäße und Fruchtknoten; c Kronblatt; d reife Schote.  
(Nach Garcke.)

*Brassica* (Pflanzenname bei Cicero), Kohl (im weiteren Sinne). Schote linealisch, stielrund oder fast 4 kantig. Bl gelb.

a) Staubfäden sämtlich aufrecht. Same glatt:

*B. oleracea*, Kohl. Traube locker. Kelch aufrecht. Schoten auf abstehenden Stielen aufrecht.

b) Die 2 kürzeren Staubfäden abstehend aufrecht. Same grubig punktiert:

*B. Rapa*, Rüben, auch Wasserrübe. Untere Blätter *grasgrün*, leierförmig-fiederspaltig, *steifhaarig*, obere eiförmig oder lanzettlich, stengelumfassend, blaugrün. Traube während des Aufblühens flach, Knospen von den geöffneten Blüten überragt. Kelch zuletzt wagrecht abstehend. Bl goldgelb. Schoten fast aufrecht.

*B. Napus*, Raps, auch Kohlrübe, Wruke. Alle Blätter blaugrün. Traube schon beim Aufblühen locker, Knospen die aufgeblühten Blumen überragend. Staubbeutel an der Spitze mit einem roten Punkt. Kelch zuletzt aufrecht abstehend. Schoten abstehend.

*B. nigra*, schwarzer Senf. Schoten kürzer, an die Traubenachse gedrückt. ☉. Flusssufer, Mittel- und Süddeutschland. Auch gebaut.

*Sinapis* (Pflanzenname bei Plinius). *S. arvensis*, Ackersenf, auch Hederich genannt (der echte Hederich ist *Raphanus Raphanistrum*). Blätter eiförmig oder länglich, buchtig gezähnt, unterste fast leierförmig-fiederspaltig. Kelch *wagrecht* abstehend. Bl goldgelb. Schoten so lang als

ihr abfallender Schnabel. Same schwarz. Sehr lästiges Unkraut, besonders unter Sommergetreide. *S. alba*, weißer Senf. B gefiedert, Schoten steifhaarig, Schnabel bleibend, sichelförmig.

*Raphanus Raphanistrum* (ῥάφανος, antiker Name des Rettichs), Acker-Rettich, echter Hederich. Schote bei der Reife hart, perlschnurartig, quer in die 1samigen Stücke zerfallend (Gliedereschote). Kelch aufrecht. Blumenblätter hellgelb mit violetten oder gelben Adern, selten weiß oder lila. Sehr lästiges Unkraut unter Sommergetreide. *R. sativus*, Rettich, Radieschen. Schote schwammig, nicht aufspringend. Bl weiß oder violett.

## § 18.

### Elfte Reihe: Rosales.

**Fam. 26. Saxifragaceae.** Frb meist 2, unter- bis oberständig. Same mit reichlichem Nährgewebe. Sonst meist wie die Rosaceae.

*Saxifraga* (saxum Felsen, frangere brechen). Bl meist 5 zählig, Kapsel 2fächerig. Viele Arten in den Gebirgen.

*S. granulata*, körniger Steinbrech. Grundblätter rosettig, langgestielt, rundlich-nierenförmig, gekerbt, die unteren in ihren Achseln Zwiebeln tragend. Bl weiß. ♀. Sonnige Hügel, Grasplätze. Mai, Juni.

*Parnassia*, Herzblatt. Vor den Blb 5 Nebenkronen-B mit borstigen, drüsentragenden Wimpern. *P. palustris*, Sumpf-H. Untere B herzförmig, langgestielt, das einzige Stengelblatt stengelumfassend. St einblütig. Bl groß, weiß. Frb 4. ♀. Feuchte Wiesen. Juli—Sept.

**Fam. 27. Rosaceae.** Blütenformel meist  $K_5, C_5$  (selten 0),  $A_{n.5}$ ,  $G_5$  oder  $n.5$  oder 4 bis 1, wobei  $n=2, 3$  oder 4, selten mehr sein kann. Same meist ohne Nährgewebe. B spiralig, meist mit Nebenblättern, oft gefiedert oder gefingert. Blütenachse konvex, flach, schüssel- oder becherförmig. Kelch, Blumenblätter und Stbb am Rande der Blütenachse um den Frk (perigynisch) oder oberhalb desselben stehend (epigynisch). Frb jedes für sich bleibend (apokarp), der gewölbten oder zylindrischen oder becherartig vertieften Blütenachse eingefügt oder (beim Kernobst) mit der Innenwand der hohlen Blütenachse vereint. Balgkapseln, Schließfrüchte oder eine Steinfrucht, oder bei Verdickung der Blütenachse eine Apfel-frucht bildend. Nebenblätter oft dem Blattstiel angewachsen. Hierher *Rosa*, *Spiraea*, *Pirus*, *Prunus*, *Fragaria* etc.

Übersicht der auf Wiesen vorkommenden Gattungen:

1. Bl sehr klein, kronenlos, in grünlichen, rötlichen oder dunkelbraunen Köpfchen:

- a) B handförmig gelappt. Kelchsaum 8spaltig, grün, mit 4 (oder 1) Stbb. . . . . *Alchemilla*.
- b) B unpaarig gefiedert. Kelch rotbraun oder grünlich-rot . . . . . *Sanguisorba*.

2. Bl etwas grösser, mit Kelch und Krone, weiss, in Rispen oder Doldenrispen. B gefiedert . . . . . *Filipendula (Ulmaria)*.
3. Bl groß, mit Aufsenkelch, B gefiedert oder gefingert:
  - a) Blumenblätter lanzettlich, zugespitzt, bleibend, schwarzpurpurn . . . . . *Comarum*.
  - b) Blumenblätter rundlich, zuweilen 4, gelb (selten weiss). Griffel abfallend . . . . . *Potentilla*.
  - c) Blb gelb oder rötlich. Griffel bajonettartig, hakig *Geum*.

*Alchemilla vulgaris* (zuerst bei Bock), gem. Taumantel. Grundblätter langgestielt, rundlich, mit 5—9 halbkreisförmigen, gesägten Lappen. Fruchtbare Wiesen, an Bächen. 15—30 cm.

*Sanguisorba officinalis* (sanguis Blut, sorbere einsaugen), (*Poterium officinale*), gemeiner Wiesenknopf. Bis 1 m hoch. Blättchen 7—13, gestielt. Bl meist ♀. Ährchen (Köpfchen) rundlich oder länglich, dunkelbraun. Zeigt gute, mälsig feuchte Wiesen an. Juni—September.

*S. minor* (*Poterium Sanguisorba*), kleiner W, Pimpernelle (nicht zu verwechseln mit dem Doldengewächs Pimpinella). Blättchen 9—25. Ährchen rundlich, grün, die oberen Blüten in denselben ♀, die unteren ♂, mit 20—30 Stbb, die mittleren oft ♀. Narben purpurn. Kelchbecher bei der Reife runzelig, steinhart, grau. (Als Verunreinigung unter Esparsettesaat.) 4. 30—60 cm. Mai—Juli.

*Filipendula Ulmaria* (*Spiraea Ulmaria*), ulmenblättrige oder Sumpfspierstaude, Wiesenkönigin. Grundachse knollig. Blättchen groß, eiförmig, das endständige handförmig geteilt. Bl gelblich-weiss, in Trugdolden, stark nach salicyliger Säure (wie Bittermandelöl) riechend. Feuchte Wiesen. 4. 60—120 cm. Juni—August.

*F. hexapétala* (*Spiraea Filipendula*), knollige S. Wurzeln in der Mitte knollig verdickt. St oberwärts fast blattlos, Blättchen klein, fiederspaltig eingeschnitten. Bl weiss, ausen oft rötlich. Trockene Wiesen, nicht überall.

*Comarum palustre* (κόμαρον, bei Theophrastos die Fr von κόμαρος Erdbeerbaum), Sumpf-Blutauge (Fig. 13). Halbstrauch, auf Sumpfwiesen und in Torfstümpfen. Rhizom weitkriechend. B unpaarig gefiedert, Blättchen länglich, scharf gesägt, unterseits blaugrün. Blumenblätter kürzer als der Kelch. Durch die schwarzpurpurne Farbe leicht auffallend.

*Potentilla* (von potens mächtig, kräftig, wegen angeblicher Heilkraft), Fingerkraut. Bl ausser bei *P. alba* gelb. 1. *Blätter fiederspaltig*. Hierher nur das lästige Unkraut *P. Anserina*, Gänse-Fingerkraut, mit *unterbrochen gefiederten*, unterseits weisfilzigen Blättern. St kriechend. Wiesen. 4. Mai—Juli. 20—50 cm lang. Nimmt besseren Pflanzen den Platz durch ihre Blattrosetten und vermehrt sich durch Ausläufer sehr stark.

2. *Blätter 3—5 zählig, gefingert: P. argentea.* B 5 zählig, Blättchen keilförmig bis lineal, unterseits silberweiß. Trockene Grasplätze. ♂. Juni, Juli. 15—30 cm. *P. reptans*, kriechendes Fingerkraut. Scheinachse 30—60 cm lang, kriechend, meist ohne Laubzweige. B fufsförmig-5 zählig. Bl meist 5 zählig. Feuchte Wiesen. Juni—August.

*Potentilla silvestris (P. Tormentilla)*, Blutwurz. St aufsteigend, 15 bis 30 cm. Stengelblätter 3 zählig. Bl meist 4 zählig. Feuchte Wiesen, Triften, Wälder. Juni—August.



Fig. 13. *Comarum palustre*.  
a Blüte ohne die Kronblätter; b Kronblatt; c Fruchtboden; d Einzelfruchtknoten mit Griffel.  
(Nach Garcke.)



Fig. 14. *Geranium pratense*.  
a Blüte, deren Kronblätter abgefallen; b Staubgefäße und Fruchtknoten nach der Blütezeit; c Längsdurchschnitt durch die Fruchtknotensäule; d sich abrollendes Teilfrüchtchen.  
(Nach Garcke.)

*Geum* (Name bei Plinius) *urbanum*, gemeine Nelkenwurz. Bl goldgelb. ♂. 30—60 cm. Mai—Juli. Gebüsche. *G. rivale*, Bach-N. Bl blaßgelb, außen rotbraun überlaufen. Feuchte Wiesen. ♂. 20—50 cm. Mai—Juni.

**Fam. 28. Leguminosae**, Hülsenfrüchte. Wird ihrer besonderen Wichtigkeit wegen in Kapitel VI, S. 311 eingehender behandelt werden.

## § 19.

**Zwölfte Reihe: Geraniales.** Meist 5 gliedrig. Frb meist je mit 2—1 Samenanlagen.

**Fam. 29. Geraniaceae**, Storachschnabelgewächse. Frb (Klappen) vor den Kelchblättern stehend. Fr (Storachschnabel) in 5 geschnäbelte Teilfrüchte zerfallend. Blätter meist handförmig gelappt oder geteilt.

*Geranium* (γέρανος Kranich, wegen der langen Fruchtschnäbel), Storachschnabel (Fig. 14). Granne (Schnabel) der Fruchtklappen bei der Reife kreis- oder bogenförmig eingerollt (bei der Gattung *Erodium* spiralig).

I. Ausdauernde Arten. a) Blumenblätter ungeteilt. α) Blütenstiel 2blütig: *G. pratense*. St drüsig behaart. Blume blau. Stiel der einzelnen Blüten nach dem Verblühen abwärts gebogen. Staubfäden aus eiförmigem Grunde plötzlich verschmälert. Zeigt die besten Wiesen an. 50—90 cm hoch. Juli, August. *G. palustre*. St oberwärts drüsenlos, behaart. Staubfäden allmählich verschmälert, sonst wie vorige, Blb violett-purpurn. Wiesen, feuchte Laubwälder. — β) Blütenstiel 1blütig: *G. sanguineum*. Bl hellpurpurn. Sonnige Hügel, trockene Waldwiesen.

b) Blumenblätter herzförmig, 2spaltig, ziemlich klein. *G. pyrenaicum*. St oben drüsig weichhaarig. Waldwiesen in Süddeutschland, öfter auf Grasplätzen etc. verwildert.

II. Einjährige Arten. Bl meist klein. Hierher *G. pusillum*, lila; *G. dissectum* (auf Lehmäckern), purpurn; *G. Robertianum*, in feuchten Gebüschen, unangenehm riechend.

**Fam. 30. Polygalaceae** (πολύς viel, γάλα Milch). Blüten zygomorph (nur durch eine Ebene symmetrisch teilbar). Kelch bleibend, 5blättrig, seine 2 seitlichen Blätter (Flügel) größer, blumenblattartig. Stbb 8, unterwärts zu einer Röhre verbunden, je 4 weiter hinauf vereinigt.

*Polygala* (Pflanzenname bei Plinius), Krenzblume. Blumenblätter 3—5, mit den Stbb verwachsen, das vordere gefranst. Kapsel verkehrt-herzförmig. *P. vulgaris*. Obere Blätter lineal-lanzettlich, Tragblätter die Blüte beim Aufblühen nicht überragend. Bl blau, rosa oder weifs. ♀. Etwas trockene Wiesen. Mai—Juli. *P. comosa*. Blüten schopfzig, weil die Tragblätter die Blüten schon vor dem Aufblühen überragen. Schmutzig rosenrot, selten weifs. Liebt Kalk (Orchideenwiesen, Diluvialhügel). *P. amara*. Untere Blätter verkehrt-eiförmig, meist eine Rosette bildend, obere keilförmig-länglich. Seitennerven der Flügel aufsen aderig, mit nicht verbundenen Nerven. Bei uns hellblau oder milchweifs, auch rot. ♀. Mäfsig feuchte anmoorige Wiesen. Mai, Juni. 5—15 cm.

**Fam. 31. Euphorbiaceae**, Wolfsmilchgewächse. Meist mit Milchsaft. Blüten ♂, ♀. Fr meist eine in 3 Teile sich spaltende Kapsel.

*Euphorbia*, Wolfsmilch. Die als einzelne Blüten erscheinenden Gebilde stellen einen ganzen Blütenstand dar, der von einem Hüllbecher mit 4—5spaltigem Saum umgeben ist. Saumlappen dick, drüsig, oft halbmond-

förmig und gelbgrün (Drüsen genannt). Im Becher 1 langgestielte ♀ Bl mit 3 Griffeln und zahlreiche ♂ Blüten, die auf 1 Stbb reduziert sind. *E. Ésula*. B glanzlos, verkehrt-länglich- bis lineal-lanzettlich, über der Mitte am breitesten. Hiervon die Unterart *E. pinifolia* mit nur schwach warziger, reif grüner Kapsel, auf Wiesen im Überschwemmungsgebiet der mittleren Elbe, Provinz Sachsen. 20—50 cm hoch. *E. Cyparissias*, zypresenartige Wolfsmilch. B graugrün, schmal-lineal. Drüsen gelb. Sandfelder, gemein. 15—30 cm. April, Mai. Alle Arten mit giftigem, weißem Milchsafte.

**Fam. 32. Callitrichaceae.** Blätter gegenständig. Wasserpflanzen. *Callitriche* (Pflanzenname bei Plinius, *καλός* schön, *τριχίς* Haar) *stagnalis*. ♀. St dünn, bis 25 cm lang. Blätter linealisch, hellgrün, obere rosettig. *C. verna*, wie vorige; obere Blätter verkehrt-eiförmig. Beide in stehendem und fließendem Wasser. Mai bzw. April—Herbst. Zeigen *gutes* Rieselwasser an.

## § 20.

**Dreizehnte Reihe: Parietales,** Wandständige. Samenanlagen meist an der Wand des Fruchtknotens.

**Fam. 33. Violaceae,** Veilchengewächse. *Viola palustris* (Pflanzenname bei den Römern), Sumpfveilchen. B rundlich-nierenförmig. Nebenblätter eiförmig, meist gefranst. Blumenblätter verkehrt-eiförmig, lila. ♀. Sumpfwiesen. Moore. ♀. April, Mai. 5—15 cm. *V. tricolor*, Stiefmütterchen. Nebenblätter groß, leierförmig fiederspaltig. Trockene Äcker, gern auf Sand.

## § 21.

**Vierzehnte Reihe: Myrtiflorae.** Blätter oft gegenständig, Blütenachse mehr oder minder becherartig oder röhrig.

**Fam. 34. Lythraceae.** B ungeteilt. Frk frei.

*Lythrum salicaria* (λύθρον, Pflanze bei Dioskorides, salix Weide, wegen der Blattform, zuerst bei Tournefort), Weiderich. Blätter gegenständig oder zu 3, selten spiralig. Ähre lang, aus zahlreichen Quirlen. Blütenachse (sogen. Kelchbecher) trichterförmig, zylindrisch. Bl 6zählig, Blumenblätter purpurrot. Stbb 12. Griffel 1. Zeigt Heterostylie oder Trimorphismus: 1) kurze und mittellange Stbb und 1 *langer* Griffel; 2) kurze und lange Stbb und 1 *mittellanger* Griffel; 3) mittellange und lange Stbb und 1 *kurzer* Griffel. ♀. An Gräben, gemein.

**Fam. 35. Oenotheraceae,** Nachtkerzengewächse. Bl oberständig, meist K 4, C 4, A 4 + 4, G (4 oder 2).

*Epilóbium* (ἔον ἐπὶ λοβόν, Veilchen über der Schote), Weidenröschen. Kapsel linealisch. Samen mit Haarschopf. *E. angustifolium*. B



spiralig. Traube lang, schön hellpurpurn. Auf Sand, besonders auf abgeholzten Waldstellen. *E. hirsutum*, *parviflorum*, *roseum*, *palustre* und viele andere Arten an Gräben, auf Sumpfwiesen. Diese alle haben die unteren Blätter gegenständig (oder zu 3), alle rot oder blaßrot.

*Oenothera* (Pflanzenname bei Plinius), Nachtkerze. Kapsel unten dicker, zuletzt fast holzig. Samen ohne Haarschopf. *O. biennis*, zweijährige Nachtkerze. Bildet im 1. Jahr nur Blattrosetten, im 2. Jahr einen bis 1 m hohen St mit gelben, langröhrigen Blüten. Seit 1614 aus Amerika eingewandert. Auf Sandfeldern und Ödland, gemein. Wurzel essbar (Rapontika).

**Fam. 36. Halorrhagidaceae**, Wasserpflanzen. Blüten klein, Kelch oberständig.

*Myriophyllum* (μυρία unzählig, πύλλον Blatt, Wasserpflanze bei Dioskorides), Tausendblatt. Mit quirlständigen, kammartig gefiederten Blättern mit haarförmigen Abschnitten. Bl einhäusig, rosa, in Ähren über dem Wasser. *M. verticillatum*. Deckblätter sämtlich fiederspaltig. Ähren aufrecht. Blüten in Quirlen. *M. spicatum* und *alterniflorum*. Obere Deckblätter ungeteilt. Alle in Flüssen, Seen etc. Gutes Rieselwasser anzeigend.

*Hippuris* (ἵππος Pferd, ὄυρά Schwanz, Pflanzenname bei Dioskorides), Tannenwedel. B ungeteilt, quirlig. Bl ♂, ohne Blumenblätter, nur 1 Staubblatt und 1 Griffel. Wurzelstock kriechend. St eng, röhrig. Blätter zu 8—12 im Quirl, linealisch. Dem Schlamm-Schachtelhalm *Equisetum limosum* (heleocharis) entfernt ähnlich, durch den engröhrigen St, den Mangel der Scheiden, die gut ausgebildeten Blätter leicht zu unterscheiden. ♀. Stehende und langsam fließende Gewässer. Zeigt gutes Rieselwasser an.

## § 22.

**Fünfzehnte Reihe: Umbelliflorae**, Doldenblütler. Blüten oberständig, meist 5gliedrig, meist in Dolden.

**Fam. 37. Umbelliferae**, Doldengewächse. K 5 oder meist 0, C 5, A 5, G 2. B spiralig, meist mehrfach gefiedert, mit Stiel und Blattscheide. Blüten in einfachen oder meist zusammengesetzten Dolden, die randständigen oft größer und zygomorph strahlend. Kelchsaum undeutlich oder (z. B. beim Koriander) 5zählig. Blumenblätter meist weiß, klein. Der unterständige Frk spaltet sich bei der Reife in 2 Hälften, die dann an einem meist gespaltenen Fruchträger baumeln: Teilfrüchte (ein Kümmelkorn ist also eine halbe Fr). Meist hat jede Teilfrucht 5 Rippen, 3 auf dem Rücken, 2 an dem Rande. Die Vertiefungen zwischen den Rippen heißen Tälchen, sie sind öfter durch eine Nebenrippe geteilt. Diese kann mitunter weiter vortreten als die Hauptrippe und borstenförmig gefiedert sein, z. B. bei der Mohrrübe. An den Stellen, wo die Tälchen sind, liegen

oft in der Fruchtschale Ölstriemen; normalerweise zwischen den 5 Rippen 4, außerdem an der Berührungsfläche der beiden Teilfrüchtchen noch 2; ein Kümmelkorn hat also 6 Ölstriemen. Einige Doldengewächse haben viele Ölstriemen, andere, z. B. der gefleckte Schierling, keine.

Die Gesamtdolde ist meist von Hüllblättern umgeben (Hülle), die einzelnen Döldchen oft ebenfalls (Hüllchen). Diese geben gute Erkennungsmerkmale.

**Übersicht der wichtigsten, auf Wiesen etc. vorkommenden oder als Bonittierungspflanzen dienenden Doldengewächse.**

**I. Blüten in einfachen Dolden oder Köpfchen:**

Kleine Wasserpflanze mit kreisrunden, schildförmigen Blättern: *Hydrocotyle vulgaris*, gemeiner Wassernabel.

Land-(Kalk-)pflanze mit weißer oder rötlicher, grün geadelter Hülle und weißen oder rötlichen Blüten: *Astrantia major*, große Sterndolde, Strenze.

**II. Blüten in zusammengesetzten Dolden:**

A. Blumenblätter gelb, eingerollt, B ungeteilt: *Bupleurum*, Hasenohr.

" " B gefiedert, Hülle und Hüllchen fehlend: *Pastinaca sativa*, gebaute Pastinake.

" " Hülle 0 oder 1—2blättrig, Hüllchen vielblättrig: *Silaus pratensis*, Silau, in Norddeutschland selten.

**B. Blumenblätter weiß:**

a) *Hülle und Hüllchen fehlend* oder wenigblättrig (1—3):

untere Blätter doppelt, obere einfach 3zählig, nicht gefiedert: *Aegopodium Podagraria*, Ziegenfuß, Giersch.

" " rundlich, oder einfach gefiedert, Fr 2knotig: *Pimpinella*.

" " doppelt(fein)gefiedert, Fr länglich: *Carum Carvi*, Kümmel.

b) *Hülle fehlend* oder wenigblättrig (1—3), *Hüllchen vielblättrig*:

1. Kronenblätter *ausgerandet*. Fr 2knotig. B dreifach gefiedert, Blättchen lanzettlich bis linealisch, scharf gesägt. Blattstiel hohl. Unterirdischer St angeschwollen, quer gefächert: *Cicuta virosa*, Wasserschierling.

2. Kronenblätter *verkehrt-eiförmig* mit eingebogenem Läppchen:

α) Hüllchen einseitwendig *herabhängend*, Laubblätter glänzend: *Aethusa Cynapium*, Gartenschierling, Hundspetersilie.

β) Hüllchen nicht herabhängend:

Kelchsaum *sahnig*, Fruchtträger nicht gespalten, Fr mit langen Griffeln, B bläugrün: *Oenanthe*, Rebendolde.

Kelchsaum *undeutlich*:

Fr eiförmig, flügelig gerippt, Rand klaffend: *Selinum*, Silje.

" zusammengedrückt, Rand klaffend, geflügelt, Blumenblätter elliptisch, grünlich-weiß. Bis 2 m hoch. Blattscheide aufgeblasen: *Archangelica* (vergl. Angelica), Engelwurz.

" linsenförmig, am Rande schmal geflügelt: *Peucedanum officinale*, Haarstrang.

Fr linsenförmig, am Rande breit geflügelt. St behaart: *Heracleum*, Bärenklau.

„ länglich-scharfrispig. Blattzipfel haarfein. Im Gebirge: *Meum*, Bärwurz.

„ länglich oder eiförmig, geschnäbelt, kahl oder borstig: *Anthriscus*, Kerbel.

„ länglich, ungeschnäbelt, kahl, gerippt: *Chaerophyllum*.

„ eiförmig, 2knotig, wellig gerippt: *Contum maculatum*, gefleckter Schierling.

3. Kronenblätter elliptisch, ohne eingebogene Spitze. Pflanze bis 2 m hoch. Bl weiß. Blattstiel seicht rinnig. Sonst wie *Archangelica*: *Angelica*, Brustwurz.

c) *Hülle und Hüllchen vielblättrig*:

aa) Fr länglich oder fast 2knotig:

St kantig gefurcht. Abschnitte der oberen Blätter schief-lanzettlich, scharf gesägt. Fr länglich-eiförmig: *Sium*, Merk.

„ stielrund, gefurcht. Abschnitte der oberen Blätter eiförmig-länglich, eingeschnitten gesägt. Fr fast 2knotig: *Bérula*, Berle.

bb) Fr linsenförmig:

Hülle und Hüllchen zurückgeklappt:

\* breit häutig berandet. St kantig gefurcht. Zipfel der Laubblätter mit weißlicher Stachelspitze: *Peucedanum palustre*.

\*\* nicht häutig berandet. St stielrund, gefurcht: *Peucedanum Cervaria* und *P. Oreoselinum*.

**§ 23. Kulturtechnisch wichtige Umbelliferen.** Das wichtigste und nützlichste Doldengewächs unserer Wiesen ist der Kümmel.

*Carum Carvi* (κάρων Pflanzennamen bei Dioskorides, carvi aus dem Arabischen, kerawi kerawia, Name einer Doldenpflanze), Kümmel. (Fig. 15.) ☉. B doppeltgefiedert, mit fiederteiligen Blättchen und schmal-linealischen Abschnitten; die beiden untersten Fiedern erster Ordnung weit hinabgerückt, am Grunde des scheidenartigen Blattstiels stehend und ein Kreuz bildend. Hülle 0 oder 1blättrig. Hüllchen 0. B weiß. Wegen des in allen Teilen, besonders aber im Samen enthaltenen ätherischen Öles als Gewürzpflanze anzusprechen. Dem Vieh, besonders Rindvieh und Schafen, in nicht zu großer Menge sehr willkommen, soll die Milchsekretion befördern und die Blähungen, die frischer Klee veranlaßt, verhindern. Auch soll er das Verdauungs- und das Nervensystem anregen. (Vergl. Werner, Handbuch des Futterbaues; Pott, Die landw. Futtermittel.)

In Gebirgsgegenden ist sehr geschätzt:

*Meum* (μειον oder μῆον, Pflanzennamen bei Dioskorides) *athamanticum*, haarblättrige Bärwurz. ♀. Wurzelstock oben schopfig. B doppelt-

fiederteilig, Fiederchen in viele haarfeine, fast quirlig gestellte Zipfel geteilt. Wurzelstock sehr aromatisch. Bl. weifs. *Meum Mutellina*, das noch höher geschätzte Mutterkraut der Schweizer Sennen, kommt nur auf Wiesen höherer Gebirge vor, nicht am Harz. Blattzipfel lineal-lanzettlich. Bl. rötlich. Ferner ist ein gutes Futter *Daucus Caróta* (Name bei Apicius), Mohrrübe. B doppelt oder 3fach fiederteilig, matt. Zipfel länglich-lanzettlich. Blattstiele steifhaarig. Hüllblätter 3spaltig oder fiederspaltig, zur Fruchtzeit die vertiefte Dolde wie ein Vogelnest umgebend. ☉ auch ☉. Wiesen, Wegränder, gern auf Lehm und Kalk.

Auf trockenen Wiesen kommen vor: *Peucedanum Oreoselinum* (*πνευδάνον*, Pflanzennamen bei Dioskorides). Grundblätter 3fach gefiedert. Verzweigungen des Blattstiels abwärts geknickt. Blättchen mit länglich-lanzettlichen Zipfeln. 4. 60—90 cm. Auf trockenen Hügeln, besonders auf Kalk. *P. Cervaria*, Hirschwurz. Verzweigungen des Blattstiels flach ausgebreitet. Blättchen länglich-lanzettlich, scharf gesägt, unterseits *blaugrün*, fast lederartig. Futterwert gering.

Einigermassen nützlich ist noch die *Pastinake*, *Pastinaca sativa* (Pflanzennamen bei Plinius), die einzige Umbellifere auf Wiesen mit gelben Blüten, deren Wurzel bekanntlich essbar ist. Nach Werner ist das Kraut seines bitteren Geschmacks wegen in gröfseren Mengen kaum verwendbar.

Die meisten anderen Umbelliferen sind schädlich, weil sie besseren Pflanzen den Raum fortnehmen, teilweise auch giftig sind. Am häufigsten sind darunter:

*Anthriscus silvestris*, wörtlich Waldkerbel, gewöhnlich Kälberkropf genannt. Hülle meist 0, Hüllchen aus meist 5 zurückgeschlagenen gewimperten Blättchen bestehend. Bl. weifs. Fr. länglich, reif lackartig glänzend. Der eigentliche Kälberkropf, Chaerophyllum, z. B. *Ch. temulum*, betäubender Kälberkropf, ☉, kommt mehr in Gebüsch vor. Er hat vielblättrige gewimperte Hüllchen und keinen deutlichen Schnabel (d. h. Fortsatz) an der Fr. St. auch oben behaart, unten oft trüb purpurn gefleckt.

*Pimpinella magna* (als Pflanzennamen zuerst bei Matthaeus Sylvaticus), grofse Bibernelle (nicht zu verwechseln mit *Sanguisorba minor*, Pimpernelle, S. 200). St. kantig gefurcht, bis 90 cm hoch. B. gefiedert. Blättchen ei-länglich, eingeschnitten gesägt. Hülle und Hüllchen 0. Griffel




Fig. 15. *Carum Carvi*.

a Blüte, bei b längsdurchschnitten  
c die Teilfrüchtchen, bei d beide  
querdurchschnitten.

(Nach Garcke.)

zur Blütezeit länger als der Frk. 4. Wiesen, Wiesenmoore. Juni—September. *P. Saxifraga*, bis 60 cm. St stielrund, gestreift. Blättchen der Grundblätter sitzend, rundlich, eingeschnitten gekerbt gesägt. Griffel zur Blütezeit kürzer als der Frk, sonst wie vorige. 4. Auf Triften, trockenen Hügeln etc. Beides minderwertige Futterpflanzen.

*Bupleurum*. Blumen gelb. Blätter ungeteilt. *B. falcatum*, sichelförmiges Hasenohr. B oft sichelförmig gebogen, untere elliptisch, mit gleich starken Längsnerven. Dolden 6—10strahlig. An Kalkbergen in Mittel- und Süddeutschland. 6—10 dm. *B. longifolium*. B mit 1 starken Nerv, ei-länglich, obere tief herzförmig stengelumfassend. Auf Kalk und Glimmerschiefer. 3—10 dm. *B. rotundifolium*. Mittlere und obere Blätter eiförmig, durchwachsen. Unter der Saat auf Ton und Kalk. 15—50 cm. In Norddeutschland selten. *B. tenuissimum*. B lineal-lanzettlich. Bl sehr klein. Salzhaltige Orte. 8—25 cm.

Höchst lästig ist die steifbehaarte Bärenklau, *Heracleum Sphondylium* (heracleum, Pflanzennamen bei Plinius, *σπονδύλιον* bei Dioskorides), B gefiedert. Hülle fehlend oder vorhanden. Hüllchen vielblättrig. Fr linsenförmig. Ölstriemen keulenförmig. Stebler und Schröter („Die Alpenfutterpflanzen“) erklären das H. Sp. für eine gute Futterpflanze.

Auf beschatteten Wiesen und in Parkanlagen kommt viel vor: *Aegopodium Podagraria* (αἴξ Ziege, πόδιον Füßchen, zuerst bei de l'Obel, wegen angeblicher Heilkraft beim Podagra), genannt Geisfuß, Giersch. Durch viele Ausläufer sich sehr schnell verbreitend und kaum auszurotten.

Giftig sind u. a. der Wasserschierling, *Cicuta virosa* (Pflanzennamen bei Herodius und Plinius), kenntlich durch die oft sellerieknollenähnlich angeschwollenen unteren Stengelteile, die quer gefächert sind. Der gefleckte Schierling, *Conium maculatum*, an Zäunen. St unten rot gefleckt. Hülle und Hüllchen zurückgeschlagen. Fr mit wellig gekerbten Rippen. Riecht mäuseartig, besonders welk. *Aethusa Cynapium* (zuerst bei Tabernaemontanus, κύων Hund und Apium, Name einer Doldenpflanze), Gartenschierling, unter Petersilie. Ob wirklich giftig, ist zweifelhaft. Da er ☺, die Petersilie aber ☹ ist, wächst er viel schneller in die Höhe. Blättchen glänzend, gerieben ohne Petersiliengeruch, daran zu erkennen; noch besser zur Blütezeit an den 3 schmalen, einseitswendig lang herabhängenden Blättern der Hüllchen.

Die Gräben werden besonders verunkrautet durch: 1. *Berula angustifolia* (Pflanzennamen bei Marcellus Empiricus), schmalblättrige (in Wirklichkeit ziemlich breitblättrige) Berle (*Sium angustifolium*). St rund. B einfach gefiedert, untere mit eiförmigen, obere mit länglichen Fiedern, eingeschnitten-gesägt. Dolden kurz gestielt. Hülle vielblättrig mit lanzettlichen, meist

fiederspaltigen Blättchen. Fr eiförmig, fast 2knöpfig. 30—60 cm. Juli—Herbst.

*Sium latifolium* (σίον, Pflanzennamen bei Theokritos und Dioskorides), breitblättriger Merk. Ausläufer treibend. Wurzeln fadenförmig. St kantig. B gefiedert. Blättchen der untergetauchten Blätter doppeltfiederteilig mit linealischen Zipfeln, die der Luftblätter schief-lanzettlich, scharf gesägt. Soll giftig sein. 60—125 cm. Juli, August.

*Oenanthe* (οἶνος Wein, ἄνθη Blume, wegen der weinähnlichen Blüte), Rebendolde, Pferdesaat. A. *Ausdauernd*. Wurzeln zum Teil knollig verdickt. *O. fistulosa*, röhrlige Pferdesaat. Ausläufer treibend. Dickere Wurzeln rübenförmig. St wenig ästig, nebst den langen Blattstielen *weit-röhrlig*. Blätter kürzer als der Blattstiel, obere einfach gefiedert, mit linealen, oft 3spaltigen Blättchen. Hülle 0 oder 1 blättrig. Hüllchen vielblättrig, Frucht kreiselförmig. Soll giftig sein. — B. *Nicht ausdauernd*, Wurzeln nicht verdickt. *O. aquatica* (*O. Phellandrium*), Wasserfenchel, Pferde- oder Roskümmele. St sparrig-ästig. B 2—3fach gefiedert. Blättchen der untergetauchten Blätter mit linealischen, die der übrigen mit lanzettlichen Zipfeln. Fr länglich, stielrund. ☉ und ☉.

*Angelica silvestris* (zuerst bei Matthaeus Silvaticus, von angelus Engel), Waldbrustwurz. 1—1,8 m hoch. B 2—3fach gefiedert, mit *seicht-rinnigem* Blattstiel. Blättchen eiförmig, gesägt, *nicht* herablaufend. Bl weiß, selten rosa. ☉. Seitenrippen der Fr breithäutig-geflügelt. *Archangelica officinalis* (archángelus, Erzengel), Engelwurz. Voriger ähnlich, aber seltener, von durchdringendem Geruch, meist größer, 1,2—2,5 m. Blattstiele nicht rinnig, weitröhrlig. B unterseits blaugrün, Endblättchen dreilappig. Bl grünlich-weiß. Inneres Perikarp (Fruchtschale) *lose* in der äußeren Fruchtschale.

*Peucedanum palustre* (πενκεδανόν, Pflanzennamen bei Dioskorides), (*Thysselinum palustre*). B 3fach-fiederteilig, mit lanzettlichen, weißspitzigen Zipfeln. Hülle und Hüllchen zurückgeschlagen, ihre Blättchen häutig-berandet.

#### B. Zweite Reihengruppe: Metachlamydeae.

#### § 24.

**Sechszehnte Reihe: Ericales.** Nach der 4- oder 5-Zahl.

**Fam. 38. Ericaceae.** Sträucher. Staubbeutel meist doppelt so viel als Blütenblätter, durch ein spitzes Anhängsel an jeder Hälfte 2hörig.

*Calluna* (καλλύνω auslegen, weil die Pflanze zuweilen zu Besen benutzt wird), Heidekraut. K 4, C (4), A 8, G (4). Kelch 4spaltig, blumenkronenartig. Blumenkrone glockenförmig, tief 4spaltig, kürzer als der Kelch, Scheidewände der Kapsel dem mittelständigen Samenträger an-

gewachsen. *C. vulgaris*, gemeines Heidekraut (Fig. 16). B lineal, dachziegelartig gedrängt, 4reihig. Traube einseitwendig. Kelch und Krone lilarosenrot. Auf Sand und Moor. Auf Heideboden die Hauptmasse des Bestandes bildend. Dient zur Schafweide, zur Bienennahrung und als Waldstreu. August — Herbst.

*Erica* (ἔρσις, Pflanzennamen bei Aischylos), Glocken-Heide. Blumenkrone länger als der Kelch, 4spaltig. *E. Tetralix*, Sumpf-Heide. Blätter zu 3—4, steifhaarig gewimpert. Blüten kopfig-doldig, zu 5—12. Blumenkrone ei-krugförmig, rosa. ♀. *Feuchte* moorige Stellen der Heide etc. Fehlt in Ostpreußen. Juni — Herbst.



Fig. 16. *Calluna vulgaris*.  
a Zweigstück mit Seitensprossen;  
b Kelch; c Blüte; d Staubgefäß;  
e Fruchtknoten.  
(Nach Garcke.)



Fig. 17. *Hottonia palustris*.  
a aufgeschlitzte Blumenkrone; b Kelch  
mit Fruchtknoten, der bei c quer-  
durchschnitten ist und die zentrale Pla-  
zenta zeigt; d 5klappige, reife Kapsel.  
(Nach Garcke.)

## § 25.

**Siebzehnte Reihe: Primulales**, meist K 5, C (5), A 5, G 1.

**Fam. 39. Primulaceae**, Primelgewächse. Kapsel ungefächert, mit Zentralplazenta (Fig. 17, c) wie bei den Centrospermae (s. S. 191).

*Primula* (*Primula veris* der älteren Schriftsteller, das erste Blümchen im Frühjahr), Himmelschlüssel. ♀. Kelch so lang oder länger als die Krone. Kapsel rundlich oder länglich. Laubblätter in grundständiger Rosette. Bei allen Arten kommen kurz- und langgrifflige Stöcke vor

(Dimorphismus, Heterostylie, vgl. Lythrum, S. 203). *P. farinosa*, mehliges H. Bl fleischrot. Moorwiesen, selten. *P. elatior*. Kelch zylindrisch. Krone hellgelb. Saum flach. Geruchlos. Schattige Laubwälder, feuchte Wiesen. März—Mai. Kultiviert in Gärten. *P. officinalis*, gebräuchlicher Himmelschlüssel. Kelch aufgeblasen. Krone dottergelb, wohlriechend, Saum vertieft. Trockene Wiesen. April—Juni.

*Hottonia palustris* (nach Professor Hotton in Leiden, † 1709, benannt), Sumpfpriamel (Fig. 17). Wasserpflanze mit untergetauchten, kammförmig-fiederspaltigen Blättern und weißen oder hellrosa Blüten in langgestielten Trauben. Gräben, Sümpfe. Heterostyl.

*Lysimachia* (bei Dioskorides, nach dem Könige Lysimachos), Friedlos. ♀. Blumenkrone radförmig, mit kurzer Röhre, gelb. *L. thyrsiflora*, strauchblütige Lysimachie. Grundachse kriechend, Ausläufer treibend. Blätter gegenständig, meist lanzettlich. Blüten klein, in achselständigen, langgestielten dichten Trauben. Tiefe Sümpfe. Mai—Juli. 30—60 cm. *L. vulgaris*. B meist länglich-eiförmig. Bl groß, zu 1—4 in den Blattachseln. Ausläufer oft 1—2 m lang. Sümpfe, Gräben. Juni, Juli. 60 bis 120 cm. *L. Nummularia*, Pfennigkraut. ♀. Stengel kriechend. B rundlich (daher der Name). Bl einzeln, groß. Grabenränder, feuchte Wiesen. Juni, Juli.

*Glaux maritima* (Pflanzenname bei Dioskorides), Seestrands-Milchkraut. Kelch hellrosa. Krone fehlt. St niedrig, Ausläufer treibend. Blätter hellgrün, länglich-lanzettlich, *sehr dicht* stehend. Am Meeresufer und auf salzigen Wiesen im Binnenland.

**Fam. 40. Plumbaginaceae.** Meist Stauden. Laubblätter meist in grundständiger Rosette. Frk mit nur 1 Samenanlage.

*Arméria vulgaris* (zuerst bei la Ruelle; soll keltisch sein), Grasnelke (hat aber mit Nelken gar keine Ähnlichkeit, höchstens die B). B linealisch. Schaft oben mit einer *unten* zerschlitzten Scheide. Bl in einem kopfartigen Blütenstande, dessen Hüllblätter nach unten verlängert die erwähnte Scheide bilden. Kelchsaum wie die Hüllblätter trockenhäutig. Blumenkrone rosa. Trockene sonnige Stellen, meist auf Sand, gemein.

## § 26.

**Achtzehnte Reihe: Contortae.** Blb in der Knospe meist gedreht.

**Fam. 41. Gentianaceae,** Enziangewächse. K 5, C (5), A 5, G (2). Meist bitter schmeckend.

B spiralig: *Menyanthes trifoliata* (Name bei Theophrast, *μνῦν* offenbare, zeige an, *ἄνθος* Blüte — auffallende Blüten), Fieber- oder Bitterklee, Sumpf-Dreiblatt. Scheinachse weit kriechend. B grundständig,



3zählig, mit langem Stiel. Bl in Trauben, rötlich-weiß. Zipfel der Blumenkrone am Rande innen bärtig-gefranst. ♀. Sümpfe, Seen. Mai, Juni.

Blätter gegenständig, gerippt: *Gentiana* (Pflanzenname bei Plinius, genannt nach dem König Gentius), Enzian. Bl groß. *G. Pneumonanthe* (zuerst bei Cordus, πνεύμων Lunge und άνθη Blume), gemeiner Enzian. St einfach, bis 0,5 m hoch. B lanzettlich-linealisch. Bl keulenglockenförmig, himmelblau, außen mit 5 grünen Streifen. ♀. Moorige Wiesen, zerstreut. Juli—Sept. *G. Amarilla*, schwachbitterer E. Sehr veränderlich. B eiförmig bis lanzettlich. Blumenkrone walzig, meist klein. Kronenschlund bärtig, rötlich-lila. ☉. Trockene Wiesen, gern auf Maulwurfshaufen. August—Oktober. 5—30 cm. *G. germanica*. St rispig-ästig oder pyramidenförmig, vielblumig. B aus breitem, halb-stengelumfassendem Grunde länglich oder lanzettlich. Blumen größer, zylindrisch-glockig, lilablau. Sonst wie vorige. Hügel, Triften, gern auf Kalk.

*Erythraea* (zuerst bei Renealmus, ἐρυθραῖος rötlich), Tausendgüldenkrant. St kantig, gabelästig. Bl rot, trichterförmig, *bleibend*. *E. Centaurium* (κενταύριον, Pflanzenname bei Hippokrates), gemeines Tausendgüldenkrant. St meist einfach, nur oberwärts ästig. Untere Blätter rosettig, Stengel-B länglich-eiförmig. Bl in *ebener* Trugdolde, fleischfarben. Kronensaum *flach*, Zipfel länglich-eiförmig. Kelch beim Aufblühen halb so lang als die Kronenröhre. ☉ und ☉. Trockene Wiesen. Juli bis September. Zerstreut; bis 30 cm. *E. linariifolia* (*E. litoralis*), schmalblättriges T. Trugdolde zuletzt verlängert, rispig. Bl rosa, Zipfel oval. Strandwiesen, im Binnenlande oft auf Salzboden. Kelch beim Aufblühen fast so lang als die Kronenröhre. *E. pulchella*, niedliches T. St vom Grunde an gabelästig. Untere Blätter nicht rosettig. Bl mit vertieftem Saum, Zipfel *lanzettlich*. Feuchte Wiesen, auch gern auf Salzboden.

**Fam. 42. Asclepiadaceae**, Seidenpflanzengewächse, wegen der lang-seidenhaarigen Samen. *Vincetoxicum officinale* (bei Dodoens, von vincere siegen, toxicum Gift, also Gegengift, weil Brechen erregend), Schwalbenwurz. Unterirdische Scheinachse kriechend. B meist gegenständig, untere und mittlere Blätter herzförmig, obere lanzettlich. Bl klein, radförmig, in Trugdolden, weiß. Sonnige Hügel, auf Sand, Lehm und Kalk. Giftig. Die 2 Frb bilden 2 Balgkapseln, welche zuletzt auseinanderspreizen (nach Fuchs einer Schwalbe ähnlich).

## § 27.

**Neunzehnte Reihe: Tubiflorae**, Röhrenblütige. K 5, C (5), A 5, G nur (2). Kelch meist bleibend.

**Fam 43. Convolvulaceae**, Windengewächse. Die 2 Frb bilden eine meist 2fächerige Kapsel. *Convolvulus* (Pflanzenname bei Plinius,

convolvere zusammenwickeln). *C. arvensis*, Ackerwinde. Wurzel Adventivknospen bildend. St windend. Blüten zu 1—3. Die 2 Vorblätter am Blütenstiel weit vom Kelch entfernt. Bl weiß oder hellrosa, außen mit 5 roten Streifen. Gern auf Lehm. Oft lästiges Unkraut. Hierher auch *C. sepium*, Zauwinde, an Hecken, und *Cuscuta Trifolii*, Kleeseide.

**Fam. 44. Bor(r)aginaceae** oder **Asperifoliaceae**, Boretschgewächse oder rauhblättrige Pflanzen. Abschnitte der Blumenkrone oft mit hohlen Ausstülpungen (Schlundscluppen). Die 2 Frb sind vom Rücken her eingeschnürt und bilden 4 Nüfchen. Blüten in „Wickeln“, d. h. ein Stiel aus dem andern hervorgesproßt, abwechselnd rechts, links, rechts, links u. s. f. oder umgekehrt. Die ganze Verzweigung bildet eine Scheinachse.

*Symphytum officinale* (σύνφυτον, Name einer Pflanze bei Dioskorides), Schwarzwurz, Beinwell. Grundachse (sogenannte Wurzel) spindelförmig, fleischig, verzweigt. St bis 90 cm hoch, dick, mit geraden und hakenförmigen Haaren. Blätter lang herablaufend, obere lanzettlich. Bl schmutziggelblich oder seltener gelblich-weiß. Die hohen Schlundscluppen bilden ein Zelt über den Staubbeuteln. ♀. Feuchte Wiesen.

*Lithospermum officinale* (Pflanzenname bei Dioskorides, λίθος Stein, σπέρμα Same), gebräuchlicher Steinsame (wegen der harten Nüfchen). St oberwärts sehr ästig. B lanzettlich. Krone hellgelb. Gern auf *Lehm* oder *Kalk*. ♀. 30—120 cm. Nüfchen groß, eiförmig, *weiß*, glatt.

*Myosotis palustris* (μῦς Maus, ὄψ, ὥτος Ohr, Pflanzenname bei Dioskorides), Sumpf-Vergiftmeinnicht. St *kantig*. Griffel so lang als der Kelch. Blüten hellblau. Schlund- oder Hohlscluppen dottergelb. ♀. Sumpfige Wiesen. *M. caespitosa*, rasiges V. ☉. St rund. Griffel halb so lang als der Kelch. Bl himmelblau. Feuchte Wiesen, zerstreut.

**Fam. 45. Labiatae**, Lippenblütler. K 5, C (5), A 2 lange + 2 kurze, G 2, gespalten in 4 Nüfchen. Blumen unregelmäßig, d. h. zygomorph, nur durch *eine* Ebene symmetrisch teilbar. St 4kantig. B gegenständig. Bl in achselständigen Halbquirlen (Doppelwickeln), Blumenkrone 2lippig. Oberlippe oft helmförmig, zuweilen den 3 Abschnitten der Unterlippe fast gleich und dann die Blume scheinbar regelmässig (*Mentha*, *Lycopus*) oder gespalten und auf die Unterlippe herabgerückt (*Ajuga* etc.). Stbb 4, didynamisch, meist die hinteren kürzer, diese mitunter (z. B. bei *Salvia*) fehlend. Frk wie bei den Boraginaceen in 4 einsamige Nüfchen (Klausen) zerfallend.

*Mentha* (Pflanzenname bei Ovidius und Plinius), Minze. In vielen Arten an Gräben und auf feuchten Wiesen etc. Alle ausläufertreibend und sehr veränderlich, je nach dem nasserem oder trocknerem Standorte. (Ascherson und Graebner „Flora des nordostdeutschen Flach-

landes“ S. 586.) Am gemeinsten sind: *M. aquatica*, Wasserrminze, bis 90 cm hoch. Halbquirle nur in den obersten Blattachseln, einen endständigen Kopf bildend (darunter noch 1—2 Köpfe). Kelchröhre trichterförmig, gefurcht, Kelchzähne länger als breit. Blätter eiförmig, gesägt. *M. arvensis*, Feldminze; weil an trockenen Stellen wachsend, meist kleiner, 15—45 cm. St oft liegend. B eiförmig gesägt oder fast ganzrandig. Halbquirle sämtlich in den Achseln von Laubblättern. Kelchröhre glockenförmig, nicht gefurcht, Kelchzähne so lang wie breit. Die oft 1 m langen Ausläufer von *M. aquatica* wachsen an Ufern zuweilen ins Wasser hinein.

*Lycopus* (λύκος Wolf, πούς Fufs), Wolfsfuß, Wolfstrapp. Ausläufer treibend. Stauden. Hintere Staubfäden ohne Stbb, nur mit 1 Knöpfchen. *L. europaeus*. 4. St hoch, bis 90 cm. B länglich-lanzettlich, *eingeschnitten gesägt*. Bl klein, weiß mit purpurnen Flecken. Am Wasser.

*Thymus* (Name einer beim Opfern [θύω] gebräuchlichen Pflanze), Thymian. Kelch nach der Blüte durch einen Haarkranz geschlossen. Oberlippe zurückgebogen. *T. Serpyllum*, Feld-Quendel. Halbstrauchig. St niederliegend, wurzelnd. B linealisch. Bl hellpurpurn. 4. Trockene Wiesen etc. Angenehm, fast wie echter Thymian, *Th. vulgaris*, aus Südeuropa, riechend. Juni—September. 2—30 cm.

*Calamintha* (καλαμίνθη, Name einer arom. Pflanze bei Aristophanes), Kelch 2lippig, zylindrisch. *C. Acinos* (ἄκινος, Name bei Dioskorides), Stein-Thymian. B klein, oval, gezähnt. Fruchtkelch geschlossen. Blumenkrone klein, lila. Trockene Hügel etc. Geruch streng aromatisch.

*Salvia*, Salbei. Nur 2 Stbb, deren Mittelband sehr lang, staubfadenähnlich ist und eine Wippe bildet. Oberlippe meist groß, helmförmig. *S. pratensis*. Grundblätter rosettig, groß, langgestielt, länglich oder herzförmig, runzelig. Bl groß, dunkelblau. 4. Trockene Wiesen. Mai—Juli. 30—60 cm. Gynodiöcisch, d. h. es kommen Stöcke mit nur weiblichen, viel kleineren Blüten vor.

*Glechōma* (γλήχον, bei Aristophanes eine aromatische Pflanze). Unterlippe flach, Mittellappen am größten. *G. hederacea*, efeublättrige Gundelrebe, Gundermann. St kriechend. B nierenförmig, gekerbt. Bl blau. Oberlippe flach. 4. Feuchte Wiesen, Gebüsche. Streng aromatisch.

*Lamium* (Pflanzenname bei Plinius), Taubnessel, Bienensaug. Kelch glockenförmig, mit 5 spitzen Zähnen. *L. purpureum*. ☉. Äcker. Übelriechend. März—Herbst. *L. album*, weißse Taubnessel. 4. Hecken, nicht zu trockene Grasplätze. April—Oktbr.

*Galeopsis* (bei Dioskorides γαλίopsis, eine nesselähnliche Pflanze), Hanfnessel, Daun. Kelch mit 5 stechenden Zähnen. ☉. *G. Ladanium*, Acker-Hanfnessel. St unter den Knoten nicht verdickt, rückwärts weichhaarig. Bl purpurn. Trockene, sandig-lehmige und kalkige Äcker. Juli bis Herbst. *G. Tétrahit*, gemeine Hanfnessel. St steifhaarig, unter den

Gelenken verdickt. Mittelzipfel der Unterlippe fast 4eckig (oder schmaler, ausgerandet, *G. bifida*). Äcker, Gärten. *G. bifida* an feuchteren Stellen.

*Stachys* (στάχυς Ähre, Pflanzennamen bei Dioskorides). Kelch glockig. Oberlippe der Krone meist helmförmig. *S. palustris*, Sumpfschäufel. Unterirdische Ausläufer an der Spitze knollig verdickt. B länglich-lanzettlich. Blütenquirle reichblütig, schmutzig-rosa. 4. Ufer, Gräben, feuchte Äcker. Juli, August.

*Betonica* (Vettonica, eine Heilpflanze der Vettones in Spanien, bei Plinius) (oft zu *Stachys* gerechnet). *B. officinalis*, gebräuchl. Betonie. Blattpaare am St sehr entfernt. B länglich-eiförmig. Bl purpurn. 4. Lichte Waldstellen, trockene Wiesen; fehlt im nordwestlichen Deutschland. 60 cm. Juni—August.

*Scutellaria* (zuerst bei Cortusi, von scutella Schälchen, wegen der Schuppe auf der K-Oberlippe), Helmkraut. Kelch 2lippig, Lippen ungeteilt, zur Fruchtzeit geschlossen, Oberlippe dann abspringend. Bl in den Blattachseln einzeln, einseitswendig. *S. galericulata*, gemeines Helmkraut. B länglich-lanzettlich, gestutzt herzförmig, entfernt kerbig gesägt. Bl blauviolett. 4. Feuchte Wiesen.

*Brunella* (zuerst bei Brunfels, wegen ihrer Anwendung gegen Bräune), Brannelle. 4. Kelch 2lippig, seine Oberlippe kurz 3zählig, zur Fruchtzeit geschlossen. *B. vulgaris*, gemeine Braunelle. B gestielt, länglich-eiförmig. Bl lila. Wiesen. Mai—Herbst. *B. grandiflora*. Bl viel größer, blauviolett. Trockene Hügel, Wiesen, auf Kalk (und Lehm); zerstreut. Juli, August.

*Ajuga* (bei Scribonius Laryus als Synonym von *abiga* angeführt, abigere vertreiben), Günsel. 4. Oberlippe der Bl sehr kurz oder gespalten und ihre Zipfel auf die Unterlippe gerückt. *A. reptans*, kriechender Günsel. Kahl, nur der St zweizeilig zottig, mit beblätterten Ausläufern, unterste Blätter groß, bleibend, langgestielt, spatelförmig. Bl in Scheinähren, blau. Hochblätter ganzrandig. Wiesen, Laubwälder. April—Juni. *A. genevensis*, Genfer Günsel. Dichtzottig. Wurzeln Adventivknospen treibend. Grundblätter zur Blütezeit meist nicht mehr vorhanden, mittlere Hochblätter 3lappig, oberste kürzer als die Bl. Trockene Wälder, Triften, aber (in Zehdenick) auch auf Moorbiesen. Bl blau.

*Teucrium* (Pflanzennamen bei Dioskorides; nach dem Heros Teucros benannt), Gamander. Oberlippe der Bl fehlend, die Zipfel auf die Unterlippe gerückt, deren Mittelzipfel sehr groß ist. *T. Botrys*, Trauben-Gamander. Hellgrün, stark aromatisch. B gestielt, doppelt fiederspaltig. Bl schmutzig rosa. ☉. Auf *Kalkbergen* und *Kalkäckern* in Mittel- und Süddeutschland. *T. Scordium*, knoblauchduftender Gamander, Lachenknoblauch. Ausläufer treibend. B sitzend, länglich-lanzettlich, grob gesägt. Bl meist zu 2, einseitswendig, hellpurpurn. 4. Wiesen, Gräben, oft rötlich überlaufen. *T. Chamaedrys*, gemeiner Gamander. Halbstrauchig.

B oval bis länglich, keilförmig in den kurzen Blattstiel verschmälert. Blüten zu 3, purpurn, einseitswendig. Hochblätter und Kelche meist braunrot. Steinige Abhänge, gern auf *Kalk*, zerstreut in Mittel- und Süddeutschland. 15—30 cm. *T. montanum*, Berg-G. Bl zu endständigen Köpfchen zusammengedrängt. B lineal-lanzettlich. Bl ziemlich klein, *hellgelb*. Sonnige *Kalkberge*, sehr zerstreut in Mittel- und Süddeutschland. Juni—August. St aufsteigend, bis 25 cm lang.

**Fam. 46. Solanaceae.** Fr eine 2fächerige Beere oder Kapsel. *Solanum tuberosum* (Pflanzenname bei Celsus), Kartoffel, von den Kordilleren Chiles und Boliviens durch die englischen Seefahrer Walter Raleigh 1584 und Francis Drake 1586 zuerst eingeführt. *S. nigrum*, schwarzer Nachtschatten; gemeines Unkraut.

**Fam. 47. Scrophulariaceae.** Wie die Labiatae, aber Fr eine 2fächerige Kapsel. Mitunter noch das 5. Staubgefäß ganz oder als Staminodium entwickelt, oder nur 2 Stbb.

*Scrophularia aquatica* (*S. alata*), Wasser-Braunwurz. St geflügelt, 4kantig. B länglich-eiförmig, scharf gesägt. Bl grünlich-rotbraun. ♀. An Gräben. Juli—Septbr. 0,6—1,2 m hoch. *S.* galt früher als Mittel gegen Skropheln.

*Antirrhinum* (Name bei Galenos, *ἀντί* gleich, *ῥίς* Nase) Löwenmaul. Blume ohne Sporn. Kapsel an der Spitze mit Löchern aufspringend. *A. Orontium*. ☺. Lehmäcker. Bl blaßrot. Juli—Oktober. 15—30 cm.

*Linaria* (zuerst bei Matthaeus Silvaticus, wegen der Ähnlichkeit der B mit denen des Flaches), Leinkraut. Bl mit Sporn, Kapsel meist mit Klappen aufspringend. *L. vulgaris*, gem. Leinkraut (auch Löwenmaul genannt). B lanzettlich-linealisch, gedrängt stehend, Bl gelb. ♀. Auf Sand, gemein. Juni—Herbst. 30—60 cm. *L. minor*, kleines Leinkraut. Drüsig behaart. Bl klein, hellviolett, mit blaßgelbem Gaumen.

*Gratiola* (zuerst bei Dodoens, von *gratia* Gnade), Gnadenkraut. Die 2 unteren Stbb auf 2 Staminodien reduziert oder fehlend. B lanzettlich, meist 3nervig, entfernt gesägt. Bl einzeln, langgestielt, weiß oder rötlich. Kapsel eiförmig, zugespitzt. Feuchte Wiesen, Ufer. *Giftig*.

*Veronica* (zuerst bei Fuchs, nach der heiligen Veronica), Ehrenpreis. Bl radförmig, nur 4lappig, weil der obere Zipfel geschwunden ist, meist blau. Stbb nur 2.

**A.** Tragblätter der Bl hochblattartig, die Blütenstände scharf von der beblätterten Pflanze sich abhebend, meist gestielte Trauben darstellend.

I. Trauben sämtlich achselständig. a) Kelch 4teilig:

*V. scutellata*, schildfrüchtiger Ehrenpreis. Trauben sehr locker, in der Achsel nur *eines* der beiden gegenständigen Blätter. B lineal-lanzettlich,

spitz. Kapsel quer breiter. Bl weißlich mit rötlichen oder blauen Adern. 4. Gräben, Ufer, Sumpfränder. Juni—September. 5—30 cm. *V. Anagallis*, Wasser-Ehrenpreis. St fast 4kantig. Trauben gegenständig. B sitzend, halb umfassend, länglich oder eiförmig, spitz. Bl bläulich-weiß mit dunkleren Adern. Kapsel rundlich. Gräben, gern an Quellen und Bächen, häufig, selbst auf Floßholz. *V. Beccabunga*, Bachbunge. St fast rund. Trauben gegenständig. B kurzgestielt, rundlich oder länglich-eiförmig, stumpf, gekerbt gesägt. Bl himmelblau, selten weiß. Besonders an Quellen und Bächen. Zeigt wie vorige *gutes* Rieselwasser an. *V. Chamaedrys* (*χαμαι* am Boden und *δρύς* Eiche = niedriges, eichenähnliches Gewächs), Männertreue (weil die schönen himmelblauen Blumen so leicht abfallen!). St 2zeilig behaart. Trauben gegenständig. B eiförmig, sitzend. Kapsel 3eckig-verkehrt herzförmig. 4. Trockene Wiesen, gemein. *V. officinalis*. St kriechend, rauhaarig. B verkehrt eiförmig, kurz gestielt. Kapsel drüsig. Bl hellblau mit dunkleren Adern. Trockene Wiesen.

b) Kelch 5 teilig: *V. prostrata*, niederliegender Ehrenpreis. St zahlreich, im Kreise niederliegend, nur oberwärts aufsteigend. B lineal-lanzettlich, kurz gestielt. Kapsel kahl. Bl hellblau. 4. Trockene Wiesen. *V. Teucrium*, breitblättriger Ehrenpreis. St wenige, aufrecht. B eiförmig, sitzend. Bl himmelblau. Trauben dichter als bei *V. Chamaedrys*. 4. Trockene Wiesen.

II. Trauben endständig, lang, himmelblau. Kelch 4 teilig. 4: *V. longifolia*. B länglich-lanzettlich, bis zur Spitze scharf doppelt-gesägt. Feuchte Wiesen und Gebüsche. Juli, August. Bis 1,25 m. *V. spicata*, ähriger E. B länglich-oval, an der Spitze ganzrandig. Trockene Wiesen. Niedriger als voriger, bis 30 cm.

**B.** Tragblätter der Bl meist laubartig, die Blütenstände nicht scharf abgesetzt. Kleine einjährige Pflanzen:

*V. Tournefortii*. B rundlich-eiförmig. Bl einzeln, langgestielt, himmelblau, groß. *V. opaca*. B dunkelgrün. Bl dunkelblau. Beide, wie auch *V. praecox* und *V. polita* auf Lehm, zerstreut. *V. hederifolia*, efeublättriger Ehrenpreis. B 3—7 lappig. Bl klein, hellblau. Gemein.

*Euphrasia* (*εὐφράσια* Freude, Frohsinn, zuerst bei Matthaeus Silvaticus), Augentrost. Kelch 4zählig. Bl mit deutlicher Röhre, rachenförmig. B gezähnt. *E. officinalis* (*E. stricta*). B eiförmig. Krone weiß oder bläulich, mit violetten Streifen, Unterlippe mit zitronengelbem Fleck. ☉. Wiesen, gemein. Juli—Oktober. 10—30 cm. *E. Odontites* (*ὀδόντις* Zahn; früher gegen Zahnschmerzen angewandt) (*E. verna*). B lanzettlich. Krone schmutzig rosa. Tragblätter länger als die Blüten. Feuchte Wiesen und Äcker, auch auf Salzboden. Juni—Oktober.

*Alectorolophus* (*ἀλεκτωρ* Hahn, *λόφος* Schopf, Pflanzennamen bei Plinius), Hahnenkamm, Klappertopf. Kelch *bauchig aufgeblasen*, 4zählig.

Oberlippe der Krone zusammengedrückt. *A. major*. St schwarzbraun gestrichelt. Deckblätter bleich, lang zugespitzt. Krone hellgelb, ihre Röhre gekrümmt, meist so lang als der Kelch. Oberlippe mit 2 längeren eiförmigen Zähnen. ☉. Fruchtbare, mäßig feuchte Wiesen, gemein. Mai bis Juli. 30—60 cm. Hiervon die *var. hirsutus*. Kelch- und Deckblätter zottig, auf Äckern. *A. minor*, kleiner Klappertopf. St meist grün. Deckblätter grün oder braun, kurz zugespitzt. Krone *dunkler* gelb, nur halb so groß wie bei der vorigen. Röhre der Krone gerade, kürzer als der Kelch. Zähne der Oberlippe kurz eiförmig; sonst wie voriger, doch nur bis 30 cm hoch. Etwas feuchte Wiesen, weniger häufig. Beide gesellige, lästige Unkräuter.

*Pedicularis* (bei Columella Name einer Pflanze, die wahrscheinlich gegen Läuse, pediculus, angewandt wurde), Läusekraut. Kelch bauchig, gespalten. B fiederspaltig. *P. silvatica*, Waldläusekraut. St mehrere, einfach, der mittlere aufrecht, fast vom Grunde an in lockerer Traube Blüten tragend, die seitlichen niederliegend. Kelch 5zählig, die Zähne blattartig gezähnt. ☉ bis ♀. Moorige Wiesen. Mai—Juli. Hellrosenrot. Hauptstengel nur 15 cm. — *P. palustris*, Sumpf-L. St einzeln, steif aufrecht, bis zur Mitte ästig, Kelch 2spaltig, die Lappen blattartig geschnitten, gezähnt, kraus. ☉. Nasse Wiesen. Bl rosensrot. Höher als vor., bis 40 cm.

*Melampyrum pratense* (μέλας schwarz, πυρός Weizen, Pflanzenname bei Theophrastos), Wiesen-Wachtelweizen. Laubblätter lanzettlich, ganzrandig. Deckblätter grün. Kommt mehr im Wald als auf Wiesen, höchstens auf Waldwiesen vor. Bl blafgelb, Oberlippe helmförmig. *M. arvense*, Acker-W. Deckblätter fiederspaltig, obere wie die Bl purpurn. Lehmäcker. *M. nemorosum*, Hain-W. Deckblätter schön blauviolett, Bl goldgelb. Laubwälder. Sehr schön.

**Fam. 48. Lentibulariaceae** oder **Utriculariaceae**, Wasserhelme, Wasserschlauch-Gewächse.

*Pinguicula*, Fettkraut. Blätter in grundständiger Rosette, fleischig, hellgrün, fangen mit den eingerollten Rändern Insekten, die sie aussaugen. *P. vulgaris*. Bl auf einem Schaft, gespornt, blau. ♀. Moorige kurzgrasige Wiesen, sehr zerstreut. Mai, Juni. 15 cm.

*Utricularia*. Wasserpflanzen mit 2zeiligen, untergetauchten, vielzipfeligen Blättern. Zipfel sehr schmal, einzelne zu rundlichen, blasenförmigen Schläuchen umgewandelt, die ein sich nach innen öffnendes Ventil an ihrer Mündung haben und so kleine Wassertierchen fangen und verdauen. Bl in langgestielten, bei uns goldgelben Trauben über dem Wasser. *U. vulgaris*, gem. Wasserschlauch. Blattzipfel allseitig abstehend. Schläuche bis 2 mm Durchmesser. Gräben, Sümpfe, meist in Wiesentorfmooren (Grünlandsmooren). Verunkrautet die Gräben.

## § 28.

**Zwanzigste Reihe: Plantaginales.**

**Fam. 49. Plantaginaceae.** K 4, C (4), A 4, G (2). Blumenblätter unscheinbar, trockenhäutig.

*Plantago* (Pflanzenname bei Plinius), Wegebreit, Wegerich. Bl in Ähren. Kapsel quer aufspringend, mit 2 ein- oder mehrsamigen Fächern.

*P. major*, großer Wegebreit (Fig. 18). Laubblätter in grundständiger Rosette, eiförmig, 3—5 nervig, gestielt. Ähren zylindrisch, Staubfäden weiß. ♀. Triften etc., gemein. *P. media*. B elliptisch, 3—9 nervig. Ähre länglich-zylindrisch. Staubfäden rötlich-lila. Blüten wohlriechend.



Fig. 18. *Plantago major*.  
a Kelch; b Blüte; c unreife, d reife Kapsel, bei e geöffnet und mit Samen.  
(Nach Garcke.)



Fig. 19. *Sherardia arvensis*.  
a Kelch; b Griffel und Hüllkelch; c ganze Blüte.  
(Nach Garcke.)

Wiesen, zerstreut. *P. lanceolata*, lanzettlicher W. (Spitzwegerich, Hundsrippe). B lanzettlich, 3—5 nervig, kahl. Schaft 5 furchig. Ähren eiförmig-länglich. Staubfäden gelblich-weiß. Gemein. *P. maritima*, Strand-W. B graugrün, fleischig, linealisch. Blumenkronen-Röhre behaart. Salzhaltige Triften, Strandwiesen; fehlt im westl. und südwestl. Deutschland. *P. coronopus*, kränchenförmige W. B fiederspaltig. Salzhaltige Triften, Meeresufer. *P. ramosa* (*P. arenaria*). St ästig, beblättert. Ähren kugelig. Sandfelder.

## § 29.

**Einundzwanzigste Reihe: Rubiales.** K 5 (oder 4), C (5) (oder 4), A 5 (oder 4) G meist (2). B gegenständig.



**Fam. 50. Rubiaceae**, Krappgewächse. K meist 5 (oder 0), C 5 (oder 4), A 5 (oder 4), G 2. Holzgewächse oder (bei uns) Kräuter. St (bei uns) 4kantig. B gegenständig mit Nebenblättern, die bei uns ebenso groß wie die Laubblätter sind, daher die Blätter in 4—6 oder mehrzähligen Scheinquirlen.

A. Kelch 6zählig, Blumenkrone trichterförmig. . . . . *Sherardia*.

B. Kelch undeutlich, Früchtchen halbkugelig:

1. Blumenkrone trichterförmig, 4spaltig . . . . . *Asperula*.

2. Blumenkrone radförmig, flach, meist 4spaltig . . . . . *Galium*.

*Sherardia arvensis* (nach William Sherard, engl. Konsul in Smyrna, † 1728), Acker-Sherardie (Fig. 19). St niederliegend, rauh, untere Blätter zu 4, obere zu 6, lanzettlich. Bl kopfig, lila. ☉ und ☉. Äcker, auf Lehm- und besonders Kalkboden, zerstreut. 15—30 cm.

*Asperula arvensis* (zuerst bei Brunfels; asper rauh, wegen des rauhen Blattrandes). Bl kopfig. Deckblätter weißborstig. Bl blau. ☉. Lehmige, besonders kalkhaltige Äcker. Sehr zerstreut in Mittel- und Süddeutschland. Mai, Juni. Bis 30 cm. *A. odorata*, Waldmeister. In Laubwäldern. ♀. Frucht mit hakigen Borsten.

*Galium* (γάλα Milch, Name bei Dioskorides; die Pflanze soll die Milch gerinnen machen), Labkraut.

a) Blütenstand blattwinkelständig:

*G. Aparine* (ἀπαρίνη, Name bei Theophrastos), Klebkraut. B zu 6 bis 8, linealisch-lanzettlich, am Nerven unterseits rückwärts stachelig rauh. Bis 1,25 m lang, oft lianenartig kletternd. Sich leicht an die Kleider heftend. Äcker etc., gemein. ☉. *G. uliginosum*, Moor-Labkraut. B zu 6—8, lineal-lanzettlich, spitz. Bleibt beim Trocknen grün. Juni—Sept. 15—30 cm. *G. palustre*, Sumpf-L. B meist zu 4, lineal-länglich, vorn breiter, ohne Stachelspitze. Wird beim Trocknen leicht schwarz. Mai bis September. 15—60 cm. Beide letzteren ♀. Auf feuchten Wiesen.

b) Blütenstand in endständigen Rispen:

*G. boreale*, nordisches L. St aufrecht, steif. B zu 4, lanzettlich, derb. Bl weiß, wohlriechend. ♀. Trockene Wiesen. Juli, August. *G. verum*, echtes L. St rundlich. B zu 8—12, linealisch. Bl zitronengelb. Wiesen, Triften, dürre Hügel. Wird beim Trocknen leicht schwarz. *G. Mollugo* (Mollugo, Pflanzennamen bei Plinius), gem. Labkraut. St 4kantig. B zu 8, vorn breiter. ♀. Wiesen, Gebüsche, gemein. Bleibt beim Trocknen meist grün. Bl weiß, wohlriechend.

**Fam 51. Valerianaceae.** B ohne Nebenblätter. Bl in Trugdolden, klein. Kelch zur Blütezeit oft undeutlich oder gezähnt, später oft eine gefiederte Haarkrone bildend. Blumenkrone oft mit Höcker (Andeutung eines Sporns), K 5, C 5, A 3, G (3). Fruchtknoten 1fächerig, 1samig oder außer dem fruchtbaren Fach noch mit zwei leeren.

*Valeriana* (zuerst bei Matthaeus Silvaticus), Baldrian. Kelchsaum zur Blütezeit eingerollt, zur Fruchtzeit als federige Haarkrone ausgebildet. Blumenkrone am Grunde mit Höcker. Frucht 1fächerig. *V. officinalis*. 6 bis 9 dm hoch. Grundachse nach Baldriansäure (fußschwefelsäureähnlich) riechend. B unpaarig gefiedert. Bl ♂. ♀. Feuchte Wiesen, Gebüsche, gern auf Kalk und Lehm. Juni—September. *V. dioica*. Niedrig, 1,5 bis 3 dm. Bl vielehig, dreierlei Art: 1. Blumenkrone groß, meist weiß, ♂. 2. Blumenkrone halb so groß, meist rosa, Griffel kürzer als die Blumenkrone. 3. Blumenkrone noch kleiner, rosa, Griffel so lang oder länger als die Blumenkrone. No. 2 und 3 tragen Früchte, bei 1 ist die Trugdolde lockerer. — Grundachse kriechend, Ausläufer treibend. ♀. Feuchte, selbst saure Wiesen. April, Mai.

*Valerianella*. Kelch undeutlich 3zählig. *V. olitoria*, gemeines Rappünzchen. St gabelästig. B länglich-spatelförmig, obere lanzettlich, gelbgrün. Blumenkrone klein, bläulich-weiß. Frucht rundlich-eiförmig. Äcker, Gärten, gern auf feuchterem Lehmboden.

**Fam. 52. Dipsaceae.** Bl klein, in Ähren oder Köpfen, die von Hüllblättern umgeben. Stbb 4 oder weniger. G (2), aber Fr 1fächerig mit 1 Samen. B gegenständig. Jede einzelne Bl mit doppeltem Kelch, der äußere röhrig, krautartig, der eigentliche, innere, oft borstenförmig.

A. Eigentlicher innerer Kelch beckenförmig, ohne Borsten. Bl in großen Ähren (Köpfen), mit stehenden großen Deckblättern. *Dipsacus silvester* (διψαχός, Name dieser Pflanze bei Dioskorides), wilde Karde. 1—2 m hoch. Deckblätter biegsam mit gerader Spitze (bei der Weberkarde *D. Fullonum* steif mit umgebogener Spitze). Meist auf Lehm; Wiesenränder, zerstreut.

B. Eigentlicher Kelch in Borsten geteilt:

I. Außenkelch ungefurcht, keine Spreublättchen (Deckblättchen) auf dem Blütenboden. Kelchsaum mit 8—16 Borsten. Blumenkrone lila . . . . . *Knautia*.

II. Außenkelch gefurcht. Spreublättchen vorhanden:

a) Außenkelch mit krautartigem, d. h. grünem Saum.

Kelchsaum mit 5 Borsten. Blumenkrone blau. . . . . *Succisa*.

b) Außenkelch mit trockenhäutigem Saum. Kelchsaum bei uns mit 5 (sonst auch 10) Borsten. Blumenkrone

blau, rötlich oder gelblich-weiß . . . . . *Scabiosa*.

*Knautia arvensis* (nach Christian Knaut, Arzt in Halle, † 1716, benannt, Verfasser der *Methodus plantarum genuina*), Acker-Knautie. Untere Blätter oft ungeteilt, mittlere fiederspaltig. Außenkelch zusammengedrückt-4kantig. Köpfe halbkugelig. Randblumen strahlend. Pfirsichblütig, fleischrot. ♀. *Trockene* Wiesen, häufig. Juni—August. 2—6 dm.

*Succisa pratensis* (zuerst bei Fuchs, wegen der unten wie abgeschnitten erscheinenden Grundachse [Wurzelstock], von succidere, unten abschneiden), Teufelsabbiss. St mit 2—3 entfernten Blattpaaren. B ungeteilt, untere länglich, obere lanzettlich. Köpfe halb-, später ganzkugelig. Bl blau. Randblüten nicht strahlend. ♀. Feuchte Wiesen. Juli—September.

*Scabiosa Columbaria*, Tauben-Skabiose (scabiosus rüdig, rauh). B der nicht blühenden Triebe eingeschnitten oder leierförmig, die oberen der blühenden St fiederteilig. Bl rötlich-lila. ♀. Trockene Wiesen.

### § 30.

**Zweiundzwanzigste Reihe: Campanulatae**, Glockenblumengewächse im weiteren Sinne. Typus: K 5 (oder 0), C (5), A (5), G (2)—(5). Hauptcharakter: *Staubbeutel zusammenneigend* oder verwachsen. Fruchtknoten unterständig, seine Blätter meist minderzählig.

**Fam. 53. Campanulaceae**, Glockenblumengewächse im engeren Sinne. Oft mit Milchsaft. B spiralig. Griffel 2—5 teilig, mit Sammelhaaren für den Pollen. Fruchtknoten 2—5 fächerig.

*Jasione* (Pflanzenname bei Theophrastos, *ἵασις* Heilung). *J. montana*, Bergjasione. Bl klein, blau, in Köpfen. Zipfel der Krone linealisch, zu einer Röhre zusammenklebend, sich später von unten nach oben trennend. B verkehrt-eiförmig, obere lanzettlich. ☉. Trockene Wälder, Sandfelder. Wird leicht für eine Komposite gehalten.

*Phyteuma* (Pflanzenname bei Dioskorides), Teufelskralle. Kronenzipfel wie bei Jasione, Staubfäden am Grunde verbreitert. *P. orbiculare*, rundköpfige T. Untere Blätter gestielt, ei-länglich, obere sitzend, lanzettlich, alle gekerbt. Äußere Hüllblätter lanzettlich, etwas gesägt. Bl himmelblau. Trockene, fruchtbare Wiesen, gern auf *Kalk- und Mergelgrund*, zerstreut in Mittel- und Süddeutschland.

*Campanula* (zuerst bei Fuchs, campanula Glöckchen; die Kirchenglocken sollen bekanntlich zu Nola in Campanien erfunden sein), Glockenblume. Blumenkrone meist glockenförmig, Kapsel kreiselförmig.

a) Blüten in Trauben: *C. rapunculoides*. Grundachse kriechend. Ausläufertreibend. St und B rauhaarig. Traube einseitwendig, Bl hellviolett. ♀. Sonnige Hügel. 3—12 dm. *C. persicifolia*, pfirsichblättrige Glockenblume. Traube wenigblütig. B kahl. Bl groß, weitglockig, himmelblau. 30—100 cm. Trockene grasige Hügel, Wälder.

b) Bl in Rispen: *C. rotundifolia*. Nur die Grundblätter, besonders der nicht blühenden Pflanzen, rundlich nierenförmig, die der blühenden St lanzettlich oder lineal. Rispe locker, Kelchzipfel lineal. Krone bauchig-glockig, dunkelblau. Gemein, auf trockenen Wiesen etc. 2—3 dm. *C. patula*,

ausgebreitete Glockenblume. Krone trichter- oder zylindrisch-glockenförmig. ☉. Wiesen, Wälder. Bl. blaulila. Mai—Juli. 3—6 dm.

*Specularia Speculum* (zuerst bei Heister, speculum Spiegel, wegen der Blumenkrone), Frauenspiegel. Blumenkrone radförmig, violett. B länglich, halb stengelumfassend. Unter der Saat, gern auf Lehmboden, in Mittel- und Süddeutschland zerstreut.

**Fam. 54. Compositae**, Zusammengesetztblütige oder Korbblütler. B spiralig. K meist 0, C (5), A (5), G (2). Kelch nicht entwickelt, an Stelle desselben oft zahlreiche Haare oder auch Borsten (Pappus). Blüten ♂ oder zum Teil ♀, klein, meist zu vielen in einem Kopf zusammengestellt, der von Hüllblättern (Hüllkelch) umgeben ist. Die mittleren (sog. Scheiben-) Blüten (seltener alle) oft regelmäÙsig, röhrenförmig, 5zählig, die Randblüten (oder alle) oft unregelmäÙsig, zungenförmig. Staubfäden frei, Staubbeutel meist zu einer Röhre verwachsen, durch welche der vom unterständigen Frk entspringende Griffel hindurchtritt und den in der Röhre befindlichen Blütenstaub (oft mit einem Besen unter den 2 Narben) hinausfeht, sich oben in 2 meist ankerartige Schenkel (Narben) teilend.

Übersicht der Unterfamilien:

- I. Meist ohne Milchsafte. Blumenkrone der Scheibenblüten nicht zungenförmig . . . . . Unterfam. *Tubuliflorae*.
- II. Mit Milchsafte. Blüten alle zungenförmig, ♀, meist gelb . . . . . Unterfam. *Liguliflorae*.

## § 31.

**Unterfamilie I. Tubuliflorae.** Zu dieser gehören nicht nur diejenigen, bei denen *alle* Blüten röhrenförmig sind, sondern auch diejenigen, bei denen die Randblüten zungenförmig sind (z. B. Kamillen). In diesem Fall sind die Randblüten meist ♀, die mittleren (sogenannten Scheibenblüten) ♂.

a) Alle Blüten röhrenförmig. *Eupatorium cannabinum* (bei Dioskorides von *εὐπάτωρ*, Beiname des Königs Mithridates), Wasserdost, Lämmerchwanz. GroÙs, 9—15 dm. B *gegenständlig*, meist 3 teilig, mit lanzettlichen Abschnitten. Köpfe klein, in dichten Doldenrispen. Trüb *rosa*. Die Pflanze duftet apfelähnlich. An Gräben und feuchten Gebüsch. 4. Juli—September. (Tussilago und Petasites, die scheinbar hierher gehören, siehe S. 226.)

b) Strahlblüten (Randblüten) meist zungenförmig, ♀ (selten geschlechtslos), weiß, gelb, rot oder blau. Scheibenblüten (Mittelblüten) gelb, ♂.

*Bellis* (Pflanzenname bei Plinius), Gänseblümchen, Maßliebchen. B rosettig, spatelförmig. St unbeblättert, 1 köpfig. Strahlenblüten weiß oder außen *rosa*. Wiesen, gemein, auf Rasenplätzen lästiges Unkraut.

*Aster Tripólium* (ἀστὴρ Stern, Name einer Pflanze bei Theophrastos), Strand-Aster. Etwas fleischig, kahl. St ästig. Obere B lineal-lanzettlich. Köpfe doldenrispig. Hüllblätter angedrückt. Strahlblüten blaulila. Strand- und Salzwiesen. ☉. Bis 9 dm. Juli—September. *A. Amellus*, Berg-aster. Behaart. Obere B länglich-lanzettlich. Hüllblätter abstehend. Köpfe doldenrispig, ziemlich groß. Strahlblüten blau. ♀. Gern auf *Kalk*. 3 bis 5 dm. *A. alpinus*, Alpenaster. St 1köpfig. B 3nervig, weichhaarig. Strahlblüten blau. Mittel- und Süddeutschland, selten, gern auf *Kalk*.

*Erigeron* (ἔρις früh, γέρον Greis, Pflanzennamen bei Theophrastos), Dürrwurz. Köpfe klein, in Doldenrispen. Strahlblüten schmal-lineal.

*E. acer*, scharfe Dürrwurz. Äste 1köpfig. Strahlblüten lang, rötlich-lila. *E. canadensis*, kanadische Dürrwurz. Äste mit vielen sehr kleinen, gedrängten Köpfchen. Strahlblüten kurz, schmutzigweiß oder lila. Beide auf sandigem Unland, lästige Unkräuter, letztere häufiger.

Hieran schlossen sich eine Anzahl Gattungen, die wollig-filzig sind und nur Röhrenblüten haben. Hüllblätter am Rande trockenhäutig, oft metallglänzend. So: *Filago* (zuerst bei Dodoens, von filum Fadengespinnt, wegen des wolligen Überzuges), Schimmelkraut. St ästig. Köpfe klein, gelblich-weiß. *F. germanica*. Sandig-lehmige oder kalkige Äcker. *Gnaphalium* (*Antennaria*) *dióicum* (γναφάλιος filzig, wegen der Blätter, bei Dioskorides), Katzenpfötchen. Mit Ausläufern. Hüllblätter der ♂ stumpf, meist weiß, der ♀ spitz, meist rosa (Immortelle). ♀. Trockene Wiesen, auf Sandboden. *G. uliginosum*, Sumpf-Ruhrkraut. St ästig, Köpfchen knäuelartig, beblättert. Hüllblätter gelblich oder bräunlich. ☉. Feuchte Äcker, auf Sand und Lehm. *Helichrysum arenarium*, Strohblume, Immer-schön. Hüllblätter locker, schön zitronengelb, selten orange. Blumenkrone orange. ♀. Sandige Triften, in Hessen nur auf Kalkhügeln.

*Ínula* (Pflanzennamen bei Vergilius), Alant. Strahlblüten geschlechtslos, Hüllblätter dachziegelig. *I. Britannica*. St zottig, 1 bis vielköpfig. Blätter weich behaart, lanzettlich, die oberen mit herzförmigem Grunde stengelumfassend. Köpfe groß, gelb. Hüllblätter viel kürzer als die Strahlblüten. ♀. Wiesen. 2—9 dm. Geruch aromatisch, etwas knoblauchartig.

*Bidens* (als Pflanzennamen zuerst bei Caesalpinus), Zweizahn, wegen der Frucht, Wasserdost. Blätter gegenständig. Fr mit 2—6 rückwärts rauen Grannen, sich leicht an die Kleider hängend, auch jungen Fischen sich ins Maul setzend und sie tödend. *B. tripartitus*, dreiteiliger Z. B meist 3—5 teilig. Blumenkrone gelbbraun. Fr mit 2 oder 3 Grannen. ☉. Gräben, feuchte Wiesen. 2—9 dm. Juli—Septbr. — *B. cernuus*, nickender Zweizahn. Köpfe nickend. Ufer, Sümpfe.

*Galinsoga* (nach de Galinsoga, Intendant des botan. Gartens in Madrid, um 1800, benannt), Knopfkraut. *G. parviflora*, kleinblum. K. Strahlblüten meist nur 5, ♀, weiß. Blütenstandachse kegelförmig. St sehr ästig. Blätter gegenständig, herzeiförmig. ☉. Aus Peru; seit 1807 aus dem botan. Garten zu Berlin ausgewandert, jetzt stellenweise lästiges Unkraut.

*Anthemis* (ἀνθεμὶς Kamille, bei Dioskorides), Hundskamille. Blütenboden mit Spreublättchen. Hüllblätter dachziegelig. Randblüten länglich, ♀. Kelchsaum 0. B spiralig. *A. arvensis*, Acker-Hundskamille. B doppeltfiederteilig. Blütenboden kegelförmig, innen *nicht* hohl, im Gegensatz zur echten Kamille *Matricaria Chamomilla*. Hüllblätter zuletzt an der Spitze zurückgebogen. ☉ und ☉. Äcker, gemein. Juni—Herbst. 2—5 dm.

*Achillea* (nach dem Heros Achilles benannt, bei Hippokrates), Garbe. Randblüten rundlich eiförmig, ♀. Kelchsaum 0. Bl in Doldenrispen. *A. Ptarmica*, Bertram-Garbe. Grundachse kriechend. B lineal-lanzettlich, gesägt. Bl in lockeren Doldenrispen. Strahlblüten etwa 10. Wiesen, Gräben. Juli, August. 3—10 dm. *A. Millefolium*, Schafgarbe. Grundachse kriechend, mit Ausläufern. B doppelt-fiederteilig, Abschnitte 2—5-spaltig, Zipfelchen lineal. Bl in dichten Doldenrispen. Strahlblüten 4—6. ♀. Wiesen, Triften, gemein. Juni—Oktober. 2—5 dm. Gute Futterpflanze.

*Leucanthemum* (λευκός weiß und ἄνθεμον Blume, Pflanzennamen bei Dioskorides). Blütenboden flach, halbkugelig, markig. *L. vulgare* (*Chrysanthemum Leucanthemum*), weiße Wucherblume. St bis 6 dm. 1 köpfig. Stengelblätter sitzend, länglich-lanzettlich, gesägt. Kopf groß, ohne Spreublättchen. ♀. Trockenere Wiesen, gemein. Mai—August.

*Tanacetum* (bei Karl dem Großen Tanazita) *vulgare*, gemeiner Rainfarn. B fiederteilig. Blüten in flachen Doldentrauben, gelb. ♀. An Rainen, besonders auf Lehm. 6—12 dm. Juli—Herbst.

*Matricaria Chamomilla* (χαμαίμηλον, bei Dioskorides eine Pflanze, deren Geruch an Äpfel [μήλον] erinnert), echte Kamille. Blütenboden kegelförmig, *hohl*, ohne Spreublättchen. B 2—3fach fiederteilig, Abschnitte schmal, lineal. ☉. Äcker, besonders auf Lehm. Geruch angenehm aromatisch. Die Blüten ein wichtiges Heilmittel.

*M. inodora*, geruchlose Kamille. Blütenboden halbkugelig, markig. B wie bei voriger. Zipfel lineal-fadenförmig, unterseits gefurcht. ☉ und ♀. Äcker. Juni—Herbst. 2—6 dm.

*Chrysanthemum segetum* (χρυσός Gold und ἄνθεμον Blume; Pflanzennamen bei Dioskorides), gelbe oder Saat-Wucherblume. Blaugrün, etwas fleischig. Obere B halb stengelumfassend, grob gesägt, an der Spitze breiter. Bl dottergelb. ☉. Äcker, auf schwarzem, feuchtem Boden, in manchen Gegenden eine Landplage, in andern fehlend.

*Artemisia* (vielleicht nach der Göttin Artemis Eileithyia, wegen ihrer Wirksamkeit bei Frauenkrankheiten), Beifuß. Strauchartig, in vielen Arten auf dünnen Plätzen etc. *A. vulgaris*, gem. B., *A. Absinthium*, Wermut.

*Tussilago Färfara* (Pflanzenname bei Plinius), Huflattich. Grundachse weiß, auf Äckern ca. 30 cm unter der Erde, wagrecht verzweigt, weithin kriechend und Ausläufer treibend. An der Spitze im Sommer und Herbst eine Rosette langgestielter, rundlich-herzförmiger (hufförmiger), gezählter, unterseits weißfilziger Blätter tragend. „Der meist endständige 1köpfige goldgelbe Blütenstand entwickelt sich, oft mit mehreren seitenständigen, im nächsten Frühjahr vor der Entfaltung der neuen Blätter; er trägt nur gefärbte schuppenartige Blätter und stirbt nach der Fruchtreife ab.“ (Ascherson und Graebner.) März—Mai. 25 cm. ♀. Auf Ton- und Lehmboden, besonders an quelligen Stellen. In den goldgelben Köpfen sind die ♀ Randblüten ganz schmal zungenförmig.

*Petasites* (πέτασος breiter Hut, wegen der rundlichen Blätter, bei Dioskorides), Pestwurz. Blütschaft blattlos, nur mit lockeren Schuppen, meist vor den Blättern erscheinend. Köpfchen in Rispen. *P. officinalis*. B rundlich-herzförmig, eckig, unterseits graugrün, Herzausschnitt tief, sehr groß. Bl schmutzig-purpurn. ♀. Feuchte Wiesen, Quellen, Gräben. März, April. 30 cm.

*Arnica montana* (zuerst bei Ruppian, soll aus *παρμηκή* durch Verstümmelung entstanden sein), Berg-Wohlverleih, Arnika. St einfach. Blätter gegenständig, hellgrün, grundständige meist 4, länglich verkehrt-eiförmig. Blütenköpfe groß, einzeln, orange. ♀. Feuchte, besonders torfige, seltener trockene Wiesen, stellenweise. Geruch stark aromatisch. Wund-Heilmittel.

*Senecio* (bei Plinius, von senex Greis; wohl wegen der bald sichtbar werdenden Haarkrone), Baldgreis. Früchte zylindrisch, gerippt, mit Haarkrone. (1200 Arten!) Köpfe bei unseren Arten gelb, rispig. *S. paluster*, Sumpfbaldgreis. Torfsümpfe, besonders in frisch gestochenen Torfgruben. Höhe 3—6 dm. Dicht klebrig zottig. St dicht beblättert. Stengelblätter lanzettlich. ☉. Norddeutschland und Elsaß. *S. vulgaris*, Kreuzkraut. ☉ u. ☉. Stengelblätter buchtig fiederspaltig, spinnwebig. Strahlblüten fehlend. Lästiges Unkraut. *S. vernalis*, Frühlings-Kreuzkraut, ☉ u. ☉, ähnlich dem vorigen. *Strahlblüten vorhanden*. B kraus. Köpfe locker doldenrispig. Mai, Juni. Eisenbahndämme, Unland. Wandert immer weiter nach Westen, ist aber lange nicht so gefährlich, wie man erst annahm. *S. Jacobaea*. Untere Blätter mit kerbig-eingeschnittenem Endabschnitt, obere Blätter fiederteilig, stengelumfassend, Fiedern weit abstehend. ♀. Wiesen. *S. aquaticus*, ähnlich, hellgrün, Köpfe größer.

*Carlina acaulis* (zuerst bei de l'Obel, nach Kaiser Karl d. Gr. benannt; sie soll sich in seinem Heere bei einer pestartigen Krankheit hilf-

reich gezeigt haben), stengellose Eberwurz, Wetterdistel. B nur grundständig, gefiedert, Abschnitte stachelig gezähnt. St 1 köpfig. Köpfe sehr groß, mit schön silberweißen, trocken sich spreizenden inneren Hüllblättern. Auf Kalk, zerstreut in Mitteldeutschland. *C. vulgaris*. St doldenrispig. Dürre Hügel, Kalkberge.

*Carduus* (Name einer Distel bei Vergilius), Distel und *Cirsium*, Kratzdistel; beide werden kurzweg als Disteln bezeichnet.

*Carduus*. Haare der Haarkrone einfach, nur gezähnt, unten zu einem Ringe verwachsen. *C. crispus*, krause Distel. B herablaufend, unterseits wollig-filzig. Köpfe klein, rundlich, meist gehäuft. Krone purpurn. ☉. Wiesen, Flußufer, Zäune. 6—15 dm.

*Cirsium* (κίρσιον, Name einer Distelart bei Dioskorides, von κίρσος Krampfader, da die Pflanze gegen dieses Leiden angewendet wurde). Haare der Haarkrone gefiedert. *C. lanceolatum*, lanzettl. Kratzdistel. B fiederteilig, oberseits von kleinen Stacheln rauh, herablaufend. Köpfe einzeln, groß. Hüllblätter mit abstehendem Stachel. Hellpurpurn. Ackerränder, Weiden. Juli, August. *C. oleraceum*, kohllartige K., Wiesen Kohl. Pflanze gelbgrün, weichstachelig. Köpfchen gehäuft, von großen, eiförmigen, bleichen Hochblättern umgeben. Bl gelblich-weiß. ♀. Auf feuchten Wiesen oft lästiges Unkraut. Juli, August. 5—15 dm. *C. acaule*, stengellose Kratzdistel. Blütenköpfchen einzeln oder zu 2—3, fast auf der Wurzel sitzend. ♀. Trockene Wiesen. Juli—September. Purpurn. *C. palustre*, Sumpf-Kratzdistel. Derb stachelig. St nebst B spinnwebig-filzig, B herablaufend, tief fiederspaltig, mit 2spaltigen, stachelspitzigen Zipfeln. Köpfchen klein, traubenförmig geknäult, auf kurzen, weiß-spinnwebigen Stielen. Purpurrot. ☉. Nasse Wiesen, auf Moorbiesen oft sehr unangenehmes, lästiges Unkraut. 6—15, selbst 25 dm hoch. *C. arvense*, Ackerdistel. Blüten 2häusig. Gleich voriger dicht- und derbstachelig und ebenso lästiges Unkraut, aber noch gefährlicher, weil sie nicht 2jährig, sondern ausdauernd ist. Wurzel sehr ästig, *Adventivknospen* bildend. St fast kahl. B wenig herablaufend, lanzettlich, buchtig bis fiederspaltig. Köpfe ziemlich klein, eiförmig, rispig-ebensträussig. Äcker, Triften, meist auf gutem Boden. Juli, August. — Vertilgung durch Ausstechen oder Ausziehen mit Distelzangen; doch bilden sich auf den zurückgebliebenen Wurzelstücken, selbst auf kleinen, wieder Adventivknospen, die sich zu Stengeln entwickeln. Daher kaum auszurotten. Nur dichte Bedeckung des Bodens mit anderen Pflanzen kann sie zurückdrängen. Auch sollte man alle Distelköpfe, bevor die Samen davonfliegen, vernichten. Vielleicht dürften sich Raupenfackeln, mit denen man die fast reifen Köpfe ansengt oder verbrennt, empfehlen.

*Serratula tinctoria* (Pflanzenname bei Plinius), Färberscharte. Grundblätter gestielt, meist ungeteilt. Stengelblätter sitzend, fiederspaltig, scharf



gesägt. Köpfe in Doldenrispen, 2häusig, purpurlila. Hüllblätter an der Spitze violett. ♀. Trockene Wiesen, lichte Gebüsche. Juli—September. 3—10 dm.

*Centaurea* (Pflanzenname bei Hippokrates, nach dem kräuterkundigen Centauren Cheiron benannt), Flockenblume. Die schönen großen tutenförmigen Randblüten sind geschlechtslos und dienen als Schauapparat, als Anlockungsmittel für Insekten. Hüllblätter dachziegelig, an der Spitze mit einem trockenhäutigen Anhängsel (oder 1 Stachel). *C. Jacéa* (italienisch, Stiefmütterchen), gemeine Flockenblume. Obere Blätter länglich-lanzettlich. Hüllblätter ganz von den meist rundlichen, bräunlichen, angedrückten Anhängseln bedeckt. Hellpurpurn. ♀. Trockene Wiesen etc. Juni—Herbst. 3—9 dm. *C. Cyanus* (κύανος blau), Kornblume. B lineal-lanzettlich. Hautrand der Hüllblätter fransig geschlitzt. — „Kornblumenblau“. ☉ und ☉. *C. montana*. B herablaufend, lanzettlich. ♀. Garten-Kornblume. Kalkberge. Mittel- und Süddeutschland. *C. phrygia*. B länglich-elliptisch, gesägt-gezähnt. Anhängsel der Hüllblätter zurückgekrümmt, fiederig gefranst, die der innersten über die äußeren hervorragend. Wiesen im östlichen Deutschland.

### § 32.

**Unterfamilie II. Liguliflorae, Zungenblütige.** Alle Bl zungenförmig. Pflanzen mit Milchsaft.

*Cichorium* (Pflanzenname bei Theophrastos und Dioskorides). Früchte kantig, nicht ausfallend. Kelchsaum aus Schuppen bestehend. *C. Intybus* (intubus oder intubum, Name der Gattung bei Vergilius), Cichorie, Wegwarte. St aufrecht. Untere Blätter buchtig-fiederspaltig, obere lanzettlich, halbstengelumfassend. Köpfe traubig. Bl hellblau. ♀. Wegränder (daher der Name), auf *Ton-* und *Lehmboden*. Auch gebaut.

*Hypochoeris* (soll von ὀπόχοιρος Ferkel [χοῖρος] säugend, herkommen; Pflanzenname bei Theophrastos), Ferkelkraut. Spreublättchen linealisch. Laubblätter größtenteils in einer grundständigen Rosette, aus der mehrere ästige Blütenstengel hervorragen. Köpfe vor der Blüte aufrecht. *H. radicata*. Grundblätter lanzettlich, stielartig verschmälert, buchtig gezähnt, mit stumpfen Zähnen. St aufrecht, blattlos. Hüllblätter alle kürzer als die Blüten. Bl. dunkel goldgelb, die äußeren außen dunkelblaugrau. Früchte sämtlich geschnäbelt. ♀. Trockene Wiesen. Vom Herbst-Löwenzahn (S. 229) sofort durch die graugrünen Stengel, die meist viel größeren Köpfe, die Farbe der Randblüten und die nicht verdickten Blütenstiele und besonders durch die Spreublätter zu unterscheiden. 1,5—6 dm.

*Achyrophorus* (zuerst bei Vaillant, ἄχρον Spreu, γόρος tragend, wegen der Spreublätter), Hachelkopf. Wie *Hypochoeris*, aber Haarkrone

nicht doppelt. *A. maculatus*, gefleckter Hachelkopf (*Hypochoeris maculata*). St 1—3köpfig, meist 1 blättrig, rauhhaarig. Grundblätter länglich-verkehrt-eiförmig, buchtig gezähnt, mit *breitem* Grunde sitzend, meist mit länglichen rotbraunen Flecken, dicht borstig. Köpfe grösser als bei voriger. Äußere Hüllblätter lanzettlich, an der Spitze abstehend, innere lineal-lanzettlich, oberwärts gelblich-filzig berandet. ♀. Sonnige Hügel, gern auf Lehm, aber auch auf sandigen Heideflächen, trockenen Wiesen, zerstreut. 3—6 dm.

*Leontodon* (λέων Löwe, ὀδούς Zahn, von Linné gebildet), Löwenzahn (nicht der gewöhnliche Löwenzahn). Blütenboden ohne Spreublättchen. Hüllblätter meist weißlich berandet. Haarkrone unserer Arten schmutzig weiß. Alle ♀. *L. autumnalis*, Herbst-Löwenzahn. Wurzel abgestutzt, St meist ästig, mehrköpfig, blattlos. Köpfchenstiel *allmählich verdickt*, oberwärts schuppig. Grundblätter buchtig oder fiederspaltig gezähnt, kahl oder sparsam behaart. Wiesen, Triften, häufig. Goldgelb. Juli—Oktober. 10—60 cm. *Sehr gutes* Futter für das Weidevieh. (Vergl. E. Weber in Arbeiten der Deutschen Landw. Gesellschaft, Heft 61, S. 87.) *L. hispidus* (*L. hastilis*, *Apargia hispida*), rauhhaariger oder spiefsblättriger L. Mit gabeligen Haaren besetzt. St ungeteilt, 1köpfig, unter dem Kopfe etwas verdickt, höchstens mit einzelnen Schuppen. Kopf vor dem Aufblühen *nickend*. Dunkel goldgelb. Wiesen.

*Tragopogon* (τράγος Bock, πῶγων Bart; Pflanzennamen bei Theophrastos), Bocksbart. B. grasartig, Köpfe langgestielt, einzeln, groß. Blütenboden ohne Spreublättchen. Früchte mit langem Schnabel. Haarkrone groß, mit ineinander gewebten Fiederhaaren.

*T. major*. Kopfstiel oberwärts keulig verdickt, hohl. Hüllblätter 10—12, länger als die Bl. Oberfläche des blühenden Kopfes in der Mitte vertieft. *Blafsgelb*. ☉. Hügel, gern auf Lehm und Kalk. 3—6 dm. Fehlt in Ostpreußen, oder dort nur Adventivpflanze. 3—10 dm.

*T. pratensis*, Wiesenhaferwurz (Fig. 20). Kopfstiel nur unter dem Kopf wenig verdickt. Hüllblätter 8, nur so lang als die Bl., oberhalb des Grundes quer eingedrückt. Dunkel goldgelb. ☉. Wiesen, Hügel. Mai—August. 3—6 dm. *T. porrifolius*, Haferwurz, aus Südeuropa, essbar.

*Taraxacum* (zuerst bei Serapion, die Pflanze galt vermutlich als Mittel gegen *τάραξις*, eine Art Augenentzündung). Hüllkelch länglich-glockenförmig, seine äußeren Blätter kürzer, zurückgebogen, einen Außenskelch bildend. Spreublättchen fehlen. Blätter in grundständiger Rosette. *T. officinale*, Kuhblume, Butterblume<sup>1)</sup>, auch Löwenzahn. Grundachse dick, ästig. B länglich-lanzettlich, buchtig-fiederspaltig, mit rückwärts gerichteten Abschnitten (schrotsägeförmig). Schaft 1köpfig, hohl. Goldgelb. ♀. Wiesen, gemein. Ein lästiges Unkraut, weil es mit seiner großen Blatt-

<sup>1)</sup> Butterblume ist eigentlich *Ranunculus acer*.

rosette anderen Pflanzen den Raum nimmt. Dient bekanntlich jung und namentlich etwas gebleicht am Rhein und besonders in Frankreich als Salat, und wird nach Weber, Arbeiten der Deutschen Landw. Gesellschaft Heft 61, S. 87, vom Fettvieh gefressen, wenn auch nicht mit Vorliebe.

*Lactuca* (Pflanzenname bei Plinius von lac Milch), Lattich. Früchte lang geschnäbelt. St beblättert. Köpfe klein, rispig. Hüllkelch zur Fruchtzeit unten meist bauchig, mit Aufsenkelch. *L. Scariola* (scariola, ital. = Endivie), wilder Salat (Fig. 21). B *senkrecht* gestellt, d. h. mit einer scharfen Kante gen Himmel, dabei an freistehenden Exemplaren meist alle nach Norden und Süden gerichtet (Kompasspflanze!). Blafsgelb.




Fig. 20. *Tragopogon pratensis*.  
a Hüllkelch und Fruchtboden;  
b Blüte; c Frucht.  
(Nach Garcke.)



Fig. 21. *Lactuca Scariola*.  
a Blüte; b Hüllkelch und Fruchtboden  
mit einzelnen Früchten; c Frucht.  
(Nach Garcke.)

☉. Hügel, gern auf fettem oder sandigem *Lehmboden*, zerstreut. Wahrscheinlich Stammpflanze unseres Salats, *L. sativa*.

*Sonchus* (σόγχος, eine Distelart bei Theophrastos), Gänsedistel. Früchte schnabellos. Haarkrone schneeweiss. Hüllblätter dachziegelig. St beblättert. B stengelumfassend, am Rande stachelig gewimpert.

A.: *Einjährig*. Wurzel spindelförmig, senkrecht. St *ästig*. Früchte gelbbraun. Hüllkelch kahl.

*S. oleraceus*, glatte Gänsedistel (Saudistel). B weich, meist glanzlos, obere Blätter stengelumfassend, am Grunde pfeilförmig. Bl schwefelgelb. Früchte querrunzelig. Äcker und Gärten, lästiges Unkraut. 3—9 dm.

*S. asper*, rauhe Gänsedistel. Steif, etwas blaugrün. B derber, meist glänzend, mit mehr stechenden Zähnen, obere am Grunde herzförmig. Früchte glatt. Sonst wie vorige, mehr auf feuchtem Boden, dunkler gelb. Juni bis Herbst. 3—7 dm.

B.: *Ausdauernd*. St unterwärts einfach, Hüllkelch drüsenhaarig:

*S. arvensis*, Acker-Gänsedistel. Hauptwurzel meist mit langen horizontalen Nebenwurzeln, die Adventivknospen treiben. Obere Blätter am Grunde herzförmig, mit abgerundeten Öhrchen. Doldenrispe wenig-köpfig. Köpfe groß. Hüllkelch und Kopfstiele *gelb-drüsenhaarig*. Bl goldgelb. Fr *dunkel*braun. Feuchte Wiesen, auch auf Äckern, besonders unter Sommergetreide, namentlich Hafer. Juli—August. 5—15 dm. Vermehrt sich in ähnlicher Weise wie *Cirsium arvense* und ist für *feuchte* Äcker ein lästiges Unkraut. *S. paluster*, bis 2,5 m hoch, mit am Grunde tief pfeilförmigen Blättern und schwarzen Drüsenhaaren an der viel- aber kleinköpfigen Doldenrispe. Kommt nur stellenweise auf feuchten Wiesen vor. Ist eins der größten Kräuter unserer Flora. Bl hellgoldgelb.

*Crépis* (κρηπίς Schuh, Pflanzenname bei Theophrastos), Grundfeste, Pippau. Äußere Hüllblätter kürzer, meist eine Außenhülle bildend. Köpfe meist in Doldenrispen. Fr *oben* verschmälert. Haare der Haarkrone, mit Ausnahme von *C. paludosa*, *schneeweißs*, weich, *nicht zerbrechlich*. — *C. foetida*, stinkende Grundfeste. St und B weichhaarig. Köpfchen vor dem Aufblühen nickend. Hüllkelch grau und zottig. Zitronengelb. ☉ und ☉. Gern auf Kalk; Mittel- und Süddeutschland. Juni—Aug. 3—4 dm. —

*C. biennis*, zweijährige Grundfeste (Fig. 22). St beblättert. Blätter flach, meist am Grunde fiederspaltig, obere ungeteilt, mit öhrchenförmigem, gezähntem, aber nicht pfeilförmigem Grunde etwas stengelumfassend. *Goldgelb*. 6—12 dm. ☉ und ☉. Ackerränder, gern auf Lehm. Juni—Okt. — *C. tectorum*, Dach-Grundfeste. Graugrün. Obere Blätter linealisch, mit pfeilförmigem Grunde stengelumfassend, mit *aufwärts* gerichteten Öhrchen, am Rande umgerollt. Kopfstiele oben etwas verdickt. *Hellgelb*. ☉ u. ☉. *Sandige* Äcker, grasige Stellen, gemein. Mai—Oktober. — *C. virens*, grüne Grundfeste. Grasgrün. Stengelblätter linealisch, am Rande nicht



Fig. 22. *Crepis biennis*.  
a Blüte; b Frucht, bei c ohne Federkelch.

umgerollt, mit *abwärts* gerichteten Öhrchen. Kopfstiele dünn, hellgelb. ☉ und ☉. Wiesen, Gebüsche. Juli—Oktober. — *C. paludosa*, Sumpf-Grundfeste. St hohl. Äußere Hüllblätter schwarz-drüsenhaarig. Nasse Wiesen, besonders in Wäldern, an Bächen, zerstreut. Haare der Haarkrone *gelblich, zerbrechlich*, dadurch den Übergang zur Gattung *Hieracium* bildend.

*Hieracium* (ἱέραξ Habicht, Name einer Pflanze bei Plinius), Habichtskraut. Äußere Hüllblätter meist keine Außenhülle bildend. Fr *unten* verschmälert. Haare der Haarkrone schmutzig-weiß, *zerbrechlich*. — Eine schwierige Gattung mit vielen Bastarden. Blätter meist in grundständiger *Rosette*; Stengelblätter dann klein oder 0. Alle Arten ausdauernd. Vegetative Vermehrung entweder: 1. durch Ausläufer oder 2. durch kurzgestielte Rosetten oder 3. durch unterirdische Knospen.

*H. Pilosella* (zuerst bei Thal und Camerarius, Diminutivform von pilosus haarig), gemeines Habichtskraut. Niedrig, mit verlängerten Ausläufern. B verkehrt ei-lanzettlich, borstig behaart, unterseits graufilzig. St blattlos, 1köpfig. Trockene, sandige Wälder, Grasplätze, gemein. Hellgelb, äußere Blüten unterseits purpurn gestreift. Mai, Juni, einzeln noch im Herbst. 30—45 cm.

*H. Auricula* (auricula muris hispanica, ein Pflanzennamen bei Joh. Bauhin), Öhrchen-Habichtskraut. Ausläufer zahlreich. B bläulich-grün, zungenförmig, fast kahl. St blattlos oder 1blättrig, 2—6köpfig. Hellgelb. Wiesen, feuchte Wälder, zerstreut. Mai, Juni. 15—30 cm. — *H. pratense*. St hohl, weich, besonders am Grunde mit langen, dichten, weichen, oft rötlichen Haaren. Köpfe zahlreich, klein, dicht gedrängt. Hell-goldgelb, Griffel gelb. Etwas feuchte Wiesen, zerstreut. Juni—August. 3—10 dm. — *H. murorum*, Mauer-Habichtskraut. Blafsgrün. Rosettenblätter zahlreich. Stengelblätter 1—2, klein. Doldenrispe vielköpfig. Blütenstiele bogig aufsteigend. Hüllkelch zylindrisch-glockig, schwarz-drüsenhaarig, innere Hüllblätter spitz. Goldgelb. Haarkrone ziemlich reinweiß. Wälder, Gebüsche. 3—9 dm. — *H. vulgatum*, gemeines Habichtskraut. Grasgrün. Rosettenblätter wenige, Stengelblätter 3—6. Hüllkelch kurz-glockig, sternfilzig und schwarz-drüsenhaarig, innere Hüllblätter stumpf. Blütenstiele aufrecht. Wälder, Gebüsche. Juni, Juli. 3—10 dm. — *H. laevigatum*, glattes Habichtskraut. St entfernt beblättert, steif. Hüllkelch zylindrisch-glockig, innere Hüllblätter spitz. Goldgelb. Sonnige Hügel, zerstreut. 6—12 dm. Juli, August. — *H. umbellatum*, doldiges Habichtskraut. St dicht beblättert. Hüllkelch länglich-zylindrisch, innere Hüllblätter stumpf. Laubblätter am Rande zurückgerollt. Wiesen, Wegränder, Gebüsche, häufig besonders auch auf den Dünen der Ostseeküste.

— — —

### Kapitel III.

#### Pflanzengeographisches über die Wiesen.

##### § 33.

**Übersicht über die deutschen Pflanzenformationen.** Die Pflanzen leben meist in Gesellschaften, in Vereinen, die man auch Pflanzenformationen nennt, zusammen.

O. Drude<sup>1)</sup> unterscheidet: 1. die deutschen Waldformationen, 2. die immergrünen und alpinen Gebüschformationen, darunter die Heide, 3. die deutschen Grasflurformationen, 4. die Moosmoorformationen, 5. die Formationen der Wasserpflanzen, 6. die offenen Formationen des trockenen Sandes und Felsgesteins, 7. die Salzpflanzenformationen des festen Landes, 8. Fels-, Geröll- und Nivalformationen des Hochgebirges, 9. die Bodenbedeckung Deutschlands unter dem Einfluß der Kultur.

Die Grasflurformationen, die uns am meisten interessieren, teilt er folgendermaßen ein: 1. Triftgrasfluren (im mittel- und süddeutschen Hügellande), 2. Sandgrasfluren (in Norddeutschland), 3. Salz- und Strandwiesen, 4. Langhalmige Niederungs- und Talwiesen, 5. Kurzhalmige Bergwiesen, 6. Langhalmige Bergtriften und Riedgrasfluren, 7. Kurzgrasige Alpenmatten, 8. Gras- oder Wiesenmoore.

Paul Graebner unterscheidet<sup>2)</sup> für das norddeutsche Flachland die Vegetationsformationen nach dem größeren oder geringeren *Nährstoffgehalt* des den Pflanzen zur Verfügung stehenden *Wassers*, und knüpft dabei an die geologischen bzw. chemischen Untersuchungen von Laufer, Wahnschaffe und Ramann an. Ramann fand z. B. in 100000 Teilen Wasser eines Heidemoores, das in ein Grünlandsmoor (Wiesenmoor) überging, nur rund 3,5 Teile Mineralstoffe, in dem Wasser der Grenze zwischen beiden, also im Übergangsmoor, 12,5, im Wiesenmoor aber 21,7!

---

<sup>1)</sup> O. Drude, Deutschlands Pflanzengeographie, Stuttgart 1896.

<sup>2)</sup> Im Archiv der Brandenburgia, Berlin 1898, und ausführlicher in Potonié, Naturwissenschaftl. Wochenschrift 1898, S. 54; ferner Graebner, Die Heide Norddeutschlands, Leipzig 1901, S. 25.

§ 34. Graebner schlägt folgende Einteilung vor:

A. *Vegetationsformen mit mineralstoffreichen Wässern:*

1. Trockener Boden:

- a) Übermäßige Ansammlung (auch tierischer, organischer Stoffe), Ruderalstellen, in der Nähe von Dungstätten u. s. w.
- b) Pontische Hügel, d. h. oft nach Süden geneigte Abhänge trockener Hügel, auf mergeligem Sand oder sandigem Mergel im Osten Norddeutschlands, mit einer Flora, welche an diejenige des süd-östlichen Europas erinnert.

2. Mäßig feuchter Boden (Waldbildung):

- a) auf Mergelboden: Buchenwälder (an sandigeren Stellen oft die Weißbuche vorherrschend);
- b) mit Sand oder doch weniger mergelhaltigem Boden:
  - $\alpha$ ) trockenerer Boden: Eichen-, Birkenwälder (hier allmähliche Übergänge zu B 2 b);
  - $\beta$ ) feuchterer Boden: (in einigen Teilen des Gebiets) Fichtenwälder.

3. Nasser Boden:

- a) ohne übermäßige Anreicherung von Nährstoffen, meist an fließendem Wasser:
    - $\alpha$ ) ohne Überschwemmung und ohne Eisgang: Erlenbrüche;
    - $\beta$ ) mit Überschwemmung, ohne Eisgang: Auenwälder (besonders Eichen);
    - $\gamma$ ) mit Überschwemmung und mit Eisgang: *Natürliche Wiesen*.
  - b) mit übermäßiger Anreicherung (auch organischer, meist pflanzlicher Stoffe): Grünlandsmoore (saure Wiesen).
4. Die Vegetationsformation des Wassers, der Landseen, Teiche, Flüsse und Bäche.

B. *Vegetationsformationen mit mineralstoffarmen Wässern:*

- 1. Sehr trockener Boden, Sandfelder.
- 2. Trockener bis mäßig feuchter Boden:
  - a) mit Ortstein oder dicken Bleisandschichten: Calluna-Heiden (gewöhnliche Heiden);
  - b) ohne Ortstein und ohne dicke Bleisandschichten, Kiefernwälder (hier Übergang zu A 2 b).
- 3. Nasser Boden, Heidemoore (Hochmoore).
- 4. Die Vegetationsformation im Wasser, Heideseen, Heidetümpel.

C. *Vegetationsformationen mit salzhaltigen Wässern:*

- 1. Trockener Boden, Dünen.
- 2. Feuchter Boden, Strandwiesen.
- 3. Nasser Boden, Salzsümpfe.

**§ 35.** Eugen Warming, Lehrbuch der ökologischen<sup>1)</sup> Pflanzengeographie, 2. Aufl., übersetzt von Paul Graebner, 1902, unterscheidet: 1. Hydrophytenvereine, also Vereine der Wasser und Luftfeuchtigkeit liebenden Pflanzen; 2. Xerophytenvereine, d. h. der Trockenheit liebenden Pflanzen; 3. Halophytenvereine, d. h. der Salzpflanzen; 4. Mesophytenvereine, d. h. der Pflanzen, welche eine mittlere Feuchtigkeit verlangen. Zu den Hydrophytenvereinen gehören auch die Sumpfmoores oder Wiesenmoore (saure Wiesen, Grünlandsmoores) und die Sphagnummoore (Moosmoore, Sphagneta, Hochmoore). Zu den Xerophytenvereinen gehören u. a. die Heiden und Kiefernwälder. Zu den Mesophytenvereinen gehören u. a. die arktischen und alpinen Gras- und Krautmatten, ferner die Wiesen, die Weiden auf Kulturland, die laubwechselnden Mesophyten-Wälder. Zu den Halophytenvereinen gehören u. a. auch die Strandwiesen. Er bespricht schließlich in seinem interessanten Werk auch den Kampf zwischen den Pflanzenvereinen.

### § 36.

**Begriff der Wiesen.** Wiesen sind nach Warming Vereine hoher, mehrjähriger, krautartiger Pflanzen, besonders der Gräser. Ihre Pflanzendecke soll sehr dicht geschlossen sein (einen Rasen bilden), und zu dieser Dichtigkeit trägt nicht wenig bei, daß die Wiese gemäht wird. Eine Weide unterscheidet sich von einer Wiese nur dadurch, daß das Abschneiden durch den Zahn des Weideviehes geschieht; auch liegt sie meist trockener, ganz abgesehen von den noch trockeneren, auf dem Acker belegenen künstlichen Weiden, Kleeegrasschlägen. Die natürlichen Weiden in den Marschen etc. sind z. T. über 100 Jahre alt (ewige Weide). Durch das Mähen bezw. Abweiden wird die Samenbildung verhindert, die Verzweigung vermehrt und die floristische Zusammensetzung geändert. Einjährige Pflanzen können sich meist auf der Wiese nicht halten, weil durch das Mähen ihre Samenreife verhindert und durch die oft eintretenden Überschwemmungen ihr Gedeihen gehemmt wird.

**§ 37. Entstehung der Wiesen.** Manche Wiesen sind aus eingetrockneten Seen etc., viele andere offenbar aus Wald entstanden, wie man das noch heute in Nordamerika sehen kann, wo nach dem Abholzen eines Waldes der Boden sich mit einer Grasnarbe bedeckt. — Läßt man eine Wiese ungemäht, so treten anfangs Sträucher, später Bäume auf derselben auf.

Die Wiesen an den größeren Flüssen — und das sind die meisten — sind aber sicherlich nicht aus Wald hervorgegangen, denn da ist des Eisganges wegen Waldwuchs gar nicht möglich gewesen. Sie sind eben eine uralte, den Flußgebieten erb- und eigentümliche Formation.

<sup>1)</sup> Als Ökologie (*οἶκος* Haus, Haushaltung, *λόγος* Lehre) bezeichnet Haeckel die Wissenschaft von den Beziehungen der Organismen zur Außenwelt.



**§ 38. Bestandteile.** Im allgemeinen bilden Gräser im weiteren Sinne den Hauptbestandteil der Wiesen, doch ändert sich das sehr mit der Höhenlage. Schon in Mittel- und Süddeutschland finden wir mehr Klee- gewächse und Blumen, in manchen Fällen auch viele schädliche oder wenigstens bessere Gewächse verdrängende Pflanzen, die z. T. auch in Norddeutschland häufig sind, wie wilder Kerbel (sogenannter Kälberkropf, *Anthriscus silvestris*), Bärenklau (*Heracleum Sphondylium*) und im Nachsommer Pastinak. (Siehe diese alle S. 206—208.)

In den hochgelegenen Teilen des Harzes besteht mitunter die Hälfte der Wiesen aus Doldengewächsen (besonders Bärwurz, *Meum Athamanticum* S. 206) und Klappertopf (*Alectorolophus* S. 218) etc. In den Alpen, namentlich in den höheren Bergen, sind ebenfalls Doldengewächse und ferner Kompositen, S. 223, sowie Wegericharten (*Plantago alpina* etc.) außerordentlich stark vertreten. Stebler und Schröter<sup>1)</sup>, Zürich, fanden z. B. auf einer Kuhweide in 1970 m Höhe nur 44,5 % Süßgräser, dagegen 10 % Kompositen und 32 % Wegericharten. — Die Wiesen in den großen Flusniederungen Norddeutschlands sind dagegen im wesentlichen nur aus Gräsern zusammengesetzt, indes finden sich auch hier Moose, Schachtelhalme und „Blumen“ aus verschiedenen Familien.

### § 39.

**Die Wiesentypen.** Je nachdem ein oder das andere Gras vorherrschend ist, kann man nach dem Vorgange von Stebler und Schröter<sup>2)</sup> und C. Weber „Wiesentypen“ unterscheiden, die selbstverständlich besonders durch die Feuchtigkeitsverhältnisse bedingt sind. Ich habe in Thiel's Landw. Jahrb. XXIII, S. 97, für Norddeutschland 4 Typen vorgeschlagen:

1. Der *Mielitz-Typus*, *Glyceria spectabilis*,<sup>3)</sup> als Typus der den Überschwemmungen und dem Eisgang ausgesetzten Flusswiesen, also der feuchtesten süßen Wiesen. Der *Glyceria spectabilis* sind beigesellt: *Phalaris arundinacea*, *Alopecurus pratensis*, *Poa serotina*, *P. trivialis*, *Festuca pratensis*, *F. arundinacea*, *Agrostis stolonifera* etc.

2. Der *Rasenschmielen-Typus*, *Aira caespitosa*, als Typus der moorigen Wiesen. Er entspricht etwa dem Besenried-Typus (*Molinia coerulea*) von Stebler und Schröter, denn *Molinia* kann auch viel vorhanden sein; es sind aber nicht so viel Seggen und dergl., sondern noch

<sup>1)</sup> Stebler und Schröter, „Die besten Futterpflanzen“, 3. Teil. Die Alpenfutterpflanzen, Bern 1889, S. 60. — Das ganze Werk, 4 Teile, ist höchst empfehlenswert und enthält treffliche farbige Abbildungen.

<sup>2)</sup> Stebler und Schröter, Versuch einer Übersicht über die Wiesentypen der Schweiz. Landw. Jahrb. der Schweiz, 1892. (Kurz abgedruckt in Thiel's Landw. Jahrb. XXIII. S. 91.)

<sup>3)</sup> Andeutungen der Silbenbetonung in Kap. V, Systematik.

mehr Gräser, namentlich *Festuca rubra*, sowie *Agrostis canina* etc. vorhanden.

3. Der französische *Raigras-Typus*, *Arrhenatherum elatius* (*Avena elatior*), als Typus der mittelfeuchten, besten Wiesen. Dieser Typus findet sich auch bei Stebler und Schröter unter dem Namen „Fromentaltypus“ auf Fettrasen. (Fromental ist die franz. und schweizerische Bezeichnung für franz. Raigras.) In ihm finden sich die meisten guten Gräser vertreten: *Festuca pratensis*, *Phleum pratense*, *Poa pratensis*, *Lolium perenne*, *Dactylis glomerata* etc.

4. Der *Straufgras-Typus*, *Agrostis vulgaris*, als Typus der trockenen Wiesen, namentlich auf der Geest, besonders auch der Bergwiesen. Auch dieser findet sich bei Stebler und Schröter. In ihm sind außerdem enthalten: Kammgras, Goldhafer und Rotschwengel.

Stebler und Schröter nehmen für die ganze Schweiz zwar 21 Typen an, doch gelten viele nur für höhere Lagen oder für saure Wiesen; für den „Fettrasen“, d. h. die gedüngten Wiesen, haben sie nur 3: Fromental-, Straufgras- und Romeyen-Wiesen (*Poa alpina*); letzterer Typus fällt bei uns weg, da er rein alpin ist.

C. A. Weber<sup>1)</sup> in Bremen nimmt für norddeutsche reiche *Moorwiesen* folgende 4 Typen an:

1. Typus des Wiesenrispengrases, *Poa pratensis* (d. i. der der trockneren Wiesen in trockenerer Luft).
2. „ „ gemeinen Rispengrases, *Poa trivialis* (d. i. der der feuchteren Wiesen in feuchterer Luft).
3. „ „ Wiesenschwengels, *Festuca pratensis* (d. i. der der dauernd feuchten Wiesen, Grundwasserstand im Sommer in 30 bis 50 cm Tiefe).
4. „ „ flutenden Mannagrases, *Glyceria fluitans* (d. i. der der nassen Wiesen, Grundwasserstand im Sommer schon in 10—20 cm Tiefe).

Für Westholstein führt Weber<sup>2)</sup> 13 Typen (er nennt sie Subformationen) auf, und geht dabei von der trockenen Geest allmählich immer mehr nach den Marschen, schliesslich auf die Aufseideichländereien am Meer.

<sup>1)</sup> In Tacke, Mitteilg. üb. d. Arbeiten d. Moor-Versuchs-Station Bremen. Thiel's Landw. Jahrb. Bd. XXVII, Ergänzungsbd. IV, S. 455.

<sup>2)</sup> Weber, Über d. Zusammensetzung d. natürlichen Graslandes in Westholstein (Schriften d. naturw. Ver. f. Schleswig-Holstein, Bd. IX, Heft II, 1892). Siehe auch viele andere treffliche Arbeiten Weber's, namentlich „Arbeiten der Dtsch. Landw.-Gesellschaft“, Heft 61: Beiträge zur Kenntnis der Dauerweiden in den Marschen Norddeutschlands, vom Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Emmerling, Kiel, und Dr. C. A. (nicht wie der Titel sagt L. A.) Weber, Bremen, Berlin 1901.

I. Geest . . . . .	1.	Typus der	<i>Aira flexuosa</i> , gebogene Schmiele.
" " . . . . .	2.	" "	<i>Poa pratensis</i> , Wiesen-Rispengras.
" " . . . . .	3.	" "	<i>Poa trivialis</i> , gemeines Rispengras.
" " . . . . .	4.	" "	<i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele.
" " . . . . .	5.	" "	<i>Carex panicea</i> , hirsenartige Segge.
" " . . . . .	6.	" "	<i>Carex gracilis</i> (= <i>C. acuta</i> ), scharfe Segge.
" " . . . . .	7.	" "	<i>Molinia coerulea</i> , blaues Pfeifengras, Besengras.
II. Übergangsgebiet .	8.	" "	<i>Festuca pratensis</i> , Wiesen-Schwingel.
III. Eingedeichte Marsch	9.	" "	<i>Agrostis alba</i> (= <i>stolonifera</i> ), Fioringras.
" " " "	10.	" "	Marschform von <i>Poa pratensis</i> .
" " " "	11.	" des	<i>Hordeum secalinum</i> , roggenartige Gerste, Wiesengerste.
" " " "	12.	" "	<i>Lolium perenne</i> , englisches Raigras.
IV. Vorland (Grodén)	13.	" der	<i>Festuca thalassica</i> , Meerstrandschwingel, und der <i>Festuca rubra</i> , Rotschwingel.

R. Braungart<sup>1)</sup> in München fügt zu Weber's Typen, die sich meist auch in Mittel- und Süddeutschland finden, noch folgende für *Mittel- und Süddeutschland* wichtige Typen (er nennt sie Formationen) hinzu. (Diese kommen übrigens mit Ausnahme von No. 21 auch bei uns im Norden vor.)

14. Typus der *Avena elatior*, französisches Raigras, und *Dactylis glomerata*, Knaulgras, Fettrasentypus.
15. " " *Avena flavescens*, Goldhafer.
16. " " *Alopecurus pratensis*, Wiesen-Fuchsschwanz.
17. " " *Bromus erectus*, aufrechte Trespe (auf trockenem Kalk und Mergel).
18. " " *Nardus stricta*, steifes Borstengras (auf sehr trockenem Boden.)
19. " " *Agrostis vulgaris*, gemeines Straußgras.
20. " " *Holcus lanatus*, wolliges Honiggras (auf kalkarmem Gebiet).
21. " " *Poa alpina*, Alpen-Rispengras.

C. A. Weber unterscheidet neuerdings in Arbeiten der D. L.-G., No 61, auf den Grasfluren des ausgesüßten Bodens der *Flußmarschen* und der eingedeichten *Seemarschen* folgende Typen:

<sup>1)</sup> Handbuch der rationellen Wiesen- und Weidenkultur und Futterverwertung. München 1899, S. 267.

I. Reihe. Die Grasfluren des hochgelegenen trockenen bis mäßig feuchten Kleibodens:

1. Typus des gemeinen Straußgrases (*Agrostis vulgaris*).
2. " des Wiesenrispengrases (*Poa pratensis*).
3. " des Kammgrases (*Cynosurus cristatus*).
4. " des roten Schwingels (*Festuca rubra*).
5. " der Quecke (*Triticum repens*).
6. " der Wiesengerste (*Hordeum secalinum*).
7. " des englischen Raigrases (*Lolium perenne*).
8. " des französischen Raigrases (*Arrhenatherum elatius*) mit den Nebentypen des Knautgrases (*Dactylis glomerata*) und des Goldhafers (*Trisetum flavescens*).

II. Reihe. Die Grasfluren des frischen bis ziemlich feuchten Kleibodens:

a) Auf reicherm Boden:

1. Typus des Wiesenfuchsschwanzes (*Alopecurus pratensis*).
2. " der Rasenschmiele (*Aira caespitosa*).
3. " des wolligen Honiggrases (*Holcus lanatus*).
4. " des gemeinen Rispengrases (*Poa trivialis*).
5. " des Wiesenschwingels (*Festuca pratensis*).
6. " des Rohrschwingels (*Festuca arundinacea*).
7. " der Quecke (*Triticum repens*).

b) Auf völlig verarmtem Kleiboden:

8. " der hirsenartigen Segge (*Carex panicea*) mit dem Nebentypus des Benthalmes, Pfeifengrases (*Molinia coerulea*).

III. Reihe. Grasfluren des feuchten Marschbodens:

1. Typus des weißen Straußgrases (*Agrostis alba*) mit den Nebentypen des flutenden Mannagrases (*Glyceria fluitans*), des geknieten Fuchsschwanzes (*Alopecurus geniculatus*) und des Sumpf-Rispengrases (*Poa palustris* oder *P. serotina*).
2. " der rauhaarigen Segge (*Carex hirta*).
3. " der Fuchssegge (*Carex vulpina*).

IV. Reihe. Grasfluren des nassen Marschbodens:

1. Typus des Rohrglanzgrases (*Phalaris arundinacea*) mit dem Nebentypus des ansehnlichen Mannagrases (*Glyceria spectabilis*).
2. " der scharfen Segge (*Carex acuta*).
3. " der geschnäbelten Segge (*Carex rostrata*).
4. " der Ufersegge (*Carex riparia*).

## Kapitel IV.

### Bau und Entwicklung der echten Gräser.

#### § 40.

**Allgemeines.** Die Familie der echten oder süßen Gräser gehört, wie aus ihrer Stellung im natürlichen System der Pflanzen S. 175 u. 181 hervorgeht, zur Unterklasse der Monokotyledonen, d. h. der Pflanzen, die nur mit *einem* Blatte keimen, meist parallelnervige Blätter haben und in ihren Blütenteilen die Dreizahl zeigen, welch letzteres bei den Gräsern freilich nur hinsichtlich der Staubgefäße in die Erscheinung tritt. — Die echten Gräser bilden mit der Familie der Ried-, Schein-, Halb- oder Sauergräser, der Cyperaceae (am angef. Orte), zusammen die *Reihe* der *Spelzblütigen* oder *Glumiflorae*. Gemeinsam ist diesen, daß die Blüten keine Kelch- und Kronenblätter besitzen und von Hochblättern (Spelzen) bedeckt sind. Ihr Fruchtknoten enthält stets nur eine Samenanlage.




Fig. 23. Frucht des italienischen Raigrases, Längsschnitt; 20:1.

a Stärkekaltige Zellen des Mehlkörpers oder Endosperms, e Embryo, k Kleberzellen (stickstoffreiche Zellen) des Mehlkörpers, s Schildchen des Embryos, w Würzelchen.

#### § 41.

**Bau des Kornes.** Der Grassamen oder das Korn, das wir aussäen, ist kein Same, sondern eine ganze Frucht, eine nicht aufspringende Schalefrucht, Caryopse, die oft noch von den Spelzen umgeben ist, wie z. B. bei Hafer und Gerste. An einem Korn, z. B. vom Weizen oder vom entspelzten Raigras, erkennt man drei Teile: 1. die Schale, 2. den Keim oder Embryo, 3. das Nährgewebe, Endosperm oder den Mehlkörper (Fig. 23). — Die *Schale* besteht aus zwei Schalen, die äußere ist die Fruchtschale, die innere die Samenschale.

Beide sind bei der Grasfrucht miteinander verwachsen, etwa so, als wenn die Schale des Haselnußsamens an die harte, holzige Fruchtschale angewachsen wäre. Diese doppelte Schale bildet beim Mahlprozeß die Kleie. — Der *Keim* (e) ist das wichtigste, er ist die noch unentwickelte Pflanze. Bei echten Gräsern liegt er meist unten und aufsen, dicht unter der Schale.

Er ist nur klein, gerade, und besteht aus einem oberen Teil: Knöspchen, Federchen oder plumula, einem unteren Teil: Wurzelanlage, radícula (*w*), und einem seitlichen, dem Mehlkörper anliegenden Teil, dem Schildchen oder scutellum (*s*), welches das eigentliche Keimblatt ist, aber nie hervortritt.

Die *Plumula* besteht aus einem ganz kurzen Stengelchen, welches mehrere tutenförmig ineinandersteckende Blätter und an seiner Spitze den Vegetationskegel trägt, welcher später den Halm mit Blättern und Blüten bildet. — Die *Wurzelanlage* ist die Fortsetzung des Stengelchens nach unten und weist nach den verschiedenen Arten der Gräser ein bis mehrere Würzelchen auf, welche von einem Hüllgewebe, der „Wurzelscheide“, umgeben sind. — Das Keimblatt oder Schildchen ist an der dem Mehlkörper zugekehrten Seite mit pallisadenförmigen Saugezellen versehen, welche sich bei der

Keimung verlängern und die gelösten Nährstoffe des Mehlkörpers dem Keim durch Diffusion zuführen.

Das *Nährge-  
webe* oder Endosperm nimmt den größten Teil des Kornes ein, es wird im gewöhnlichen

Leben „Mehlkörper“ genannt, weil meistens seine Zellen (*a*) reich mit Stärkemehl erfüllt sind. Die äußerste Zellenlage, unter

der Schale, ist sehr protein- und fettreich (wie auch der Embryo) und heist Kleberschicht (*k*). Der eigentliche Kleber liegt aber im Innern.




Fig. 24. Keimling des Weizens, 3 Tage nach der Aussaat. *w*<sub>1</sub>—*w*<sub>2</sub> Haupt- und Seitenwurzeln, *h* Anfänge der Wurzelhaare, *wh* Wurzelhaare, *ws* Wurzelscheide, *sb* Fruchtschale, *sc* Schildchen, *p* Fruchtschale, *ka* Keimspalte; 7:1.

(Nach Nowackl.)




Fig. 25. Junge Weizenpflanze. *s* Korn, *b* erstes (röhrenförmiges) Blatt, *w* Wurzeln mit Erde *e* bekleidet, welche durch die Wurzelhärchen festgehalten wird; 2:3.

(Nach Sachs.)

## § 42.

**Keimung und Entwicklung.** Bei der Keimung tritt zuerst die Wurzelscheide heraus und entsendet aus ihrer Oberhaut zahlreiche Haare,

welche das etwa oberflächlich liegende Korn am Boden befestigen. Gar bald folgt dann das Würzelchen, oder wenn, wie beim Getreide, mehrere vorhanden sind, zuerst das stärkste derselben (Fig. 24). Eine eigentliche Haupt- oder Pfahlwurzel bildet sich bei allen Monokotyledonen nicht, denn die Nebenwurzeln erreichen bald die gleiche Stärke wie die Hauptwurzel.

Außerdem findet sich am fortwachsenden Ende jedes Würzelchens eine „Wurzelhaube“, welche die Wurzelspitze beim Vordringen im Boden schützt. Kurz vor der Spitze, aber nicht an dieser selbst, treten bald eine große Menge „Wurzelhärchen“ (Fig. 25, 26), die als Ausstülpungen der Oberhautzellen anzusehen sind, hervor, und diese Wurzelhärchen sind die




Fig. 26. Wurzelhaar des Weizens, bei e mit den Bodenteilen verwachsen; 500:1.  
(Nach Nowacki.)




Fig. 27. Junge Weizenpflanze. sb Scheidenblatt, w Keimwurzeln, w<sub>1</sub> sogen. Kronenwurzeln, a Trieb, s Samenkorn; 2:3.  
(Nach Nowacki.)

eigentlichen Organe, mit welchen die Pflanzen ihre Nahrung aus dem Boden aufsaugen. Wegen des festen Umklammers der Erdteilchen zeigt sich jede aus dem Boden gezogene jüngere Wurzel, sehr deutlich beim Getreide, mit Erdteilchen, den sog. „Wurzelhöschen“ (Fig. 25 und 26) besetzt.

Das Blattknöschen, die Plumula, entwickelt sich etwas später als die Radicula. Sein kurzer Stengelteil zeigt häufig schon im Samen zwei oder mehr Nebenwurzelanlagen, wie denn oft am unteren Stengelteile der Gräser, auch nach seinem Hervortreten über die Erde, an den Knoten Nebenwurzeln entspringen (Mais). Das Stengelchen selbst, das Epikotyl, streckt sich anfangs nur wenig; was man zuerst über die Erde hervortreten sieht, ist das erste Blatt. Dieses Blatt ist aber nicht flach, wie die späteren es gewöhnlich sind, sondern röhrenförmig (Fig. 25b, 27sb). Es tritt aus

einer Spalte, meist am oberen Drittel des Keimes (Fig. 24), hervor, durchbricht mit seiner harten Spitze den Erdboden und öffnet sich oben erst nach einiger Zeit, um die von ihm eingeschlossenen folgenden Blätter hindurchtreten zu lassen. Beim Roggen ist das erste Blatt rötlich, daher sieht die junge Roggensaar rötlich-braun aus. Dies eine Blatt wird häufig als Keimblatt angesehen, in Wirklichkeit ist, wie gesagt, das Schildchen des Keimes als solches aufzufassen.

## § 43.

**Stengel.** Endlich entwickelt sich der Stengelteil stärker und tritt heraus. Er wird bekanntlich bei den Gräsern *Halm* genannt. Selten ist er holzig und mit seinem oberirdischen Teile ausdauernd (wie beim Bambusrohr), gewöhnlich krautig und über der Erde nach der Fruchtreife absterbend. Im Innern ist er meistens hohl, nur beim Mais, dem Zuckerrohr, zum größten Teil auch bei der Mohrenhirse (*Andropogon*) etc. voll (auch beim englischen oder bauchigen Weizen, *Triticum turgidum*, und beim Hartweizen, *T. durum*, aber hier nur dicht unter der Ähre).

Die Stellen, an denen die Blätter entspringen, sind aber stets voll und erscheinen gewöhnlich verdickt. Man nennt sie die *Knoten* oder *Nodi*, die zwischen den Knoten liegenden Stücke heißen die *Internodien*. Die Verdickung der Knoten wird nur in seltenen Fällen durch eine Verdickung des Halmes selbst bewirkt (Halmknoten), so bei den Hirsearten etc., bei den meisten Gräsern durch Anschwellung der *Blattscheiden-Basis* (Scheidenknoten). Einige Gräser, wie z. B. *Molinia coerulea*, das blaue Pfeifengras, haben scheinbar gar keine Knoten. Hier sitzen sie aber ganz unten dicht übereinander, weil die Internodien mit Ausnahme des obersten dort wenig gestreckt sind.

Durch den *zylindrischen* oder zweischneidigen, nicht dreikantigen, meist *hohlen*, mit *Knoten* versehenen Halm unterscheiden sich die echten Gräser oder Süßgräser, Gramineae, von den Scheingräsern oder Sauergräsern, Cyperaceae, von denen allerdings manche auch einen runden Stengel haben.

*Seitenzweige* bildet der Halm nur an seinem *obersten* Ende, in der Blütenregion, und an seinem *untersten* Ende, in oder dicht über der Erde, in der Achsel von Laubblättern oder Niederblättern (schuppenartigen Blättern, Fig. 28). Die Verzweigung aus der Basis nennt man bei den




Fig. 28. Schema der Bestockung.  
a Hauptstamm, b, c Seitenzweige 1.,  
d—g 2. Ordnung, w Wurzeln.  
(Nach Nowacki.)



Gräsern die *Bestockung*. Je öfter man ein Gras mäht, um so öfter bilden sich wieder neue Seitenzweige an der Basis, um den Verlust zu ersetzen; doch kommt nicht allen Gräsern diese Eigenschaft in gleich hohem Grade zu.

Bei den *einjährigen* oder annuellen Gräsern gelangen die basalen Seitentriebe mit dem Haupttriebe zugleich oder wenig später zur Blüten- und Fruchtbildung, und die Pflanze stirbt dann ab.

Bei den *ausdauernden* oder *perennierenden* Gräsern, und zu diesen gehören die besten Wiesengräser, kommen die *Seitentriebe* meist erst ein Jahr später zur Blüte als der Haupthalm; sie überwintern in unfruchtbarem Zustande, um im nächsten Jahre an ihrer Basis wieder Seitentriebe zu erzeugen, die im dritten Jahre blühen, während sie selbst nach der Reife absterben. Man braucht also nur nachzusehen, ob ein blühendes Gras an seiner Basis *sterile Blattbüschel* besitzt, um zu wissen, ob man es mit einem ausdauernden Grase zu tun hat.



Fig. 29.  
Horstbildendes  
Gras, schematisch.  
(Nach Stebler  
und Schröter.)

Mitunter zeigen auch die einjährigen Gräser scheinbar sterile Blattbüschel an ihrer Basis, wenn man aber dieselben näher untersucht, findet man doch beim Auseinanderfalten der Blätter die Anlage eines Blütenstandes. Bei ausdauernden Gräsern sieht man oft noch den abgestorbenen Blütenhalm des vorigen Jahres, was ebenfalls als ein Kennzeichen gelten kann.

Öfter kommen übrigens auch bei ausdauernden Gräsern *mehrere* basale Seitentriebe noch in demselben Jahre zur Blüte, besonders wenn der erste Halm abgemäht ist. So erklärt es sich, daß z. B. das französische Raigras, *Arrhenatherum elatius*, häufig sowohl beim ersten wie beim zweiten Schnitt in Blüte steht. Solche Gräser sind mit die wertvollsten.

Die untersten Teile der auseinander hervorgesproßten Seitentriebe bleiben meist unter der Erde und haben dort keine Laubblätter, sondern nur kleine, bleiche oder braungelbe Schuppenblätter, sog. Niederblätter, in deren Winkeln wieder Seitentriebe entstehen können, während an den Knoten des Stengels Wurzeln auftreten. Die Schuppenblätter verkümmern später, und man sieht dann nur die Stengel mit den Seitenwurzeln daran. Dadurch könnte man leicht verleitet werden, diesen unterirdischen Teil überhaupt als Wurzel anzusehen, in Wirklichkeit ist es aber ein unterirdisches Stengelgebilde, ein sog. *Wurzelstock*, Grundachse, Erdstamm oder *Rhizom*. Dieses Rhizom kann kurz oder lang sein, und darnach unterscheidet man *horstbildende* (oder rasige) und *ausläufer-treibende* (Kriechtriebe bildende) Gräser.

Bei den *horstbildenden* Gräsern (Fig. 29) wenden sich die Seitentriebe gleich oder doch bald nach oben, ihr unterirdischer Teil bleibt mehr

oder weniger kurz, und alle oberirdischen Teile stehen mehr oder weniger dicht beisammen, sie bilden einen Büschel, einen Horst, wie dies auch bei den einjährigen Gräsern der Fall ist. (Linné nannte solche Büschel „Rasen“, caespes).

Der Horst der mehrjährigen Gräser nimmt selbstverständlich alljährlich an Umfang zu, da immer neue Seitentriebe entstehen. Diese Seitentriebe können sich aber verschieden verhalten. Entweder wachsen sie *innerhalb der Scheiden* der unteren Halmblätter, in deren Achsel sie entsprossen sind, nach oben, dem Muttertriebe fest angedrückt (*intravaginale* Seitentriebe) oder sie *durchbrechen* die Scheide gleich an ihrer Basis, oft schon als Knospen (*extravaginale* Seitentriebe). Im ersteren Falle entsteht oft ein sehr *dichter ebener* Horst, z. B. beim Knautgras, oder, wenn die untersten Glieder etwas verlängert sind, ein *lockerer ebener* Horst, wie beim englischen Raigras, *Lolium perenne*; im letzteren Falle meist ein lockerer Horst. Indes gibt es auch Fälle, wo die extravaginale Seitentriebe einen *dichten*, aber *polsterförmigen* Horst bilden, wie z. B. beim wolligen Honiggras, *Holcus lanatus*, weil dort die Seitensprossen sich sofort über ihrer Ursprungsstelle in scharfem Winkel nach oben wenden und dazu noch einzelne Zwischenknotenstücke (Internodien) dieser aufrechten Triebe sich stark verlängern, so daß der Gesamthorst aus *übereinander* liegenden Teilhorsten besteht.




Fig. 30. Schematische Darstellung eines ausläuferbildenden Grases. 1 vorjähriger, 2 diesjähriger, 3 nächstjähriger blühender Halm.  
(Nach Stebler und Schröter.)

Bei den *Ausläufer* (Stolonen) oder Kriechtriebe bildenden Gräsern laufen die Seitentriebe erst eine Strecke weit horizontal *unter* der Erde (Quecke) oder *an* und *unter* der Erde (Fioringras, Wiesenrispengras) oder *oberirdisch* (gemeines Rispengras) hin, um dann erst sich nach oben zu wenden. Daher stehen die oberirdischen Teile der Pflanze mehr oder weniger weit auseinander (Fig. 30).

Fast selbstverständlich ist es, daß solche horizontal dahinkriechenden Seitentriebe immer die Scheide ihres Mutterblattes durchbrechen müssen, also immer *extravaginal* sind.

Zur Bildung einer geschlossenen Grasnarbe muß man stets beiderlei Arten von Gräsern verwenden, horstbildende und ausläufertreibende. Letztere füllen mit ihren Kriechtrieben alle die Lücken aus, welche sich zwischen

den einzelnen Horsten der ersteren finden; darum sind z. B. Fioringras und Wiesenrispengras, die reichlich Ausläufer treiben, im Verein mit dem horstbildenden englischen Raigras, dem Kammgras, dem Hartschwingel etc., so vorzüglich zur Bildung eines dichten Gartenrasens geeignet.

### § 44.

#### Übersicht über die Wuchsverhältnisse der Gräser.

##### I. Horstbildende Gräser.

###### a) Mit intravaginalen Seitentrieben.

Alle Getreidearten. Ferner: *Trisetum* (*Avena*) *flavescens*, Goldhafer (Triebe bald herausbrechend), *Cynosurus cristatus*, Kammgras, *Dactylis glomerata*, Knaulgras (Triebe ausläuferartig), *Festuca pratensis*, Wiesenschwingel, *F. ovina*, Schafschwingel, *Lolium italicum*, italienisches Raigras, *L. perenne*, englisches R. (auch kurze Ausläufer), *Phleum pratense*, Timotheegrass (Triebe bald herausbrechend).




Fig. 81. 1. Einseitig, 2. mehrseitig biegeunfähige Konstruktion; *f* Füllung zwischen der Zuggurtung *g*<sup>1</sup> und der Druckgurtung *xg*<sup>2</sup>*x*; letztere in Form eines I-Trägers, dessen Gurtungen *x**x*, dessen Füllung *g*<sup>2</sup>.  
(Nach Potonié.)

###### b) Mit extravaginalen Seitentrieben.

*Anthoxanthum odoratum*, Ruchgras (auch intravaginale), *Arrhenatherum elatius*, französisches Raigras, hoher Hafer, *Bromus erectus*, aufrechte Trespe, *B. inermis*, unbewehrte, grannenlose Trespe, *Festuca rubra*, Rotschwingel, *Holcus lanatus*, wolliges Honiggras.

##### II. Ausläufertreibende Gräser.

(Stets mit extravaginalen Seitentrieben, daneben mitunter auch intravaginale.)

*Alopecurus pratensis*, Wiesenfuchsschwanz (Ausläufer nur kurz), *Agrostis stolonifera*, Fioringras, *Agrostis vulgaris*, gemeines Straußgras, *Holcus mollis*, weiches Honiggras, *Phalaris arundinacea*, Rohrglanzgras oder Havelmiehlitz, *Poa pratensis*, Wiesen-Rispengras, mit meist langen, unterirdischen Ausläufern und auch intravaginalen oberirdischen, *Poa trivialis*, gemeines Rispengras, mit langen, oberirdischen (auch intravaginalen) Ausläufern, *Triticum repens*, Quecke.

Nach Weber<sup>1)</sup> spielen auf den *Dauerweiden* in den Marschen Norddeutschlands die mit Kriechtrieben versehenen Pflanzen mit Ausnahme des Weisklees eine recht untergeordnete Rolle. Außer den oben angeführten Gräsern mit Ausläufern haben noch folgende von Weber daselbst beobachtete Pflanzen

<sup>1)</sup> Emmerling und Weber, Beiträge zur Kenntnis der Dauerweiden in den Marschen Norddeutschlands. Arbeiten der Deutschen Landw. Gesellschaft. Heft 61. Berlin 1901. S. 84.

Kriechtriebe (Ausläufer): *Equisetum arvense*, Acker-Schachtelhalm; *E. palustre*, Sumpf-Schachtelhalm; *Carex hirta*, rauhaarige Segge; *Juncus compressus*, zu-




Fig. 32. Teil eines Querschnitts durch den Roggenhalm.  
o Oberhaut, r Ring von mechanischen, bastähnlichen Zellen, g Gefäßbündel,  
m Zellen der Gefäßbündelscheide, m Markzellen.  
(Nach Nowacki.)

sammengedrückte Binse; *Urtica dioica*, zweihäusige große Brennnessel; *Polygonum amphibium*, ortwechselnder Knöterich; *Vicia sepium*, Zaunwicke; *Lathyrus pratensis*, Wiesen-Platterbse; *Achillea Millefolium*, Schafgarbe; *Tussilago Farfara*, Huflattich; *Sonchus arvensis*, Acker-Gänsedistel.

## § 45.

**Das mechanische Prinzip im Bau des Monokotyledonenstengels.** Der Stengel der meisten Monokotyledonen ist im Innern mit weichem Gewebe erfüllt oder hohl; seine festen Teile, sein Skelett, liegen peripherisch, er stellt bei den meisten Gräsern eine *hohle Säule* dar. Den Querschnitt einer hohlen Säule kann man sich aber zusammengesetzt denken aus lauter I-Trägern (Fig. 31), und wie der Ingenieur die I-Träger bzw. die hohlen Säulen benutzt, um mit der gleichen Menge Material eine größere Festigkeit zu erzielen, als bei massiver Anordnung, so auch die Natur im Bau des Monokotyledonenstengels, worauf Schwendener zuerst hingewiesen.




Fig. 33. Teil eines Querschnitts durch den Halm der unbegrannten Tresse, *Bromus inermis*.  
Die dunklen Teile sind das mechanische System, die weißen an der Peripherie das grüne Assimilationssystem.  
(Nach Klenitz-Gerloff.)

Nahe unter der Oberhaut liegt, im Querschnitt gesehen, bei dem Grashalm oft ein Ring von sog. mechanischen Zellen, die hier lange bastähnliche Fasern darstellen; dieser Ring wird der *Sklerenchym-* oder *Stereomring*<sup>1)</sup> genannt (Fig. 32.) Oft verbindet er sich mit der Oberhaut durch rippenähnliche Sklerenchymstränge (Fig. 33), zwischen denen dann grünes Gewebe liegt, welches der Assimilation, d. h. der Aufnahme der Kohlensäure dient. Ähnliche Sklerenchymstränge begleiten auch die *Gefäßbündel* (die Nerven oder Adern), die von den Blättern in den Stengel eintreten. Diesem stark entwickelten Sklerenchym (Hartgewebe) verdankt der Halm der Gräser seine außerordentliche *Biegungs-*festigkeit. (Bei den Wurzeln, die mehr auf *Zug-*festigkeit in Anspruch genommen werden, liegen die festen Teile in der Achse.)




Fig. 34. Links Halmstück des Hafers aus der Blattscheide *a* herausgezogen, *b* Blatt, *k* Blatt- oder Scheidenknoten, *h* Blattspreite, *sp* Blattspreite; 1:2.

(Nach Nowackl.)

### § 46.

**Die Blätter** der Gräser stehen spiralg, d. h. abwechselnd, in zwei Zeilen, die um die Hälfte des Stengelumfangs voneinander liegen. Diese Blattstellung nennt man die  $\frac{1}{2}$  Stellung (Sehr deutlich beim Knaulgras, beim Mais etc.). Bei den Schein- oder Sauergräsern stehen sie in 3 Zeilen, nach  $\frac{1}{3}$  Stellung.

Während die vollkommensten Blätter, z. B. die der Doldengewächse drei Teile: Scheide, Stiel und Spreite haben, fällt bei den Laubblättern unserer Gräser der Stiel weg, dafür ist die *Scheide* aber sehr stark entwickelt. Bei den sog. Niederblättern, die als Schuppen an den unterirdischen Stengeln auftreten, ist die Scheide allein vorhanden, ebenso ist es bei den Hochblättern, d. h. den Spelzen, die Spreite ist bei letzteren aber oft zu einem borstenförmigen Anhängsel, der Granne, umgewandelt.

Die Blattscheide (Fig. 34) umschließt den Halm röhrenförmig und schützt ihn; meist ist sie der Länge nach *offen*, während sie bei den Sauergräsern (Cyperaceae) geschlossen ist; doch gibt es auch manche Süßgräser, die *geschlossene* oder wenigstens anfangs geschlossene Blattscheiden haben, und dies ist ein *wichtiges* Erkennungszeichen. Man muß aber *jüngere* Seitentriebe untersuchen.

*Geschlossene* oder wenigstens *bis etwa zur Mitte geschlossene* Blattscheiden besitzen: *Avena pubescens* (weichhaariger Hafer), *Briza media* (Zitter-

<sup>1)</sup> σκληρός trocken, hart, στερέωμα das Festgemachte.

gras), *Bromus* (Trespe, alle unsere Arten), *Dactylis glomerata* (Knaulgras), *Glyceria* (Süßgras, alle Arten), *Lolium italicum* und *perenne* (italienisches und englisches Raigras), *Melica* (Perlgras, alle Arten), *Poa alpina*, *pratensis*, *trivialis* und wohl alle Arten *Poa* (Rispengras) an den Seitentrieben, *Sesleria coerulea* (blaue Seslerie).

Auch die *Behaarung* der *Blattscheiden* kann mitunter gute Merkmale geben. Zottig behaart sind sie bei: *Trisetum* (*Avena*) *flavescens* (Goldhafer), *A. pubescens* (weichhaariger Hafer), *Brachypodium* (Zwenke, beide Arten), den Trespen *Bromus mollis*, *racemosus* und einigen andern, *Holcus lanatus* (Honiggras), *Koeleria cristata* (kammförmige Koelerie), *Melica ciliata* (gewimpertes Perlgras); meist sind dann auch die Blätter behaart.

An der Grenze zwischen Scheide und Spreite erhebt sich eine meist weißliche, häutige Fortsetzung der Scheide, das *Blatthäutchen* oder die *Ligula* (Fig. 34h). Auch dieses ist ein wichtiges Erkennungszeichen; bei den meisten Gräsern ist es kurz; *lang*, d. h. länger als breit, aber bei folgenden:

*Lange Blatthäutchen besitzen*: *Agrostis alba*, weißes Straußgras, Fiorin-gras und *A. canina*, Hunde-Straußgras; *Aira*, Schmele oder Schmiele (alle Arten),



Fig. 35.



Fig. 36.




Fig. 37.

Fig. 35 bis 37. Blattquerschnitte: 35 *Lolium italicum*, 36 *Festuca rubra*, 37 *F. ovina*, a jung, b ausgewachsen. 35 gerollt, 36 bis 37 gefaltet. (Nach Stebler und Schröter.)

*Avena pratensis*, Wiesenhafer und *A. pubescens*, weichhaariger Hafer; *Brachypodium*, Zwenke (beide Arten); *Calamagrostis*, Landrohr (alle Arten außer *C. arundinacea*); *Dactylis glomerata*, Knaulgras; *Glyceria fluitans*, flutendes Süßgras, Mannaschwaden; *Milium effusum*, gemeines Flattergras; *Phalaris arundinacea*, Phleum pratense (d. oberen), *Poa trivialis*, *serotina* und *annua*. — Bei *Glyceria spectabilis*, echtes Mielitzgras, endigt das sehr breite, abgerundete Blatthäutchen in eine Grannenspitze (Unterschied von *Phalaris arundinacea*, Rohr-Glanzgras).

Die Spreite der Laubblätter ist meist lineal, d. h. schmal und fast überall gleich breit, in der Knospenlage meist gerollt (wie man ein Blatt Papier zusammenrollt, Fig. 35). *Gefaltet*, d. h. zusammengeklappt wie ein Buch (Fig. 36, 37) ist sie nur bei folgenden (man untersuche jüngere Triebe):

*Gefaltete Blätter besitzen*: *Agrostis canina*, Hunde-Straußgras; *Aira*, Schmiele (alle Arten); *Avena pratensis* und *pubescens*, Wiesen- und weichhaariger Hafer; *Bromus erectus*, aufrechte Trespe; *Cynosurus cristatus*, Kammgras;

*Dactylis glomerata*, Knaulgras; *Festuca ovina*, Schafschwingel, heterophylla und rubra; *Glyceria*, Süßgras oder Schwaden (alle Arten); *Lolium perenne*, englisches Raigras; *Nardus stricta*, steifes Borstengras; *Poa*, Rispengras (alle Arten); *Sieglingia* (*Triodia*) *decumbens*, niederliegender Dreizahn etc.

Auf der unteren oder beiden Seiten des Blattes wie auf allen grünen Teilen befinden sich Spaltöffnungen (Fig. 38) zur *Atmung* und *Assimilation*, d. h. zur Aufnahme der Kohlensäure. Die Atmung erfolgt bei den Pflanzen gerade wie bei Menschen und Tieren Tag und Nacht, die Pflanzen atmen auch gerade wie Menschen und Tiere Sauerstoff ein und Kohlensäure aus. Daß man die Ausatmung der Kohlensäure bei den Pflanzen am Tage




Fig. 38. Oberhaut der Oberseite des Haferblattes mit Spaltöffnungen aa, zwischen den Blattnerven in parallelen Reihen angeordnet; 70:1.  
(Nach Nowacki.)




Fig. 39. *Poa pratensis*. A Querschnitt durch ein noch nicht ganz flaches Blatt, schwach vergrößert, schematisch. B Mittlerer Teil von A stärker vergrößert; b Bastbelege an den Kanten, c Oberhaut der Oberseite, e Oberhaut der Unterseite, f Fächer- oder Gelenkzellen, die das Zusammenfallen der Spreite veranlassen, wenn sie ihr Wasser verlieren, g Gefäßbündel (Nerven) mit Bastbelegen, besonders an der Unterseite, h Haare auf den Nerven.

nicht spürt, kommt daher, daß bei Tage ein anderer Prozeß, die Assimilation, die Aufnahme und Zerlegung der Kohlensäure nebenhergeht. Die Pflanzen nehmen nämlich am Tage mit den Spaltöffnungen reichlich Kohlensäure aus der Luft auf. Diese wird in den grünen (chlorophyllhaltigen) Zellen zerlegt und der Sauerstoff wieder ausgeschieden. Daher verbessern grüne Pflanzen bei Tage die Luft. Der bei der Assimilation in den Chlorophyllkörnern zurückgebliebene Kohlenstoff verbindet sich mit Wasser zu Kohlehydraten z. B. Stärke etc., und diese Stärke wandert in der Nacht in Gestalt von Zucker etc. aus den Blättern in den Stengel und weiter nach den Vegetationsspitzen, um hier als Baustoff für neue Zellen zu dienen, oder nach den sogen. Speicherorganen (Kartoffelnknollen, Samen etc.) um als Reservenernährung dort abgelagert zu werden. Die

Oberhautzellen der Blätter wie die des Halmes sind oft stark verkieselt. Manche Blätter haben in der Epidermis der Oberseite zwischen den Nerven sog. Fächerzellen (Fig. 39), welche sich mit Wasser füllen und die Ausbreitung der Spreite mit bedingen. Verlieren diese Zellen ihr Wasser, so rollen sich die Blätter ein oder falten sich zusammen, um sich gegen zu starke Verdunstung zu schützen; so viele Steppengräser, auch manche unserer Gräser.

### § 47.

**Die Blüten.** Alle Blüten der höheren Pflanzen kann man als *Sprosse*, d. h. beblätterte Stengel oder beblätterte Achsen auffassen. Man muß sich nur




Fig. 40. *A* Schematischer Aufriss eines 3blütigen Gräserährchens. *B* Grundriss eines 2blütigen Haferährchens; *h* 2 Hüllspelzen, *d* Deckspelzen, *v* Vorspelzen, *p* die 2 Schüppchen, *r* rudimentäre Blüte, *a* Achse des Ährchens.

die durch die Blüte gehende Längsachse mehr gestreckt denken, dann tritt deutlich hervor, daß die Kelchblätter den ersten Quirl, die Blumenblätter den zweiten, die Staubgefäße den dritten (oft auch einen vierten), die Fruchtblätter den obersten Quirl bilden.

Stehen die Blüten seitlich (Fig. 40), so gelten für sie dieselben Regeln wie für Laubzweige, denn sie sind ja nur veränderte Zweige. Ein Zweig (oder im Jugendzustand eine Knospe) steht normalerweise immer im Winkel eines Laubblattes, ähnlich auch die Blüten; das Blatt, in dessen Achsel eine Blüte steht, ist aber gewöhnlich kleiner als die Laubblätter und wird *Deckblatt*, bei den Gräsern *Deckspelze*, *äußere* oder *untere Spelze* (palea inferior) genannt (Fig. 40, *d*). Diese Spelze steht also *vor* der Blüte. Bei den Blüten der Dikotyledonen stehen am Stiele der Blüte oder, wenn dieser fehlt, an ihrer Basis noch zwei kleine Blättchen, links und rechts, die *Vorblätter* (sehr deutlich beim



Jelängerjelieber, beim Eisenhut), bei den Monokotyledonen nur *eins* und zwar nach hinten; dies heisst bei den Gräsern die *Vorspelze*, *innere* oder *obere Spelze* (palea superior) (Fig. 40, v). — Bei vielen Blüten fehlen Deck- und Vorblätter, theoretisch muß man sie aber immer annehmen, und bei den Gräsern sind sie verhältnismässig groß, denn die Spelzen fallen viel mehr in die Augen, als die Blüten selbst.

Die Spelzen sind aufzufassen als Laubblätter, die nur ihren untersten, *scheidenartigen* Teil entwickelt haben; ist eine Granne vorhanden, so ist diese als Mittelnerv der fehlenden Blattspreite anzusehen. Vergl. S. 248.

Die *Gesamtblütenstände* der Gräser sind entweder *Ähren*, *Trauben*, *Rispen* oder *ährenförmige Rispen*, welch letztere auch *Scheinähren* genannt werden.



Fig. 41. Haferährchen; hh Hüllspelzen, 1—3 erste bis dritte Blüte, dd Deck- oder äussere Spelzen, vv Vor- oder innere Spelzen. Oben rechts Haferblüte; p die 2 Schüppchen, n die 2 Narben, s die 3 Staubgefäße.

## § 48.

**Teile des Grasährchens.** Die letzten Verzweigungen des Blütenstandes tragen

die *Ährchen*. Ein *Ährchen* kann 1- oder mehrblütig sein, theoretisch ist es in allen Fällen wiederum ein Zweig, an dessen aus kurzen Gliedern zusammengesetzter Längsachse zweizeilig angeordnete abwechselnde Blättchen, die oben erwähnten *Spelzen*, stehen, gerade so, wie am Halme die Blätter. Die untersten 2 (bei Hirse etc. 3—4) dieser Spelzen (hh Fig. 40 und 41) entwickeln in ihrer Achsel keine Blüte und heißen *Hüllspelzen*, Klappen, Balg oder glumae. Beim Raigras ist nur eine Hüllspelze vorhanden, ausgenommen das Ährchen an der Spitze; beim Borstengras sind beide verkümmert. — Ist das Ährchen 1 blütig, so folgt auf die Hüllspelzen nur eine fruchtbare Spelze, die Deckspelze (palea inferior), ist es mehrblütig, so folgen abwechselnd links und rechts mehrere Deckspelzen. Jede Deckspelze entwickelt in ihrer Achsel ein *sehr* kurzes, oft

kaum sichtbares Zweiglein, den Blütenstiel, welcher ganz unten auf der inneren Seite, der Deckspelze gegenüber, eine zartere Spelze, das Vorblatt, die Vorspelze, *innere* oder *obere Spelze*, *palea superior* (*v*), und an seiner Spitze eine Blüte trägt.

Die *Hüllspelzen* (*hh*) sind den Deckspelzen oft sehr ähnlich, bald groß und das ganze Ährchen einhüllend, z. B. beim Hafer, Honiggras, Fuchsschwanz, bald klein, wie beim Roggen, oft ungleich lang, meist unbegrannt.

Die *Deckspelzen* (*dd* Fig. 40 und 41) sind in der Form verschieden, meist lanzettlich, mit einem Hauptnerv in der Mittellinie und oft begrannt. Aus dem Vorhergesagten folgt, daß, so viel Deckspelzen ein Ährchen trägt, so viel Blüten gewöhnlich vorhanden sind.

Die der Deckspelze gegenüber liegende *Vorspelze* ist meist dünnhäutig, durch den Druck der Achse gewöhnlich eingebuchtet, zweikielig und hat 2 Nerven (*vv* Fig. 40 B).

Als eine zweite Vorspelze des kleinen, theoretisch anzunehmenden Zweiges, welcher die Blüte trägt, sieht man die 2 Schüppchen (Fig. 40 und 41, *p*) an, welche dem Vorblatt gegenüber, also oberhalb der Deckspelze stehen. Man denkt sich diese als 2 Hälften eines Blattes; andere sehen sie als 2 rudimentäre Blumenblätter an. Das dritte Blumenblatt wäre dann das beim Federgras (*Stipa*) vorkommende hintere dritte Schüppchen.

Die Blüte der Gräser selbst (Fig. 40 und 41) besteht, wenn man nicht die 2 Schüppchen (*lodicae*) als Blumenblätter ansehen will, nur aus den Geschlechtsorganen: Staubgefäßen und Fruchtknoten (Stempel). Gewöhnlich sind 3 *Staubgefäße* (Fig. 40 B) vorhanden, von denen eins über der Deckspelze, die beiden andern seitlich stehen. Diese 3 entsprechen dem äußeren Staubblattkreise der *Liliaceae*; beim Reis und bei gewissen Arten von *Bambus* sind 6 Staubgefäße vorhanden. Hier ist also auch der innere Staubblattkreis der *Liliaceae* entwickelt.

Der Fruchtknoten ist aus einem einzigen Fruchtblatt gebildet, er enthält nur eine Samenanlage und trägt an seiner Spitze meist 2, gewöhnlich sitzende Narben, beim *Bambus* 2—3.

Die Narben sind mit meist langen, oft verzweigten Haaren (*Papillen*) besetzt. Sind diese, was gewöhnlich der Fall, in einer oder zwei Längsreihen angeordnet, so heißt die Narbe *federförmig*; solche Narben treten gewöhnlich seitlich, zwischen Deck- und Vorspelze, hervor. Stehen die Papillen nach allen Richtungen ab (nach Art einer Flaschenbürste oder eines Zylinderputzers, Ascherson und Graebner), so nennt man die Narbe *sprengwedelförmig* (Hirse). Eine sehr verlängerte sprengwedelförmige Narbe mit kurzen Papillen heißt *fadenförmig* (Ruchgras). Die beiden letzteren treten gewöhnlich an der Spitze der sich wenig öffnenden Spelzen hervor (Ruchgras, Fuchsschwanz, Borstengras).



Kügelchen. Bei den meisten Gräsern treten die Staubbeutel früher hervor als die Narben (die Blüte ist proterandrisch) und ihr Blütenstaub fällt daher meist auf die Narben anderer Blüten, beim Fuchsschwanz und Ruchgras aber, auch bei Pennisetum etc., treten die Narben eher hervor (protogynisch). Es findet daher, trotzdem die Gräser meist Zwitter sind, eine Selbstbestäubung doch selten statt, ausgenommen z. T. bei Gerste und Weizen.

Da die Gräser keine schön gefärbten Blütenhüllen, keine „Blumen“ haben, so werden die Insekten durch sie nicht angelockt; die Verbreitung des Blütenstaubes erfolgt nur durch den Wind. Die Gräser sind *Windblüher*. Der Blütenstaub, der auf die Narben gefallen ist, treibt Schläuche (Pollenschläuche), welche in die Samenanlage des Fruchtknotens eindringen (Fig. 42 und 44).

Die *Samenanlage*, auch Ei genannt, hat zwei Hüllen oder Schalen (Integumente), welche am unteren Ende eine Öffnung, den Keimmund (Mikropyle), lassen. Im Innern der Samenanlage (Fig. 43) ist eine große Zelle, der Embryosack, welcher u. a. das sog. Keimbläschen, auch Eizelle genannt, (und daneben 2 kleine Bläschen, die sog. Gehülfinnen) enthält. Der Pollenschlauch dringt bis hierhin vor und der eine seiner beiden Kerne verschmilzt dann mit dem Kern des Keimbläschens; damit ist die eigentliche Befruchtung vollzogen. Das Keimbläschen teilt sich alsdann durch mehrere Scheidewände, wird durch wiederholte Teilung in verschiedener Richtung und durch Streckung immer größer und bildet schließlich den *Embryo* oder Keim. In dem übrigen Raum des sich rasch vergrößernden Embryosackes entsteht dann das Endosperm, d. h. das Nährgewebe oder der Mehlkörper, welcher sich so vermehrt, daß der Keim schließlich an die untere äußere Wand des Kornes gedrängt wird (vergl. Fig. 23 auf S. 240). — Nach den neuesten Untersuchungen erfolgt die Bildung des Endosperms erst, nachdem der zweite Kern des Pollenschlauchs sich mit dem sog. sekundären, vegetativen Kern des Embryosackes *n* (Fig. 43) verbunden hat. Es findet also eine Doppelbefruchtung statt. Der sexuelle Kern des Pollenschlauchs befruchtet den sexuellen Kern des Keimbläschens, der vegetative den vegetativen des Embryosackes. Dies erklärt, warum z. B. bei Kreuzungen zwischen weißem und blauem Mais schon in dem Jahre der Kreuzung die Körner eines Kolbens teils blau, teils weiß werden. — Die Antipoden *a* (Fig. 43) sind ohne Bedeutung.




Fig. 44. Der Teil bei *k* von Fig. 43 stärker vergrößert, nach der Befruchtung, *k* das zum Embryo heranwachsende Keimbläschen, *ps* Pollenschlauch; 300 : 1. (Nach Nowacki.)

## § 50.

**Dauer der Gräser.** Die meisten Gräser dauern mehrere Jahre aus, eine Anzahl derselben aber ist einjährig. Zu letzteren gehören die Getreidearten und einige wild wachsende Gräser, die meist als Unkräuter anzusehen sind.

Die ausdauernden Gräser verhalten sich hinsichtlich ihrer Dauer auch sehr verschieden. So geht das englische Raigras, *Lolium perenne*, schon nach 2—3, selten 4—6 Jahren ein und gibt in den letzten Jahren nur wenig Ertrag; andere, wie *Phleum pratense*, das Timothee, leben länger, nehmen aber langsam im Ertrage ab, noch andere, wie *Festuca pratensis*, Wiesenschwingel, bleiben sich viele Jahre im Ertrage gleich, noch andere nehmen im Laufe der Jahre sehr zu, so *Poa pratensis*, das viele Jahre aushält.

Auf der Wiese herrscht ein steter Kampf ums Dasein, und wenn von ihren Kräutern die einen früher eingehen, so ist es eben zum Teil, weil sie diesen Kampf weniger gut bestehen können. Allein gesät, würden sie wohl länger aushalten, auf der Wiese werden sie aber durch andere, denen vielleicht die Bodenverhältnisse mehr zusagen, verdrängt. In nassen Zeiten entwickeln sich die Gräser besser, in trockenen Jahren die übrigen Kräuter.

### § 51.

**Ansprüche an Boden, Wasser und Dünger.** Die meisten Gräser lieben einen frischen, feuchten Boden, nur wenige Arten leben auch auf trockenem, z. B. Schafschwingel; andere dagegen wachsen selbst im Wasser. Humoser, sandiger Lehm sagt den meisten am besten zu, einige lieben reinen Sand, andere mehr Kalk. (Näheres im speziellen Teil.)

a) *Wasserliebend* (hygrophil) sind: Flutender Schwaden, Wasserschwaden, Rohrglanzgras, Wiesenschwingel, Wiesenfuchsschwanz, Knaulgras, Fioringras, gemeines Straußgras, wolliges Honiggras, Lieschgras (Timothee), Goldhafer, mittleres Zittergras, gemeines und spätes Rispengras, Rasenschmiele, italienisches Raigras.

b) *Wasserfliehend* (xerophil) sind: Aufrechte Tresse, gekämmte Koelerie, graue Schmiele, Boehmers Lieschgras, Schafschwingel, knolliges Rispengras, gebogene Schmiele, blaue Sesleria etc.

c) Mehr oder weniger *indifferent* sind: Geruchgras, weichhaariger Hafer, englisches Raigras, Rotschwingel, verschiedenblättriger Schwingel, französisches Raigras, Wiesen-Rispengras, Quecke, oft auch das oben unter a) genannte Knaulgras.

Die Feuchtigkeit liebenden Gräser, überhaupt die meisten sog. hygrophilen Pflanzen, sowie die indifferenten, sind meist für Dünger sehr dankbar, ganz besonders verträgt das italienische Raigras die größten Düngermengen und wird deshalb so viel auf städtischen Rieselfeldern, die mit Spüljauche berieselt werden, gebaut. — Die wasserfliehenden, also die Trockenheit liebenden, sog. xerophilen Gräser fliehen meist auch den Dünger.

Nach Stebler und Schröter, „Die Alpen-Futterpflanzen“, sind düngerscheu, d. h. werden durch Düngung direkt geschädigt: Blaue Sesleria,

Borstengras, aufrechte Trespe, liegender Dreizahn, Michelis Lieschgras. — *Düngerfliehend*, d. h. an gedüngten Plätzen sich nicht stärker entwickelnd als an ungedüngten und deshalb von andern Pflanzen verdrängt: Mittleres Zittergras, gefiederte Zwenke, violettes Rispengras, Alpenstraußgras, violetter Schwingel und verschiedene andere alpine, meist an trockenen Stellen wachsende Gräser. Die meisten guten Gräser sind *düngerliebend*, einzelne, wie das einjährige Rispengras und das Alpen-Rispengras, sogar *düngerfordernd*, d. h. sie finden sich nur an gedüngten Plätzen.

Weber (Arb. d. D. L.-G. Hft. 61, S. 84) fand, daß auf den Dauerweiden der Marschen Norddeutschlands alle Gewächse zu den Mesophyten, d. h. zu denen gehören, die eine mittlere Feuchtigkeit lieben; aber gerade die Arten, welche nach Zahl der Individuen vorherrschen, sind solche, die vermöge ihrer Organisation verhältnismäßig trockene Standorte verlangen, oder doch vermöge der Anschmiegsamkeit ihres Organismus zu ertragen vermögen. Namentlich gilt dies von dem so stark vorherrschenden englischen Raigras, das im Mittel der vom Weidevieh bevorzugten Stellen 72% einnimmt (Weißklee als nächster 13% der Fläche). Das Fehlen der Spaltöffnungen auf der Unterseite, ihre Lage an den Flanken der Riefen der Oberseite, ihre leichte Verschleißbarkeit und das Zusammenfallen des Blattes bei Wassermangel, endlich die meist 45 cm tief reichenden Wurzeln befähigen es dazu, auch an trockenen Stellen zu gedeihen.

## § 52.

**Wuchs, Ober- und Untergräser.** Viele Gräser haben einen hohen, reich beblätterten Stengel, solche heißen „*Obergräser*“; andere dagegen entwickeln wenig Blätter an den Halmen, wenigstens an den blühenden, und dafür mehr Blätter an den Seitentrieben, solche heißen „*Untergräser*“; manche kann man sowohl als Ober- wie als Untergräser bezeichnen. Bei der Zusammenstellung von Grasmischungen ist es wichtig, beide Arten zu nehmen, die Obergräser geben im ersten, die Untergräser im zweiten Schnitt den Hauptertrag.

## Kapitel V.

### Systematik der Gräser und Verwandten.

#### *Reihe oder Ordnung Glumiflorae, Spelzblütige.*<sup>1)</sup>

Blätter meist schmal, parallelnervig. Blüten klein, meist in den Achseln spelzenartig ausgebildeter Deckblätter. Blütenblätter (Perigon) fehlend oder verändert, unterständig. Frucht nicht aufspringend, einsamig, Keimling gerade.

#### **1. Fam. Gramineae (Gramina), Gräser (Echte oder Süßgräser).**

**Wichtigste Merkmale.** Blüten meist zwitтерig, ohne Blütenhülle (d. i. ohne Blütenblätter), in der Achsel spelzenartiger, sie verhüllender Deckblätter (Deckspelzen), einzeln oder zu mehrblütigen Ährchen verbunden, mit *einem der Deckspelze gegenüberstehenden, meist zweikeiligen Vorblatt* (Vorspelze), einem über der Deckspelze stehenden, meist bis zum Grunde 2 teiligen, sehr kleinen, gewöhnlich saftreichen zweiten Vorblatt (die beiden vorderen Schüppchen, lodiculae, auch als Blütenblätter angesehen) (Fig. 45, 40 u. 41). Mitunter ist noch ein 3. Vorblatt entwickelt, das dann wieder hinten über dem 1. steht (so bei Stipa). Staubgefäße meist 3. Fruchtknoten aus einem einzigen, zusammengefalteten, hinten an der Verwachsungsstelle oft eine Furche bildenden Fruchtblatt, mit 1 Samenanlage. Narben meist 2. Frucht nicht aufspringend, sondern geschlossen bleibend, eine




Fig. 45. *Holcus lanatus*. a Ährchen, die obere männliche Blüte mit einer in der Jugend noch nicht hakenförmigen Granne; b Fruchtknoten, davor die 2 Schüppchen; c Staubbeutel längs aufgesprungen.

Schließfrucht, bei welcher meist Frucht und Samenschale verwachsen (Ausnahme d. ausländischen *Zizaniopsis* u. *Eleusine*). Eine derartige Schließfrucht heißt Korn oder Karyopse. Sie ist mit großem, stärkereichem Nährgewebe (Mehlkörper) versehen, dessen *Vorderseite und Basis der nur von der Kornschale bedeckte Keim außen anliegt*. Keim meist klein und gerade,

<sup>1)</sup> Vergl. S. 175 und 181.

mit schildförmigem Keimblatt, in dessen vorderer Aushöhlung oder Rinne das mit mehreren Blattanlagen versehene Knöspchen und die von einem Hüllgewebe umgebenen Würzelchen liegen. (Vergl. Fig. 23 u. 24, S. 240 u. 241.)

Kräuter, selten Sträucher oder Bäume, mit knotig gegliederten Stengeln (Halmen), abwechselnden zweizeiligen Blättern mit meist offenen Blattscheiden, die Ährchen meist am Grunde von leeren spelzenartigen Hüllblättern umgeben (Hüllspelzen, Klappen), in rispen- oder ährenartige Blütenstände vereinigt.

### § 53.

**Einteilung der Gräser.** Man hat früher die Gräser einfach nach der Zahl der Hüllspelzen eingeteilt, und da Ascherson und Gräbner diese Einteilung in ihrer trefflichen „Flora des nordostdeutschen Flachlandes“, 1898/99, sowie in ihrem noch größeren Werk „Synopsis der Mitteleuropäischen Flora“ wieder angenommen haben, wollen wir diese voranstellen, im übrigen aber der Einteilung von Hackel in dem großen Werk von Engler und Prantl, „Natürliche Pflanzenfamilien“, die sich auch in Engler's Syllabus der natürlichen Pflanzenfamilien (2. Ausgabe 1898) findet, folgen. Beide Einteilungen lassen sich ganz gut verbinden.

Hüllspelzen mehr als 2, Ährchen meist 1blütig

Unterfamilie:

I. Panicoideae

umfasst unsere Gruppen 1—5.

Hüllspelzen 2 (bei *Lolium* 1, bei *Nardus* 0),

Ährchen 1- oder mehrblütig . . . . .

II. Poaeoideae

umfasst unsere Gruppen 6—11.

#### Einteilung nach Hackel.

A. *Ährchen 1blütig*, ohne Achsenverlängerung, d. h. ohne kurzes seitliches Stielchen über der Blüte, also ohne Andeutung einer 2. Blüte; selten 2blütig und dann die untere Blüte unvollkommen. Ährchen bei der Reife als Ganzes vom Stiele oder samt gewissen Gliedern der Ährenspindel abfallend.

a) *Ährchen vom Rücken* her zusammengedrückt oder stielrundlich. (Die Körner können auf dem Rücken liegen.) Nabel meist punktförmig. Hüllspelzen meist 3.

α) *Deckspelze und Vorspelze* (letztere oft fehlend) *sarinhäutig*. Hüllspelzen derbhäutig, die unterste am größten.

Gruppe 1. *Maydeae*. ♂, ♀. Ährchen in getrennten Blütenständen oder in getrennten Teilen desselben Blütenstandes.

Gruppe 2. *Andropogoneae*. Ährchen ♂ oder ♀, in demselben Blütenstande so gemischt, dass ein ♂ neben einem ♀ steht.

β) *Deck- und Vorspelze meist knorpelig*, Hüllspelzen zarter, die unterste meist klein.

Gruppe 3. *Paniceae*. Hirsegräser.

b) *Ährchen von der Seite zusammengedrückt* (die Körner können deshalb nicht auf dem Rücken liegen). Nabel lineal.

Gruppe 4. *Oryzeae*. Reisgräser.



B. Ährchen 1- bis vielblütig, die 1blütigen oft mit *Achsenfortsatz* (Stielchen) über der Blüte (als Andeutung einer 2. Blüte), ihre Spindel meist oberhalb der Hüllspelzen gegliedert, sodafs die Hüllspelzen beim Ausfallen der reifen bespelzten Körner *stehen bleiben* (Ausnahmen u. a: Alopecurus, Fuchsschwanz und Holcus, Honiggras, wo das Ährchen als Ganzes abfällt). — Wenn 2- oder mehrblütig, dann immer mit deutlichen Internodien (Stielchen der nächsten Bl) zwischen den Blüten.



Fig. 46. Roggenähre im Aufblühen begriffen. Beginn i. d. Mitte, nach oben u. unten vorschreitend.

a) Ährchen 1blütig.

Gruppe 5. *Phalarideae*.

Ährchen gestielt, in Rispen oder Ährenrispen, 1blütig, mit 4 Hüllspelzen, die zwei inneren oft sehr klein. Vorspelze 1nervig.

Gruppe 6. *Agrósteae*, wie vorige, aber nur mit 2 Hüllspelzen, diese so lang oder meist länger als die Deckspelze.

b) Ährchen meist 2- bis mehrblütig, Hüllspelzen 2.

Gruppe 7. *Avéneae*. Ährchen gestielt, in Rispen. Hüllspelzen länger als die nächste Deckspelze. Granne, wenn vorhanden, auf dem Rücken oder an der Basis, meist gekniet.

(Gruppe 8. *Chlorideae*. Ährchen in 2 einander genäherten Reihen sitzend. Eleusine Coracana, Afrika, Ostindien, zur Bierbereitung in Ostafrika.)

Gruppe 9. *Festúceae*. Ährchen gestielt, in Rispen oder Trauben. Deckspelzen länger als die Hüllspelzen, unbegrannt oder aus der Spitze (selten, z. B. Bromus, unter der Spitze) begrannt, Granne nie gekniet. Selten 1blütig.

Gruppe 10. *Hordéae*. Ährchen in *Einsenkungen der Spindel*, in einer sog. *Ähre*, fast stets in 2 einander gegenüberstehenden Reihen.

(Gruppe 11. *Bambúseae*. Grofse, oberirdisch ausdauernde Gräser mit oft kurzgestielten Blattspreiten, in den Tropen.)

§ 54.

**Künstlicher Schlüssel** zum Bestimmen der *Gattungen* der einheimischen Gräser. (Hier sind auch solche aufgenommen, die im speziellen Teil nicht behandelt sind.)

- A. Getrennten Geschlechts, die männlichen (Staubgefäße-) Blüten in Rispen an der Spitze des *nicht hohlen* Stengels, die weiblichen in Kolben im Winkel der Blätter . . . . . *Zea Mays*, Mais.



Fig. 47. *Lolium multiflorum* (italicum), italienisches Raigras. Ährchen mit der schmalen Seite der Ährenspindel zugekehrt.




Fig. 48. *Lolium multiflorum* (italicum). *a* Ährchen vor der Blüte; *b* Ährchen in Blüte, die erste Blüte ist schon verblüht, die zweite in voller Blüte; *c* Fruchtknoten mit den zwei Schüppchen davor.

- B. Mit Zwitterblüten. Zerfallen nach dem Blütenstand in:

- I. *Ährengräser*, d. h. Ährchen sitzend an einer einzigen, unverästelten Achse (Spindel), z. B. Roggen (Fig. 46). Vergl. III.
- II. *Fingerährengräser*; mehrere Ähren fingerig zusammengestellt, z. B. Fingerhirse.
- III. *Rispenährengräser oder Scheinährengräser*; Ährchen kurzgestielt, die Stiele oft verzweigt, aber alle dicht aneinander und der Hauptachse anliegend, z. B. Fuchsschwanz. I u. III sind einander ähnlich.
- IV. *Rispengräser*; Ährchen an ziemlich langen, verzweigten Stielen.

## I. Ährengräser. S. auch III.

## a) Hüllspelzen fehlend.

Ährchen einzeln, 1 blütig, in einseitwendiger Ähre, Narbe nur 1, Blätter borstenförmig . . . . . Nardus, Borstengras.

## b) Hüllspelze 1, nur das endständige Ährchen mit 2.

Ährchen einzeln, wechselständig, 3- bis mehrblütig, mit der *schmalen* Seite der Ährenspindel zugekehrt (Fig. 47 und 48) . . . Lolium Lolch, Raigras.



Fig. 49. *Triticum repens*, kriechender Weizen. Quecke. Ährchen m. d. breiten Seite der Ährenspindel zugekehrt.




Fig. 50. *Triticum repens*. a Ährchen; b Staubbeutel; c Fruchtknoten, davor die 2 Schläppchen.

## c) Hüllspelzen 2.

## 1. Ährchen einzeln.

\* Ährchen sitzend.

α) Ährchen mit der *breiten Seite* der Spindel zugekehrt, 3- bis vielblütig, begrannt oder grannenlos, Hüllspelzen eiförmig oder lanzettlich, mehrnervig (Fig. 49 und 50) . . . . . Triticum, Weizen.

β) Ährchen 2 blütig, in der Mitte zwischen beiden das Stielchen einer 3. verkümmerten (zuweilen sich entwickelnden) Blüte, Deckspelzen lang begrannt, Hüllspelzen pfriemenförmig . . . Secale, Roggen.

- \*\* Ährchen kurzgestielt (Blütenstand streng genommen eine Traube, keine Ähre), Ährchen vielblütig, Hüllspelzen ungleich lang, Vorspelze am Rande kammförmig gewimpert. . . . Brachypodium, Zwenke.
2. Ährchen zu mehreren.
- a) Ähre ohne Gipfelährchen, Ährchen zu 3, 1 blütig, mittleres stets zwittrig, lang begrannt, die 2 seitenständigen entweder zwittrig oder männlich oder geschlechtslos, begrannt oder grannenlos.  
Hordeum, Gerste.
- β) Ähre mit Gipfelährchen, Ährchen zu 2 bis mehreren, 2- bis vielblütig, alle zwittrig. . . . . Elymus, Haargras.
- NB. Phleum pratense, Timotheegras, Alopecurus, Fuchsschwanz, Anthoxanthum, Ruchgras, die scheinbar Ähren tragen, siehe unter III.

### II. Fingerährengräser.

Ährchen in einseitigen, fingerartig gestellten Ähren. 1 blütig. Narben sprengwedelförmig.

- a) Ährchen von der Seite zusammengedrückt. . . . . Cynodon.
- b) Ährchen vom Rücken zusammengedrückt, zu 2 nebeneinander.

Ährenspindel fast zylindrisch, behaart, gegliedert, Hüllspelzen 3.

Andropogon.

Ährenspindel flach, ungegliedert, Hüllspelzen 3, die unterste sehr klein oder verkümmert. Digitaria (eine Untergattung von Panicum, s. S. 266).

### III. Rispenährengräser (mit Scheinähren). S. auch I.

- a) Verzweigungen der ährenförmigen Rispe zum Teil ohne Ährchen, als raue Borsten hervorragend, Hüllspelzen 3, die unterste die kleinste.

Setaria, Borstenhirse.

- b) Verzweigungen sämtlich Ährchen tragend.

1. Hüllspelzen 4, die 2 äußeren groß, kahnförmig, die 2 inneren klein, schuppenförmig; nur angebaut. . Phalaris canariensis, Kanariengras.

2. Hüllspelzen 4, die unterste halb so lang als die zweite, die 2 inneren verdeckt, bräunlich und begrannt, daher 2 Grannen. Staubgefäße 2. Narben fadenförmig, hervortretend. . . . Anthoxanthum, Ruchgras.

3. Hüllspelzen 2.

Ährchen 1 blütig, groß, Hüllspelzen am Grunde verwachsen, 1 Granne, Ähre weich. . . . . Alopecurus, Fuchsschwanz.

Ährchen 1 blütig, klein, Hüllspelzen nicht verwachsen, stachelspitz, daher Ährchen stiefelknechtartig, Ähre büstenartig rau (Fig. 51).

Phleum, Lieschgras.

Ährchen 1 blütig, sehr groß, untere Hüllspelze kleiner, Blüten am Grunde mit Haaren. . . . . Ammophila, Sandhalm.

Ährchen 2- bis mehrblütig, allseitwendig, Deckspelze stachelspitz oder begrannt. . . . . Koeleria, Koelerie.

Ährchen 2 blütig, meist einseitwendig, bläulich, Narben fadenförmig.

Sesleria, Seslerie.

Ährchen mehrblütig, einseitswendig, mit kammförmig gefiedertem Tragblatt . . . . . *Cynosurus*, Kammgras.

Ährchen mehrblütig, Hüllspelzen gewölbt, so lang wie das Ährchen, untere Spelze knorpelig, am Rande zottig gewimpert.

*Mélica ciliáta*, gewimpertes Perlgras.

#### IV. Rispengräser (selten nur eine Traube).

##### a) Ährchen 1blütig.

##### *α) Hüllspelzen 4 (Phalarideae).*

1. Hüllspelzen 4, die 2 äußeren länger als die Blüte, die inneren sehr klein, pinselförmig, Ährchen geknäuel, oft rötlich oder violett angehaucht. . . . . *Phálaris arundinácea*, rohrartiges Glanzgras.




Fig. 51. *Phleum pratense*. *a* Ährchen, *b* Hüllspelzen, *c* Fruchtknoten mit den beiden Narben und den zarten Blütenspelzen, *d* unterer Teil von *c*, stärker vergrößert.

2. Hüllspelzen 4, die 2 inneren braun, mit je 3 Staubgefäßen in ihrer Achsel, also eigentlich männliche Blüten. Die fruchtbare Zwitterblüte mit 2 Staubgefäßen . . . . . *Hieróchloa*, Mariengras.

##### *β) Hüllspelzen 3 (Paniceae).*

3. Unterste Hüllspelze die kleinste . . . . . *Pánicum*, Hirse.

##### *γ) Hüllspelzen 2 (Agrosteae).*

4. Ährchen eiförmig, im Querschnitt rund, hirseähnlich. Rispe groß, sehr locker, Blätter sehr breit und schlaff. Hohes Waldgras.

*Mílium*, Flattergras.

5. Ährchen von der Seite zusammengedrückt, sehr klein, untere Hüllspelze größer, Granne fehlend oder sehr kurz . . . *Agróstis*, Straußgras.
6. Ährchen von der Seite zusammengedrückt, untere Hüllspelze kleiner, Granne lang, sonst wie *Agróstis* . . . *Apéra*, Windhalm.
7. Ährchen von der Seite zusammengedrückt, untere Hüllspelze größer, Blüten am Grunde mit Haaren, kurz begrannt. Hohe, harte Gräser.  
*Calamagróstis*, Landrohr.

**b) Ährchen 2- bis vielblütig. Hüllspelzen stets 2, selten 0 (*Nardus*).**

**1. Hüllspelzen (wenigstens eine) so lang oder länger als das Ährchen oder wenigstens als die nächste Deckspelze (*Aveneae*).**

**a) Ährchen gewölbt.**

Ährchen 3blütig, die 2 unteren Bl männlich. *Hieróchloa*, Mariengras.  
 Ährchen 2–3blütig, die oberste Bl geschlechtslos, einen Knopf bildend, Blattscheiden geschlossen, Deckspelze knorpelig. *Mélica*, Perlgras.  
 Ährchen 2blütig, groß, die untere Blüte männlich, mit langer, gekniet Granne, untere Hüllspelze halb so lang als die obere.

*Avena* (*Arrhenátherum*) *elatiór*, französisches Raigras.

Ährchen 2blütig, alle Blüten zwittrig.

† Deckspelze nahe dem *Grunde* mit kurzer, fast gerader oder langer gekniet Granne, Rispe locker . . . *Aira*, Schmele.

†† Granne grundständig, oberwärts keulenförmig.

*Weingaertnéria*, Silbergras.

Ährchen meist groß, 2- bis vielblütig, alle Blüten zwittrig. Hüllspelzen meist das ganze Ährchen verdeckend.

† Deckspelze auf dem *Rücken* mit langer, gekniet Granne (beim gebauten Hafer oft fehlend) . . . *Avéna*, Hafer.

†† Deckspelze unbegrannt, Rispen *traubenförmig*, d. h. Äste fast unverzweigt . . . *Sieglingia*, Sieglingie.

**β) Ährchen zusammengedrückt gekielt.**

Ährchen klein, 2blütig, die obere Bl männlich, kurz begrannt, Granne hakenförmig oder gekniet . . . *Holcus*, Honiggras.

**2. Hüllspelzen kürzer als die nächsten Deckspelzen (*Festuceae*).**

**a) Alle Blüten, außer der untersten, von langen, seidenartigen Haaren umhüllt . . . *Phragmites*, Schilfrohr.**

**β) Blüten ohne solche Haare.**

**αα) Ährchen herzförmig, herabhängend . . . *Briza*, Zittergras.**

**ββ) Ährchen von gewöhnlicher Form, länglich oder lanzettlich.**

† Deckspelzen auf dem Rücken *zusammengedrückt gekielt*.  
 (Die Spelzen können nicht auf dem Rücken liegen.)

Ährchen geknäuel, Deckspelze mit Grannenspitze, *Blattscheiden halb geschlossen, platt* . . *Dáctylis*, Knaulgras.

Ährchen einzeln an der vielästigen Rispe, unbegrannt, *Blattscheiden z.T. anfangs geschlossen, meist rund*. *Poa*, Rispengras.

†† Deckspelzen auf dem Rücken *gewölbt*. (Können auf dem Rücken liegen.)

††α) Halm scheinbar ohne Knoten, Blatthäutchen in eine Reihe Haare aufgelöst, Ährchen bläulich, Deckspelze bauchig, Narben purpurn . . . *Molinia*, Pfeifengras.

††β) Halm deutlich mit Knoten.

Ähren 4—11 blütig, Deckspelze länglich, stumpf, 5—7nervig, grannenlos, Narben ästig gefranst, Blattscheiden geschlossen. Hohe Wassergräser. *Glyceria*, Stiefgras. Ährchen 2—7blütig, untere Hüllspelze größer als die obere, Deckspelze 3spitzig, am Grunde mit 1 Haarbüschel. Hohes Wassergras mit sehr ästiger Rispe, Blätter am Grunde mit braunem Fleck. Ähnlich wie *Glyceria aquatica*, aber Blattscheiden offen.

*Scolochloa festucacea*, Schwingelschilf.

Ährchen 2blütig, schlaffes Wassergras.

*Catabrosa aquatica*, Quellgras.

Ährchen 2- bis vielblütig, Deckspelze stumpf und unbegrannt oder lanzettlich und *an der Spitze* begrannt, Narben *an der Spitze* des Fruchtknotens, Rispe vor und nach der Blüte oder selbst während derselben meist einseitwendig . . . . *Festuca*, Schwingel. Ährchen vielblütig, Deckspelze grannenlos oder *unter* der Spitze begrannt, Narben *unter* der Spitze des Fruchtknotens eingefügt, *Blattscheiden bis zur Hälfte geschlossen* (Fig. 52) . . . . *Bromus*, Trespe.

Einen Schlüssel zum Bestimmen der häufigeren Gräser der norddeutschen Marschen im blütenlosen Zustande gibt C. Weber in „Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft“, Heft 61, S. 33 (1901).

## § 55.

Die ersten 4 Gruppen der Gräser umfassen meist ausländische Arten. Die Gruppencharaktere s. S. 259.

Gruppe 1. *Maydeae*, Maisgräser. *Zea Mays*, Mais, türkischer Weizen, stammt aber aus Amerika. ♂ Bl in Rispen an der Spitze des Stengels, ♀ in Kolben in den Blattachsen.

Gruppe 2. *Andropogoneae*, Mohrenhirsegräser. *Andropogon* *Sorghum* (*Sorghum vulgare*), Mohrenhirse, Durrha, Dari, Broomcorn, aus Afrika, jetzt überall in wärmeren Ländern, besonders auch in Nordamerika gebaut.

Gruppe 3. *Panicaceae*, Hirsegräser. *Panicum miliaceum*, Rispenhirse. Rispe weitschweifig; gebaut. *P. (Digitaria) sanguinale*, raubhaarig, und *P. (Dig.) lineare*, kahl, beide mit fingerförmigen Blütenständen,<sup>1)</sup> *P. crus galli*, Hühnerhirse (mit einseitwendiger Rispe), alle 3 Unkräuter, ebenso wie *P. viride* (*Setaria viridis*), *P. glaucum* (*S. glauca*), diese beiden mit borstigen Scheinähren. Als Kolbenhirse wird *P. italicum* gebaut, die wohl nur eine Kulturform von *P. viride* ist. Hierher gehört auch *Pennisetum typhoideum*, Negerhirse, Afrika,

<sup>1)</sup> *P. lineare*, Blätter und Halm niederliegend, Ähren meist zu 3; ☉, Juli—Herbst. Besiedelt nackte Sandflächen und bereitet die Pflanzendecke vor.

Kolben einem Rohrkolben ähnlich, sowie *Paspalum dilatatum*, Südamerika, Futtergras in den Tropen.

Gruppe 4. *Oryzaceae*, Reisgräser. *Oryza sativa*, Reis, trop. Asien. *Oryza clandestina* (*Leersia oryzoides*), am Wasser vorkommend, bei uns selten, die Rispen entwickeln sich nur in warmen Sommern.

### Die wichtigsten Gattungen und Arten aus den Gruppen 5—10.

#### § 56.

Gruppe 5. *Phalarideaceae*. Ährchen gestielt, 1 blütig, mit vier Hüllspelzen, die zwei inneren sehr klein. Rispen oder Scheinähren.

(Gattung) 1. *Phalaris*,<sup>1)</sup> Glanzgras. Rispe lappig oder, bei *P. canariensis*, ährenförmig, die 2 äußeren Hüllspelzen die Blüte verdeckend, die zwei inneren klein, pinsel- oder schuppenförmig, Deckspelze grannenlos, glänzend.

(Art) 1. *P. arundinacea* (*Baldingera arundinacea*, *Digraphis arundinacea*), rohrartiges Glanzgras, Havel-Mielitz (Fig. 53). — Zahlreiche unterirdische, bis 30 cm lange, purpurrote, glänzende Ausläufer treibend, rohrartig, Blätter breit, schmal zugespitzt, mit glänzend weißem Mittelnerv, trocken, schilfartig ranschend, die Blattscheide, gegen das Licht gesehen, mit vielen Queradern, die Blattspreite mit 40—60 feinen weißen Längsstreifen, Blattgrund flach, Blatthäutchen lang, bis 6 mm, abgestutzt oder spitz, meist




Fig. 52. *Bromus inermis*. a Ährchen; b Fruchtknoten mit den 2 Schüppchen, c derselbe von hinten, die 2 seitlichen Staubfäden abgeschnitten; d Staubbeutel; e Pollenkorn auf den Haaren der Narbe.

<sup>1)</sup> Gewöhnlich leitet man es ab von *φάλος*, *φαλερός* glänzend. Nach Ascherson und Graebner, Flora des nordostdeutschen Flachlandes S. 77, ist *φάλαρις* bei Dioskorides der Name eines Grases, das eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Helmschmuck (*φάλαρα*) hat.



zerschlitzt, Halm hoch, Rispe gelappt, oft rötlich oder violett angelaufen, die beiden inneren Hüllspelzen (eigentlich verkümmerte Blütchen) auf kleine Haarbüschel reduziert. Deckspelze silbergrau, pergamentartig. 4. Juni, Juli. 1—2 $\frac{1}{2}$  m.

**Standort:** An Flusufern und stehenden Gewässern, besonders in der Ebene, neuerdings aber auch viel auf besandeten Moorwiesen angebaut, ebenso hoch in den Alpen, wo es vortrefflich gedeiht und der Kälte völlig widersteht. — **Bewässerung** verträgt es sehr gut, auch stauende Nässe, und gedeiht selbst



Fig. 53. *Phalaris arundinacea*.  
a Ährchen, b die 2 äußeren Hüllspelzen; c Blüte mit den 2 pinselförmigen inneren Hüllspelzen an der Basis, d Fruchtknoten, e Frucht.  
(Nach Garcke.)



Fig. 54. *Anthoxanthum odoratum*, echtes Ruchgras.  
a blühendes Ährchen, bei b ausgebreitet, c innere Hüllspelzen, d Staubgefäße u. Fruchtknoten.  
(Nach Garcke.)

oft auf trocknerem Boden. An der Havel und allen norddeutschen Flüssen sehr verbreitet und ähnlich hoch geschätzt wie das echte Mielitzgras (S. 287), von dem es sich durch runden Halm, offene Blattscheide, langes Blathäutchen und die gelappte Rispe, die öfter bei ihrem violetten Anhauch dem Honiggras ähnlich sieht, aber größer ist, unterscheidet. **Wert:** Vor der Blüte gemäht ein gutes, wenn auch grobes Gras, von norddeutschen Heuhändlern sehr hoch gehalten: später hart.

Entwickelt sich früh, gibt guten Nachwuchs und kann oft 3mal geschnitten werden. Auf Moorwiesen breitet es sich oft in bedenklicher Weise aus und bildet große blaugrüne Inseln. Die jungen Triebe sehen denen des Timotheegrases, *Phleum pratense*, sehr ähnlich. **Unterscheidung:** Die Längs-

nerven der Blattscheiden sind durch *sahlreiche* und *deutliche Queradern* verbunden, während sich bei Phleum nur wenige und minder deutliche finden.

Eine Abart, var. *picta* mit weiß gestreiften Blättern, ist das Bandgras der Gärten.

2. *P. canariensis*, Kanariengras, Spitzsamen, mit hellgrünen matten Blättern, hat keine Rispen, sondern ovale Ähren, eigentlich Scheinähren. Die 2 unteren Hüllspelzen sehr groß, auf dem Rücken mit ganzrandigem, bis zur Spitze reichendem Flügel, kahnförmig, obere lanzettlich, weißlich, letztere sitzen oft noch der gelben Scheinfrucht, dem Spitzsamen, an. Auf dem Acker gebaut, mitunter verwildert. Stammt aus Südeuropa.

2. *Anthoxanthum* (ἄνθος Blüte, ξανθός gelb, wird früh gelb), Ruchgras. Rispe ährenförmig (Scheinähre), Ährchen 1 blütig. Hüllspelzen 4, die unterste *halb* so lang als die 2., die 3. und 4. kurz, verborgen, *braun, behaart* und auf dem Rücken begrannt (verkümmerte Blüten). Staubgefäße nur 2. Narben fadenförmig. Blätter nach Waldmeister und etwas bitter schmeckend, getrocknet nach Cumarin riechend.

1. *A. odoratum*, gemeines, echtes Ruchgras (Fig. 54). Triebe teils intra-, teils extravaginal, einen niedrigen Horst bildend. Stengel aufrecht, Knoten kurz, grün. Blattscheiden stark gerippt, meist mit abstehenden Haaren. Blätter gewimpert, oft oberseits behaart, oberstes bewimpertes Blatthäutchen lang, spitz. Halm aufrecht oder gekniet, wenig beblättert. Scheinähren länglich, dicht, spitz, bald gelb werdend. Innere (also 3. und 4.) Hüllspelzen (verkümmerte Blüten) (Fig. 54, c) zur Reifezeit *dunkelbraun*, lang und schwarz behaart, *kaum länger* als die zwischen ihnen sitzende *fruchtbare Blüte* (das Korn), die 3. Hüllspelze mit einer kurzen, geraden, die 2. Hüllspelze nicht überragenden, die 4. mit einer langen, geknieten Granne, die länger als die 2. Hüllspelze. — Protogynisch! (S. 255.)

2. Wälder, Wiesen, auf trockenem, wie nassem Boden. *Sehr früh*, Mai, Juni, 30—50 cm. Nach Bewässerung wächst es üppig. Wert nur mittelmäßig, in *kleinen* Mengen wegen des angenehmen Cumarin-Geruchs, der an Waldmeister erinnert, als Würze des Heues erwünscht; der eigentliche Heugeruch stammt aber nicht vom Ruchgras her, sondern entsteht durch die Gärung (Fermentation), welche alle Gräser etc. während des Trocknungsprozesses durchmachen (Heubacillus). Cumarin-Geruch des Heues verrät immer die Gegenwart von *Anthoxanthum odoratum* oder von *Hierochloa odorata*. — Der Ertrag ist gering.

2. *A. aristatum Puelii*, begranntes oder Puel's Ruchgras. (Nach Timothée Puel, Mitte des 19. Jahrhunderts Arzt in Paris, beschäftigte sich mit der Flora Frankreichs und der Syriens). Wie voriges, aber niedriger, Stengel gekniet, Knoten lang, dick, winkelig, oft rot, Scheinähre *ziemlich locker* und *kürzer*, die 2 unteren Hüllspelzen mit *deutlicher Stachelspitze*, die 2 oberen behaart und etwa doppelt so lang als die fruchtbare Blüte (das Korn); ihre Grannen die unteren Hüllspelzen meist weit überragend.

**Einjährig.** Juni, Juli. Mittelmeergebiet, auf sandigen Äckern im nord-westlichen Deutschland, namentlich im Hannoverschen seit längerer Zeit eingeschleppt und jetzt sich weiter verbreitend. Im Nordwesten viel als Unkraut unter Roggen. *Fast wertlos.* Wird leider vielfach angeboten unter dem unschuldigen Namen „*Anthoxanthum odoratum* (*Puelii*)“ und sollte dann stets *zurückgewiesen* werden. Dient auch zur Verfälschung des echten Ruchgrases. Die Unterscheidung ist schwierig, meist ist der sog. Samen etwas heller braun als der vom echten und etwas kürzer. Leider ist echtes Ruchgras fast gar nicht mehr zu haben; in Norddeutschland ist fast alles *A. aristatum*, das im Lüneburgischen aus dem Roggen ausgesiebt wird und über Hamburg in den Handel kommt.




Fig. 55. *Hierochloa australis*. *a* Rispen-  
ästchen, *b* Ährchen, *c* eine der beiden  
männlichen Blüten, *d* die Zwitterblüte von  
der Seite, *e* dieselbe von innen.

(Nach Garcke.)



Fig. 56. *Alopecurus pra-*  
*tensis*. *a* Hüllspelzen, *b* und  
*c* Ährchen, *d* Deckspelze,  
*e* Blüte.

(Nach Garcke.)

**3. *Hierochloa*** (ἱερός heilig, χλόη oder χλόα junges Gras), Mariengras. Rispe locker, glänzend. Die beiden inneren (bei *Anthoxanthum* unfruchtbaren) Hüllspelzen sind hier zu 2 wirklichen ♂ Blüten mit je 1 Deck- und Vorspelze und mit 3 Staubgefäßen entwickelt (Fig. 55, *c*); die Zwitterblüte hat nur 2 Staubgefäße wie *Anthoxanthum* und steht zwischen den beiden männlichen. Spelzen zur Fruchtzeit erhärtend. Cumarinhaltig.

1. *H. odorata*, wohlriechendes Mariengras, Darrgras. Wurzelstock bis 30 cm lang, *kriechend*. Ährchenstiele kahl, ♂ Blüten mit sehr kurzer, gerader Granne.

4. Trockene und mäßig feuchte Wiesen, sandige See- und Teichränder, lichte Gebüsche, westlich der Elbe weniger häufig, stellenweise. Mai und Juni, 30—60 cm. Wertlos, nur wegen des Wohlgeruchs in kleinen Mengen angenehm.

2. *H. australis*, südliches Mariengras (Fig. 55). *Locker rasenförmig*, ohne oder mit sehr kurzem, kriechendem Wurzelstock. *Ährchenstiele unter dem Ährchen mit einem Haarbüschel*. Oberste ♂ Blüte mit 3 mm langer geknieter Granne. Rispen silberglänzender. Sonst wie vorige.

4. Schattige Wälder, besonders Laubwälder. In Westpreußen häufig.

## § 57.

Gruppe 6. **Agrostaceae**. Ährchen gestielt, in Rispen oder Scheinähren, 1blütig mit zwei Hüllspelzen.

1. *Alopecurus* (ἀλώπηξ Fuchs, οὐρά Schwanz), Fuchsschwanz. *Rispe ährenförmig*, eine Scheinähre oder Rispenähre bildend, *Hüllspelzen groß, meist am Grunde verwachsen*, Deckspelze auf dem Rücken begrannt.

1. *A. pratensis*, Wiesenfuchsschwanz (Fig. 56). Wurzelstock kurz, kriechend, Triebe extravaginal, kurze Ausläufer darstellend, aber gleich aufsteigend und im Laufe der Jahre große Horste bildend, untere Scheiden oft rötlich, *nicht in Fasern aufgelöst*, obere länger als die Blätter, oberste etwas aufgeblasen. Untere Blatthäutchen kurz, dick, obere breit, länglich, abgestutzt. Halm glatt, mit starken Knoten, unten oft gekniet, dann aufrecht. Blätter grasgrün, mäßig breit, etwas rau, mit ca. 7 flachen Hauptnerven (im ganzen 20—30), lineal, allmählich zugespitzt. Scheinähre (ährenförmige Rispe) lang, die kurzen Äste mit 4—10 Ährchen. Ährchen groß, eiförmig, 5 mm lang, mit zwei großen, die Blüte verdeckenden Hüllspelzen. Hüllspelzen breit, lanzettlich, nur bis *unterhalb der Mitte verwachsen*, weiß, mit grünen Nerven, an der Spitze gerade oder zusammengeneigt, am Kiele *lang gewimpert*, daher die ganze Ähre, im Gegensatz zu der ähnlichen des Timotheegrases, weich anzufühlen.

Blüte nur mit 1 Deckblatt, der unteren Spelze, versehen, das Vorblatt fehlt. Deckblatt oberhalb der Basis mit hervortretender Granne, die doppelt so lang als die Hüllspelzen. Narben 2, lang, fadenförmig, weit hervortretend, vor den Staubgefäßen entwickelt (proterogyn), Staubbeutel gelb, dann rotbraun.

4. Fruchtbare Wiesen, Mai und Juni, 60—100 cm. Wohl das *vorzüglichste* aller Gräser, *sehr früh*, sehr ertragreich und der strengsten Kälte wie auch den Spätfrösten widerstehend. Treibt schon im April lange, kräftige Wurzelblätter und blüht Mitte Mai. Bestockt sich nach dem 1. Schnitt wieder sehr schnell, wenn auch nicht immer stark, und könnte auf gutem Boden, wenn es allein stände, 3mal geschnitten werden. Dauert viele Jahre aus, gibt aber im 2. und 3. Jahre die höchsten Erträge. — Liebt nur den besten, feuchten Wiesenboden und gedeiht angesät auch in den Alpen sehr gut, während das Timothee-

gras dort oft erfriert. Stauende Nässe verträgt es nicht, für Bewässerungswiesen ist es aber vorzüglich geeignet. Same früher wenig keimfähig, in neuerer Zeit, wo viel Saat aus Finnland kommt, aber öfter zu 70–80%.

1a. *var. nigricans*. Ausläufer länger, Scheinähren dicker, schwärzlich. Nicht selten.

2. *A. arundinaceus*, rohrartiger Fuchsschwanz. 2. 60–130 cm hoch, graugrün. Wurzelstock lang, kriechend. Hüllspelzen oberwärts auseinander-tretend. Pommern, Salzwiesen an der Ostsee.

3. *A. geniculatus*, geknietter Fuchsschwanz. Halm am Grunde niederliegend, knickig aufsteigend, etwas graugrün, Scheinähre (Rispe) dünner und kürzer als bei *A. pratensis*, Rispenäste 1–2 Ährchen tragend, Ährchen nur 3 mm lang, verkehrt eiförmig, Hüllspelzen *nur am Grunde verwachsen*, ihre Spitzen auseinandertretend, kurzhaarig, Granne unter der Mitte des Deckblattes, lang hervortretend, Staubbeutel hellgelb, verblüht hellbraun. Sehr nasse Wiesen. Geschätztes Untergras für Weiden und Wiesen, Same kaum im Handel.

4. *A. fulvus*, rotgelber Fuchsschwanz. Wie voriger graugrün. Granne in der Mitte, kaum vorragend. Staubbeutel verblüht rotgelb. Wohl nur Abart des vorigen.

5. *A. agréstitis*, Acker-Fuchsschwanz. Rispenähre schmal, an beiden Enden verdünnt. Ährchen zu 1–2, verkehrt eiförmig *oberhalb der Mitte* am breitesten, Hüllspelzen bis zur Mitte verwachsen, kurz gewimpert. Granne doppelt so lang als das Ährchen. ☉. Auf Äckern, besonders in Süddeutschland. — Dient mitunter zur Verfälschung der Wiesenfuchsschwanzsaat. Leicht an den fast kahlen, härteren, mehr keilförmigen, nicht ovalen Ährchen im Samen zu unterscheiden. Die Hauptverunreinigung des Samens von *Alopecurus pratensis* ist aber *Holcus lanatus*, siehe S. 281.

2. *Phleum* (phleos bei Aristophanes Name einer Sumpfpflanze), Lieschgras. Rispe ährenförmig, Hüllspelzen getrennt, aber dicht zusammenstehend, klein, stachelspitz begrannt, einen Stiefelknecht bildend; Deckspelze stumpf, unbegrannt, wie die Vorspelze zart.

1. *Phleum pratense*, Wiesen-Lieschgras, Timotheegrass (Fig. 57). Triebe intravaginal, einen ziemlich dichten Horst bildend. Blattscheiden lang, eng anliegend, die alten unteren sich oft in Fasern auflösend. Blattschäutchen der unteren Blätter kurz abgestutzt, der oberen oft länger, spitz und gezackt, sich oft an der Scheide geöhrt hinabziehend. Scheiden frühzeitig der ganzen Länge nach offen. Blattspreite gelbgrün, mitunter auch dunkelgrün, lang zugespitzt, rückwärts rau, gegen das Licht gesehen mit ca. 7 weißlichen Hauptnerven, im ganzen ca. 15–25 flache Nerven. Halm aufrecht, Knoten kurz, länglich, wenig verdickt, oft gebräunt, Scheinähre zylindrisch, ziemlich stumpf, Ästchen ganz kurz, gedrückt, 2 bis 3 Ährchen tragend. Ährchen klein, 1 blütig, die Blüte von den 2 bis unten getrennten Hüllspelzen ganz verdeckt, Hüllspelzen länglich, quer abgestutzt, in eine stachelspitzige Granne von  $\frac{1}{3}$  der Länge der Hüllspelzen auslaufend, am Kiel steif gewimpert. Deck- und Vorspelze

zart. Staubbeutel purpurn, später gelbbraun. *Same des Handels*: die nackte, kleine, gelblichbraune Frucht, meist noch mit den zarten, silbergrauen Deck- und Vorspelzen bedeckt.

*Spät.* Ende Juni, Juli, 0,50—1 m. Eins der *wichtigsten*, große Massen liefernden Gräser, oft auch auf dem Acker rein oder im Gemenge mit Klee als „Klee gras“ gebaut. Muß spät geschnitten werden, aber noch ehe der Halm hart wird; gibt oft erst im 2. Schnitt den höchsten Ertrag, weil es im



Fig. 57. *Phleum pratense*, Lieschgras (blühende Ähre).



Fig. 58. *Phleum Boehmeri*. *a* ganze Pflanze, verkl., *b* Blatthäutchen, *c* Scheinähre, *d* dieselbe gebogen, um die Äste zu zeigen, *f* Hüllspelze, *g* Deck- und Vorspelze, *h* Frucht, von den Spelzen umgeben.

ersten noch weit zurück ist, so auf Moordammwiesen. Nachwuchs nicht bedeutend. — Die volle Entwicklung erreicht es erst im 2. Jahre und nimmt nach einigen Jahren sehr ab, dauert überhaupt nach Weber auf den meisten Wiesen Norddeutschlands nur 4—6 Jahre aus; bei uns winterhart, in den Alpen aber öfter erfrierend. Auf allen besseren, frischen, humosen Bodenarten. An trockenen Orten verdickt sich der Halm am Grunde zwiebelartig (var. *nodosum*). Für Bewässerung sehr empfänglich, auch für Moordammkulturen ausgezeichnet. Vom *Fuchsschwanz*, der übrigens viel früher blüht, durch die rau anzufühlenden Scheinähren und die viel kleineren, einem *Stiefelknecht ähnlichen Ährchen*

leicht zu unterscheiden. Unterschied von *Phalaris arundinacea* siehe S. 269. Auch sind nach Weber die Blattscheiden der jungen Triebe ganz offen.

2. *Phleum Boehmeri*, Boehmer's Lieschgras (Fig. 58). Graugrün. Laubtriebe kurz. Blatthäutchen kurz, gestutzt. Scheinähre schmal zylindrisch, meist oben oder auch unten verschmälert; zeigt beim *Biegen* die lappigen Äste und beweist dadurch, daß *Phleum* keine Ähren, sondern ährenförmige Rispen besitzt. ♀. Hüllspelzen lanzettlich, plötzlich in die kurze Granne zugespitzt. Sonnige Hügel, Grasraine, zerstreut, fehlt im Nordwesten und in Schleswig-Holstein.



Fig. 59. *Agrostis alba* (stolonifera). a das lange Blatthäutchen, b Ährchen, c Blüte, d Ährchen geschlossen, e Frucht, von Spelzen umgeben.



Fig. 60.  
*Agrostis alba*, blühend.

3. *Agróstitis* (Name eines Futtergrases bei Homer), Straußgras. Ährchen 1 blütig, ohne Ansatz einer 2. Blüte; untere Hüllspelze kleiner, Blüten *klein*, meist unbegrannt. Längsriefen der Blattspreite nach Weber im Querschnitt oben abgerundet (im Gegensatz zu *Alopecurus geniculatus*).

1. *A. alba* (*A. stolonifera*, Fig. 59 und 60), weißliches Straußgras, Fioringras. *Ausläufer* meist *zahlreich*, *sehr lang*, teils unter, teils auf der Erde, an den Knoten sich bewurzelnd und dort *zahlreiche* reich-beblätterte Triebe entwickelnd, sodafs zuletzt ein dichter Filz entsteht.

Halm aufsteigend, *Blatthäutchen lang*, länger als der Spreitengrund, Blattspreite lang, rückwärts rau, Rispe *vor* und *nach* der Blüte *zusammengezogen*, während der Blüte mit spitzwinklig ausgebreiteten rauhen Ästen; weißlich oder rötlich-violett. Deckspelze doppelt so lang als die Vorspelze, klein, unbegrannt. ♀. Spät. Ende Juni, Juli, im Gebirge oft August, Höhe 30—60 cm. Hauptertrag im 2. Schnitt, wegen der massenhaft sich nach dem 1. Schnitt entwickelnden Blätter.

Liebt feuchten, lockeren Boden, erträgt die größte Kälte und kommt daher von der Meeresküste bis hoch in den Alpen vor. Zur Bewässerung sehr geeignet. Bildet nach Weber an der Seeküste und in den Seemarschen, sowie an den Flusniederungen des norddeutschen Flachlandes ausgedehnte Bestände.

2. *A. vulgaris*, gemeines Straußgras. Ausläufer fehlend oder kurz. Halm aufsteigend. *Blatthäutchen sehr kurz*, abgestutzt. Blattspreite tief gerillt, kurz, dunkelgrün, unterseits meist glänzend, Mittelnerv undeutlich, jederseits 7—9 starke Nerven. Rispe vor der Blüte *zusammengezogen*, während der Blüte eiförmig, auch nach der Blüte ausgebreitet oder doch nicht ganz *zusammengezogen*, rotbraun. Äste haarfein, untere bis zu 7 im Quirl. Klappen (Hüllspelzen) beinahe gleich lang.

♀. Sehr spät. Ende Juni bis Juli, oft erst im August. — Auf allen Bodenarten und in allen Lagen, bis hoch in den Alpen. Oft an Waldrändern auf kiesigem oder sandigem Boden, überall auf der Geest in Schleswig-Holstein. *Wert: Untergras.* Rasen dicht, fein. Ertrag nur mäßig, aber im 2. Schnitt besser, für Gebirgswiesen wichtig, bildet in der Schweiz einen besonderen Typus, den Straußgras Typus, der die gedüngten Wiesen der Bergtäler von 800—1700 m (oberhalb des Arrhenatherumtypus) umfaßt.

3. *A. (Apera) spica venti*, Windhalm. Lästiges Unkraut unter Getreide, mit langen Grannen. — 4. *A. canina*. Auf Moorboden, mit borstenförmigen Blättern, violetten Ährchen und ganz kurzen Grannen. Blätter bei beiden in der Knospenlage gefaltet (bei den beiden vorhergehenden gerollt). Grundblätter borstenförmig.

4. *Calamagrostis* (καλαμος Schilf, Rohr, agrostis siehe S. 274), Landrohr. Ährchen 1 blütig, mit oder ohne behaartes Stielchen als Ansatz einer zweiten Blüte, untere Hüllspelze größer, Blütenkelch am Grunde mit *Haaren*, was besonders zur Reifezeit sichtbar. Granne sehr kurz. Große, rohrartige, grobe Gräser, Blüten größer als bei Agrostis.

A. Ansatz zur 2. Blüte fehlend (nur unter der Lupe zu sehen):

1. *C. lanceolata*, lanzettliches Landrohr. Wurzelstock kriechend, Stengel und Scheiden unten glatt, oberwärts etwas rau, *Blatthäutchen lang*, Rispe länglich, schlaff, zur Blütezeit abstehend, violett, Hüllspelzen lanzettlich, *Haare länger als die Spelzen*, Granne *endständig*, gerade, aus einer *sehr kurzen* Ausrandung wenig hervortretend. ♀. Moorige Wiesen, Erlenbrüche. Juli, August. 0,60—1,25 m. Schlechtes Futtergras.



2. *C. epigeios*, Landrohr, Hügelrohr. Wurzelstock kriechend. Pflanze graugrün, Stengel und Scheiden besonders oberwärts rauh, Blätter breit, Blatthäutchen lang. Rispe steif aufrecht, auch *während der Blüte geknäult-lappig*, oft sehr lang, über Winter vertrocknet stehen bleibend, Hüllspelzen lanzettlich, pfriemlich, *Haare länger als die Spelzen*. Granne unter oder aus der Mitte des Rückens hervortretend, gerade. ♀. Sonnige Hügel, sandige Ufer. Juli, August. 1—1,5 m. Befestigt den Sand. Als Futter wertlos.

B. Ährchenachse über die Blüte verlängert, d. h. stielartiger Ansatz zur zweiten Blüte vorhanden, oberwärts pinselförmig behaart.



Fig. 61. *Ammophila arenaria*. a Teil der Scheinnähre, b Ährchen, bei c zerlegt, d Vorspelze, e die 2 Schüppchen, Staubgefäße und Fruchtknoten.

3. *C. neglecta* (*C. stricta*), vernachlässigtes Landrohr. Stengel unter der Rispe rauh. Scheiden glatt. B unterseits grasgrün, glänzend. Rispe schmal, steif, vor und nach der Blüte sehr dicht, zur Blütezeit abstehend. Haare kürzer oder fast so lang als die Spelzen, Granne unterhalb der Mitte des Rückens entspringend, gerade.

♀. Feuchte, moorige Wiesen, Torfstümpfe, zerstreut, aber sehr gesellig. Juni, Juli. 0,60—1 m. — Es gibt noch mehrere Arten, die sich schwer unterscheiden lassen.

5. *Ammophila* (ἄμμος Sand, φίλος Freund), Sandgras, Helm. Untere Hüllspelze kleiner, stielförmiger Ansatz zur 2. Blüte an der Spitze pinselartig behaart. Sonst wie *Calamagrostis*, aber Ährchen viel größer.

*A. arenaria* (*A. arundinacea*, *Psamma arenaria*) (Fig. 61), Sand-Helm, Strandhafer, Strandroggen. Wurzelstock

weithin kriechend, Blätter eingerollt, weißlich-graugrün, Rispe *ährenförmig, walzlich*. Hüllblätter lanzettlich, spitz, Haare 3mal kürzer als die kurzstachelspitzigen Spelzen. ♀. An der Küste der Nord- und Ostsee und auf Flugsand im Binnenlande. Juli, August. 1 m. Wichtigste Pflanze zum Befestigen der Dünen und daher viel dort angepflanzt. „Durchdringt den Sand mit einem dichten Netz von Rhizomzweigen, das dem stärksten Wogenandrang widersteht.“ (Hackel.)

## § 58.

Gruppe 7. **Avéneae**. Ährchen gestielt, meist *mehrblütig*. Hüllspelzen 2, *groß*, ganz oder fast ganz die Blüten, wenigstens die unterste, verdeckend. Narben federig, aus dem Grunde der Blüte hervortretend.

1. *Avéna* (Name des Hafers bei Varro), Hafer. Ährchen 2- bis vielblütig, alle zwittrig. Deckspelze an der Spitze 2spaltig oder 2zählig, auf dem Rücken mit einer geknieten, gedrehten Granne. Frucht außer bei *A. flavescens* gefurcht.

A. Ährchen, wenigstens nach der Blüte, hängend; Hüllspelzen 5- bis 11nervig.

1. *Avena sativa*, gemeiner Hafer. Rispe gleichmäßig ausgebreitet. Ährchen 1- bis 3-, meist 2blütig. Hüllspelzen länger als die Blüten, sehr groß, 7—11nervig; Ährchenachse nur unter der unteren Blüte behaart. Deckspelzen kahl, an der Spitze 2spaltig und gezähnt, grannenlos oder die untere mit gekniet, hervorragender Granne, weißlich, gelb oder braun. ☉. Juli, August.

2. *A. orientalis*, türkischer Hafer. Rispe einseitwendig, sonst wie voriger, von dem er nur eine Abart ist. Gebaut. ☉.

3. *A. brevis*, kurzer Hafer, Kurzhafer. Rispe oft einseitwendig. Ährchen klein, meist 2blütig. Obere Hüllspelze 7nervig. Deckspelze länglich, bisweilen mit 2 kurzen Grannenspitzen, graulich bis schwarzgrau. Achse unter der oberen Blüte stärker büschelig behaart. Unter anderem Hafer, selten.

4. *A. strigosa*, Rauh- oder Sand-Hafer. Rispe oft einseitwendig, überwärts traubenförmig. Obere Hüllspelze 7—9nervig. Deckspelze an beiden Blüten begrannt, mit gekniet Granne, an der Spitze 2spaltig, mit 2 deutlichen Grannenspitzen, zuletzt graulich bis schwarzgrau, selten weiß, sonst wie *sativa*. Gebaut oder unter anderem Hafer, ziemlich selten.

5. *A. nuda*, nackter Hafer. Rispe groß. Ährchenachse verlängert, dünn. Ährchen 3—6blütig, klein. Korn aus den Spelzen herausfallend. Selten gebaut.

6. *A. fatua*, Flug- oder Windhafer. Rispe groß, ausgebreitet. Ährchen meist 3blütig. Obere Hüllspelze 9nervig. Deckspelze lanzettlich, an der Spitze gezähnt, 2spaltig, auf dem Rücken mit starker, gekniet Granne, braun, vom Grunde bis zur Mitte borstig behaart. Ährchenachse rauhaarig. ☉. Unkraut unter Getreide, besonders Hafer. Vielleicht Stammpflanze unseres Hafers, aber die von den Spelzen umgebene Frucht leicht herausfallend.

B. Ährchen aufrecht, Hüllspelzen 1—3nervig. (Wiesenpflanzen.)

7. *A. pubescens*, weichhaariger Hafer. Horst locker, mälsig groß, mit zahlreichen Halmen und bogig aufsteigenden Ausläufern. Blätter flach, die unteren nebst den unteren Scheiden zottig. Rispe etwas zusammengesogen, fast traubig, kürzere Äste mit 1, längere mit 2 Ährchen, untere zu 5; Ährchen 2—3blütig. Ährchenachse unter jeder Blüte behaart. Deckspelze nach der Spitze silberig, trockenhäutig. Granne braun oder hübsch purpurrot.

4. Früh, Mai, Juni. 0,30—1 m. Auf nicht zu feuchten Wiesen, am liebsten auf Mergel und humosem Lehm, auch auf Moor mit Kalkunterlage. Erträgt Bewässerung gut und gibt dann auch Obergras, während er sonst mehr als

Untergras anzusehen ist. *Wert*: 2. Güte, auf trockenem Boden hart und wenig ertragreich.

8. *A. pratensis*, Wiesen-Hafer. Horst klein, dicht. Graugrün, Blätter schmal zusammengefaltete, *knorpelig berandet*, lang, steif, *oberseits sehr rauh, nebst den Blattscheiden kahl*, Rispe *zusammengesogen, traubig*, untere Äste zu 2, *obere einzeln*, alle ein einzelnes (seltener 2) Ährchen tragend. Ährchen 4- bis 5blütig. ♀. Juni, Juli. 0,30—0,60 m. Wert gering. Untergras. Seltener als *A. pubescens*. Sonnige Hügel, trockene Wälder, seltener auf trockenen Wiesen, sehr zerstreut, doch sehr gesellig. Selten in der Nähe der Ostseeküste und überhaupt im Nordosten. Hat nach Aschersons briefl. Mitteilungen ganz ähnliche Standorte wie die Küchenschelle, *Pulsatilla pratensis* (Ranunculaceae), für die auch der Name *pratensis* (Wiesen) nicht paßt.

2. *Trisetum*, Dreiborste. Deckspelze 2spitzig, auf dem Rücken mit geknietter Granne. Fruchtknoten kahl, Frucht nicht gefurcht, frei. Sonst wie *Avena*.

*T. flavescens*, Goldhafer (*Avena flavescens*, Fig. 62 und 63). Besonders der ungefurchten Frucht wegen als eigene Gattung *Trisetum* von *Avena*, die gefurchte Früchte hat, abgetrennt. — Horst ziemlich locker, nicht ganz eben. Seitentriebe zwar intravaginal, aber früh die Scheide durchbrechend. Halm 40—60 cm hoch, mitunter an den Knoten rückwärts behaart. Untere Scheiden alle *zottig*, Haare herabgebogen, seltener kahl, Blatthäutchen kurz, Spreite vielnervig, mit 20 bis 25 Nerven, davon im durchfallenden Licht 5 als weiße Streifen sichtbar, oberseits *zottig* behaart. Rispe schmal eiförmig, ca. 13 cm lang, Äste unten zu 5—7, fein, selbst zur Blütezeit nicht ganz horizontal abstehend, längere Äste 5—6 Ährchen tragend. Ährchen klein, zur Blütezeit bläulichgrün und gelblich gescheckt, später glänzend gold- oder lehmgelb, meist 3—4blütig. Untere Hüllspelze 1nervig, kürzer, obere 3nervig, fast so lang als die 1. Blüte. Deckspelze 5nervig, an der Basis (an der Achse) mit einem Haarbüschel, mit 2 kurzen, grannenförmigen Spitzen und *auf dem Rücken* mit einer langen, geknietten Granne. Daher *Trisetum flavescens*, gelbliche Dreiborste, genannt. Alle Spelzen mit weißem Hautrande. Ährchenachse behaart. Schüppchen schmal, abgestutzt oder gezähnt, fast so lang wie der eiförmige, kahle Fruchtknoten. Staubbeutel hellgelb, Narben federig, weiß. Blüte mittelfrüh, protandrisch. ♀. Juni, Juli.

Same des Handels: Die einzelnen *Blütchen*, selten die nackte, *ungefurchte* Frucht. Von *Aira flexuosa*, die sehr oft als Verfälschung dient, durch die *rückenständige* Granne (nicht grundständige) unterscheidbar. (S. S. 281.)

*Standort*: Liebt frischen Mergel- und Kalkboden, kalkhaltigen Lehm, warmen, fruchtbaren Sand und entwässerten Humus. Vom Meere bis hoch in den Alpen, auf Bergwiesen aber häufiger. Für Dünger sehr empfänglich, ebenso für Bewässerung; stauende Nässe erträgt er nicht. An manchen Stellen Nord-

deutschlands nach Weber wahrscheinlich durch Ansaat oder Verschleppung angesiedelt. — *Wert*: Vortreffliches Untergras, wächst gut nach und gibt in beiden Schnitten ein vorzügliches, feines Futter, wenn auch nicht in großen Quantitäten. Leider ist der Same selten echt zu haben und sehr teuer. Er sollte aber nach Stebler möglichst in jeder Mischung für Dauerwiesen vorhanden sein, wenigstens zu 2—3<sup>o</sup>/<sub>o</sub>.

**3. *Arrhenatherum* (ἄρρην männlich, ἀθήρ Granne), Wiesenhafer.**

Ährchen 2blütig; Hüllspelzen kürzer als die Blüten, untere Blüte männlich, auf dem Rücken mit langer, geknieter Granne, obere zwittrig, unter der Spitze mit kurzer, gerader Granne, öfter jedoch grannenlos. Sonst wie *Avena*.



Fig. 62. *Trisetum flavescens*. a, c Ährchen, b Ährchenachse, d Frucht mit der begrannten Deckspele. (Nach Garcke.)



Fig. 63.  
*Trisetum flavescens*, blühend.

*A. elatius* (*Avena elatior*), hoher Wiesenhafer, Glatthafer, französisches Raigras, in der Schweiz *Fromental* (Fig. 64). Horst groß, locker, kürzere Ausläufer mit vielen, langen Wurzelblättern.

Halm sehr hoch, glatt und glänzend. Scheiden öfter etwas rauh. Blätter stets etwas rauh. Spreite nahe dem Grunde mit kräftig vorspringendem 3kantigem Kiel, im Gegensatz zu *Bromus mollis* und *racemosus*. Rispe zur Blütezeit ausgebreitet, silberig schimmernd, vor- und nachher sehr zusammengezogen. Ährchen mittelgroß, untere Hüllspelze halb so lang als die obere. ♀. Juni, Juli. 0,60—1,15 m.

Liebt sehr fruchtbaren, trockenen, warmen, humusreichen Kalk oder mergeligen Lehm, sowie frischen, lehmigen Sand und ist mit Recht in der Schweiz als *Typus* der gras- und kleereichen, etwas trockeneren Wiesen mit mildem, humosem Lehm Boden hingestellt, kann auch bei uns als solcher gelten. — Geht in der Schweiz nach Stebler selten über 900 m, gedeiht also hauptsächlich in den fetten Talwiesen, bildet dort den erwähnten Typus und macht 20 bis 50% des Bestandes aus. Nach oben schließt sich an ihn der *Agrostis vulgaris*-Typus. Gegen rauhes Klima und rauhe Lagen ist das französische Raigras empfindlich, gedeiht aber auf besandeten Moordämmen gut, zumal es Kali und Phosphorsäure nebst Kalk liebt. — Blüht ziemlich früh, Ende Mai, Anfang Juni, gibt auch



Fig. 64. *Arrhenatherum elatius*.  
a Blühendes Ährchen, b Frucht.  
(Nach Garcke.)



Fig. 65. *Aira caespitosa*.  
a Halm, b Ährchen, c Blütchen, d Staub-  
gefäße und Fruchtknoten, e Frucht.  
(Nach Garcke.)

guten Nachwuchs, der oft noch wieder in Blüte schießt. Gibt schon im 1. Jahre bedeutenden Ertrag, oft 3—4 Schnitte, im zweiten Jahr ist der Ertrag am höchsten, mit dem 3. nimmt er ab. Bewässerung: für Berieselung geeignet, stauende Nässe erträgt es nicht. Sehr gutes *Obergras*; wenn nicht zu spät geschnitten, treffliches, reichliches Futter; *allein* gebaut soll das Futter bitter sein.

4. *Aira* [sprich: Eira], (auch Aera, Name eines Unkrautes bei Theophrastos), Schmele oder Schmiele. Ährchen 2blütig, Deckspelze abgestutzt, 4zählig, an der Basis des Rückens begrannt. B im Triebe gefaltet.

1. *A. caespitosa* (Deschampsia c.), Rasen-S. (Fig. 65). Horst groß, polsterförmig. Blätter flach, fast alles Wurzelblätter, sehr lang, bis 30 cm und mehr, oberseits mit *sehr starken Nerven* und rückwärts *sehr rauh*, gegen das Licht gehalten mit etwa 6 weißen Streifen. Blatthäutchen lang, spitz.

Halm sehr hoch. *Rispe sehr grofs*, weitschweifig, breit pyramidenförmig. Äste etwas geschlängelt, sehr lang, untere zu 5—7. Ährchen klein, silberig glänzend oder gescheckt. Hüllspelzen so lang wie das Ährchen. Blüten an der Basis behaart. Deckspelze an der Spitze abgestutzt, 4zählig. Granne *an der Basis* befestigt, borstenförmig, nicht hervortretend.

4. Auf schlechten, moorigen Wiesen, an Gräben. Juni, Juli. Bis 1,25 m. Grobes, hartes Gras, das aber doch, wie Verf. sich überzeugete, auch bei uns so gut wie in der Schweiz jung vom Weidevieh gefressen wird. Trotzdem ist es, wie Weber mit Recht sagt, wegen seines stark „bültigen“ Wuchses als Unkraut anzusehen.

2. *A. flexuosa*, geschlängelte Schmele, Drahtschmele. Horst dicht, Triebe intravaginal, nur feine, borstenförmige Wurzelblätter entwickelnd, viele Jahre dauernd, von unten her allmählich absterbend. Halm aufrecht, dünn. Rispe ausgebreitet. Äste und Zweige meist geschlängelt, oft rötlich. Ährchen *grofs*, 2blütig, hellbräunlich, silberig-trockenhäutig. Hüllspelzen ungleich, die untere etwas kürzer. Deckspelze bräunlich-gelb, an der Basis fein weißlich behaart und *eben über der Basis* mit einer *geknieten*, hervortretenden Granne.

4. Trockene Waldränder, besonders in Nadelwäldungen und Schonungen massenhaft, den Typus der *Aira flexuosa* bildend. 40—60 cm. Als Futter wertlos. Der Same dient als Verfälschung des Goldhafers, bei welchem die Granne aber in der Mitte befestigt ist.

5. *Weingaertnéria* (nach Konrektor Weingärtner, welcher zu Anfang des 19. Jahrh. bei Erfurt botanisirte), Silbergras. Deckspelze nicht gezähnt. Granne kurz, oberwärts *keulenförmig*, in der Mitte mit einem behaarten Knoten, sonst wie *Aira*. *W. canescens* (*Aira canescens*, *Corynéphorus* [d. h. keuletragend] *canescens*) (Fig. 66), graues Silbergras, Bocksbart, Schindermann. Dicht rasenförmig, Horst aber nur lose verbunden, graugrün. Blätter zusammengefaltet, borstlich. Scheiden unterwärts rosa, oft purpurn. Rispe nur zur Blütezeit spreizend. Staubbeutel dunkelbraun. 1,5—3 dm. Juni, Juli. 4. Auf dem traurigsten Sandboden.

6. *Holcus* (Name eines Grases bei Plinius), Honiggras. Ährchen als *Ganzes* abfallend, 2blütig, obere Blüte männlich. Hüllspelzen gekielt, flach, länger als die Blüten.

1. *H. lanátus*, wolliges Honiggras (Fig. 67). Horst dicht, polsterförmig, graugrün, Halm aufrecht, am Grunde gekniet, an und unter den Knoten nebst den Blattscheiden behaart. Rispe nur zur Blütezeit ausgebreitet, rötlich oder violett überlaufen. Blätter weichhaarig, im durchfallenden Licht mit 6—10 weissen Streifen. Blatthäutchen mässig lang. Hüllspelzen ziemlich grofs, weißlich, oft hellpurpurn überlaufen. Die obere männliche Blüte mit kurzer, *eingeschlossener* oder wenig hervortretender, *zuletzt hakenförmig einwärts gebogener Granne*.

4. Treibt früh und erfriert leicht, blüht Anfang Juni, zuweilen schon Mitte Mai, und zur Zeit der Heuernte fallen die reifen Ährchen leicht ab, daher Hauptbestandteil der sog. „Heublumen“ (Samen), nach Stebler mitunter bis 50 %. Auf allen Bodenarten, liebt besonders feuchtes Klima und verliert hier auch etwas von der starken Behaarung, die es dem Vieh unangenehm macht. Von geringem Wert und schwer zu mähen wegen der polsterförmigen Horste, doch reich im Ertrage. Nur auf armem Boden, sowie auf Moor, wo bessere Gräser nicht gut gedeihen, zu empfehlen. Wird vom Weidevieh in den Marschen nach Weber meist gemieden (Arb. d. D. L.-G., Heft 61, S. 87).



Fig. 66. *Weingaertneria canescens*.  
a vor, b zur Blütezeit; c Ährchen;  
d Deck- und Vorspelze, erstere mit  
der Keulengranne e am Grunde;  
f Staubgefäße und Fruchtknoten.



Fig. 67. *Holcus lanatus*.  
a Ährchen, bei b dessen Hüllspelzen  
abgetrennt, darüber die 2 Blütchen.  
c Staubgefäße und Fruchtknoten.  
(Nach Garcke.)

2. *H. mollis*, weiches Honiggras. Lange, fast queckenartige *Ausläufer* treibend, schlanker als voriges. Halm unten stark gekniet, oft liegend, dann aufrecht, hoch. Nur die Knoten, besonders die unteren, mit rückwärts gerichteten, abstehenden Haaren. Obere Blätter und Blattscheiden *kahl*. Untere Blattscheiden kurz, obere länger; Blattspreite mit ca. 7 Hauptnerven, meist kurz. Rispe vor und nach der Blüte zusammengezogen. Hüllspelzen, an der Basis oft violett, untere mit 1, obere mit 3 starken Nerven. Blüten 2, wie bei *H. lanatus* die obere verkümmert (nicht immer rein männlich, wie gewöhnlich angegeben, sondern öfter auch rein weiblich), unten an der Basis der Spelzen behaart, unter der Spitze mit einer *hervortretenden*, später *gekniet* Granne. 4. Juli, August. 50–100 cm. In Wäldern und an Feldrändern, oft auch auf moorigem Boden. Wertlos, höchstens zur Befestigung von Sand und Moor. Geht hoch ins Gebirge.

**7. *Steglingia*.** Ährchen 3- bis 5blütig, oberste Blüte verkümmert. Hüllspelzen > Blüten. Deckspelze an der Spitze 3zählig (daher auch *Triodia* genannt), Ährchenachse zerbrechlich. *S. decumbens*, liegende Sieglingie (Fig. 68). Stengel anfangs im Kreise niederliegend, später aufrecht. Blätter und Scheiden gewimpert. Rispe traubig. Innere Spelze am Grunde mit 2 großen Schwielen. ♀. Moorige, trockene Wiesen, zerstreut, aber gesellig. Juni, Juli. 1,5—3 dm.

Gruppe 8. **Chlorideae**, enthält keine wichtigen einheimischen Wiesengräser. Hierher gehören: *Cynodon Dactylon*, fast kosmopolitisch, in Nordamerika Weidegras; *Bouteloua* und *Buchloe*, Präriengräser dasselbst; *Eleusine Coracana*, in Ostindien und Afrika wichtiges Getreide (z. B. zur Bierbereitung).

## § 59.

Gruppe 9. **Festuceae**. Ährchen gestielt, Hüllspelzen kürzer als die nächste Deckspelze, sonst wie Gruppe 7.

**1. *Phragmites***, Schilfrohr, Dachrohr. Ährchen 3—7blütig, unterste Blüte männlich oder geschlechtslos, unbehaart, die übrigen zwittrig, mit langen, von der Achse entspringenden Haaren. Deckspelze lang zugespitzt, unbegrannt, auf dem Rücken zusammengedrückt.

Narben sprengwedelförmig. *Ph. communis*, gemeines S. Das größte unserer Gräser. 1—3, selten bis 9 m hoch. Grundachse verzweigt, oft Ausläufer treibend, mitunter die Laubstengel bis 10 m lang kriechend. Blätter breit, am Rande messerartig scharf. Rispe dunkelbraun, violett überlaufen. ♀. Am Wasser. Jung gemäht ein mäßiges Futter. Samen selten keimfähig, in Lehm einzukneten und zu versenken. Besser gelingt die Anpflanzung durch Einsetzen von Wurzeln, Büten oder Stecklingen etc. (Illustr. Landw. Zeitg. 1902, No. 35, Deutsche Landw. Presse 1902, No 40).




Fig. 68. *Sieglingia decumbens*. a Pflanze; b Blattscheide; c Ährchen; d Frucht; e Grundriss der Blüte: pi äußere Spelze, ps innere Spelze mit den 2 Schwielen, letztere oben stärker vergrößert.



**2. *Mélica*, Perlgras.** Die untersten 2 Blüten oder nur 1 fruchtbar, die folgenden sterilen zu einem knorpeligen Köpfchen vereinigt. *M. nutans*, nickendes Perlgras. Grundachse weit kriechend. Ährchen in einseitwendiger Traube, hängend, braun, trockenhäutig. ♀. Laubwälder, zerstreut. Juni, Juli. *M. uniflora*, einblütiges Perlgras. Rispe schlaff, einseitwendig. Ährchen nicht trockenhäutig, nur mit 1 fruchtbaren Blüte. ♀. Schattige Laubwälder, besonders unter Buchen. Mai, Juni. *M. ciliata*, gewimpertes Perlgras. Rispe dicht ährenförmig. Deckspelze lang zottig gewimpert (Fig. 69). ♀. Zerstreut auf steinigten Hügeln in Mittel- und Süddeutschland.



Fig. 69. 1 *Melica ciliata*. 2 *M. nutans*.  
1a Rispe, 1b Ährchen, 1c reifes Ährchen,  
1d Staubgefäße, 1e Fruchtknoten und Narben.  
1f Frucht. 2a Ährchen, 2b dessen knorpeliges Köpfchen.



Fig. 70. *Koeleria cristata*.  
a Scheinähre vor, b während der Blüte; c Ährchen.

**3. *Koeleria*** (nach Koeler, Professor in Mainz, 1802). Deckspelze zusammengedrückt gekielt. Rispe ährenförmig. *K. cristata*, kammförmige Koelerie (Fig. 70). Grasgrün. Alle Blätter und Scheiden oder nur die unteren gewimpert. Ährchen glänzend, gelblich-weiß. Deckspelze zugespitzt. ♀. Trockene Wiesen. Juni, Juli. *K. glauca*, graugrüne Koelerie. Pflanze bläulich-grün. Blatt starr, schmalrinnig. Deckspelze stumpf. Dürre Sandfelder. In der Tracht ähnlich wie *Weingartneria canescens*, S. 281.

**4. *Sesleria*** (nach Leonardo Seslero, Arzt in Venedig, Zeitgenosse Linnés; schrieb über die Naturgeschichte des adriatischen Meeres. Carl

v. Linné lebte von 1707—1778). Rispe ährenförmig, ihre Zweige meist 2zeilig. Ährchen meist 2blütig. Hüllspelze so lang als die 1. Deckspelze (also a. d. Grenze zwischen Aveneae und Festuceae). Blätter starr, in der Knospenlage gefaltet. *S. coerülea*, blaue Seslerie, Gilzgras. Blätter plötzlich zugespitzt. Ährchen gelblich-weiß, blau überlaufen. Grundachse meist kriechend, durch die Verzweigungen einen dichten Rasen bildend. 4. Sonnige *Kalkhügel*, Mittel- und Süddeutschland.

5. *Briza* (gr. Name einer Getreideart bei Galenos, wahrscheinlich Roggen), Zittergras. Ährchen 3- bis vielblütig, herzförmig rundlich, von der Seite zusammengedrückt. Hüll- und Deckspelzen gewölbt, muschelförmig, letztere am Grunde herzförmig ausgeschnitten.

*B. media*, mittleres Zittergras. Halm aufrecht. Blätter schmal, Blatthäutchen kurz, gestutzt. Rispe aufrecht, zierlich, violett und weißlich gescheckt. Gutes, feines Untergras. Auf allen Bodenarten, auch Moor, am ertragreichsten auf feuchten Wiesen. Same leider meist nicht im Handel. 4. Mai, Juli.

6. *Poa* (πόα Gras oder Kraut), Rispengras. Ährchen 2- bis vielblütig, eiförmig, klein, platt. Deckspelze seitlich zusammengedrückt, auf dem Rücken *gekielt*. Die Blüten, bzw. die sog. Samen können daher nicht auf dem Rücken liegen. Äste wie bei *Festuca* 3seitig, meist nur auf 2 Seiten Zweige tragend. Deckspelzen unterwärts meist mit Zotten, welche den Zwischenraum zwischen den Blüten ausfüllen. Vorspelze 2spaltig. Blätter im Triebe *gefaltet*. *Blattscheiden* offen, aber an den *Trieben geschlossen*.

### I. Einjährig.

1. *P. annua*, einjähriges Rispengras. Blatthäutchen an jungen Trieben groß (1 mm), Spreite kurz, breit, plötzlich in eine breite, kappenförmige Spitze zusammengezogen, unterseits meist glanzlos. Rispe meist mit 1 grundständigen Ast. Untere Hüllspelze viel kürzer. Dichte Einzelrasen, zuweilen mit kurzen Ausläufern. In Gärten und auf Straßsen, auf kahlen Stellen der Wiesen. Bis jetzt nicht benutzt, könnte aber, da es vom ersten Frühjahr bis zum spätesten Herbst blüht und außerordentlich widerstandsfähig gegen Kälte ist, vielleicht in Kultur genommen werden, zumal es nach Weber in den westdeutschen Marschen auch mehrjährig ist.

### II. Ausdauernd. a) Untere Rispenäste zu 1—2.

2. *P. bulbosa*, zwiebeliges Rispengras. Stengel und Laubtriebe am Grunde von harten, umhüllenden Scheiden zwiebelig verdickt. Unter Bäumen. Bei der var. *vivipara*, die viel häufiger ist als die Stammart, wachsen die Ährchen in blättertragende Pflänzchen aus. Trockene Wälder, Parkanlagen, Triften.

- b) Untere Rispenäste meist 4, selten weniger, Deckspelzen mit *schwachen* Nerven.

3. *P. nemoralis*, Hain-Rispengras. *Blattscheiden kürzer als die Halmglieder*, die oberste kürzer als ihr Blatt. Halmknoten entblößt. *Blatthäutchen sehr kurz*, fast fehlend. Rispenäste rauh. Ährchen klein, 2—5 blütig. ♀. Wälder, Gebüsche, besonders auf trockenem Boden. Juni, Juli. 3—10 dm.

Für Wiesen nicht in Betracht kommend, aber als eines der wenigen feinen Gräser, welche *Beschattung ertragen*; für *Parkanlagen*, Obstgärten etc. höchst wichtiges *Untergras*.

4. *P. serotina* (*P. palustris*), spätes oder *Sumpf-Rispengras*. Horst hoch, mit zahlreichen, an den Knoten oft wurzelnden Halmen. Spreite schlaff, unterseits meist glanzlos. *Blatthäutchen länglich*, spitz. Deckspelzen meist ohne Zotten. Sonst wie *P. nemoralis*. ♀. Juli. 3—6 dm.

Treibt *sehr spät*, blüht erst Ende Juli, gibt aber guten und reichlichen Nachwuchs. *Standort*: Feuchte, fruchtbare Wiesen, auch auf Moorboden zerstreut und für Moorziesen sehr geeignet. Leider ist der Same noch wenig im Handel zu haben, doch erhält man ihn jetzt von Dänemark aus in größerer Menge. *Bewässerung* erträgt es sehr gut, auch stauende Nässe. *Wert*: Gras erster Güte, besonders im zweiten Schnitt ertragreich. *Untergras*.

5. *P. compressa*, zusammengedrücktes Rispengras. Stengel zweischneidig zusammengedrückt, knickig, graugrün, lange Ausläufer treibend. Blätter schmal. *Blatthäutchen kurz*, gestutzt. Rispe schmal-länglich. Rispenäste rauh, die unteren zu 1—4. Ährchen 5—8 blütig. Sonnige Hügel, besonders auf Lehm und Kalk, gern auf Mauern. Der Same kommt öfter aus Nordamerika als oder unter *P. pratensis*. Unterscheidet sich von dieser besonders durch die *schwachen* Nerven der *stumpfen*, oben am Rande weiß-trockenhäutigen Deckspelze.

- c) Untere Rispenäste zu 3—5, Deckspelzen mit 5 *starken* Nerven, kahl oder unterwärts auf dem Rücken mit zottigen Haaren besetzt.

6. *P. trivialis*, gemeines Rispengras. Horst locker, ausgebreitet. Triebe extravaginal, teils aufsteigend, teils *über* dem Boden hinkriechend und dann an den Knoten einen neuen Laubtrieb erzeugend. *Halm gekniet* aufsteigend, rückwärts *rauh*. *Blattscheiden rauh*. *Blatthäutchen*, besonders an den Halmblättern, *lang und spitz*. Blattspreite mit 5 Hauptnerven, unterseits glänzend, nach oben allmählich verschmälert, mit kleiner, kappenförmiger Spitze. Rispe eiförmig, blafsgrün. Ährchen 3—4 blütig. Deckspelzen am Grunde mit verbindenden Zotten. ♀. Juni, Juli. 3—10 dm.

Auf feuchten, fruchtbaren Wiesen überall, bildet auf feuchtem Boden oft typische Bestände, zumal in den Küstenlandschaften (Weber). Für *Bewässerung* sehr geeignet, besonders als *Untergras*, den Boden dicht bedeckend, aber im

Gebirge (nach Schröter) oft mit seinen Ausläufern einen lästigen Filz bildend. Nach Stebler ist es wenig ergiebig und verdient keinen Ruhm. Der Nachwuchs im 2. Schnitt ist nach Weber *äußerst* gering. Gedeiht auch unter Bäumen und ist für schattige Rasenflächen von Frankreich aus empfohlen.

7. *P. pratensis*, Wiesen-Rispengras (Fig. 71). Horst locker, weit ausgebreitet, eben, mit zahlreichen *unterirdischen Ausläufern*, außerdem mit intravaginalen, sich sofort nach oben wendenden Trieben, welche mit ihren Mutterhalmen Teilhorste bilden. Halm aufrecht, *glatt*. Laubtriebe 2schneidig. Blattscheiden *glatt*, auf der vorderen, dem Mittelnerv gegenüber liegenden Seite mit tiefer Einfaltung. *Blatthäutchen* kurz, gestutzt. Blattspreite mit 7 Hauptnerven, unterseits glänzend, nach oben wenig verschmälert, mit breiter, kappenförmiger Spitze. Rispe pyramidal, blaugrün oder violett überlaufen. Ährchen 3—5 blütig. Deckspelzen am Grunde und auf dem Rücken mit verbindenden Zotten. Kommt mit breiten und schmalen Blättern vor, letztere in der Nachmahd oft  $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$  m lang. ♀. Juni, Juli.

Auf fast allen Bodenarten, liebt aber etwas trockeneren Stand als *P. trivialis*, gedeiht trotzdem ausgezeichnet auf Riesewiesen, dort oft Obergras, auf Moorbiesen treffliches Untergras. Eins der vorzüglichsten, lange Jahre bleibenden Gräser, das im Ertrag mit den Jahren sehr zunimmt. Bildet nach Weber auf mäsig feuchtem Boden, zumal im Küstenklima, oft einen besonderen Bestandtypus.

8. Die größte *Poa* ist das *Tussock-* oder *Tussack-Gras* von den Falklandsinseln, Feuerlands- und den Kerguelen-Inseln, *P. flabellata*, bildet bis 2 m hohe, riesige Rasen mit fächerförmig gestellten Blättern. Nur für sehr feuchtes Sommerklima.

7. *Glyceria* (*γλυκερός* süß, wegen der wohlschmeckenden Samen von *G. fl. u. plic.*), Schwaden. *Blattscheiden geschlossen, Blätter gefaltet*, Ährchen 4—11 blütig. Deckspelze länglich, *gewölbt, stumpf*, 5—7 nervig, unbegrannt. Hüllspelzen 1 nervig.

1. *G. aquatica* (*G. spectabilis*, *Poa aquatica*), Wasser-Schwaden, echtes Miellitz. Hellgrün. In der Blüte vom Aussehen eines riesigen Rispengrases, aber mit hohem, steif aufrechtem, *plattem*, schilfartigem Halm. Wurzelstock weit kriechend. Blätter breit, gegen das Licht gehalten wie



Fig. 71. *Poa pratensis*.

a Ährchen, bei b nach Beseitigung der Hüllspelzen, c Blütchen, d Fruchtknoten.

(Nach Garcke.)

die Blattscheiden mit vielen Queradern. *Blatthäutchen breit, mit spitzem, grannenartigem Zahn. Rispe gleichmäÙig ausgebreitet, weitschweifig, sehr ästig. Ährchen klein*, wie bei *Poa*, 5—9 blütig. Deckspelze stumpf, mit 7 hervortretenden Nerven (nicht 5, wie bei vielen *Poa*-Arten). ♀. Am Rande von Gewässern und im Wasser. Juli und August.

Nach dem Schilfrohr das *größte deutsche Gras*, 1,25—2 m hoch. Besonders in den Gräben der Marschen häufig, aber auch an den Flusniederungen stets in großen Beständen. Im Havel-, Spree-, Warthe- und Oderheu sehr häufig und als „echtes Mielitzgras“ von den Heuhändlern sehr geschätzt vielleicht überschätzt. Jung geschnitten ein vorzügliches Futter für Rindvieh und Pferde. Wird jetzt mitunter auf besandeten Moorwiesen angebaut. („Havelmielitz“ s. S. 267.) Öfter sind die Blätter in langen schwarzen Streifen mit einem Brandpilz, *Ustilago longissima*, besetzt.



Fig. 72. *Glyceria fluitans*.  
a Ährchen, b Blütchen.  
(Nach Garcke.)

2. *G. fluitans*, flutendes Süßgras, Schwaden- oder Mannagras (Fig. 72). Wurzelstock kriechend, Ausläufer treibend. Halm aufsteigend, unterwärts platt, Knoten kurz, wenig hervortretend. *Blattscheiden* sehr lang, oft über den nächsten Knoten hinaufragend. *Blatthäutchen* *derb, sehr lang, zerschlitzt*, obere spitz. *Blattspreite* kurz zugespitzt, besonders unterseits gegen die Spitze rauh. *Rispe traubenförmig*, lang und schmal. Äste vor und nach der Blüte an die Hauptachse angedrückt, zur Blütezeit *einseitswendig* rechtwinkelig abstehend, untere meist zu 2, obere sehr kurz. *Ährchen sehr lang*, lineal, 7- bis 11 blütig, hellgrün. Hüllspelzen ungleich,

untere sehr kurz, beide stumpf. Blüten länglich. Deckspelze länglich, 7nervig, an der Spitze weißlich, unbegrannt. Vorspelze bleich, mit 2 grünen Nerven. Staubbeutel violett. Frucht nackt, schwarzbraun.

♀. An Gräben, Flüssen. Juni, September. Ein vorzügliches Gras auf nassen Wiesen, neuerdings daher für Moorwiesen empfohlen. Liefert die sogen. *Schwadengrütze* oder *Mannagrütze*, *Frankfurter Schwaden*.

3. *G. plicata*, gefaltetes Süßgras. Stengel schlaff, Rispe nicht einseitswendig, untere Äste zu 3—5, sonst wie voriges. Gern an Quellen; oft übersehen. — Beide zeigen gutes Rieselwasser an.

8. *Molinia* (nach dem Missionar Molina in Chile, um 1800), Steifhalm, Molinie. Ährchen stielrundlich, 2—5 blütig. Deckspelzen gewölbt, stumpf, 5nervig, von der Vorspelze, besonders zur Fruchtreife, etwas abstehend. Narben purpurn.

*M. coerulea*, blauer Steifhalm, blaues Pfeifengras, Pfeifenrümer, in der Schweiz Besenried. Horstbildend. Triebe intravaginal. Wurzeln wellig gebogen. Halm steif aufrecht, *scheinbar ganz ohne Knoten*, am Grunde gleich über der Wurzel mit mehreren dicht übereinander stehenden Knoten, zwischen denen ein etwas längeres Internodium birnförmig angeschwollen ist (Speicherinternodium nach Schellenberg, Ber. d. schweiz. bot. Gesellsch. 1897), nur am Grunde beblättert, aber die Blätter, wie Schellenberg nachgewiesen, mit sehr langen Scheiden, damit die Spreiten mehr ans Licht kommen. Rispe *etwas zusammengezogen*. Ährchen oft *schieferblau*, daran leicht zu erkennen.

4. Auf Torfboden, Heidemooren, moorigen Wiesen und in Wäldern, bildet an moorigem Sande und auf Moorboden, seltener auf reinem Sande einen sehr charakteristischen Bestand (Molinétum nach Stebler und Schröter, *Molinia*-Typus nach Weber). Spät, August, September. Im Gebirge niedrig, in der Ebene bis 1,50 m. Als Futter gewöhnlich für wertlos gehalten, aber nach der „Flora von Brandenburg“ des Ökonomie-Kommissionsrats Schramm 1857 bei Brandenburg als kräftiges Futter bekannt; als Streu beliebt und in der Schweiz, wo großer Mangel an Streu, deswegen gebaut. Läßt sich im Herbst, nachdem die Blätter sich zumeist fast feuerrot gefärbt haben, leicht zusammenrechnen, da sich der Halm mit den Blattbüscheln leicht an den Knoten abgliedert. Heißt in der Mark „Flunkerbart“.

## § 60.

### Festuceae. (Fortsetzung.)

9. *Dactylis* (bei Plinius Name einer Weintraubensorte; ob von *δάκτυλος*, Dattel?), Knaulgras. Ährchen 3—6 blütig, geknäult. Hüllspelzen ungleich. Deckspelzen auf dem Rücken *zusammengedrückt gekielt* (die Samen können daher nicht auf dem Rücken liegen), *stachelspitz* oder kurz begrannt. Stengel platt zusammengedrückt. *Blattscheiden geschlossen*. Blätter *gefaltet*. Rispe nach dem Festuca-Typus, d. h. mit 3kantiger Achse, die nur auf 2 Seiten abwechselnd Äste trägt, daher einseitwendig.

1. *D. glomerata*, gemeines Knaulgras (Fig. 73 u. 74). Wurzelstock faserig. Horst dicht, mit sehr zahlreichen, bläulich-grünen, deutlich 2zeiligen Blättern, kein geschlossener Rasen. Triebe intravaginal, fächerartig. Halm unterwärts platt, meist 2schneidig, Knoten stark. Blattscheiden in der unteren Hälfte *geschlossen*, *Blatthäutchen sehr lang, spitz* oder zerrissen. Blattspreite sehr lang und schlaff, rückwärts sehr rauh, gegen das Licht gehalten mit vielen weißen Streifen. *Rispe ein-*

*seitswendig*, bis 13 cm lang, fast stets aufrecht, dicht büschelig, lappig geknänelt, mit 7—8 Hauptästen, davon der unterste sehr lang und abgerückt. Äste am Grunde mit Quellpolster und daher besonders zur Blütezeit abstehend oder zurückgeschlagen. Ährchen länglich-eiförmig, dicht gedrängt, oft purpurn überlaufen, besonders im Gebirge; 3—5blütig. Hüllspelzen lanzettlich, zugespitzt, untere 1nervig, obere 3nervig, auf dem Kiel steifhaarig kurz bewimpert. Deckspelze wenigstens am Grunde undentlich 3- oder 5nervig, lanzettlich, grün, auf dem Kiel steif bewimpert. Vorspelze spitz, 2zählig. Staubbeutelhälften parallel, am Grunde nur wenig getrennt.



Fig. 73. *Dactylis glomerata*.  
a Halmstückchen mit Blatthäutchen,  
b Ährchen. (Nach Garcke.)




Fig. 74. *Dactylis glomerata*,  
blühend.

4. Mai, Juni, Juli. 0,30—1,35 m. Sehr früh treibend. Blüht Ende Mai; im zweiten und dritten Jahr den höchsten Ertrag gebend, doch auf den meisten Wiesen Norddeutschlands, wie Dr. Weber beobachtete, nach einigen Jahren stark zurückgehend. Liebt mälsig feuchten Boden, selbst nafs kalten Tonboden, kommt aber auch viel auf trockenem vor und gedeiht ferner noch gut im Schatten, in Parks und Obstgärten etc., ebenso auf Moorboden. Gegen Spätfröste empfindlich. Für Bewässerung mit Rieselwasser oder Spüljauche sehr geeignet und dann riesige Erträge bringend, aber oft zu geil wachsend. — Eins der besten Gräser, wenngleich etwas grob, wird aber vielleicht überschätzt; muß möglichst früh gemäht werden, da es sonst leicht hart wird.

2. *D. Aschersoniana*. Von *D. glomerata* verschieden durch folgende Merkmale: Lebhaft hellgrün. Grundachse (Wurzelstock) kriechend, bis

10 cm lange, dünne Ausläufer treibend. Rispe schlank, bis 20 cm lang, nicht geknäult, die einzelnen Teile fast ährenförmig, überhängend. Rispenäste fast anliegend, nur zur Blütezeit abstehend. Ährchen länglich, schmal, meist 6blütig. Hüllspelzen beide 3nervig, kahl, durchsichtig häutig. Deckspelze schmal weißlich-häutig, mit 3 stark vorspringenden grünen und 2 undeutlicheren Nerven, kahl, auf dem Rücken rau. Staubbeutelhälften am Grunde stark auseinander tretend, nur im oberen Viertel zusammenhängend.

4. Erst Ende Juni, Juli. Auf buschigen, sonnigen Hügeln, in Laub-, besonders Buchenwäldern, auf Waldwegen, nur auf *mergel*haltigem feuchtem Boden. Diese erst 1899 von Dr. Paul Graebner im Notizblatt des Königl. botanischen Gartens und Museums Berlin II 274 (1899) aufgestellte Art unterscheidet sich nach Ascherson und Graebner, Synopsis der Mitteleuropäischen Flora, Leipzig 1900, S. 381 in ihrer Tracht und in ihren systematischen Merkmalen außerordentlich von *Dactylis glomerata*. In der Tracht erinnert sie etwas an *Phalaris arundinacea* (S. 267). Die schlaff überhängenden Blätter erinnern an *Melica*, die Stengel sind sehr schlank und hoch ( $\frac{1}{2}$ —1 m), tragen an der Spitze die überhängende schlanke, wenig auffällige, hellgrüne Rispe und stehen fast stets einzeln an der Pflanze. Die abgestorbenen Stengel bleiben sehr lange stehen, mindestens bis zur Mitte des folgenden Sommers, und drücken dadurch den Beständen ein ganz charakteristisches Gepräge auf.

10. *Cynosurus* (κύων Hund und οὐρά Schwanz), Kammgras. Unter jedem ährchentragenden Zweiglein ein anderes mit zweizeilig gestellten, gekämmt erscheinenden tauben Spelzen (sog. gefiedertes Trag- oder Deckblatt). Blätter *gefallt*. Ährchen 1—5blütig, Deckspelze auf dem Rücken abgerundet. Die Samen können daher auf dem Rücken liegen.

*C. cristatus*, gemeines Kammgras (Fig. 75). Triebe intravaginal, aber ausläuferartig. Horst klein, eben, mit zahlreichen Wurzelblättern. Bildet selten einen dichten Rasen, da es meist vereinzelt steht, ist aber ein gutes Untergras. Halme zahlreich, aufrecht, fein, glatt, obere Knoten länglich. Blatthäutchen kurz. Blätter schmal, gelbgrün, ähnlich denen des englischen Raigrases, aber zäher, steifer und sperriger. Spreitengrund ohne Zahnfortsatz. *Rispe ährenförmig*, einseitswendig oder 3seitig. Hüllspelzen etwas ungleich, lanzettlich, fein und kurz begrannt. *Deckspelze* auf dem Rücken stark gewölbt, oberwärts *fein warzig behaart* (was in der Reife viel mehr hervortritt), *kurz begrannt*.

4. Wiesen, Triften. Juni, Juli. 0,30—0,60 m. Mittelfrüh, erst Mitte Juni blühend, zur Zeit der Heuernte noch wenig entwickelt, im 2. Schnitt aber sehr viel (nach Weber nur mälsig) Ertrag gebend. Liebt feuchten Boden und feuchtes Klima, viel in den Marschen, selbst auf zähem Ton gedeihend, in der Schweiz im unteren Teile der Straußgras-Region, 700—1200 m, oft bis zu 58% vorkommend. Über den Wert sind die Ansichten geteilt. Tatsache ist, daß das Weidevieh in den Marschen die trockenen, abgeblühten Halme stehen läßt; als



Untergras hat es großen Wert. Bewässerung erträgt es gut. Leider ist der Same sehr teuer.

**11. *Festuca*** (Name eines Unkrautes bei Plinius; bedeutet eigentlich einen Grashalm), Schwingel. *Rispe* (außer zur Blütezeit) meist *einseitswendig* (S. 289). Ährchen 2- bis vielblütig, Deckspelze auf dem Rücken ungekielt (Gegensatz zu *Poa*: die Samen können auf dem Rücken liegen), entweder stumpf und unbegrannt oder spitz und an der Spitze begrannt. Vorspelze fein gewimpert, untere Hüllspelze bei unseren Arten 1-, obere 2nervig. *Narben an der Spitze des Fruchtknotens.*



Fig. 75. *Cynosurus cristatus*.  
a Ährchen, b dasselbe blühend, mit  
den sogen. Kammspelzen, c Blütchen,  
d Staubgefäße und Fruchtknoten.  
(Nach Garcke.)



Fig. 76. *Festuca pratensis*.  
Rechts oben Blatthäutchen, unten  
Frucht mit Spelzen, von innen  
gesehen.

### I. Blätter alle flach.

1. *F. pratensis* (*F. elatior*), *Wiesen-Schwingel* (Fig. 76). Horst ziemlich dicht, eben, mit zahlreichen hohen Halmen und langen, breiten Blättern. Untere Blattscheiden am Grunde glänzend purpurn, sich in *braune Fasern* auflösend. Blätter unterseits stark glänzend, lang zugespitzt, ähnlich denen des englischen Raigrases, besonders auch wegen der Zahnfortsätze am Blattgrunde, aber Blätter im Triebe gerollt, nicht gefaltet, der Blattgrund ferner am Rande rückwärts rau und die Spreite mit deutlicheren Rippen, 15—20, die als weiße Längsstreifen im durchfallenden Licht erscheinen. Rispe einseitswendig, nur während der Blüte ausgebreitet. *Äste rau*, die unteren meist zu 2, der eine davon *sehr kurz* und *meist*

1 *Ährchen*, der zweite 3—4 Ährchen tragend. Ährchen 7—12blütig, unbegrannt, untere Hüllspelze kleiner. 4. Juni, Juli. Treibt ziemlich früh, blüht Anfang Juni, wächst schnell, bestockt sich stark und bleibt lange Jahre sich im Ertrage gleich.

Liebt feuchtes, nebeliges Klima und guten Boden, besonders humusreichen, frischen Mergel-, Lehm- und Tonboden, auch besandeten und gedüngten Moorboden; eines der besten Gräser für *Bewässerungs*- und für *Moorwiesen* und überhaupt eines der vorzüglichsten Gräser, gibt große Massen sehr guten Futters, kann oft 3mal geschnitten werden. Vom Meere bis in die Alpen, hoch geschätzt.

2. *F. arundinacea*, rohrartiger Schwingel. Horst dicht, groß, höher, derber und breitblättriger als *F. pratensis*. Blattscheide mit undeutlichen Queradern, etwas rauh, Blattspreite im durchfallenden Licht mit ca. 9 weißen Streifen, steif, dick und hart, Rand des Spreitengrundes gewöhnlich mit einigen verlängerten Borstenhaaren. *Rispe ausgebreitet*, überhängend. Äste rauh, zu 2, verzweigt, 5—15 Ährchen tragend, die unteren mit einem nur wenig kürzeren, fast *ebensoviel Ährchen* tragenden, grundständigen Zweige. Ährchen 4—5blütig. 4. Juni, Juli. 0,60 bis 1,50 m.

Feuchte Wiesen mit fruchtbarem, bindigem Boden, besonders in den Marschen, wo sie zuweilen massenhaft sich findet. Liefert, frühzeitig gemäht, viel und gutes Futter, auch guten Nachwuchs für den 2. Schnitt, hat aber nach Webers Beobachtungen, namentlich auch für Weiden, bei weitem nicht den Wert von *F. pratensis*, deren Same noch dazu billiger ist. (Ist *F. elatior* der Samenhändler.)

II. *Halmblätter flach (trocken aber auch fast borstlich). Wurzelblätter borstlich. Alle Blätter im Triebe gefaltet, Blatthäutchen kurz, mit 2 Öhrchen den Stengel umfassend.*

3. *F. heterophylla*, verschiedenblättriger Schwingel. Wurzel faserig. Triebe intravaginal, dichte Horste bildend. *Wurzelblätter borstenförmig*, zusammengefaltet, *grasgrün*, meist schlaff, *halmständige flach* (trocken gefaltet). Stengel dünn, schlaff. *Rispe einseitigwendig*, nur während der Blüte abstehend, Rispenäste fein, rauh. Die untersten meist mit 1 *grundständigen* Zweige. Ährchen 2zellig, meist 6blütig. Hüllspelzen sehr ungleich, die untere halb so groß als die obere, 1nervig, die obere 3nervig. Deckspelze an der Spitze mit einer Granne, die kürzer ist als die Spelze. (*F. duriuscula* der Samenhändler.)

4. Mai, Juni. Trockene Wälder und Wegränder; nach Weber auch auf nicht abgetragenen Hochmoor gedeihend. Der *Aira flexuosa* ähnlich. Höhe 0,50—1 m. Für leichten Boden geeignet. Feines Untergras. Erträgt Bewässerung, doch wird meistens statt seiner der rote Schwingel, *Festuca rubra*, genommen, der, weil Ausläufer treibend, einen besseren Rasen bildet. Oft sind beide kaum voneinander zu unterscheiden.

4. *F. rubra*, roter Schwingel (Fig. 77 und 36, S. 249). Wurzelstock meist *kurze Ausläufer* treibend und einen zusammenhängenden, auf Moorboden und im Gebirge oft büstendichten Rasen bildend. Sonst wie voriger, oft etwas graugrün, so an trockneren Stellen. Waldränder, auch auf sandigen und moorigen Bodenarten. Bei der Varietät *fallax* fehlen die Ausläufer, und ist es dann äußerst schwer, sie von *F. heterophylla* zu unterscheiden.

Mai, Juni. Höhe 0,30—0,60 m. Ährchen und Halme oft rot überlaufen. Treibt früh, blüht Ende Mai; zunächst langsam wachsend, hat er seine höchste



Fig. 77. *Festuca rubra*, mit Querschnitt des Blattes, Blatthäutchen und bespelzter Frucht.  
(Nach Stebler und Schröter.)



Fig. 78. *Festuca ovina*, nebst bespelzter Frucht, von innen und von außen.

Entwicklung im 2. Jahr. Bildet im 2. Schnitt zahlreiche lange Blätter. *Wert:* 2. Güte. Eines der besten Untergräser für geringere Wiesen, namentlich Moorbiesen, da es unempfindlich gegen Kälte ist und Nässe gut erträgt. Von den Strandwiesen des Meeres bis hoch in die Alpen. Bildet am Strande der See als *var. litoralis* ausgedehnte Bestände.

### III. Alle Blätter borstlich, sonst wie II.

5. *F. ovina*, Schafschwingel (Fig. 78). Graugrün oder grasgrün, Horst dicht, rundlich. Triebe intravaginal, Halme fein. Rispe zusammengezogen, nur während der Blüte abstehend. Äste aufrecht, ihr unterster Zweig erst *oberhalb* des Grundes abgehend. Ährchen eiförmig bis läng-

lich, 3—4 blütig. Deckspelze kurz begrannt, lineal-lanzettlich, Vorspelze an der Spitze 2zählig.

4. Trockene Wiesen, Heiden, Triften, Wälder, gemein, früh. Typus eines Steppengrases. Nur für Schafweiden. Mai, Juni. 30—60 cm. Sehr vielgestaltig.

**12. *Bromus* (*βρῶμος*, Name des Hafers bei Theophrastos), Trespse.** Rispenäste zweiseitswendig, Ährchen vielblütig. Deckspelze lanzettlich oder eilanzettlich, begrannt oder seltener grannenlos. Narben nicht an der Spitze, sondern auf der *vorderen* Seite des Fruchtknotens, *oberhalb der Mitte* eingefügt. *Blattscheiden meist bis zur Hälfte geschlossen.* Die Arten am besten zur Reifezeit zu unterscheiden, zu welcher Zeit der charakteristische Winkel an den Deckspelzen, den einige Arten zeigen, deutlicher ist.

1. *B. secalinus*, Roggen-Trespse. ☉. Gefürchtetes Unkraut unter Getreide, besonders Roggen. Blüten sich nicht deckend. Blätter im durchfallenden Licht mit 6—7 weissen Streifen.

2. *B. racemósus*, traubenförmige Trespse. Gelblich-grün. *Untere* Blattscheiden behaart. Rispe schmal, traubenförmig, *aufrecht*, zuletzt auch überhängend, nach dem Verblühen zusammengezogen. Ährchen eiförmig-länglich, *kahl*. Blüten elliptisch, fruchttragende am Rande sich deckend. Deckspelze 7nervig, zur Fruchtzeit am *Rande* bogenförmig, nicht stumpfwinklig, länger als die steif gewimperte Vorspelze. Granne gerade. ☉ (zweijährig). Wiesen, Triften, zerstreut. Mai und Juni. 30—50 cm. Sehr ähnlich der folgenden. Futtergras 2. bis 3. Güte.

3. *B. mollis*, weiche Trespse (Fig. 79). Graugrün. Horst locker, mit breiten Wurzelblättern. Blätter und Ährchen weichhaarig. Deckspelze zur Fruchtzeit am *Rande oberhalb der Mitte stumpfwinklig hervortretend*, sonst wie vorige. ☉. Wiesen, Raine, auf allen Bodenarten, auch auf Moorbiesen, weniger im Gebirge. Mai, Juni. 15—50 cm. Ändert ab mit kahlen Ährchen.

Obergras, früh blühend und reifend. Ziemlich unempfindlich gegen Klima. Wegen der starken, weichen Behaarung vom Vieh ungern gefressen. Nach Weber höchstens Weidegras 3. Güte, auf Wiesen zu verwerfen. Für Be-




Fig. 79. *Bromus mollis*.  
a Hüllspelzen, b Blütchen,  
c Deckspelze, ausgebreitet,  
d Vorspelze, e Staubgefäße  
u. Fruchtknoten, f Frucht.  
(Nach Garcke.)

wässerung ungeeignet. Dennoch, wo billige Aussaat verlangt wird, z. B. auf unbesandeten Moorwiesen, an Eisenbahndämmen etc. (leider) oft viel angesät. Da die Samen früh ausfallen, kann sie sich leicht auf Wiesen ausbreiten und die besseren Gräser verdrängen. Im 2. Schnitt findet sie sich selten, denn der Nachwuchs ist gering.

4. *B. erectus*, aufrechte Trespe. Obergras. Triebe extravaginal, aber sich gleich aufwärts wendend. Horst klein, dicht, keinen geschlossenen Rasen bildend, hellgrün. Untere Blattscheiden bis  $\frac{3}{4}$  geschlossen, abstehend locker behaart oder kahl. Blätter in der Knospe *gefallt* (nur bei dieser




Fig. 80. *Bromus inermis*, blühend.

Art *Bromus*), schmal und lang, *am Rande gewimpert*, die unteren fast borstenförmig. Halm wenigblättrig, oben locker abstehend behaart. Rispe *aufrecht*, untere Äste zu 3—6, meist 5, 1—2 Ährchen tragend. Ährchen lineal-lanzettlich, 5—8blütig, lang, gelbgrün, untere Hüllspelze 3-, nicht 1nervig. Deckspelze kurz begrannt. Staubbeutel hellgelb. ♀. Sonnige Hügel, trockene Wiesen. Juni, August. 3—9 dm. Liebt trockenen, besonders Mergel- und Kalkboden.

Ziemlich früh, unempfindlich, auch in Hochtälern noch verbreitet (Engadin). Bewässerung und Beschattung erträgt sie nicht. Volle Entwicklung erst im 2. Jahre. *Wert*: 2. Güte, aber für trockene, *kalkhaltige* Wiesen wichtig.

5. *B. inermis*, grannenlose Trespe (Fig. 80). Hellgrün oder etwas graugrün. Lange unterirdische Ausläufer treibend und einen zusammenhängenden Rasen bildend. Halm vielblättrig. Blätter alle breit, zäh, wie die Blattscheiden *kahl*. Rispe ausgebreitet, kürzer als bei *Bromus erectus*. Deckspelze grannenlos oder kurz begrannt. Staubbeutel zitronen-, zuletzt orangegelb. Sonst wie vorige. ♀. Juni, Juli. 0,15—1 m. Entwickelt sich später als alle andern Trespenarten, blüht erst Mitte Juni, gibt aber noch guten Nachwuchs.

Gegen Kälte und Trockenheit unempfindlich, am liebsten auf humusreichem sandigem Lehmboden. Für *Bewässerung* dankbar. Gras 2. Güte; wird, wenn

nicht vor der Blüte geschnitten, leicht hart. Für trockene Wiesen aber wertvoll, auch für Böschungen etc.

6. *B. arvensis*, Acker-T. Blätter schlaff, mit 15—25 Rippen, abstehend behaart, selten kahl, Blattscheiden abstehend behaart, obere mitunter kahl. Rispe groß, abstehend, bei der Fruchtreife etwas überhängend, Äste sehr lang, Ährchen lineal-lanzettlich, Blüten elliptisch-lanzettlich. Deckspelze 7nervig, am Rande oberhalb der Mitte stumpfwinkelig, etwa so lang als die Vorspelze. — Leicht kenntlich an den schmalen, meist violetten oder grün und violett gescheckten Ährchen und den zugespitzten Deckspelzen (Ascherson). ☉ und ☉, zerstreut, am liebsten auf etwas feuchtem, sandigem Lehm- und torfigem Boden. In Dänemark für solche Verhältnisse als recht gutes, einjähriges Futtergras empfohlen; von dort der Same jetzt eingeführt.

13. *Brachypodium* (βραχύς kurz, πόδιον Füßchen, hier Stielchen), Zwenke. Ährchen *kurz* gestielt, einzeln, 2zeilig, in einfacher, ährenförmiger Traube, vielblütig. Vorspelze (innere Spelze) auf den Kielen kammförmig gewimpert.

1. *B. silvaticum*, Wald-Zwenke. Wurzelstock faserig. Blätter schlaff, *dunkelgrün*. Scheiden rückwärts rauhaarig. Ähre (Traube) 2zeilig, locker überhängend. Grannen der oberen Deckspelzen länger als diese, dünn. ♀. Schattige Wälder, zerstreut. Juli, August. 0,60—1 m.

2. *B. pinnatum*, gefiederte Zwenke. *Wurzelstock kriechend*. Blätter steif, *hellgrün*. Scheiden weichhaarig. Ähre meist aufrecht, Grannen kürzer als die Deckspelzen, steif. ♀. Grasige, trockene Hügel, Wälder, gern auf Sand und Kalk.

## § 61.

Gruppe 10. **Hordéace**, Ährengräser. *Ährchen in Auszahnungen der Spindel, d. h. der Achse, in einer sog. Ähre*, fast stets in zwei einander gegenüberstehenden Reihen. (Nardus einseitwendig.)

1. *Triticum* (Name des Weizens bei Varro), *Weizen*. Ähre mit Gipfelährchen. Ährchen meist einzeln, die *breite Seite der Spindel der Ähre zugekehrt*, 2- bis mehrblütig. Hüllspelzen eiförmig oder lanzettlich, mehrnervig. Deckspelzen auf dem Rücken abgerundet oder gekielt.

*A. Ährchen gedunsen, Hüllspelzen eiförmig oder länglich, kürzer als die Ährchen.*

I. Spindel der Ähre zähe, Frucht frei. Nackte Weizen.

a) Hüllspelzen breit eiförmig, nur oben gekielt, unten meist gewölbt, etwa so lang wie die nächste Deckspelze. Halm auch oben hohl.

1. *T. vulgare* (im engeren Sinne), *gemeiner Weizen*. Ährchen ziemlich locker. Deckspelze begrannt (Bartweizen) oder unbegrannt (Kolbenweizen).

Winter- oder Sommerfrucht. Ähren vorn und hinten etwas breiter als an den Seiten, im Grundrifs also ein queres Rechteck bildend (man halte die Blüten-seite vor sich). Die häufigste Art. — 2. *T. compactum*, Zwergweizen. Wie voriger, aber Ähre kurz, dicht, im Grundrifs quadratisch, begrannt (Igelweizen) oder unbegrannt (Binkelweizen).

b) Hüllspelzen meist breit eiförmig, *ihrer ganzen Länge nach scharf gekielt*, meist halb so lang als die nächste Deckspelze. Halm oben markig.

3. *T. turgidum*, *bauchiger* Weizen, Rauhweizen, englischer Weizen, obwohl in England viel mehr *T. vulgare* gebaut wird. Ähre lang, dicht und dick, im Grundrifs quadratisch, *lang begrannt*. Grannen meist parallel der Ähre. Korn dickbauchig, wenig proteinreich. Hierher die in der Provinz Sachsen so viel gebaute Sorte *Rivetts bearded*.

c) Hüllspelzen oft *länglich*, *ihrer ganzen Länge nach fast flügelig gekielt*, oft so lang wie die nächste Deckspelze. Halm oben markig.

4. *T. durum*, Hartweizen. Ähren im Grundrifs verschieden, bald mehr quadratisch, bald mehr rechteckig, kurz oder lang, dick oder dünn. Ährchen sehr lang begrannt, Grannen *abstehend*. Spelzen von der Seite zusammengedrückt. Korn meist glasig, hart und dann sehr proteinreich. (Scharfe Unterschiede von den vorigen gibt es nicht.)

## II. Spindel zerbrechlich, Frucht von den Spelzen umschlossen.

### Bespelzte Weizen.

a) *Ähre fast gleichmäfsig 4kantig*, im Grundrisse also quadratisch, *locker, lang und dünn*.

5. *T. Spelta*, *Spels*, *Dinkel*. Hüllspelzen quer und breit abgestutzt, mit sehr kurzem, stumpfem Mittelzahn, wenig gekielt, begrannt oder unbegrannt.

b) *Ähre von der Seite zusammengedrückt*, dicht, im Grundrifs ein aufrechtes Rechteck bildend, fast stets begrannt.

6. *T. dicoccum* (*T. amyleum*), *Emmer*, *Zweikorn*. Hüllspelzen länglich, ihre Spitze einwärts gebogen, meist mit spitzem Mittelzahn, scharf gekielt.

7. *T. monococcum*, *Einkorn*. Hüllspelzen länglich-lanzettlich, mit *zwei* spitzen, geraden Zähnen, Vorspelze (innere Spelze) bei der Reife bis zum Grunde in 2 Teile geteilt, Korn flach, von der *Seite* zusammengedrückt.

*B. Ährchen bauchig gedunsen, Hüllspelzen länglich, so lang oder länger als das ganze Ährchen.*

8. *T. polonicum*, polnischer Weizen. Ähre meist sehr grofs und locker, gewöhnlich begrannt, Ährchen sehr grofs. Hüllspelzen papierartig, Vorspelze halb so lang als die Deckspelze. Sehr selten gebaut. (Der polnische Weizen des Handels gehört zu *T. vulgare*.)

*C. Ährchen nicht bauchig gedunsen. Hüllspelzen lanzettlich.*

9. *T. repens*, *kriechender Weizen*. *Quecke*, *Pede* (Fig. 81). Lange, unterirdische, weifsliche Ausläufer treibend und den Acker sehr verunkrautend, auf Wiesen aber wegen Befestigung des Rasens durchaus nicht zu verachten.

Blatthäutchen kurz. Blattspreite mit 7—9 Hauptnerven, meist schlaff, oft oberseits etwas rauh durch eine einfache Reihe kleiner Borsten auf den Nerven. Halm unterwärts liegend, gekniet, dann aufrecht. Ähre 2zeilig, kürzer als bei *Lolium*. Ährchen 2—5 blütig. Deckspelze meist kurz begrannt. Staubbeutel gelb. ♀. Juni, Juli.

Von *Lolium perenne* und *L. italicum*, englischem und italienischem Raigras, durch die mit der *breiten* Seite nach der Spindel der Ähre gekehrten Ährchen leicht zu unterscheiden.

10. *T. caninum*, Hundsweizen. Nicht kriechend. Blätter graugrün, unterseits dunkelgrün, glänzend, rauh. Ähre lang und schlaff, überhängend. Granne etwas geschlängelt. ♀. Schattige Laubwälder.

2. *Secale* (Name einer Getreideart bei Plinius), Roggen. Ähre ohne Gipfelährchen, Ährchen meist einzeln, gewöhnlich 2blütig. *Hüllspelzen pfriemlich*, einnervig, sonst wie *Triticum*, aber der Embryo am reifen Korn auf dem Querschnitt mit 4 Würzelchen, beim Weizen nur mit 3.

*S. cereale*, *gemeiner Roggen*. Ähre überhängend, lang. Hüllspelzen am Kiel rauh, kürzer als das Ährchen. *Deckspelzen am Kiel kammartig borstig gewimpert*. ☉ und ☺, selten ♀. Überall gebaut. Mai, Juni. Stammt vom perennierenden *S. montanum*, mit zerbrechlicher Ährenspindel, in Südeuropa.

3. *Elymus* (gr. *elymos*, Name einer Hirseart bei Hippokrates), Haargras. Ährchen (bei unsern Arten) meist zu 3 stehend, 2- bis vielblütig, oder, wenn 1blütig, mit einem Ansatz zu einer 2. Blüte. Wird jetzt meist zur Gattung *Hordeum* gezogen.

*E. arenarius*, Strandroggen, *blauer Helm*. Bläulich-grün, Wurzelstock weit kriechend, Ausläufer treibend. Blätter steif, breit, trocken eingerollt. Ähren lang, aufrecht, Ährchen 3blütig, weichhaarig, unbegrannt. ♀. Auf Sand an den Küsten der Nord- und Ostsee, im Binnenlande seit dem 18. Jahrhundert wie *Ammophila arenaria* (S. 276) zum Binden des Flugsandes eingeführt und jetzt völlig eingebürgert. (Ascherson.)

*E. europaeus*, europäisches Haargras. Grasgrün, ohne Ausläufer, an und unter den Knoten kurz rückwärts-zottig, *untere Scheiden rückwärts zottig*. Blätter flach. Ährchen 2blütig oder 1blütig, mit dem Rudiment einer 2. Blüte. Hüllspelzen linealisch-pfriemlich, begrannt, Deck-



Fig. 81. *Triticum repens*.  
a Hüllspelzen, b 5 Blütchen, c ein  
Blütchen, d dessen Schüppchen,  
e Fruchtknoten.  
(Nach Garcke.)



spelzen lang begrannt. Laubwälder. ♀. Sieht *Triticum caninum* und *Brachypodium silvaticum* ähnlich.

4. *Hordeum* (Name der Gerste bei Vergilius), *Gerste*. Ährchen zu 3 stehend, meist einblütig. Hüllspelzen lineal-lanzettlich bis borstenförmig, sich mit Deck- und Vorspelze *kreuzend*. Deckspelze meist lang begrannt. (Beim Weizen stehen die meist vorhandenen 3 Körner auf einer Stufe der Ähre in 1 Ährchen; bei der Gerste dieselben 3 Körner in 3 Ährchen, jedes Ährchen enthält nur *ein* Korn.)

*A. Blütenspelzen meist elliptisch, Granne flach verbreitert.*

a) Alle Ährchen fruchtbar, begrannt (sog. kleine Gerste).

1. *H. hexastichum*, *sechszellige Gerste*. Ähre mit 6 gleichartig abstehenden Ährchenreihen. Selten gebaut.

2. *H. tetrastichum* (*H. vulgare*), *vierzellige Gerste*. Die zwei mittleren Ährchenreihen anliegend, die vier seitlichen abstehend. Als Winter- und Sommerfrucht gebaut.

b) Nur die Mittelährchen fruchtbar (sog. große Gerste).

3. *H. distichum*, *zweizellige Gerste*. Seitliche Ährchen verkümmert. Keulenförmig. Als Sommerfrucht viel gebaut. Var. *erectum*, aufrechte, richtiger dichte Gerste, Imperialgerste.

*B. Blütenspelzen lanzettlich, Grannen haarfein.*

4. *Hordeum murinum*, Mäuse-Gerste. Grasgrün. Hüllspelzen des mittleren Ährchens lineal-lanzettlich, bewimpert, die der 2 gestielten seitlichen borstenförmig, rauh. ☉. Wege, Schutthaufen. Juli, August. 0,15 bis 0,30 m. — Unkraut.

5. *H. secalinum*, *roggenartige Gerste*. Graugrün. Horst klein, büschelig, mit zahlreichen Wurzelblättern. Scheiden der unteren Blätter rauhaarig. *Hüllspelzen aller Ährchen borstenförmig und rauh*. ♀. Juni, Juli.

Liebt feuchtes Klima und feuchten Boden, besonders Salzboden; auf den reichen Fettweiden der Marschen, besonders wenn diese älter werden, sehr verbreitet und dort sehr geschätzt. Für Bewässerung sehr geeignet, da aber der Same nicht im Handel zu haben ist, für künstliche Wiesen ohne Bedeutung. Treibt früh, blüht oft schon Ende Mai. *Wert*: Vor der Blüte gemäht ein gutes Futter.

## § 62.

**Hordéaceae, Ährengräser, Fortsetzung: Raigräser.**

5. *Lolium* (Name eines Unkrauts bei Vergilius), Lolch. Ährchen einzeln, vielblütig, mit der *schmalen Kante* der Ährenspindel zugewendet. Das Gipfelährchen mit 2 Hüllspelzen, die seitenständigen nur mit einer, der äußeren, oberen. Den Schutz, den sonst die hier fehlende untere

Hüllspelze gibt, gewährt bei *Lolium* eine Rinne an den Internodien der Ährchenspinde, in welche sich die Ährchen legen. Blattscheiden geschlossen. Blattgrund mit 2 Zähnen. Blatthäutchen kurz.

*I. Wurzelstock treibt blühende Halme und nichtblühende Blätterbüschel.*

1. *L. perenne*, ausdauernder Lolch, englisches Raigras (Fig. 82). Horst dicht, eben, ausgebreitet, weil die Internodien der zwar intravaginalen, unterirdischen Triebe sich dennoch oft fast zu Ausläufern verlängern, sodafs der ganze Horst aus Teilhorsten besteht. Blattscheiden meist etwas flach, untere am Grunde rot, lange bleibend, ohne sich in Fasern (wie beim Wiesenschwingel) aufzulösen. Blattspreite schmal, anfangs freudig grün, daher der Gartenrasen so lebhaft grün (Samsö Lund), später dunkler grün, unterseits glänzend grün, mit hervorragendem Mittelnerv und vielen feinen (12—20) Seitenerven, die im durchfallenden Licht als dunkle Linien erscheinen, während die Zwischenräume zwischen ihnen gelbgrüne Linien darstellen, im Triebe *gefaltet*, selten bei jungen, kräftigen Exemplaren gerollt. Halm zusammengedrückt. Ähre lang, flach, 2zeilig, Ährchen 8—10blütig. Hüllspelze  $1\frac{1}{2}$  mal so lang als die nächste ihr anliegende Deckspelze. Deckspelze stumpf, *grannenlos*, 5nervig.

Trockenere Wiesen, auf besserem, schwerem Boden, Wegränder, gemein. Bildet nach Weber Bestände von grofser Ausdehnung, besonders in den Seemarschen, wo die Fettweiden bis zu 70, ja 80 % aus engl. Raigras bestehen. Juni—Oktober. 30—60 cm. Früh, bestockt sich nach dem Abmähen und Abweiden sehr stark, besonders auch nach dem Festtreten, daher zu Rasen, der begangen werden soll, sehr geeignet. Gibt nur in den ersten beiden Jahren hohe Erträge, ist aber während dieser Zeit fast unentbehrlich, zumal es auch bei seiner schnellen Entwicklung der anderen Grassaat zum Schutz (als Überfrucht) dienen kann. Für Bewässerungs- und Moorwiesen sehr geeignet, stauende Nässe aber erträgt es nicht. Gras 1. Güte. Meist 2—3, selten mehrjährig. Same von kultivierten Pflanzen scheint meist viel weniger lang dauernd, aber schneller in „Saat“ schiefsende Individuen zu erzeugen, als der von wildwachsenden. (Weber, Arb. d. D. L.-G., Heft 61.) Für Rasenplätze hat man sehr feinblättrige Varietäten.



Fig. 82. *Lolium perenne*.  
a Ährchen, links die einzige Hüllspelze, b Blüthen, c Fruchtknoten, d Schüppchen.  
(Nach Garcke.)

Von der Quecke, *Triticum repens*, durch die mit der schmalen *Kante*, nicht mit der breiten Seite der Hauptachse zugewandten Ährchen leicht zu unterscheiden.

Same des Handels: Die einzelnen Blüten; von den ähnlichen, aber meist viel teureren des Wiesenschwingels, *Festuca pratensis*, durch ein kurzes, *plattes*, nicht langes, rundes *Stielchen* zu unterscheiden.

2. *L. multiflorum* (*L. italicum*), italienisches Raigras (Fig. 83). Horst ziemlich dicht, büschelig, untere Scheiden rot. Halme rauh, bis 1 m hoch. *Blätter* schlaff, mit 15—25 Rippen, im durchfallenden Licht mit 5—7 grünlich-weißen Streifen, meist breiter als bei *L. perenne*, *hellgrün*, unterseits glänzend, im *Triebe gerollt*. Ährchen sehr zahlreich, sehr lang, meist 10—20 blütig. Hüllspelze kaum so lang als die Deckspelze. Deckspelzen, besonders die oberen, meist *begrannt*. Sonst wie vorige, aber Ährenachse zur Reifezeit sehr zerbrechlich, Vorspelze am Rande stärker gezähnt-gewimpert. Meist 2-, selten 3 jährig. Juni—Oktober.



Fig. 83. *Lolium italicum*  
(italienisches Raigras),  
blühend.

Stammt aus Südeuropa, liebt warmes Klima und feuchten, humusreichen Boden, auch Kalk- und Mergelboden, sowie milden, durchlassenden Tonboden, erfriert in Norddeutschland öfter, wird aber dennoch überall gern gebaut, weil es schon im ersten Jahre hohe Erträge gibt. Gras 1. Güte.

*Bewässerung.* Kein Gras eignet sich so für Bewässerung, wie das italienische Raigras; es wurde seit langen Zeiten auf den lombardischen Wässerswiesen gebaut, später in England auf den Rieselfarms, und jetzt ist es auch auf den deutschen städtischen Rieselfeldern das am meisten angebaute Gras, da es nach Spüljauche-Düngung sich 5—6 mal im Jahre schneiden läßt. Man sät es meist alle Jahre von neuem an, da der Winter den Bestand sehr lichtet. Auch auf besandeten Moorswiesen viel gebaut, zumal es im 1. Jahr als Schutz für die übrigen Gräser dient.

Da es sehr schnell wächst, unterdrückt es andere Gräser leicht und dürfen davon nicht über 10% in Grasmischungen beigegeben werden.

## II. Wurzelstock treibt nur blühende Halme.

3. *L. temulentum*, Taumellolch, unter Sommergetreide, besonders Hafer. Hüllspelze länger als das Ährchen. Deckspelze länger oder kürzer begrannt. Giftig. ☉. 4—9 dm. Die Giftigkeit wird wahrscheinlich durch einen Pilz hervorgerufen, dessen Gewebe innerhalb der Samenschale wuchert und in

Symbiose mit dem Korn lebt. Er kommt beim Keimen wieder in die neue Pflanze.

4. *L. remotum*, Leinlolch. Hüllspelzen fast so lang oder kürzer als die Ährchen. Deckspelzen meist unbegrannt. ☉. Unkraut unter Lein. 3—6 dm.

6. *Nardus* (νάρδος, Name einer ährentragenden Pflanze, welche ein wohlriechendes Öl liefert). Ährchen ohne Hüllspelzen, *Griffel nur 1*.

*N. stricta*, *steifes Borstengras* (Fig. 84 und 85). Wuchs der ausdauernden Juncus-(Binsen-)Arten. Scheinachse dick, kurz kriechend, niedrige graugrüne Horste bildend, welche aus oft über hundert dicht zusammen-




Fig. 84. *Nardus stricta*.  
a Ährchen, b Deckspelze, c Blüte,  
d Staubgefäße u. die einzige Narbe.



Fig. 85. *Nardus stricta*, steifes Borstengras,  
kurz kriechende Scheinachse.

gedrängten Trieben bestehen, die zu je 5—10 wieder eng zusammengepreßt und von sterilen Blattscheiden umgeben sind. Wurzeln faserig, fast horizontal. Unterste (äußere) Blattscheiden schuppenförmig, kurz ei-lanzettlich, rötlich-weiß, porzellanartig glänzend, innere lang, eng anliegend, weiß. Blattspreite *borstenförmig*, rinnig gefaltet, rundlich, rückwärts rauh. Halm dünn, borstenförmig, meist 1blättrig. Ähre *einseitwendig*, Ährchen 1blütig, in den rinnenförmigen Aushöhlungen der Ährenachse. Deckspelze an der Spitze mit kurzer Granne, trüb purpurn, am Rande sehr rauh. Vorspelze sehr schmal, weiß. Griffel mit *einer* fadenförmigen, weit hervortretenden Narbe. Frucht lang, gelb, glänzend, noch mit dem Griffel und

der Narbe gekrönt. 4. Trockene moorige Wiesen, Abhänge. Sehr schlechtes, hartes Gras. Unkraut. Durch Düngung verschwindet es.

## 2. Familie Cyperaceae, Halb-, Ried- oder Sauergräser.<sup>1)</sup>

### § 63.

Blüten wie die der echten Gräser in der Achsel von Deckblättern (Deckspelzen), aber *ohne Vorblatt* (Vorspelze). Die Blütenhülle fehlt entweder, wie bei den Gramineae, oder sie ist durch 6 oder mehr einfache oder verzweigte Borsten dargestellt. Staubgefäße meist 3, Fruchtblätter 2 oder 3 (wie man an der Zahl der Narben erkennt); Fruchtknoten aber, wie auch bei den echten Gräsern, nur 1fächerig. Frucht nicht aufspringend, Same im Gegen-




Fig. 86.  
Grundriss der Blüte von *Scirpus*;  
 $2 \times 3$  Borsten,  $1 \times 3 + 0 \times 3$  Staub-  
gefäße,  $1 \times 3$  Fruchtblätter;  
a Achse.

(Nach Kienitz-Gerloff.)



Fig. 87. *Scirpus lacustris*. a Stengel-  
querschnitt, b Blüte, c Staubgefäße,  
Fruchtknoten und Borsten, d Frucht  
mit Deckspelze, e reife Frucht, von  
den 6 Borsten umschlossen.

(Nach Garcke.)

satz zu dem der meisten echten Gräser *frei*, d. h. seine Schale nicht mit der Fruchtschale verwachsen. Keim vom Nährgewebe *eingeschlossen* (nicht wie bei den echten Gräsern an der Seite außen). Blüten zwitтерig oder eingeschlechtlich, in Ährchen, welche wieder zu Ähren, Köpfen oder Rispen zusammengestellt sind.

Grasähnliche Kräuter, einjährig oder meist durch einen unterirdischen Wurzelstock ausdauernd, aus dem einzeln oder büschelig die beblätterten oder blattlosen, oft scharf dreikantigen, knotenlosen und markhaltigen Halme entspringen. Blätter meist 3zeilig an den 3 Kanten des Halmes. Blattscheiden geschlossen.

<sup>1)</sup> Vergl. S. 258.

Die meisten Scheingräser sind schlechte Futterkräuter und kommen in der Regel auf *saueren* Wiesen vor.

Gattungen: 1. *Scirpus* (Name der Binse bei Terentius), *Binse* (Fig 86). Ährchen vielblütig, zu einfachen oder zusammengesetzten Blütenständen geordnet. Blüte zwittrig, in der Achsel einer Deckspelze, *ohne Vorspelze*. Blütenhülle (Perigon) aus sechs Borsten bestehend oder fehlend. Griffel am Grunde nicht oder wenig verdickt. Blätter scheidig, oft ohne Spreite.

Hierher *Scirpus caespitosus*, Rasen-Binse. 1—3 dm. Ährchen *einzel*n, *endständig*. Heidemoore, zerstreut. Rasen gelbgrün. *S. lacustris*, Teich-




Fig. 88. *Heleocharis uniglumis*.  
a Ähre, b, c Spelzen, d Staubgefäße, Fruchtknoten und verdickter Griffel, e Frucht (sogen. Nüsschen).  
(Nach Garcke.)



Fig. 89. *Eriophorum latifolium*.  
a Blühende Pflanze, b Blütenbüschel, c Blüte, d Staubgefäße und Fruchtknoten, freigelegt, e Fruchtblüschel, f einzelne Fruchthöhre, g Same mit den Wollhaaren, bei h ohne solche.  
(Nach Garcke.)

binse (Fig 87). 1—3 m hoch, im Wasser. Ährchen in doldenähnlichen Blütenständen (sog. Spirren). Halm stielrund, grasgrün. *S. silvaticus* und *radicans* mit großer, reich verzweigter Rispe, an feuchten Orten. 6—9 dm.

2. *Heleocharis* (ἑλος Sumpf und χάρις Huld, Zier), *Ried*. Wie *Scirpus*, aber *Griffel am Grunde verdickt*. *H. palustris* (*Scirpus palustris*), Sumpf-Ried. Ährchen *einzel*n, *endständig*, länglich-lineal. Unterste Spelze das Ährchen halb umfassend. In Sümpfen, große Flächen überziehend. ♀. Juni bis August. 1—6 dm. *H. uniglumis*, einbälziges Ried (Fig. 88). Ährchen eiförmig-länglich, unterste Spelze das Ährchen ganz umfassend, sonst wie vorige. ♀. Juni bis August. Trocken leicht gelb werdend.

**3. *Eriophorum*** (ἐρίοφορος; Wolle tragend), *Wollgras*. Wie *Scirpus*, aber Perigon aus zahlreichen, sich nach der Blüte verlängernden Fäden, die einen weissen *wolligen Schopf* bilden.




Fig. 90. *Carex*. A Grundriss (Diagramm) der männlichen Blüte, B der weiblichen. a Achse, b Tragblatt (Deckspelze) des Blütenzweiges, f Fruchtknoten, na Nebenachse, d. h. Achse 2. Ordnung, st die an ihr sitzende Deckspelze, das Tragblatt 2. Ordnung, welches an seinen Rändern verwächst und als sog. „Schlauch“ die Frucht umschleift, st Staubblätter. (Nach Kienitz-Gerloff.)

*E. vaginatum*, scheidiges Wollgras. Ährchen einzeln. Stengelblätter mit aufgeblasener Scheide. *E. polystachyum*, vielähriges W. Stengel rundlich, Stengelblätter rinnig. *E. latifolium*, breitblättriges W.; ähnlich. Stengel 3kantig, Stengelblätter flach (Fig. 89). Alle auf Moorbiesen.





Fig. 91. *Carex*. A Weibliche Blüte mit b Tragblatt (Deckspelze) des Blütenzweiges, s Schlauch (Tragblatt oder Deckspelze der Blüte), n Narben. — C Schematischer Aufriss derselben, a Achse, f Frucht, s Schlauch. — B Männliche Blüte, b Tragblatt (Deckspelze), st Staubgefäße. — D Schematischer Aufriss derselben. (Nach Kienitz-Gerloff.)

**4. *Carex*** (Pflanzenname bei Vergilius), *Segge*. Ährchen 1blütig, eingeschlechtlich, entweder eine einzige endständige oder mehrere Ähren bildend. Sind mehrere Ähren vorhanden, so sind gewöhnlich die obersten männlich, die unteren weiblich. Die männlichen Blüten bestehen nur aus 3 Staubgefäßen und sitzen unmittelbar in der Achsel der Deckspelze; die weiblichen bestehen nur aus einem Fruchtknoten mit 2 oder 3 Narben, sie sitzen nicht unmittelbar in der Achsel der Deckspelze, sondern es entspringt aus der Achsel der Deckspelze erst ein kurzer Zweig, welcher auf der innern Seite wieder eine Deckspelze (Tragblatt 2. Ordnung) trägt. Erst in der Achsel dieser sekundären Deckspelze steht die weibliche Blüte. Das sekundäre Tragblatt vergrößert sich und

umhüllt die Frucht als sogen. *Schlauch* (Fig. 90 und 91).

Hierher sehr viele Arten mit meist scharfen, schneidenden Blättern, daher meist als Futter ungeeignet, mit Ausnahme einiger Arten in den Alpen. Nach Ratzeburg soll *Carex vulpina* auf den Oderwiesen einigen Futterwert haben; überhaupt werden manche grössere Arten öfter im Heu mitgefressen, einzelne sehr langblättrige sogar zu Häcksel geschnitten.

Fig. 92. *Carex dioica*.

a Blühende männliche Ähre, b Blüte mit Deckspelze, c weibliche Ähre, d Blüte mit Deckspelze, e weibliche Ähre zur Fruchtzeit, f, g Früchtchen.  
(Nach Garcke.)



Fig. 93. *Carex arenaria*. a Blühende Pflanze mit dem lang kriechenden Wurzelstock, b fruchttragende Pflanze, c männliche Blüte mit Deckblatt, d Deckblatt der weiblichen Blüte, e weibliche Blüte, der sog. Schlauch mit geflügelten Rändern, aus dem die beiden Narben des im Schlauch sitzenden Fruchtknotens hervorschauen, f Schlauch zur Reifezeit (Scheinf Frucht), mit den geflügelten Kielen, g eigentliche Frucht, noch mit dem Griffel und dessen 2 Narben versehen, h dieselbe im Querschnitt, i letzterer vergrößert.

(Nach Reichenbach.)

Man teilt die außerordentlich zahlreichen Seggenarten, von denen wir nur einige vorführen können, folgendermaßen ein:

**A. Einährige Seggen.** Ein *einzelnes*, endständiges Ährchen, z. B. *Carex dioica* (Fig. 92), zweihäusige Segge. 10—20 cm.

**B. Gleichährige Seggen.** Mehrere Ährchen zu einer einfachen oder zusammengesetzten Ähre, seltener zu einer Rispe zusammengestellt, alle einander ziemlich gleich.



I. *Mit Ausläufern. Carex arenaria*, Sand-Segge (Fig. 93). Blühender Stengel 3kantig, oberwärts rauh, so lang wie die starren Blätter. 15—30 cm. hoch. Schläuche (Scheinfrüchte s. S. 306) breit geflügelt, gekielt. Eine der wichtigsten Pflanzen zur Befestigung des Flugsandes und der Dünen. Kommt am Meeresstrande und auf trockenem Sande des Binnenlandes von Ostfriesland bis Ostpreussen vor. In Mitteldeutschland seltener, in Süddeutschland fehlend. Die unterirdischen, sich mittelst einer pfriemlichen Spitze weiter bohrenden Stengel treten als grüne Büschel über die Erde, ein Seitentrieb setzt den unterirdischen Stengel fort, kommt wieder an die Oberfläche u. s. w. Dadurch entstehen sehr lange, bis 6 m erreichende „Scheinachsen“, die sich durch die schnurgerade angeordneten grünen Triebe über dem Boden bemerklich machen. Der unterirdische Stengel (Wurzelstock) riecht nach Terpentin. — Ähnlich: *C. ligérica*, die Loire-Segge, durch schlankere Stengel, schmälere Blätter und schmälere Flügel der Schläuche von voriger unterschieden, mit der sie oft zusammen vorkommt.

## II. Ohne Ausläufer, dicht rasenförmig.

### 1. Schläuche innen flach, außen gewölbt, sperrig abstehend.

*C. vulpina*, fuchsbraune Segge. Stengel sehr scharf 3kantig mit vertieften Seitenflächen. Ähre meist einfach, dick. Schläuche 6—7nervig. Feuchte Wiesen. 30—90 cm. — *C. muricata*, sperrfrüchtige Segge. Stengel mit ebenen Seitenflächen, nur oberwärts rauh. Viel feiner als vorige. Auch auf ziemlich trockenen Wiesen. 15—60 cm.

### 2. Schläuche beiderseits gewölbt, aufrecht.

*C. paradoxa*, abweichende Segge. Gelbgrün. Untere Scheiden von den faserigen Resten der vorjährigen Blätter umgeben (faserschopfig), glänzend schwarzbraun. Rispe dicht, länglich. Schläuche 9—11nervig. Moorwiesen. 3—6 dm.

*C. paniculata*, rispige Segge. Graugrün, kräftig. Untere Scheiden nicht zerfasernd, schwarzbraun. Rispe grofs und locker. Deckspelzen breit silberweifs berandet. Sehr rauh. Sumpfwiesen. 5—9 dm. Ähnlich: *C. teretiuscula*, rundliche Segge, aber Blätter viel schmaler. Ähre dicht. Torfsümpfe. 3—6 dm.

**C. Verschiedenährige Seggen.** Ährchen deutlich in ♂ und ♀ geschieden, meist die oberen ♂, die unteren ♀. Narben 2 oder 3.

## I. Narben 2.

### 1. Dichte feste Rasen bildend, mit langen Laubblättern. Blühender Stengel ganz am Grunde ohne Laubblätter, nur mit Blattscheiden.

*C. stricta*, steife Segge (Fig. 95). Graugrün oder dunkelgrün, kräftig. Alle Blattscheiden netzfaserig, hellgelbbraun. Sumpfige Wiesen,

in tiefen Sümpfen große Polster (Bülten) bildend und sie dadurch wegsam machend. 3—9 dm.

*C. caespitosa*, rasige Segge. Stengel schlaff. Nur die unteren, schwarzpurpurnen Scheiden netzfaserig. Blätter der nicht blühenden Triebe sehr lang. Fruchtbare, mäßig feuchte Wiesen. Ziemlich große, sehr dichte, durch ihre hellgrüne Farbe auffallende Rasen bildend. 3—5 dm.

2. Wie 1, aber blühender Stengel schon am Grunde mit Laubblättern.

*C. acuta* (*C. gracilis*), spitzkantige Segge. Meist grasgrün. Blätter breit linealisch, trocken meist am Rande rückwärts gerollt. Stengel weit herab rauh. Tragblatt des untersten ♀ Ährchens den Stengel überragend. ♂ Ährchen 2—4, die 3—5 ♀ meist überhängend. Sumpfwiesen, Gräben, Ufer. Bis 1 m. (Nicht zu verwechseln mit *C. acutiformis* [S. 310]).

*C. Goodenoughii* (*C. vulgaris*), gemeine Segge. Meist graugrün, kleiner als vorige. Stengel nur oben rauh. Blätter schmal. Tragblatt des untersten ♀ Ährchens kürzer als der Stengel. ♂ Ährchen meist 1, seltener 2, ♀ 2—4, aufrecht. Deckspelzen stumpf. Wiesen, Triften, Gräben.

## II. Narben 3.

1. Schläuche schnabellos oder kurz geschnäbelt.

*C. panicea*, hirseartige Segge. Mit Ausläufern. Stengel am Grunde beblättert, untere Scheiden braun. ♀ Ährchen meist 2, locker, oft wenigblütig. Schläuche sehr groß, kugelig-eiförmig, hirseartig. Feuchte Wiesen, Sumpfränder.

2. Schläuche mit kürzerem oder längerem 2-zähligem Schnabel.

a) Meist nur 1 ♂ Ährchen. Zähne des Schnabels gerade. Blattscheiden nicht netzfaserig.

*C. flava*, gelbe Segge. Gelbgrün. ♀ Ährchen 2—3, rundlich-eiförmig. Tragblatt des untersten weit abstehend. Schläuche wagerecht abstehend, aufgeblasen, mit zurückgekrümmtem Schnabel. Nasse, nicht torfige Wiesen. Auf sandigem Moorboden und in Heidemooren die var. *Oederi* mit geradem Schnabel.



Fig. 94. *Carex stricta*.  
a Junge blühende Pflanze, b fruchttragender Halm, c männliche Blüte mit Deckspelze (Tragblatt), d Frucht.  
(Nach Garcke.)

b) ♂ *Ährchen meist mehrere*. Zähne des Schnabels linealisch zugespitzt, *von einander abstehend*. Blätter und besonders Blattscheiden meist mit sehr entwickelten Quernerven, dadurch *gitterartig*.

a) *Rasenförmig*. (♂ Ährchen nur 1.) *C. Pseudo-Cyperus*, cypergrasähnliche Segge. Zuletzt gelbgrün. ♀ Ährchen 3—6, lang gestielt, zuletzt *hängend*. Stümpfe, Gräben, Ufer.

β) *Mit Ausläufern*.

1. Schläuche länger als die stumpflichen Deckspelzen, hellgrün. Untere Scheiden netzfaserig.

*C. rostrata (C. ampullacea)*, geschnäbelte oder Flaschen-Segge. Graugrün. Stengel *stumpfkantig*. ♀ Ährchen 2—3. Schläuche *fast kugelig, aufgeblasen*, plötzlich in einen ziemlich langen Schnabel verschmälert, *horizontal abstehend*. Heidemoore, Gräben und moorige Ufer. 30—60 cm.

*C. vesicaria*, Blasen-Segge. Grasgrün. Stengel *scharfkantig*. Schläuche *ei-kegelförmig*, allmählich in einen mäsig langen Schnabel verschmälert, meist *schief abstehend*, sonst wie vorige. Gräben, Stümpfe, Ufer, nasse Wiesen, sowohl auf Moor- als auf humosem Boden. 30—60 cm.

2. Schläuche wenig länger oder kürzer als die zugespitzten Deckspelzen, olivengrün. Die Pflanzen graugrün.

*C. acutiformis (C. paludosa)*, Sumpf-Segge. Scheiden netzfaserig. Stengel scharfkantig. Schläuche nicht aufgeblasen, eiförmig, zusammengedrückt. 3—9 dm. Sumpfwiesen, Ufer, Gräben. Von *C. acuta (C. gracilis)* durch die dicken ♂ Ährchen, die drei Narben, den 2zähligen Schnabel und das Fasernetz unterschieden. (S. vorige S.)

*C. riparia*, Ufer-Segge. Die *größte und kräftigste deutsche Art*. 6—12 dm hoch. Durch die breiten, stark gegitterten Blätter und Blattscheiden leicht auffallend. Blattscheiden meist nicht netzfaserig, die unteren Deckspelzen der ♂ Ährchen stachelspitz, sonst wie vorige.

*C. hirta*, kurzhaarige Segge. Grasgrün. Blätter und Blattscheiden undeutlich gegittert, wie die Schläuche mehr oder weniger *behaart*. Wiesen, feuchte, aber auch trockene Sandstellen. 2—6 dm.

## Kapitel VI.

### Bau, Entwicklung und Systematik der Hülsefrüchte (Leguminosae).

#### A. Bau und Entwicklung.

##### § 64.

**Allgemeines.** Blüten oft median-zygomorph (jochgestaltig), d. h. gleich dem menschlichen Körper nur durch eine Ebene von vorn nach hinten in 2 symmetrische Hälften zu teilen. Nach der 5-Zahl gebaut, Kelch 5 zählig oder 2lippig, Blumenblätter 5, Staubgefäße  $2 \times 5 = 10$  (oder mehr). Fruchtknoten einfächerig, aus einem *ein-sigen* (wie ein Bogen Papier) zusammengefalteten Fruchtblatt gebildet, das an der Bauchnaht, d. h. in der Blüte an der Innenseite, die Samen trägt, welche man als verdickte, einwärts geschlagene Blattzähne ansehen kann. Die Frucht (Hülse) springt in zwei Klappen auf, indem sich das Fruchtblatt an seiner Rückennaht und an der Bauchnaht teilt (wie ein Buch, dessen Rücken zerreißt). Eine Scheidewand, wie bei den *Schoten* der Cruciferae, Kreuzblütler, ist gewöhnlich nicht vorhanden. Blüten stets *seitlich*. Blätter fast immer zusammengesetzt.

Die Leguminosen zerfallen in drei Unterfamilien, die man früher als eigene Familien ansah: *Papilionatae*, *Caesalpinioideae* und *Mimosoideae*, von denen nur die *ersten* sog. *Schmetterlingsblüten* besitzen und für uns in Betracht kommen, da unsere Kleegeewäschs und Hülsefrüchte alle zu ihnen gehören.



Fig. 95. Grundriss der Papilionaten-Blüte.

a Achse, d Deckblatt,

f Fahne, fl Flügel,

sch Schiffchen.

9 Staubfäden verwachsen, das 10. hintere frei.

(Nach Kienitz-Gleroff.)

##### § 65.

Unterfamilie **Papilionatae**, *Schmetterlingsblütler*, früher als eigene Familie *Papilionaceae* (Fig. 95). Kelch 5 zählig, röhrig, zuweilen 2lippig, Kronenblätter 5, das hintere meist aufrechte heisst *Fahne* (vexillum) und deckt in der Knospe die zwei seitlichen, die *Flügel* (alae), und diese wieder die beiden vorderen, meist zu einem kahnförmigen Gebilde, dem *Schiffchen* oder Kiel (carina) verwachsenen (sog. absteigende Deckung). Die 10 Staubfäden (nicht die

Beutel) sind bei einigen (meist honiglosen) *alle* zu einer Röhre verwachsen (1brüderig), bei den meisten aber ist der hintere Staubfaden frei und deckt den Schlitz, welchen die Röhre der 9 übrigen hinten infolgedessen aufweist (2brüderig). Fruchtknoten von der Staubfadenröhre eingeschlossen, Griffel meist vorragend, Frucht eine Hülse (siehe oben), seltener durch Querwände geteilt (Gliederhülse, bei *Serradella*) oder quer aufspringende Kapsel (Rotklee).

### § 66.

**Bau des Samens, Keimung und Entwicklung** (Fig. 96). Im Gegensatz zu den Gräsern ist der Keimling im Samen sehr groß und




Fig. 96. Same der Pferdebohne, nach Nobbe. *a* Von außen, *α* Lage des Würzelchens, *β* Nabel, *γ* Mikropyle (Keimmund); *ε* Same im Längsschnitt, *α* Samentasche, *β* Würzelchen, *γ* Federchen (Plumula), *η* Keimblatt, *δ*, *ε* Samenschale.




Fig. 97. Keimende Luzerne, nach Nobbe. *a* Keimblätter (Kotyledonen), *b* hypokotyles Stengelglied, an der Spitze gewunden, *c* Würzelchen mit Wurzelhaaren, *d* Wurzelhaube.

nimmt mit seinen beiden großen Keimblättern fast den ganzen Raum ein, so daß für Nährgewebe (Endosperm) meist kein Platz bleibt, dafür sind aber die Keimblätter selbst mit Stärkemehl und Eiweißstoffen (Protein) erfüllt. Die beiden Hälften einer Bohne oder Erbse sind die Keimblätter. Die Plumula und die Radicula liegen zwischen ihnen und sind nur klein.

Bei der Keimung (Fig. 97) tritt zuerst das Würzelchen aus der Mikropyle oder dem Keimmund, welchen man z. B. bei der weißen Bohne als einen Nadelstich neben dem Nabel erkennt, hervor, dann erst folgt das Knöspchen, die Plumula, und streckt die beiden Keimblätter wie bei den meisten Pflanzen bald *über* die Erde. Bei der ganzen Gruppe der

*Wicken, Erbsen* etc. (Viciae) bleiben sie aber *unter* der Erde, ebenso bei der Feuerbohne.

Manche Samen von Hülsenfrüchten, besonders von wildwachsenden, keimen schwer, weil ihre Schale so hart ist, daß sie kein Wasser durchläßt, so z. B. der wilde *Lathyrus silvester* und selbst manche Rotklee-samen. Durch Ritzen kann man die Wasseraufnahme beschleunigen, und dann keimen sie leichter. Auch durch längere Kultur werden sie durchlässiger.

### § 67.

**Bau der Wurzel, Wurzelknöllchen, Impfung.** Die Hülsenfrüchte haben, wie die meisten

Dikotyledonen, eine Haupt- oder Pfahlwurzel und viele Seitenwurzeln. Was sie aber besonders auszeichnet, sind die *Wurzelknöllchen* (Fig. 98). Diese nehmen aus dem Rindengewebe der Wurzel ihren Ursprung und sind den Gallbildungen zu vergleichen. Sie werden erzeugt durch einen Spaltpilz (*Rhizobium leguminosarum*, synonym *Bacillus radicicolum*). Die Gestalt ist nach den Gattungen verschieden. Bei den Lupinen bilden sie große, kugelige oder kropfartige Gebilde an der Hauptwurzel, bei vielen andern sitzen sie mehr an den Seitenwurzeln und sind

kleiner, oval oder spindelförmig. Bei *Wicken* und *Serradella* etc. sind sie gelappt. Diese Gallen sind reich mit der stickstoffreichen Substanz der Bakterien erfüllt, die von der Pflanze zur Fruchtbildung aus ihnen entnommen wird. Zur Fruchtzeit sind die Knöllchen daher meist leer, einzelne Bakterien finden sich aber doch noch darin; diese gelangen bei Verwesung der Knöllchen wieder in den Erdboden, wo sie neue Wurzeln infizieren können.




Fig. 98. Wurzelknöllchen der Leguminosen.  
1. *Vicia silvatica*. 2. *Melilotus officinalis*. 3. Einzelne  
Knöllchen von *Melilotus officinalis*, vergrößert.

**Impfung.** Durch Unterhacken von wenig Erde eines Feldes, auf dem Saubohnen gestanden, hat man andere Felder, auf denen Saubohnen nicht wachsen wollten, zu großer Fruchtbarkeit gebracht. Offenbar waren die Wurzelbakterien mit der Erde dem letztgedachten Felde eingimpft worden. Ähnlich bei Lupinen, Klee u. s. w. In neuester Zeit sind die Bakterien der Wurzelknöllchen von Nobbe und Hiltner künstlich gezüchtet worden und werden unter dem Namen *Nitragin* von den Farbwerken in Höchst a. M. in den Handel gebracht.

Die lange bekannte Tatsache, daß die Leguminosen Stickstoffsammler sind, findet durch das freundschaftliche Zusammenleben (Symbiose) dieses Pilzes mit ihnen eine gewisse Erklärung.

### § 68.

**Bau des Stengels und der Blätter.** Der Stengel ist wie der der meisten Dikotyledonen gebaut, d. h. im Innern findet sich das Mark, dann folgt das Holz, darauf ein Kambiumring (die Neubildungsschicht) und dann der Bast. Außen findet sich als Analogon des Markes die innere Rinde und dann folgt schließlich die Oberhaut. Der ganz jugendliche Stengel besteht nur aus Grundgewebe (das später noch als Mark und innere Rinde vorhanden ist). Da aber die Gefäßbündel (Adern) der Blätter sich auch rückwärts in dem Stengel hinunterziehen, entstehen die festeren Teile. Oft verschwindet schließlich das Mark, dann wird der Stengel hohl. Mehrjährige Schmetterlingsblütler zeigen wie alle Dikotyledonen in ihrem Stamme Jahresringe, oft auch sog. falsche Jahresringe.

Die *Blätter* der Papilionatae sind meist zusammengesetzt, entweder 3zählig, d. h. aus 3 Blättchen gebildet, wie beim Klee und den Gartenbohnen, *Phaseolus vulgaris*, oder gefiedert. Wenn letzteres, so ist oft ein Endblättchen vorhanden (unpaarig gefiedert); fehlt es (paarig gefiedert, Erbsen, Wicken etc.), dann bilden sich die Mittelnerven der 2 obersten Blättchen gewöhnlich zu Ranken um, oder der Hauptstiel zu einer Stachelspitze.

Wie bei den meisten Dikotyledonen sind die Blätter netzaderig. Viele Leguminosen haben (sehr deutlich die Gartenbohne) an der Basis der einzelnen Blättchen ein Gelenk, dessen Zellen sich je nach den Tageszeiten auf einer Seite des Stielchens mehr mit Wasser füllen, so daß das Gelenk aufwärts oder abwärts gekrümmt wird. Hierdurch wird der Schlaf mancher Blätter, die Tag- und Nachtstellung, hervorgerufen. Es gibt übrigens auch viele Laubblätter ohne Gelenke, welche in der Nacht eine Schlafstellung annehmen. Da kommen die Bewegungen durch einseitiges Wachstum zu stande.

### § 69.

**Bestäubung.** Die Bestäubung erfolgt meist mit Hilfe von Insekten, und die meisten haben deswegen schön gefärbte Blüten („Blumen“). Das Schiffchen

schützt die in ihm liegenden Geschlechtswerkzeuge gegen Regen und unberufene Blumengäste. Der Honig wird bei den honigliefernden Arten auf den Innenseiten der vereinigten Staubfadenbasen abgesondert und in einem ringförmigen Hohlraum zwischen Staubblattzylinder und Fruchtknoten angesammelt. Dort findet sich links und rechts von der Basis des oberen freien Staubfadens, der den Schlitz der Röhre sonst bedeckt, je eine ovale Spalte (Saftlöcher), in welche die Insekten ihren Rüssel stecken müssen. Bei honiglosen Schmetterlingsblütlern




Fig. 99. *Melilotus officinalis*. *a* Blüte von der Seite, *b* Flügel und Schiffchen, *c* Schiffchen, *d* Staubfadenröhre, *e* Fruchtknoten, *f* Fahne, Schiffchen und Flügel entfernt.

sind diese Saftlöcher unnütz, und gewöhnlich verwächst dann der 10. Staubfaden mit den übrigen 9, die sonst eine oberseits aufgeschlitzte Röhre darstellen, zu einer geschlossenen Röhre. Hauptsächlich sind bei uns Bienen und Hummeln (siehe unten beim Klee) die Bestäuber. Insekten, welche einen zu kurzen Rüssel haben, pflegen durch Zerbeißen der Blüte am Grunde den Honig zu rauben. Die normale Einsatzstelle für den Insektenrüssel wird oft durch ein auffallend gefärbtes „Saftmal“ an der Fahne, die man als Schauapparat, Wirtshausschild, ansieht, bezeichnet. Das Insekt setzt sich meist auf Schiffchen oder Flügel oder



auf beides, drückt durch sein Gewicht das Schiffchen hinunter und bestäubt seine Unterseite mit Blütenstaub. Flügel und Schiffchen sind meist gelenkartig verbunden, indem eine Aussackung des Flügelgrundes in eine entsprechende Vertiefung des Schiffchens eingreift, sodaß eine Art Winkelhebel entsteht.

Die *Ausstreuvorrichtung des Pollens* ist verschieden (Einteilung nach Loew).

1. *Klappvorrichtung*. Hier treten beim Niederdrücken des Schiffchens die Antheren (Staubbeutel) an den Leib des Insektes, und die Blumenteile klappen nach erfolgtem Besuch wieder in ihre frühere Lage zurück. So bei *Trifolium pratense*, *Mellilotus officinalis* (Fig. 99), Goldregen etc.




Fig. 100. *Anthyllus vulneraria*, Wundklee.  
a Blüte von der Seite, b nach Entfernung des aufgeblasenen Kelches, c Flügel, d Schiffchen und 1 Flügel, e Staubfadenröhre in der Blütezeit, f Fruchtknoten.

### 2. *Pumpenvorrichtung*.

Das Schiffchen bildet an der Spitze einen Hohlkegel, in dessen Basis die frühzeitig aufspringenden 5 äußeren großen Staubbeutel hineinragen, sodaß sein oberer Teil sich mit Pollen füllt; die fünf inneren kleinen Staubbeutel mit verdickten Fäden wirken als Kolben und pressen beim Niederdrücken des Schiffchens den Blütenstaub in Form einer Nudel aus der Schiffchenspitze. Bei stärkerem Druck tritt auch die Narbe heraus. So *Lotus corniculatus*, *Anthyllus vulneraria* (Fig. 100), *Lupinus*, *Ononis spinosa* (bei letzterer Vorrichtung 2 + 1 vereinigt).

### 3. *Explosionsvorrichtung*.

Die sehr elastische Staubfadenröhre wird im Schiffchen durch eine Hemmungsvorrichtung in Spannung erhalten. Sobald das Schiffchen niedergedrückt

wird, schnellt der Geschlechtsapparat hervor, wobei die Narbe mit dem Körper des Besuchers in Berührung kommt und kurz darauf auch lockerer Blütenstaub gegen das Insekt geschleudert wird. Ein Zurückkehren der Geschlechtsteile in ihre frühere Lage findet hier nicht statt, sodaß ein einmaliger Insektenbesuch ausreichen muß. Beispiele: *Medicago sativa*, Luzerne (Fig. 101), *M. falcata*, *Genista anglica*, *G. tinctoria*.

4. *Bürstenvorrichtung*. Der Griffel trägt am oberen Ende dicht unterhalb der Narbe einen einseitigen Haarbesatz, an und über welchem in der ihn

umschließenden Schiffchenspitze sich Pollen ansammelt. Bei Abwärtsbewegung von Flügel und Schiffchen tritt die Griffelbürste hervor und fegt portionenweise




Fig. 101. *Medicago sativa*, blaue Luzerne. *a* Blüte von der Seite, *c* von vorn, Staubfadenröhre noch im Schiffchen; *b* Blüte von vorn, mit der hervorgeschnellten, gegen die Fahne gekrümmten Staubfadenröhre, *d* letztere von der Seite.

Blütenstaub hinaus. Beispiele: *Vicia Cracca*, *V. sepium*, *V. Faba* (Fig. 102), *Pisum* (letztere vereinigt Pumpen- und Bürstenvorrichtung und ist selbstbefruchtend),



Fig. 102. *Vicia faba*. Fruchtknoten und Griffel, an letzterem der als Bürste dienende, auf der äußeren Seite befindliche Bart.

*Lathyrus* (Fig. 103), *Phaseolus vulgaris* (Bohne); bei letzteren beiden tritt die Bürste schief hervor, und der Pollen wird nicht an der Bauchseite des Insekts, sondern an dessen linker oder rechter Seite abgesetzt.

## B. Systematik.

## § 70.

**Systematische Übersicht der Papilionatae.** (Nach Engler und Prantl, „Natürliche Pflanzenfamilien“.)

*I. Keimblätter meist flach, über die Erde tretend.*

**Tribus 1. *Sophoreae*.** Staubfäden frei, nicht verwachsen. Blätter gefiedert. Ausländer. *Sophora japonica*, Zierstrauch.




Fig. 103. *Lathyrus pratensis*, Wiesen-Platterbse. *a* Blüte von der Seite, *b* nach Entfernung von Kelch und Fahne, *c* Schiffchen, *d* Staubfädenröhre und Griffel, *e* Fruchtknoten mit Griffel und seiner Bürste, *f* Pollenkorn, *g, g* Pollen, Schläuche treibend.

**Tribus 2. *Podalyrieae*.** Ebenso. Blätter einfach oder gefingert. Ausländer.

**Tribus 3. *Genisteae*.** Alle 10 Staubfäden zu einer Röhre verwachsen. Blätter mit 3 ganzrandigen Blättchen.

**Tribus 4. *Trifolieae*.** Hinterer Staubfaden frei (ausgenommen *Ononis*). Blätter mit 3 gezähnelten Blättchen.

Tribus 5. *Lóteae*. Hinterer Staubfaden frei (ausgenommen *Anthyllis* vor der Blüte). Blätter mit 3 ganzrandigen Blättchen.

Tribus 6. *Galégeae*. Hinterer Staubfaden frei (ausgenommen *Galega*). Blätter unpaarig gefiedert, ohne Ranken.

Tribus 7. *Hedysáreae*. Ebenso. Blätter wie vorige; Hülse aber quer gefächert und meist in Glieder zerfallend.

## II. Keimblätter dick, unter der Erde bleibend.

Tribus 8. *Vicieae*. Ebenso. Blätter paarig gefiedert, mit Ranken. Hülse wie gewöhnlich, einfächerig.

## III. Keimblätter dick und fleischig, meist über die Erde tretend.

Tribus 9. *Phaseóleae*. Ebenso. Blätter mit 3 ganzrandigen Blättchen. Stengel meist windend.

## §§ 71 bis 78.

### Beschreibung der wichtigsten Arten.

#### § 71.

Tribus 3. *Genistaeae*. *Staubfäden 1brüderig* (alle 10 zu einer Röhre verwachsen), *Flügel der Blumenkrone am oberen Rande faltig-runzelig*. Blätter mit 3 ganzrandigen Blättchen.

(Gattung) *Ulex* (bei Plinius Name eines Strauches). Kelch 2lippig, Hülse gedunsen. (Art) *U. europaeus*, Stech- oder Stachelginster. Blätter pfriemlich-linealisch, mit stark stechender Spitze. Blüten klein, gelb, ihr Tragblatt so lang als der Blütenstiel. Als immergrünes Viehfutter empfohlen, aber wegen der vielen Stacheln kaum bei uns verwendbar; verlangt Seeklima, wintert sonst leicht aus. ♀. Mai, Juni.

*Sarothamnus* (σάρος Besen und θάμνος Strauch). Kelch 2lippig, Griffel sehr lang, uhrfederartig aufgerollt. *S. scoparius*, *Besempfriemen*. Strauch oft fast baumartig. Äste grün, rutenförmig, kantig. Blüten groß, gelb. Sandige Hügel und Wälder, besonders im nordwestlichen Deutschland. ♀. 5–6. Die Ruten zu Besen verwandt, als sog. Brambesen, geben auch gute Vieh-Streu, was bei Separationen beachtenswert ist. In der Priegnitz wird das Holz nach Ascherson und Graebner als Brennholz geschätzt.

*Genista* (Pflanzenname bei Vergilius), *Ginster*. Griffel pfriemlich, aufsteigend, Narbe schief. Wichtigste Art: *G. tinctoria*, *Färber-Ginster*. Stengel dornenlos, Blätter meist einfach, nicht zu 3, indem die beiden seitlichen fehlen, länglich oder elliptisch, am Rande weichhaarig; *Blüten gelb*, in *endständigen Trauben*, *Blumenkrone und die lineal-länglichen Hülsen kahl*. Kleiner Strauch, trockene Wiesen, Felder, Wälder.

*Lupinus* (Name bei den Römern, welche sie schon als bodenverbessernd kannten), *Lupine*, *Wolfsbohne*. Kelch 2lippig, Flügel an der Spitze verwachsen, Schiffchen geschnäbelt. Griffel pfriemlich, Narbe kopfig, Hülse lederartig, mit schwammigen Querwänden. Blätter meist *gefingert*.

A. Blüten in endständiger, langer Traube, quirlig, sitzend, in der Knospe mit Deckblättchen versehen.

*L. luteus*, gelbe Lupine. Dicht behaart, Blättchen länglich bis lanzettlich. Oberlippe des Kelches 2teilig, Unterlippe 3zählig. Blüten gelb, wohlriechend, 0,30–1 m. Same platt, weiß mit schwarzbraunen Flecken. ☉. Stammt aus Südeuropa und wird jetzt auf sandigem Boden im großen gebaut. Bekanntlich einer der besten Stickstoffsammler. Hauptwurzel spindelförmig, mit großen Wurzelknöllchen. Meidet Kalkboden.

Ändert ab: b) *leucospermus*, Same ganz weiß.

c) *melanospermus*, sibirische Lupine, Same ganz schwarz.

B. Blüten in endständiger, kurzer Traube, wechselständig, gestielt. Deckblattlos.

*L. angustifolius*, blaue Lupine. Angedrückt-behaart. Blättchen linealisch. Oberlippe des Kelches 2spaltig, Unterlippe fast 3spaltig. Blumen blau. 0,30 bis 1,25 m. Auf Sand- und mergeligem Boden gebaut. Samen dick, eiförmig, blaugrau mit braunen Punkten. Ebenfalls trefflicher Stickstoffsammler, nicht solcher Kalkfeind wie die gelbe.

Ändert ab: b) *diploleucus*, doppelte Lupine, ostpreussische weiße Lupine, oder einfach *weiße Lupine* genannt. Blüten und Samen weiß. Nicht zu verwechseln mit der südeuropäischen echten, weißen Lupine, *L. albus*, die viel größere, fast 4 eckige, platte Samen hat.

Verwandt ist *L. hirsutus* mit blauen Blüten. Mittelmeergebiet.

Aus Amerika stammen viele Gartenlupinen und auch die als Wildfutter gebaute perennierende Lupine *L. polyphyllus* aus Kalifornien, mit sehr langen blauen Trauben.

Die Samen aller Lupinen enthalten bekanntlich mehr oder weniger Bitterstoff (Lupinin), der bei Schafen Lupinose (Gelbsucht) hervorrufen kann. — Auch die Samen des Goldregens sind giftig.

## § 72.

Tribus 4. **Trifolieae.** Kleegevächse. Staubfäden 2brüderig (9 + 1), (mit Ausnahme von *Ononis*), Blätter 3zählig (ausgenommen *Trifolium* *Lupinaster* und *Lotus*), mit gezähnelten Blättchen.

*Ononis* (ὄνυξ, Pflanzennamen bei Dioskorides), *Hauhechel*. Kelch zur Fruchtzeit offen. Staubfäden alle 10 verwachsen, Schiffchen pfriemlich geschnäbelt, Hülse aufgeblasen.

Wichtigste Art: *O. spinosa*, dornige *Hauhechel*. Stengel aufrecht oder aufstrebend, von 1–2reihigen Haaren zottig und zerstreut-drüsenhaarig; Äste dornig, Dornen meist zu 2, Blättchen eiförmig-länglich, gezähnt, ziemlich kahl; Blüten blattwinkelständig, einzeln oder zu zweien, rosenrot. Hülsen eiförmig, so lang oder länger als der Kelch. 4. Triften, Wege, Wiesen. Juni, Juli. 30–60 cm. Im Heu wegen der Dornen sehr unangenehm und deshalb auszurotten; namentlich häufig auf den Wiesen in den Dünentälern.

**Medicago** (medicus medisch, agere führen, die Luzerne ward aus Medien eingeführt), Schneckenklee. Schiffchen stumpf; Staubfädenröhre nach Berührung elastisch aufwärts schnellend, sich der Fahne anlegend (siehe Bestäubung S. 316), und vielleicht dadurch Anlaß zur Schneckenform der in ihr liegenden jungen Hülse gebend. *Hülse nierenförmig, sichelförmig oder schneckenförmig gewunden*. 1- bis vielsamig.

a) *Trauben reichblütig, Hülsen dornenlos.*

*M. sativa*, *Luzerne* (Fig. 101 u. 104). Wurzelstock vielköpfig. Stengel aufrecht. Nebenblätter aus eilanzettlichem Grunde pfriemlich. Blättchen



Fig. 104. *Medicago sativa*.  
a Blüte, längs durchschnitten,  
b, c Hülsen.  
(Nach Garcke.)



Fig. 105. *Medicago falcata*.  
Oben rechts Blüte,  
links Hülse.  
(Nach Stebler und Schröter.)

vorn gezähnt, die der unteren Blätter länglich-verkehrt-eiförmig, die der oberen linealisch-keilig. *Trauben länglich*. Blüten 7 bis 11 mm lang. Hülsen zu einer *lockeren Spirale* zusammengerollt. *Windungen 2—3, im Mittelpunkt offen*. ♀. Juni bis September. Blumenkrone bläulich oder violett. 0,3—0,9 m. Standort: Milder, humoser Lehm- und Tonboden, mergeliger Boden. Viele (20—30) Jahre dauernd, widersteht wegen ihrer bis 3 m und mehr tief gehenden Wurzeln gut der Trockenheit. Außerordentlich wichtige Futterpflanze.

Same 2—3 mm lang, ei- bis bohnenförmig, wenig gekrümmt, gelb. Würzelchen halb so lang als die Keimblätter.

*M. falcata*, Sichelklee, sichelfrüchtige Luzerne (Fig. 105). Stengel niederliegend oder aufsteigend. *Hülsen* nur eine halbe Windung machend, daher *sichelförmig gebogen*, selten eine ganze Windung oder ganz gerade. *Blumen gelb*, sonst wie vorige. ♀. Trockene Wiesen, gern auf Lehm. Juni bis September. Same nicht im Handel.

*M. media* (*M. varia*, *M. falcata* × *sativa*), Sandluzerne. Natürlicher Bastard zwischen 1. und 2. Blumenkrone anfangs gelb, dann grasgrün, zuletzt bläulich oder braun, mitunter anfangs blaßgelb und dann bläulich, zuweilen auch von Anfang an blau. *Hülsen meist mit  $1\frac{1}{2}$ —2 Windungen*, doch auch  $\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ . ♀.

Wird auf leichterem Boden als die eigentliche Luzerne gebaut. Der Same entwickelt sich sparsam, sieht oft verschrumpft aus und ist meist teurer als der der gewöhnlichen Luzerne.



Fig. 106. *Medicago lupulina*.  
(Nach Stebler und Schröter.)

*M. lupulina*, Hopfenluzerne, Hopfenklee, Gelbklee (Fig. 106). Stengel ausgebreitet, ästig. Blättchen vorn gezähnt, verkehrt-eiförmig-keilig, die der obersten Blätter schmaler. *Trauben ährig-kopfförmig*. Blüten nur  $1\frac{1}{2}$ —3 mm lang, goldgelb. Fruchtstand einem Hopfenzapfen ähnlich. Hülsen nierenförmig, netzaderig, gedunsen, im Mittelpunkt geschlossen, reif schwarz. ♂ und oft ♀. Wiesen. — Viel in Klee-grasgemengen, auch auf Moorbiesen gebaut. Same kleiner als Luzernesamen, rundlich-

oval mit *vorragender Spitze* des Würzelchens, mitunter als Verfälschung des Luzernesamens. 15—60 cm.

b) *Trauben wenigblütig. Hülsen stachelig.*

*M. minima*, kleinster Schneckenklee. Dicht zottig. Hülsen fast aderlos, mit 5 Windungen, am Rande mit 2 Reihen hakiger Stacheln. ♂. Trockene Hügel, stellenweise. Blüten gelb. 10—30 cm.

Bemerkung. Viele mit dornigen Hülsen versehene Arten, wie *M. hispida*, *arabica* etc. kommen zum Teil als „Wollkletten“ in überseeischer Wolle vor; ihre Samen werden in den Wollwäschereien gewonnen und dienen mitunter zur *Verfälschung der echten Luzerne*. Diese Samen unterscheiden sich meist durch ihre *größere Länge*, ein *längeres*

*Wurzelchen* und oft (durch die Behandlung der Wolle) *schwärzliche Farbe*. Da sie alle einjährig sind und gelb blühen, würde ihr Zusatz leicht bemerkt werden, wenn man nicht die Keimkraft der Samen absichtlich durch Dörren tötete! Jetzt kommen sie wenig mehr vor. — Ursprünglich stammen diese Arten meist aus Südeuropa, ihre Früchte sind aber mit den Schafen über das Meer gewandert und kehren nun als Wollkletten zurück.

*Mellótus* (μέλι Honig und λωτός eine Kleeart), *Steinklee*. Blüten klein, bei unseren Arten in *langen* gestielten Trauben; Schiffchen stumpf, Hülse



Fig. 107. *Melilotus officinalis*.  
a Fahne, b Flügel, c Schiffchen,  
d Kelch mit Staubgefäßen,  
e unreife, f reife Frucht.  
(Nach Garcke.)



Fig. 108. *Trifolium pratense*.  
a Kelch, b Blüte, c Blumenkrone,  
aufgeschnitten, d Fruchtknoten,  
e Fruchtkelch mit Hülse, f Same,  
Querschnitt.  
(Nach Garcke.)

sehr kurz, fast kugelig, meist einsamig, unvollkommen aufspringend. Nebenblätter am Grunde mit dem Blattstiel verwachsen.

*M. officinalis*, *gebräuchlicher Steinklee* (Fig. 107). Stengel aufsteigend. Nebenblätter pfriemlich-borstlich, ganzrandig. Trauben dünn, locker, gelb. Flügel so lang als die Fahne, *länger* als das Schiffchen. Hülsen eiförmig, stumpf, stachelspitz, querfaltig, wenig netzig-runzelig, *kahl*, reif gelbbraun. ☉. Ackerränder, Wege, Triften, gern auf *Lehm*. Juli bis September. 0,5—1 m.

*M. altissimus* (*M. macrorrhizus*), hoher oder langwurzeliger Steinklee. Trauben dicker, dichter. Flügel und Schiffchen so lang als die



Fahne. Hülsen zugespitzt, deutlich netzig-runzelig, reif schwarz, weichhaarig. Sonst wie voriger. Wiesen, an Gräben, gern auf *Salzboden*. Blume dunkler, goldgelb, Fahne braun gestreift. ☉. 6—12 dm.

*M. albus*, *weißer Steinklee*, Bokharaklee. Stengel aufrecht. *Blumen weiß*. Hülsen stumpf, stachelspitz, *netzig-runzelig*, *kahl*. ☉. Besonders auf Lehm und lehmigem Sand. 1—2 m hoch. Wächst bei uns überall wild, kommt nicht aus der Bucharei. Verdient wegen seines nach dem Trocknen übermächtig starken Geruchs nach Cumarin, der auch den beiden vorigen eigen, und seiner harten Stengel nicht die ihm gewordenen Empfehlungen.

### § 73.

#### Trifolieen. (Fortsetzung.)

*Trifolium* (schon bei Plinius; von tres drei und folium Blatt). Blumenkrone *verwelkend*, *bleibend*, die eiförmige, 1- bis 4samige, *kaum oder unregelmäßig aufspringende Hülse* einschließend. Staubfadenbündel *mit der Blumentröhre* mehr oder weniger *verwachsen*. *Nebenblätter am Grunde mit dem Blattstiel verwachsen*. Blüten in *köpfchenartigen Ähren* oder Trauben.

#### A. Die einzelnen Blüten sitzend.

a) Kelchschlund innen mit einer schwieligen Leiste oder einem Haarkranz.

1. Kelchröhre außen *weichhaarig* oder *sottig*.

*T. pratense*, *Wiesenklee*, *Rotklee* (Fig. 108). Wurzelstock vielköpfig. Hauptachse kurz, nie blühend, eine bodenständige Laubrosette tragend. Stengel aufsteigend, kantig, nicht hohl, angedrückt behaart, aus den Achseln der untersten Laubblätter entspringend und in der Achsel des obersten Blattes oder der beiden obersten Blätter Blütenköpfe tragend. Nebenblätter eiförmig, im freien Teil *dreieckig*, *plötzlich in eine Granne übergehend*, mit 7—9 sich gabelnden, grünen Längsadern, Blättchen *elliptisch oder eiförmig*, gewimpert, unterseits behaart, jedes Haar auf 1 Würzchen. Köpfchen kugelig, oft zu 2, meist von kurz gestielten Blättern umhüllt; das oberste scheinbar endständig. Kelchröhre weiß, mit 10 grünen Nerven, Kelchzähne 5, fadenförmig, der unterste fast doppelt länger. Kelchschlund mit Haarkranz. Blume meist purpurn. Flügel und Schiffchen kürzer als die Fahne, alle Blumenblätter mit ihren Stielen und 9 Staubfäden zu einer langen Röhre verwachsen. Die Flügel haben am Ende des Stiels einen rückwärts gerichteten Haken, der gelenkartig über das Schiffchen greift (wie bei *Melilotus* S. 315, Fig. 99, b). Bestäubung meist durch Hummeln. Fruchtknoten mit 2 Samenanlagen, von denen sich nur eine entwickelt. Griffel kurz. Hülse eiförmig, mit dem hakigen Griffelrest gekrönt, nicht mit 2 Klappen aufspringend. Der obere Teil der Hülse bildet ein glattes, pergamentartiges Käppchen (Deckel), der untere, größere, ein runzeliges, dünnhäutiges Becherchen, das unregelmäßig zerreißt, wenn

der Deckel nicht abfällt. Same länglich-rund, etwas flach, oft fast beilförmig wegen des an einer Kante liegenden vorragenden Würzelchens, das die halbe Länge der Keimblätter hat. Farbe des Samens gelb oder rötlich, oft violett. Nach Preyer sind die gelben Samen die besten.

Wild in fast ganz Europa und im westlichen und mittleren Asien; in Amerika eingeführt, aber verwildert. In den Alpen (in einer weisblütigen alpinen Form) bis 2500 m Höhe. — Gedeiht am besten auf humusreichem Mergelboden, sowie auf Lehm- und Tonboden mit etwas Kalk.

*Abarten:* a) *T. pratense pratense*, wilder Wiesenkle. Wurzel sehr faserig. Stengel mehr behaart, meist voll, nicht hohl, Köpfchen meist einzeln, die 2 Laubblätter dicht darunter. Dauert länger aus und heisst auch *T. prat. perenne*, ausdauernder oder Bullenkle, engl.: Cowgras. Same unansehnlicher, aber teurer. Wird auch gebaut.

b) *T. pratense sativum*, gebauter Wiesenkle. Meist nur 2jährig. Von diesem gibt es, je nach der Heimat, viele Sorten, die sich schwer unterscheiden lassen: Brabanter, steierischer, normannischer, schlesischer, italienischer, amerikanischer etc. Die Saat des letzteren wird viel eingeführt, die daraus erwachsenden Pflanzen sind aber meist sehr behaart und gegen strenge Winter nicht so widerstandsfähig.

*T. alpestre*, *Waldkle*. Stengel aufrecht, angedrückt behaart. Blättchen *länglich-lanzettlich*, Nebenblätter lanzettlich-pfriemlich. Köpfchen meist 2, von Blättern umhüllt, Kelchröhre 2*nervig*, zottig. ♀. Trockene Laubwälder und Wiesen. Juni—August. 0,30 m. Blume purpurrot (vergl. *T. rubens*, S. 326).

*T. pannonicum*, *pannonischer Kle*. Stengel steif aufrecht, hoch, ganze Pflanze rauh behaart. Nebenblätter an den Blattstiel angewachsen, der freie Teil grün, lanzettlich-pfriemenförmig, sehr lang, so lang oder länger als der angewachsene Teil. Blättchen länglich-lanzettlich, stumpf. Köpfchen groß, länglich-oval. Kelch 10*nervig*, zottig, Kelchzähne aufrecht, lanzettlich-pfriemenförmig, der untere doppelt so lang wie die übrigen, so lang als die Flügel, Fahne noch  $\frac{1}{2}$ mal länger.

Blumen weislich oder gelblich-weis. ♀. Juni und Juli. Neuerdings wird dieser ungarische Kle, trotz seiner starken Behaarung, für raue Gegenden und nicht zu trockenen, aber tiefgründigen Boden als sehr dauerhaft von Dr. Stebler, Zürich, empfohlen.

*T. incarnatum*, *Inkarnatklee*. Stengel aufrecht, nebst den Blättern zottig, Blättchen *verkehrt-eiförmig*, vorn gezähnt. Nebenblätter eiförmig, gezähnt. Ährchen eiförmig, zuletzt walzlich. Zähne des Kelches lanzettlich-pfriemlich, *kürzer als die Krone*, die des fruchttragenden Kelches abstehend. ☉. In Mittel- und Süddeutschland viel auf Feldern gebaut. Blume *purpurrot*, zuweilen weis. 0,30—0,50 m. — Wird in mildem Klima im Herbst gesät und gibt dann schon sehr früh, im Mai und Anfang Juni, einen reichen Schnitt.

*T. arvense*, *Acker-, Katzen- oder Mäusekle*. Blättchen linealisch-länglich. Nebenblätter eiförmig, zugespitzt. Köpfchen länglich oder walzenförmig, *sehr zottig*, dadurch mäusegrau. Kelchzähne pfriemlich, borstenförmig, *länger* als die weisliche, später fleischfarbige Krone. ☉. Äcker, Sandfelder. Juli—September. 0,10—0,30 m. Für Wiesen wertlos, auf Schafweiden nicht ganz zu verachten.

## 2. Kelchröhre außen kahl.

*T. medium*, mittlerer Klee. *Ausläufer treibend*, Stengel etwas liegend, meist hin- und hergebogen. Blättchen elliptisch. Nebenblätter *lanzettlich*, spitz, gewimpert. *Köpfchen einzeln*, *kugelförmig*, *ohne Hülle*, Kelch 10nervig. ♀. Wälder, trockene Wiesen. Blumenkrone purpurrot. Vom Rotklee durch die kahle Kelchröhre, die lanzettlichen Nebenblätter und die lebhafter gefärbten, etwas lockeren, größeren Köpfe unterschieden. — Mehr zur Weide als zum Schnitt geeignet. Für schattigen Boden. Same nicht oder selten im Handel. Soll bitter sein und den Acker wegen der Ausläufer verunkrauten.

*T. rubens*, rötlicher Klee. Stengel kahl, aufrecht. Blättchen länglich-lanzettlich. Nebenblätter eiförmig. Köpfchen walzenförmig, meist zu 2, oft behüllt. Kelchröhre 20nervig. ♀. Bergige Laubwälder. Blume purpurn. Vergl. *T. alpestre*, S. 325.

## b) Kelchschlund inwendig kahl.

*T. fragiferum*, Erdbeer-*klee*. Stengel kriechend. Blättchen elliptisch oder breit-verkehrt-eiförmig. Nebenblätter lanzettlich-pfriemlich. *Köpfchen mit ihren Stielen länger als das Blatt*, *kugelig*, am Grunde von einer vielteiligen Hülle umgeben. *Kelch 2lippig*, *zur Fruchtzeit groß*, *aufgeblasen*, *häutig*, *netzaderig*, *behaart*, daher der Fruchtstand einer Erdbeere entfernt ähnlich. ♀. Blumenkrone fleischrot. Nasse, besonders salzhaltige Wiesen, an Flusaufern, zerstreut.

## B. Die einzelnen Blüten länger oder kürzer gestielt.

## a) Kelchzähne gleich lang.

## 1. Hauptachse eine Zentralrosette bildend, aus deren Blattachseln Blütenstengel entspringen.

*T. montanum*, Bergklee. Stengel fast aufrecht. Nebenblätter eiförmig, pfriemlich zugespitzt. Blättchen länglich-lanzettlich, klein gesägt, *unterseits behaart*. *Blumen weiß*. ♀. Trockene Wiesen, Bergwälder. Mai bis Juli. 0,20 bis 0,40 m. Same nicht im Handel.

## 2. Hauptachse gestreckt, in ihren Blattachseln gestielte Köpfe tragend.

α) Stengel kriechend, wurzelnd, innere Blütenstielchen so lang als die Kelchröhre. Nebenblätter trockenhäutig.

*Trifolium repens*, Weißklee, kriechender Klee. Hauptwurzel tiefgehend. Faserwurzeln oberflächlich. Stengel *niederliegend*, an den Knoten *wurzelnd*, mit wenigen langgestielten Blättern, aus deren Achseln die noch länger gestielten Blütenköpfe entspringen. *Nebenblätter breit-lanzettlich* oder eiförmig, plötzlich in eine Stachelspitze ausgezogen, *trockenhäutig*. Blättchen alle sitzend, keilig-verkehrt-herzförmig, fein gezähnt, mit jederseits etwa 12 (1—2 mal) gegabelten Hauptnerven (mitunter einzelne ungegabelt). Stiel des Blütenköpfchens *unbeblättert*, *kantig*, voll. Kelch röhrig, 10 nervig, rötlich-weiß, mit 5 etwas ungleichen Zähnen, die 2 oberen etwas

länger, der untere der kleinste. Blumen weiß oder rötlich-weiß, ihre Blätter nur teilweise verwachsen, Platte der Fahne zur vollen Blütezeit fast flach ausgebreitet, länger als die durch ein nicht sehr deutliches Gelenk verbundenen Flügel und Schiffchen, Schiffchen kürzer als die Flügel. Fruchtknoten lang, mit 3—4 Samenanlagen.

4. Wiesen, Triften, überall, vom Meere bis in die Alpen. Liebt humusreichen, frischen Mergel-, Lehm-, Kalk- und Sandboden. — Same sehr klein, 1 mm, herzförmig, gelb, glänzend. — Die Stiele der einzelnen Blüten biegen sich sofort nach der Blüte scharf abwärts.

β) Innere Blütenstielchen 2—3 mal so lang als die Kelchröhre.

Nebenblätter krautartig.

*Trifolium hybridum*, Bastardklee, schwedischer Klee, Alsike-Klee (nach dem Ort Alsike bei Upsala, Schweden). Wurzel eine weißliche Pfahlwurzel mit vielen horizontalen Ästen, an denen die eiförmigen Wurzelknöllchen unmittelbar an der Ursprungsstelle der Wurzelfasern sitzen.

Stengel aufsteigend, *kahl, hohl*. Nebenblätter krautartig, länglich-lanzettlich, lang zugespitzt, mit 4—5 Längsadern. Blättchen elliptisch oder eiförmig, fein gezähnt, mit jederseits ca. 17 mehrmals gegabelten Blattnerven, jeder Gabelast in einen Zahn auslaufend. Blütenköpfe rötlich-weiß, im Winkel von Laubblättern, Blüten *kurz gestielt*, Stielchen oberwärts etwas behaart, Kelch *kahl*, halb so lang als die Blumenkrone, weiß mit 5 grünen, gleich langen Zähnen, Platte der Fahne zur Blütezeit ausgebreitet, länglich-eiförmig, Schiffchen kürzer als die mit ihm durch ein Gelenk verbundenen Flügel. Fruchtknoten meist 2-, selten 3samig. Same herzförmig, *gelbgrün* bis *dunkelolivengrün*, klein, so groß wie Weißkleeamen.

4. Feuchte Wiesen, ausgezeichnet für Moorkulturen. Mai bis September. Unterste Blüten *rosa*, die übrigen weiß (nicht nur die abgeblühten *rosa*, sondern auch manche eben erst aufblühende). Durch die beblätterten Blütenstiele sofort von *T. repens* zu unterscheiden.

Ändert ab: b) *elegans* (*Trifolium elegans* Savi, als Art). Stengel *fest* und *hart, nicht hohl*, im Kreise niedergestreckt, oberwärts etwas behaart, Blättchen eiförmig oder verkehrt-eiförmig, jederseits mit ca. 40 Nerven, Nebenblätter eilanzettlich, lang zugespitzt. Blume hellrosa, später dunkler.

b) Die oberen Kelchzähne kürzer, Hülse gestielt, 1 samig.

*T. agrarium*, Goldklee. Blättchen länglich-lanzettlich oder verkehrt-eiförmig, vorn gezähnt, *alle sitzend*; Nebenblätter *länglich-lanzettlich*, am Grunde *nicht breiter*; Köpfchen gestielt, kugelig. Blumen *goldgelb*, beim Welken *hellbraun*. Griffel so lang wie die Hülse. Fahne vorn löffelförmig erweitert, gefurcht. ☺. Trockene Wiesen und Wälder, stellenweise. Juni, Juli. 0,40 bis 0,50 m. Same nicht im Handel.

*T. procumbens*, *niederliegender Klee*. Stengel aufsteigend oder niederliegend, *Blättchen* verkehrt-eiförmig, vorn gezähnt, *das mittlere länger gestielt*, Nebenblätter eiförmig, Griffel mehrmals kürzer als die Hülse. Sonst wie voriger. ☉. Äcker, Triften, trockene Wiesen, gemein. Köpfchen *kleiner und schwefelgelb* oder *größer und goldgelb*, beim Welken bräunlich. 0,15—0,20 m. Same nicht im Handel.

*T. minus* (*Trifolium filiforme*), *kleiner Klee*. Stengel ausgebreitet, Blättchen keilförmig, gezähnt, *das mittlere nicht länger gestielt*. *Nebenblätter eiförmig*; Köpfchen klein, *locker*, 10—20blütig. Griffel wie voriger. ☉. Wiesen, Triften, gemein. Mai bis September. Blumen *blafs-gelb*, Stengel 0,10—0,30 m lang.

Darf wie die beiden vorigen nicht mit dem Gelbklee der Samenhändler, *Medicago lupulina*, verwechselt werden; alle 3 unterscheiden sich von letzterem leicht durch die *stehenbleibenden welkenden* Blumenkronen.

### § 74.

Tribus 5. **Lóteae**. Staubfäden 2brüderig (ausgenommen *Anthyllis* vor der Blüte), Blätter meist 3zählig, mit *ganzerandigen* Blättchen.

*Anthyllis* (ἀνθύλλις, Pflanzennamen bei Dioskorides), *Wundklee*. Kelch zur Fruchtzeit geschlossen, groß, bauchig aufgeblasen, trockenhäutig; Schiffchen stumpf, Staubfäden *oberwärts verbreitert*, der vor der Fahne stehende anfangs mit den anderen verwachsen, nach der Befruchtung ganz oder bis zur Mitte frei.

Einzige deutsche Art: *A. Vulneraria*, gemeiner Wundklee (Fig. 100 u. 109). Stengel mehrere, liegend oder aufsteigend; *unterste* Blätter langgestielt, länglich-eiförmig, *einfach* oder am Blattstiele noch ein Paar Seitenblättchen tragend, Stengelblätter deutlich gefiedert, mit *großem Endblättchen*; Blüten in einem endständigen Köpfchen mit fingerig geteiltem Deckblatt. Kelch bauchig, weiß wollig, Blumenkrone *gelb* oder der obere Teil des Schiffchens blutrot. ♀. Mai bis Juni. 0,30—0,50 m hoch. — Triften, trockene Wiesen, von der Meeresküste bis hoch in den Alpen, gern auf Lehm. Neuerdings als Futterpflanze auf sandigen, etwas kalkhaltigen Äckern viel gebaut.

*Lotus* (λωτός, bei Homer eine Kleeart), *Hornklee*. Flügel oben zusammenneigend, Schiffchen geschnäbelt, hornförmig, aufsteigend, Griffel allmählich verschmälert, Hülse stielrund, mit 2 sich zusammendrehenden Klappen aufspringend.

*L. corniculatus*, gemeiner Hornklee. Blätter 5zählig gefiedert, das unterste Paar (gewöhnlich Nebenblätter genannt) am Grunde des Blattstiels. Blättchen länglich-verkehrt-ei- oder keilförmig. Das unterste Paar schiefbreit-eiförmig; Nebenblätter klein, borstenförmig. Blüten in kopfförmigen Dolden. Stengel ausgebreitet, *fest und hart*, nicht oder kaum röhrig. *Köpfchen meist 5blütig*, *Kelchzähne vor dem Aufblühen zusammenneigend*; *Schiffchen fast rautenförmig, rechtwinklig aufsteigend*, plötzlich in den Schnabel zugespitzt. Flügel etwas schmaler als das Schiffchen, Griffel an der Hülse rechtwinklig gebogen. ♀. Trockene

Wiesen, Grasplätze. Mai bis September. Blumenkrone *gelb*, Fahne *purpurn* überlaufen, besonders vor dem Aufblühen. — Auf Salz- und Muschelkalkboden schmalblättriger (*var. tenuifolius*).

• *L. uliginosus*, Sumpf-Hornklee (Fig. 110). Stengel Ausläufer treibend, *höher, kräftiger*, aber weicher, meist mit weiter Höhlung. Unterstes Paar der Fiederblättchen rundlich-herzförmig, das folgende Paar etwas schief, das Mittelblättchen verkehrt-ei- bis keilförmig, wimperig behaart. Köpfchen im Winkel eines Blattes scheinbar endständig, reichblütig, bis



Fig. 109. *Anthyllus vulneraria*.  
a Kelch, b ganze Blüte, c Fahne,  
d Flügel, e Schiffchen, f, g Staub-  
fädenröhre und Griffel, h Fruchtkelch,  
mit der nicht aufspringenden Hülse  
(Nufshülse). (Nach Garcke.)



Fig. 110. *Lotus uliginosus* (zu stark  
behaart). a, b Kelch, c Kronenblätter,  
d Fruchstand.  
(Nach Garcke.)

14 Blumen. *Kelchzähne vor dem Aufblühen bogenförmig abstehend oder zurückgekrümmt*, besonders die beiden unteren, bewimpert. Schiffchen nicht im rechten Winkel, sondern allmählich in einen gelben stumpflichen Schnabel umgebogen, daher der Griffel an den halbreifen Früchten auch nur im stumpfen, nicht im rechten Winkel gebogen. Fahne breit-eiförmig, an der Basis mit 13 roten Nerven. Flügel eiförmig, *so breit als das Schiffchen*. Hülsen 3 cm lang.

Feuchte Wiesen; für Moorbiesen sehr geeignet. Juni, Juli. Blume gelb. 30 bis 100 cm. Fälschlich in den Samenverzeichnissen *Lotus villosus* genannt. Same viel *kleiner* als bei vorigem.

## § 75.

Tribus 6. **Galégeae**. Blätter unpaarig gefiedert, ohne Ranken, Staubfäden 2brüderig, aber bei der Gattung *Galega* alle zu einer Röhre verwachsen, also 1brüderig.

Gattung ***Galéga*** (zuerst bei de la Ruelle, soll aus *Glaux* korrumpiert sein), ***Geisraute***. Kelch zur Fruchtzeit offen. Hinterer Staubfaden halb verwachsen. *G. officinalis*, gebräuchliche Geisraute. Blättchen lanzettlich. Traube länger als das Blatt. Blüte lila (oder weifs). ♀. Selten, doch oft angepflanzt in Gärten. Hohes Kraut, 0,60—1,25 m. In warmen, tiefgründigen, wenn auch trockenen Lagen, so in der Schweiz auf trockenen Abhängen, gute Futter-

pflanze, ähnlich der Luzerne, aber weniger anspruchsvoll. — Verwandt sind *Robinia Pseudacacia*, Robinie, fälschlich Akazie. *Glycyrrhiza glabra*, Süßholz. *Indigofera tinctoria*, Indigo etc.

Gattung ***Astragalus*** (ἀστράγαλος Wirbel, Name einer Leguminose bei Dioskorides), **Bärenschote**. Schiffchen stumpf. Hülse durch die untere einwärts gebogene Naht der Länge nach 2fächerig oder fast 2fächerig.

*Astragalus glycyphyllos*, süßholzblättrige Bärenschote (Fig. 111). Stengel niederliegend, fast kahl. Blätter 5—7paarig, mit grossen, eiförmigen Blättchen. Blütentrauben eiförmig, länglich, nebst ihren Stielen kürzer als das Blatt, grünlich-gelb oder gelblich-



Fig. 111. *Astragalus glycyphyllos*.  
Die Hülse oben ist umgekehrt zu denken.

weifs. *Hülsen linealisch, etwas gebogen, unten tief gefurcht, kahl; zuletzt aufrecht zusammenneigend.*

♀. Wälder, Gebüsche, Wiesenränder. Mai bis Juli. 1—1,25 m. Wird mitunter als Futterpflanze empfohlen, läßt sich aber auf Wiesen und Äckern, da sie Beschattung verlangt, schwerlich bauen.

## § 76.

Tribus 7. **Hedysáreae, Gliederhülsige**. *Hülse in Glieder quer abgeteilt* und oft in diese zerfallend. Keimblätter, wie bei allen vorigen Tribus, ziemlich flach, über die Erde hervortretend. Blätter unpaarig gefiedert.

1. Untergruppe. ***Coronillinae***, Blüten doldig.

Gattung ***Coronilla*** (zuerst bei de l'Obel; von corona Kranz, wegen des doldigen Blütenstandes), ***Kronenwicke***. Kelch kurz glockig, durch die 2 oberen,

größtenteils verwachsenen Zähne fast 2lippig. Schiffchen geschnäbelt. Hülse walzlich oder 4kantig.

*C. varia*, *bunte Kronenwicke*. Stengel krautig, niederliegend; Blätter meist 10 paarig; Blättchen länglich oder verkehrt-eiförmig. Nebenblätter lanzettlich, *nicht zusammengewachsen*. Dolden 8—20 blütig, Blumen schön, *weiß, mit rosenroter Fahne*. Schiffchen mit dunkel-purpurnem Schnabel. 4. Wiesenränder, sonnige Hügel, gern auf *Kalk* und *Lehm*. Juni bis August. 0,30—1,25 m lang.

Die frühere Behauptung, daß das Kraut giftig sei, hat sich nicht bestätigt. Wird von Schafen gern gefressen. Same nicht im Handel.

Gattung *Ornithopus* (ὄρνις Vogel und πούς Fuß), *Klauenschote*, *Vogelfuß*. Kelch 5zählig, die beiden oberen Zähne am Grunde verwachsen, Schiffchen stumpf, Staubfäden nach oben verbreitert, Hülse meist sichelförmig gekrümmt, zusammengedrückt, an den Gelenken zusammengezogen, die 2 bis 5 Hülsen eines Blütenstandes einem Vogelfuß ähnlich.

*O. sativus*, gebauter Vogelfuß, *Serradella*. Weichhaarig. Stengel aufstrebend. Blätter 7—12 paarig. Blättchen klein, elliptisch. Dolden 2- bis 5 blütig, im Winkel der Fiederblätter, doppelt so lang gestielt als diese. *Kelchzähne pfriemlich, fast so lang als die Röhre*. Blumen klein, rosa. Schiffchen sehr klein, kaum so lang als die Kelchzähne. Stengel 0,30—0,60 m lang. ☉. Juni, Juli. Aus Portugal. Bei uns seit etwa 50 Jahren sehr viel auf *Sandboden* gebaut, meist in den Roggen eingesät. „Der Klee des Sandes.“

*O. perpusillus*, kleinster Vogelfuß (Fig. 112). Stengel meist niederliegend, Kelchzähne eiförmig, 3 mal kürzer als die Röhre. Blumen *sehr* klein, weißlich, Schiffchen gelblich. Fahne mit purpurnen Adern. 0,08 bis 0,30 m. Sandfelder. ☉.

Gattung *Hippocrépis* (ἵππος Pferd und χορῆς Schuh, also Hufeisen), *Hufeisenklee*. Kelch glockig, fast 2lippig. Schiffchen geschnäbelt, Hülse zusammengedrückt, an der oberen Naht buchtig, ausgeschnitten. *Glieder hufeisenförmig*.

*H. comosa*, *schopfgiger Hufeisenklee* (Fig. 113). Stengel ausbreitet. Blätter 5—7 paarig gefiedert; Blättchen länglich oder verkehrt-



Fig. 112. *Ornithopus perpusillus*.  
a Kelch, b Blüte, c Kronenblätter,  
d Hülse, in e längsdurchschnitten.



eiförmig; Dolde 4—8blütig; Hülsen bogenförmig, Glieder flach hufeisenförmig gekrümmt. ♀. Sonnige Kalkberge, zerstreut in Mittel- und Süddeutschland. Mai bis Juli. Blumenkrone gelb. 0,08 bis 0,25 m. Für kalkhaltige Weiden, Same jedoch nicht im Handel.

2. Untergruppe. *Euhedysarinae*. Blüten traubig.

Gattung *Onóbrychis* (ὄνος Esel und βρύχω zerbeißen), *Espарsette*. Flügel sehr kurz, Schiffchen schief abgestutzt, Hülse nur 1gliedrig, knochenhart, verkehrt-eiförmig, grubig-netzig, nicht aufspringend.



Fig. 113.  
*Hippocrepis comosa*,  
schopfiger Hufeisenklee.



Fig. 114. *Onóbrychis viciaefolia*.  
*a* Laubblättchen, *b* Blüte, *c* Kelch.  
Staubgefäße und Griffel, *d*, *e* Hülsen.

*O. viciaefolia* (*O. sativa*), *Espарsette* (Fig. 114). Stengel aufsteigend oder aufrecht, Blätter 6—12paarig, Blättchen linealisch-länglich, Blütentrauben doppelt so lang als das Blatt; Kelchzähne doppelt so lang als die Röhre, Flügel kürzer als die Kelchzähne. Hülsen kreisrundlich, erhaben-netzig, am Rande kammförmig gezähnt. Zähne halb so lang als die Breite des Kammes. ♀. Auf Kalkboden, stellenweise wild, und sehr viel im großen gebaut. Wichtigste Futterpflanze auf Kalkboden, „der Klee des Kalkes“.

Zu den Gliederhülsigen gehört auch *Arachis hypogaea*, die Erdnufs, ursprünglich in Südamerika einheimisch, jetzt in allen Tropen als Nahrungsmittel und zur Gewinnung eines feinen Öls viel gebaut. Die Rückstände bilden die Erdnufskuchen.

## § 77.

Tribus 8. **Vicieae**. Wickengewächse. Hülse 1fächerig, Blätter *paarig* gefiedert, mit Endspitze oder 2 oft gegabelten *Wickelranken*, den Mittelnerven der 2 obersten verkümmerten Blättchen. *Keimblätter* dick, mehlig, *in der Samenschale und unter der Erde bleibend*.

1. Untergruppe. *Ervoidinae*. Staubfädenröhre *schief* abgeschnitten, d. h. die unteren, dem Schiffchen zugekehrten Fäden länger, und weiter hinauf verwachsen als die oberen, der Fahne zugekehrten.

*Vicia* (Name einer Hülsenfrucht bei Varro), *Wicke*. Kelch 5zählig oder 5spaltig, obere Zähne kürzer; *Griffel* gerade aufstrebend, meist unterhalb der Spitze auf der *äußern Seite bärtig*, Hülse zusammengedrückt, 2- bis vielsamig.

*A. Trauben reichblütig, langgestielt. Nebenblätter ohne Nektarien (ohne dunklen Fleck auf der Unterseite). Griffel ringsum behaart.*

*Vicia Cracca*, Vogelwicke. Überall *angedrückt behaart*. Stengel kantig. Nebenblätter halbspießförmig, ganzrandig, linealisch. Blättchen 10—12 paarig, die untersten Paare oft wechselständig, die oberen gegenständig. Blättchen länglich-linealisch, kurz stachelspitz, ihre Seitennerven in sehr spitzem Winkel abgehend. Trauben langgestielt, reichblütig (bis 20 und mehr). Blüten kurz gestielt. Kelch blau, kurzröhrig, schief abgeschnitten, die 5 Zähne ungleich, der unterste am längsten. *Platte der Fahne so lang wie ihr Nagel. Blumen blau oder rötlich-violett*. Schiffchen weißlich, reife Hülsen braun, lineal-länglich, ihr Stiel kürzer als die Kelchröhre. Nabel  $\frac{1}{3}$  des Samens umgebend. ♀. Überall an Ackerrändern, Zäunen, auch am Rande von Wiesen. Juni bis August. 30—125 cm. Die zu *mäßigen* Preisen als *Vicia Cracca* angebotenen Samen sind, wie Weber mit Recht bemerkt, fast immer die von *Vicia* (*Ervum*) *hirsuta*, die beim Reinigen des Getreides gewonnen werden. Echte Samen sind kaum zu haben und sehr teuer. Nach Stebler kommt die Pflanze außerdem im Wiesenbestande nicht fort, und wird nach Weber vom Weidevieh nicht gern gefressen, daher nicht zu empfehlen.

*V. tenuifolia*, feinblättrige Wicke. Stengel meist kahl; *Platte der Fahne meist doppelt so lang als ihr Nagel*, Nabel  $\frac{1}{4}$  des Samens umgebend. Sonst wie vorige. ♀. Gebüsche, Bergwiesen. Juni—August. Blüten violett. 0,60—1,25 m.

*V. villosa*, zottige Wicke (Fig 115). Meist *zottig behaart*; Blätter meist 8paarig, Nebenblätter länglich-lanzettlich; die 3 unteren Kelchzähne pfriemlich-fadenförmig, so lang wie die Röhre, die oberen viel kürzer, lanzettlich-pfriemlich. *Platte der Fahne nur halb so lang als ihr Nagel*. Hülse länglich, ihr Stiel *länger* als die Kelchröhre. Nabel  $\frac{1}{8}$  des Samens umgebend. ☉ oder ☉. Unter der Saat auf sandigem Lehmboden und besonders im Winter-Roggen, namentlich im nördlichen

und östlichen Gebiet. Mai bis Juli. — Jetzt viel mit Roggen zusammen angebaut. — Unterscheidet sich von *Vicia Cracca* durch die kürzere Fahnenplatte und die größeren Blumen, vor dem Aufblühen durch die von den Kelchzähnen federig-beschopft erscheinenden Blütentrauben.

*V. varia*, bunte Wicke. ☉. Schlanker. Stengel dünner, sparsamer behaart, mit wenigen Zotten. Trauben kürzer gestielt. Blüten kleiner, die unteren 3 Kelchzähne aus *verbreitertem Grunde lanzettlich*. Fahne meist weiß. Wenig ertragreich. Same mitunter als *V. villosa* im Handel.

*B. Blüten einzeln oder 2—6, kurzgestielt, traubig. Nebenblätter mit Nektarien. Griffel auf der äußeren Seite meist bärtig.* (S. 317, Fig. 102.)

a) Blätter 4—8 paarig.

*V. sepium*, Zaun-Wicke. Blättchen *breit-eiförmig* oder *eiförmig-länglich*; Kelchzähne *ungleich*, die 2 oberen zusammenneigend, 2—3 mal kürzer als ihre Röhre; Traube meist 5 blütig. Hülse länglich, bei der Reife kahl, schwarz. ♀. Zäune, Wiesen. April bis September. Blumenkrone schmutzig-violett.

*V. sativa*, gebaute Wicke. Einjährig. Überall behaart. Stengel schwach 4kantig. Nebenblätter halb pfeilförmig, der rückwärts gerichtete Teil des Pfeiles an den unteren oft gezähnt. Auf der Unterseite der Nebenblätter in einer Vertiefung ein schwarzbrauner Fleck (Nektarium). Blätter 4—6 paarig, mit 2 Wickelranken. Blättchen der unteren Blätter verkehrt-eiförmig, die der untersten tief ausgerandet, die der oberen länglich oder lineal-verkehrt-eiförmig, ausgerandet oder gestutzt, alle stachelspitz.

Blüten blattwinkelständig, kurzgestielt, zu 1—2. Kelch grün, behaart, mit 5 Zähnen, die 2 obersten die längsten, genähert, fast so lang wie die Röhre. Fahne blau oder rosa oder violett; Flügel purpurn, Schiffchen weißlich. Griffel ringsum behaart, aber an der äußeren Seite unterhalb der Spitze viel stärker, dort bärtig. Hülsen *aufrecht, länglich, zusammengedrückt*, etwas holperig, bei der Reife den Kelch zerreisend, meist *kurz behaart, braun*. Stammt von der überall wildwachsenden *Vicia*



Fig. 115. *Vicia villosa*.

a Laubblättchen, b Blüte, c Fahne, d Flügel, e Schiffchen, f Staubgefäße und Griffel, g Hülse.

*angustifolia*, *schmalblättrige Wicke*, ab, die sich durch schmalere Blättchen, purpurne Fahne und *abstehende linealische*, bei der Reife meist *kahle*, *schwarze* Hülsen unterscheidet. *V. angustifolia* entwickelt öfter unterirdische, sich nicht öffnende, sog. kleistogamische Blüten, die Früchte liefern. (*V. angustifolia* var. *amphicarpos*). Juni, Juli, im Gebirge im August. *Einjährig*. Überall auf besserem Boden gebaut, oft im Gemenge mit Hafer etc. Die Samen von *V. angustifolia* sind in neuerer Zeit statt derjenigen von *V. sativa* in den Handel gekommen. Man suche recht grofskörnige Saat, möglichst linsenförmige Samen, die in der Mehrzahl 4 mm Durchmesser haben, zu erhalten. (Wittmack in Mitt. d. D. L.-G., 1902, S. 26.)

b) Blätter 2—3paarig, ohne Wickelranken.

*V. Faba*, Buff-, Puff-, Sau-, Tauben-, grofse oder Pferdebohne. Stengel aufrecht, 4kantig, stark; *Blätter mit krautiger Stachelspitze*, Blättchen grofs, elliptisch oder länglich, Nebenblätter halb pfeilförmig, begrannt-gezähnt; Blüten in sehr kurzen, 2—4blütigen Trauben; die 2 oberen Kelchzähne viel kürzer. Hülsen grofs, länglich, lederartig, gedunsen, mit schwammigen Querscheidewänden, auf *den Kanten eben*, auf den Flächen von sehr kurzen Härchen sammetartig. ☉. Stammt aus dem Orient. Gebaut. Juni, Juli. *Blumenkrone sehr grofs, meist weifs, mit schwarzem Fleck auf den Flügeln*. Same mit *endständigem* Nabel.

*Ervum* (Name einer Hülsenfrucht bei Columella), *Erve*. Griffel an der Spitze *ringsum* gleichmäfsig fein behaart, nicht bärtig.

*E. monanthos*, *einblütige Erve*, *Wicklinse*. *Blätter meist 7paarig*; Nebenblätter ungleichförmig, das eine linealisch, sitzend, ungeteilt, das andere halbmondförmig, gestielt und borstenförmig gezähnt. Blättchen 5—7paarig, linealisch, meist gestutzt. Blütenstiele 1-, selten mehrblütig, etwa so lang als das Tragblatt; Hülsen länglich-eiförmig, hellbraun, meist 3samig, kahl. ☉. *Bisweilen gebaut*. *Blumenkrone grofs, Fahne lila*. 0,30—0,60 m.

Hierher auch *E. hirsutum*, *rauhfrüchtige Erve*. Blätter 8—10paarig; Trauben 3—8blütig, Blüten *bläulich-weifs*. Hülsen länglich-eiförmig, kurzhaarig, meist 2samig, reif schwärzlich. ☉. Äcker, Grasplätze. Mai bis August. — *E. tetraspermum*. Blätter 3—8paarig, linealisch; Trauben 1—3blütig, Blüten bläulich-weifs, etwas gröfser als bei voriger. Hülsen länglich-linealisch, meist 4samig, kahl, reif hellbraun. ☉. Wiesen, Gebüsche. Mai bis Juli.

*Lens* (Name bei Plinius), *Linse*. Griffel flach, unterhalb der Spitze auf der *innern* Seite behaart.

*L. esculenta*, *efsbare Linse*. Obere Blätter meist 6paarig, Nebenblätter lanzettlich, ganzrandig; Blüten *bläulich-weifslich*, einzeln oder zu 2—3 traubig, an langen Stielen; *Hülsen elliptisch-rautenförmig*, kahl, 2samig. ☉. Gebaut. Aus Westasien.

## § 78.

2. Untergruppe. *Lathyroidinae*. Staubfädenröhre gerade abgeschnitten, der freie Teil sämtlicher verwachsenen Staubfäden gleich lang.

*Pisum* (Name einer Hülsenfrucht bei Columella), *Erbse*. Griffel 3kantig, von der Seite her zusammengedrückt, an der Spitze auf der Innenseite härtig. Hülse länglich, vielsamig.

*P. sativum*, *gebaute Erbse*, *gelbe* oder *grüne Erbse*. Blätter 2—3paarig, Blättchen eiförmig, in der Knospenlage gefaltet. Nebenblätter sehr groß, eibis halbherzförmig, an den Öhrchen gezähnt, einen Becher bildend. Blütentrauben 2 oder mehrblütig. Die weißsamigen haben ganz weiße Blumen, die grün-samigen die Fahne weiß, die Flügel rosa, sowie die Nebenblätter am Grunde purpurn. ☉. Aus Südeuropa. Auf Äckern und in Gärten gebaut. Mai bis Juli. 0,3—1 m.

Ändert ab: b) *arvense*, graue Erbse. Blüten einzeln oder zu 2, Same meist kantig-eingedrückt, graugrün mit braunen Punkten. Fahne bläuviolett oder bläulich, Flügel purpurrot, Nebenblätter am Grunde purpurn. Schiffchen weiß. Hierher auch die sog. „Peluschke“.

*Lathyrus* (λάθυρος, Name einer Hülsenfrucht bei Theophrastos), *Platterbse*. Griffel an der Spitze flach, auf der ganzen inneren Seite behaart (einer schmalen Haarbürste ähnlich). Hülsen mehr oder weniger zusammengedrückt, 2- bis vielsamig. Blätter meist mit Wickelranken, die Untergattung *Orobus* ohne Wickelranken, Blättchen in der Knospenlage gerollt.

a) *Stengel ungeflügelt, kantig.*

*L. tuberosus*, *knollige Platterbse*, Erdmandel. Kahl, Wurzelstock sehr tief gehend, dünn, an den Gelenken mit knollenförmig verdickten, stärkereichen, efsbaren Wurzeln; Blättchen 1paarig, länglich. Nebenblätter halbpfeilförmig, linealisch; Trauben reichblütig, purpurrot oder rosenrot, wohlriechend. ♀. Auf schwerem Lehmboden. Juli, August. 0,30—1 m lang. Bonitierungspflanze!

*L. pratensis*, *Wiesen-Platterbse*. Weichhaarig; Blättchen 1paarig, länglich-lanzettlich. Nebenblätter halbpfeilförmig, breit-lanzettlich; Blütentrauben reichblütig, gelb; Hülsen linealisch-länglich. ♀. Auf fruchtbaren Wiesen, an Gräben etc. 0,30—1,00 m. Futterwert zweifelhaft. Nach Weber wurde sie auf den Fettweiden der Marschen vom Vieh gänzlich verschmäht.

b) *Stengel geflügelt.*

*L. silvester* (nicht *silvestris*), Wald-Platterbse. Flügel des Stengels doppelt so breit als die der Blattstiele. Blätter 1paarig, Blättchen lanzettlich, stumpf oder zugespitzt; Nebenblätter halbpfeilförmig, linealisch-pfriemlich; Blütentrauben reichblütig. Fahne rosa, außen rötlich-grün, innen am Grunde purpurrot, Flügel purpurn, Schiffchen grünlich. Hülse zusammengedrückt. Samen schwarzbraun, etwas höckerig-rauh. Nabel.

die Hälfte der ziemlich kugeligen, etwas höckerig-rauen Samen umgebend. ♀. Wälder, buschige Bergabhänge, auf trockenerem Boden. Juli, August. 1—2 m. Ändert ab: b) *ensifolius*. Blättchen schmaler, lineal-lanzettlich.

*Lathyrus silvester* ist seit einer Reihe von Jahren von dem Landwirte Wagner, zuletzt in Kirchheim a. Teck, in Kultur genommen und es hat derselbe früher viele steinige Abhänge in Westfalen, auf denen sonst nichts wuchs, mit Erfolg damit bepflanzt, wie er denn überhaupt bei seinem Futterbau das richtige Prinzip aufstellte, daß man besonders die Futterpflanzen anbauen müsse, die in der betreffenden Gegend wild vorkommen, und daß man deren Samen gewinnen solle. Durch langjährige Kultur, öfteres Verpflanzen der Sämlinge und ein damit verbundenes Behandeln der Wurzeln ist es ihm gelungen, eine Varietät zu erzielen, deren Samenschale dünner ist, sodaß der Übelstand, den fast alle wilden Hülsenfruchtsamen zeigen, daß sie spät, oft erst im 2. Jahr keimen, aufgehoben ist. (*Lathyrus silvester Wagneri*.) Der Nährstoffgehalt ist sehr hoch, das Futter ist frisch etwas bitter (nach Wagner bei seiner Varietät jetzt nicht mehr), als Braunheu wird es gern genommen.

Für *trockene* Gegenden mit *tiefem* Grundwasserstande dürfte *L. silvester* vielleicht eine Zukunft haben, in feuchten Jahren fault er unten leicht. Die Versuche dürfen noch nicht als abgeschlossen angesehen werden, sind aber im ganzen nicht so günstig ausgefallen, wie man erst hoffte.

*L. platyphyllos*, flachblättrige Platterbse. Flügel der Blattstiele fast ebenso breit als die des Stengels; Blättchen 1paarig, länglich oder länglich-lanzettlich, stumpf, stachelspitz, sonst wie vorige. ♀. Gebüsche. Blumenkrone etwas größer, Fahne innen rosefärblich, Flügel vorn violett. Schiffehen schmutzgelb, Same aschgrau, sehr fein gekörnt. 1—1,3 m. Wird neuerdings von Ascherson und Graebner nur als Varietät von *L. silvester* angesehen.

*L. heterophyllos*, verschiedenblättrige Platterbse. Untere Blätter 1paarig, obere 2—3paarig. Nabel kaum  $\frac{1}{3}$  des Samens umgebend, sonst wie *silvester*. Selten. Blumenkrone purpurn. Blätter meergrün. 1—3 m.

*L. latifolius*, breitblättrige Platterbse. Blätter sämtlich 1paarig, sehr selten die oberen 2paarig, Blättchen eiförmig, Blütentraube reichblütig, schön rosefärblich. Nabel kaum  $\frac{1}{3}$  des Samens umgebend. In Gärten, dort auch mit weißen Blüten. 1—3 m.

*Lathyrus platyphyllos*, *heterophyllos* und namentlich *L. latifolius* dürften sich zum Anbau vielleicht ebenso eignen wie *L. silvester*; namentlich *L. latifolius* gibt, im kleinen wenigstens, ganz außerordentlich hohe Erträge.

*L. paluster*, Sumpf-Platterbse. *Blattstiele flügellos*. *Blätter 2 bis 3paarig*, Blättchen länglich-lanzettlich; *Nebenblätter mehrmals kleiner als die Blättchen*, halbspießförmig, linealisch-lanzettlich; *Blütentraube bis 6blütig*, schmutzig-blau. ♀. Sumpfige Wiesen, stellenweise. Juli, August. 0,30—1 m. Wird zu Versuchen auf Moorbiesen empfohlen, aber nach Weber vom Vieh nicht gern genommen. Same nicht im Handel.

## Anhang.

### Bonitierungspflanzen und Samenmischungen.

#### § 79.

**Bonitierungspflanzen.**<sup>1)</sup> Die chemische Zusammensetzung des Bodens ist für viele Pflanzen von geringerer Wichtigkeit als die physikalische Beschaffenheit. Da z. B. ein Kalkboden meist trocken ist, siedeln sich viele Pflanzen, die Trockenheit lieben, dort an, kommen aber oft auch auf anderem trockenen Boden vor; man muß daher bei Beurteilung des Bodens nach den Pflanzen vorsichtig sein. Kann eine Pflanze auf dem verschiedensten Boden wachsen, so heißt sie *bodenwag*, zieht sie eine bestimmte Bodenart vor, ohne jedoch ausschließlich darauf vorzukommen, so heißt sie *bodenhold*, z. B. *kalkhold*, lebt sie nur auf einer bestimmten Bodenart, so heißt sie *bodenstet*, z. B. *kalkstet*. Strenge Grenzen lassen sich aber nicht ziehen.

1. *Kalkpflanzen*. Gramineae: *Bromus erectus*, *Poa compressa*, *Sesleria coerulea*. Liliaceae: *Allium fallax*, *Tofieldia calyculata*. Orchidaceae: *Anacamptis pyramidalis*, *Cephalanthera grandiflora*, *Cypripedium Calceolus*, *Epipactis microphylla*, *Ophrys fuciflora*, *O. muscifera*, *Orchis militaris*, *O. purpurea*. Fagaceae: *Fagus silvatica*. Amarantaceae: *Polycnemum majus*. Caryophyllaceae: *Gypsophila repens*, *Tunica prolifera*. Ranunculaceae: *Adonis aestivalis*, *A. flammeus*, *A. vernalis*, *Anemone silvestris*, *Helleborus foetidus*, *H. niger*, *Hepatica triloba*, *Nigella arvensis*. Cruciferae: *Alyssum saxatile*, *Arabis petraea*, *Conringia orientalis*, *Erysimum odoratum*, *E. orientale*, *Iberis amara*, *Lepidium campestre*. Saxifragaceae: *Saxifraga aizoon*, *S. caesia*. Rosaceae: *Rubus saxatilis*, *Sanguisorba minor*. Leguminosae: *Coronilla montana*, *Hippocrepis comosa*, *Medicago minima*, *Onobrychis viciaefolia* (*O. sativa*). Rutaceae: *Dictamnus albus*. Polygalaceae: *Polygala calcarea*, *P. chamaebuxus*, *P. comosa*. Violaceae: *Viola mirabilis*. Umbelliferae: *Astrantia major*, *Caucalis daucoides*, *Laserpitium latifolium*, *Scandix Pecten Veneris*, *Seseli Hippomarathrum*. Gentianaceae: *Gentiana ciliata*, *G. cruciata*, *G. germanica*, *G. verna*. Asclepiadaceae: *Vincetoxicum officinale*. Boraginaceae:

<sup>1)</sup> Wegen der Beschreibungen der einzelnen Arten, soweit sie nicht in Kap. I und VI behandelt sind, ist eine „Flora“ nachzuschlagen, z. B.: Garcke's Illustr. Flora von Deutschland, 18. Auflage, aus der viele unserer Abbildungen entstammen; Potonié, Illustr. Flora von Norddeutschland; Wünsche, D. Pflanzen Deutschlands; Ascherson, Graebner und Beyer, Nordostdeutsche Schulflora etc.

*Lithospermum officinale*, *Nonnea pulla*. Labiatae: *Ajuga Chamaepitys*, *Brunella alba*, *B. grandiflora*, *Galeopsis angustifolia*, *Teucrium Botrys*, *T. Chamaedrys*, *T. montanum*. Scrophulariaceae: *Linaria Elatine*, *L. minor*, *L. spuria*. Globulariaceae: *Globularia nudicaulis*. Rubiaceae: *Asperula glauca*, *Galium parisiense*, *G. tricornis*, *Sherardia arvensis*. Valerianaceae: *Valerianella rimosa*. Campanulaceae: *Campanula bononiensis*, *Phyteuma orbiculare*. Compositae: *Anthemis tinctoria*, *Aster Amellus*, *Carlina acaulis*, *Centaurea rhenana* (*C. paniculata*), *Filago germanica*, *Hieracium praealtum*, *Inula Conyza*, *Lactuca perennis*, *L. Scariola*, *Senecio campester*.

2. *Lehm- und Tonpflanzen*. Equisetaceae: *Equisetum arvense*. Gramineae: *Sclerochloa* (*Poa*) *dura*, *Poa compressa*. Juncaceae: *Juncus bufonius*, *J. glaucus*. Liliaceae: *Allium sphaerocephalum*. Orchidaceae: *Cephalanthera grandiflora*. Caryophyllaceae: *Silene noctiflora* (*Melandryum noctiflorum*), *Vaccaria parviflora*, (*Vaccaria Vaccaria*). Ranunculaceae: *Adonis aestivalis*, *A. flammeus*, *Nigella arvensis*, *Ranunculus arvensis*. Cruciferae: *Conringia orientalis*, *Coronopus Ruellii*, *Lepidium campestre*, *Thlaspi arvense*. Rosaceae: *Alchemilla arvensis*. Leguminosae: *Anthyllis vulneraria*, *Lathyrus tuberosus*, *Melilotus albus*, *M. officinalis*, *Trifolium striatum*. Geraniaceae: *Geranium dissectum*. Euphorbiaceae: *Euphorbia exigua*. Umbelliferae: *Falcaria Rivini*, *F. vulgaris*, *Scandix Pecten Veneris*. Gentianaceae: *Erythraea litoralis*, *E. pulchella*. Asclepiadaceae: *Vincetoxicum officinale*. Convolvulaceae: *Convolvulus arvensis*. Boraginaceae: *Lithospermum officinale*, *Nonnea pulla*. Labiatae: *Brunella grandiflora*. Scrophulariaceae: *Antirrhinum Orontium*, *Euphrasia Odontites*, *Linaria Elatine*, *L. minor*, *L. spuria*, *Melampyrum arvense*, *Specularia Speculum*, *Veronica agrestis*, *V. opaca*, *V. polita*, *V. praecox*, *V. Tournefortii*. Orobanchaceae: *Orobanche pallidiflora* syn. *reticulata* (schmarotzt auf Distelarten). Rubiaceae: *Galium parisiense*, *G. tricornis*, *Sherardia arvensis*. Campanulaceae: *Campanula bononiensis*. Compositae: *Caucalis daucoides*, *Crepis biennis*, *Hypochoeris maculata*, *Lactuca Scariola*, *Lappa tomentosa*, *Matricaria Chamomilla* (*Chrysanthemum Chamomilla*), *Tussilago Farfara*.

3. *Sandigen Lehm liebende Pflanzen*. Gramineae: *Bromus arvensis*, *Panicum glaucum*. Juncaceae: *Juncus capitatus*, *J. Tenageia*. Amarantaceae: *Polycnemum arvense*. Caryophyllaceae: *Alsine viscosa*, *Gypsophila muralis*. Ranunculaceae: *Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides*, *Myosurus minimus*. Papaveraceae: *Papaver Argemone*, *P. Rhoeas*. Cruciferae: *Thlaspi perfoliatum*. Saxifragaceae: *Saxifraga tridactylites*. Crassulaceae: *Tillaea muscosa*. Primulaceae: *Centunculus minimus*. Labiatae: *Galeopsis Ladanum*, *Stachys arvensis*. Scrophulariaceae: *Linaria arvensis*, *Veronica triphyllos*. Compositae: *Arnoseris minima*, *Carduus acanthoides*, *Filago arvensis*, *F. germanica*, *Gnaphalium luteo-album*, *G. uliginosum*, *Hypochoeris glabra*.

4. *Salzpfannen*. Gramineae: *Alopecurus arundinaceus*, *Festuca distans*, *Hordeum secalinum*. Cyperaceae: *Carex distans*, *C. extensa*, *C. secalina*, *Scirpus parvulus*, *S. rufus*. Juncaginaceae: *Triglochin maritima*. Juncaceae: *Juncus bufonius*, *J. Gerardi*, *J. ranarius*. Chenopodiaceae: *Obione pedunculata*, *Salicornia herbacea*, *Suaeda maritima*. Caryophyllaceae: *Sagina maritima*, *Spergularia media*, *S. salina*. Cruciferae: *Capsella procumbens*, *Lepidium latifolium*. Legumi-



nosae: *Melilotus altissimus*, *M. dentatus*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Trifolium fragiferum*. Malvaceae: *Althaea officinalis*. Umbelliferae: *Apium graveolens*, *Bupleurum tenuissimum*. Primulaceae: *Glaux maritima*. Plantaginaceae: *Plantago Coronopus*, *P. maritima*. Compositae: *Artemisia maritima*, *Aster Tripolium*, *Lactuca saligna*, *Pulicaria dysenterica*, *Thrinicia hirta* (*Leontodon taraxacoides*).

### § 80.

**Gebrauchswert der Samen und Samenmischungen.** Die Gras- und Kleesamen des Handels sind selten ganz rein, sondern enthalten fast immer Verunreinigungen, die teils unschuldiger Natur, teils Samen schädlicher Pflanzen sein können, wie z. B. Kleeseide im Klee. Die reinen Samen sind aber nicht alle keimfähig; Timothee, englisches und italienisches Raigras, Rotklee u. s. w. keimen zwar mit 85—95%, die meisten Gräser aber nur mit 70—80, ja Honiggras, Ruchgras, Drahtschmele u. s. w. nur mit 40—50, selten bis 60%. Man muß deshalb den *Gebrauchswert* kennen, und dieser ergibt sich nach der Formel:

$$G = \frac{R \cdot K}{100},$$

wobei *G* Gebrauchswert, *R* Reinheit, *K* Keimfähigkeit in Prozenten bedeutet; z. B. wenn  $R = 90\%$ ,  $K = 80\%$ , so ist  $G = 72\%$ . Eine solche Ware heißt einfach 72prozentig. Wenn man den Gebrauchswert mit dem Gewicht multipliziert, so erhält man *Kiloprozente*. Ein „Kiloprozent“ ist 1 kg einer 1prozentigen Ware, 100 Kiloprozent sind 1 kg einer 100prozentigen Ware. Es gelangen in dem von Stebler eingeführten Begriff „Kiloprozent“ Qualität (Reinheit und Keimfähigkeit) und Quantität in einer *einzigen* Zahl zum Ausdruck. Z. B. 100 kg Rotklee mit 98% Reinheit und 85% Keimfähigkeit sind 8330 Kiloprozent; 100 kg eines anderen Rotklees mit nur 85% Reinheit, aber 98% Keimfähigkeit sind auch 8330 Kiloprozent. Man darf hieraus aber nicht schließen, daß beide Kleearten gleichwertig sind, denn bei nur 85% Reinheit bekommt man viel mehr Unkrautsamen mit auf das Feld. Freilich könnte man in unserm Falle einwenden, daß bei 98% Keimfähigkeit die Unkräuter wohl unterdrückt werden.

Im allgemeinen werden die Saatmischungen nach *Gewicht* zusammengestellt und dabei ein *durchschnittlicher* Gebrauchswert zu Grunde gelegt. Da die meisten Samenhändler in ihren jährlichen Preisverzeichnissen den Gebrauchswert angeben, so ist, falls dieser in einem Jahre sehr von dem mittleren abweichen sollte, entsprechend mehr oder weniger Saat zu nehmen.

(Siehe die Tabelle über Reinheit und Keimfähigkeit auf S. 341.)

Die Samenmischungen sind je nach der *Art* der Anlage, sowie nach den Bodenverhältnissen, auch dem Klima, sehr verschieden. Die Anlagen

*Durchschnittliche Reinheit und Keimfähigkeit einer guten Handelsware nach Stebler.<sup>1)</sup>*

No.	Samenart	Reinheit %	Keimfähigkeit %	Also reine und keimfähige Samen, „Gebrauchs- wert“ % (abgerundet)
1	Rotklee, Mattenklee . . . . .	98	90	88
2	Weisklee . . . . .	96	80	77
3	Bastardklee . . . . .	97	75	73
4	Luzerne . . . . .	98	90	88
5	Hopfenklee . . . . .	97	85	83
6	Esparsette . . . . .	98	80	77
7	Wundklee . . . . .	90	85	77
8	Gemeiner Schotenklee . . . . .	90	60	54
9	Sumpfschotenklee . . . . .	90	67	60
10	Englisches Raigras . . . . .	96	80	76
11	Italienisches Raigras . . . . .	95	80	76
12	Französisches Raigras (Fromental)	70	70	49
13	Goldhafer . . . . .	60	50	30
14	Wiesenschwingel . . . . .	90	85	77
15	Rohrschwingel . . . . .	90	85	77
16	Roter Schwingel . . . . .	80	60	48
17	Schafschwingel . . . . .	85	70	60
18	Verschiedenblättriger Schwingel .	80	50	40
19	Knaulgras . . . . .	76	75	57
20	Timothee . . . . .	98	90	88
21	Wolliges Honiggras . . . . .	70	50	35
22	Wiesenfuchsschwanz . . . . .	90	50	45
23	Kammgras . . . . .	93	75	70
24	Wiesenrispengras . . . . .	85	50	43
25	Gemeines Rispengras . . . . .	85	70	60
26	Hainrispengras . . . . .	80	70	56
27	Fioringras . . . . .	85	85	72
28	Ruchgras . . . . .	90	40	36
29	Rohrglanzgras . . . . .	90	70	63
30	Aufrechte Trespe . . . . .	80	60	48
31	Wehrlose Trespe . . . . .	80	85	68
32	Gemeine Schafgarbe . . . . .	90	65	59
33	Wiesenflockenblume . . . . .	90	30	27
34	Becherblume, Poterium sanguisorba	70	75	53
35	Kümmel . . . . .	98	70	69

<sup>1)</sup> Dr. F. G. Stebler, Vorstand der schweizerischen Samen-Kontrollstation.  
Die Grassamen-Mischungen, 3. Auflage, Bern 1895. S. 91.

können dreierlei Art sein: 1. *Kleegrasschläge*. Diese werden meist 2 Jahre gemäht, im Herbst des 2. Jahres und oft noch im 3. Jahre beweidet und dann wieder als Ackerland benutzt. — 2. *Wechselwiesen* und *Wechselweiden*. Diese kommen besonders bei der Feldgras-, Koppel-, Dreesch-, Schlag- oder Egartenwirtschaft vor und werden 3—12, meist 4—6 Jahre genutzt. — 3. *Dauerwiesen* und *Dauerweiden* mit langjähriger Nutzung (Rieselwiesen, Flusswiesen etc.).

Die Kleegrasschläge erfordern Pflanzen, die schon im 1. und 2. Jahre reiche Erträge bringen, die beiden andern daneben auch solche, welche erst später sich reich entwickeln. Damit sowohl erster wie zweiter Schnitt möglichst hohe Erträge geben, muß man ferner frühe, mittelfrühe und späte Arten, auch Ober- und Untergräser (ja man könnte allgemeiner sagen: Ober- und Unterpflanzen) wählen. — Von Obergräsern nimmt man meist  $\frac{2}{3}$ , falls Klee dabei ist, bis 70%, von Untergräsern  $\frac{1}{3}$  (30%).

*Zahl der Arten* in der Mischung. Für die meisten Verhältnisse sind 10 Arten genügend; denn da die Samen fast nie ganz rein, erhält man einige andere Arten meist dazu, auch werden durch natürlichen Anflug, wie durch das Riesel- oder Überschwemmungswasser viele Samen anderer Arten hinzugebracht. Je mehr Arten man übrigens in der Mischung hat, desto sicherer ist der Erfolg unter den verschiedensten Bedingungen.

*Berechnung der Aussaatmenge*. Alle Versuche, die Menge der nötigen Körner für eine Flächeneinheit theoretisch zu begründen, sind bis jetzt gescheitert.<sup>1)</sup> Man hat zwar festgestellt, wie viel Pflanzen auf 1 qm stehen, was natürlich nach den Arten verschieden ist; man weiß auch, wie viel Körner von jeder Art in 1 kg enthalten sind, allein wenn man aus beiden Daten die Menge der Aussaat berechnen wollte, würde man viel zu niedrige Zahlen erhalten. Man ist daher bis jetzt auf die langjährige Erfahrung der Praxis angewiesen.

Aus dieser Erfahrung weiß man, wie viel von einer Art auf einer gegebenen Fläche, z. B. 1 ha, ausgesät werden muß, wenn diese ganz *allein* (Reinsaat, Einzelsaat) angebaut werden soll. Darüber gibt es viele Tabellen. *Von der Rein- oder Einzelsaat muß man ausgehen*. Darauf muß man bestimmen, *wie viel Flächenprozent von jeder Art* auf der Wiese vorhanden sein sollen, und den entsprechenden Teil der Reinsaatmenge nehmen. — Allein in Mischungen kann und muß erfahrungsgemäß *dichter* gesät werden als bei Einzelsaat, weil die verschiedenen Arten den Raum besser ausnutzen, andererseits sich auch gegenseitig verdrängen. Man

<sup>1)</sup> Auch die Angaben von Schenk in Dünkelbergs Wiesenbau treffen nur für einen speziellen Fall zu. Übrigens ist die dort für Rieselwiesen angegebene Mischung, wie mir Herr Dr. Schenk geschrieben, in der großen Praxis noch nicht erprobt.

muß deshalb einen „Zuschlag“ geben, und zwar einen um so höheren, je mehr Arten man in die Mischung nimmt. Bei einer Mischung von nur 2 Arten, z. B. Rotklee und Timothee als Klee-grasgemenge, ist kein Zuschlag nötig; bei 3—6 Arten muß aber etwa 25 % und bei noch mehr Arten 50 % dichter gesät werden. Bei Mischungen von vorwiegend langsam sich entwickelnden, dauerhaften Arten, also für Dauerwiesen, empfiehlt Stebler 75 % Zuschlag; man kann diesen selbst bis 100 % steigern, denn es kommt vor allem darauf an, daß schon im ersten Jahre die Wiese gut bestanden sei, damit kein Unkraut aufkomme. Je feiner der Same ist, desto mehr muß man die theoretische Menge erhöhen; ebenso muß auf zu leichtem wie auf zu schwerem Boden mehr Saat genommen werden. Wir geben die folgende Tabelle nach Stebler.

(Siehe die Tabelle auf S. 344.)

Ähnliche Tabellen findet man in Werner, Handbuch des Futterbaues, 2. Aufl., 1889; Lehrke, Mischung und Aussaat von Grassämereien, Breslau 1888; ferner von Wollny im Landwirtschaftlichen Kalender von Mentzel & v. Lengerke; in Burgtorf, Wiesen- u. Weidenbau; Strecker, Erkennen und Bestimmen der Wiesengräser; für Moorwiesen von Weber in Thiel's Landw. Jahrb. Bd. 27, Ergänz.-Bd. 4 etc. Im speziellen weichen die Zahlen oft voneinander ab. — Wir wollen bei folgendem Beispiel für Dauerwiesen die Stebler'schen Zahlen mit 75 % Zuschlag zu Grunde legen.

<i>Beispiel.</i> Soll eine Rieselwiese bestehen aus:		abgerundet	
<i>Obergräser</i>	10 % Fuchsschwanz, . so sind pro ha nötig . .	4,5 kg	
	20 " Wiesenschwingel, " " " " " . .	16,5 "	
	10 " Knaulgras, " " " " " . .	7,0 "	
	20 " Timothee, " " " " " . .	7,0 "	
<i>Untergräser</i>	10 " Wiesenrispengras, " " " " " . .	4,0 "	
	5 " Gemein. Rispengras, " " " " " . .	2,0 "	
	10 " Fioringras, " " " " " . .	3,0 "	
	10 " Engl. Raigras, " " " " " . .	9,0 "	
	5 " Kammgras, " " " " " . .	2,5 "	
		<hr/> 55,5 kg	
Hierzu könnte man als Gewürz noch nehmen: Ruchgras . .		0,5 "	
		Kümmel . .	1,0 "
		<hr/> Summa	57,0 kg

Nachstehend folgt eine Zusammenstellung von Samenmischungen verschiedener Autoren. Wie man leicht bemerkt, sind sie selbst für die nämliche Art Wiese sehr verschieden, es hängt das z. T. von persönlichen Ansichten ab. Namentlich ist auch die Summe sehr verschieden; auf graswüchsigen Boden genügen 40—50 kg, lieber nehme man aber etwas mehr.

(Siehe Tabellen über Samenmischungen für Dauerwiesen auf S. 346 u. 347.)

## Saatzmenge bei Rein- oder Einzelsaat in Kilogrammen nach Stebler.

No.	Samenart	Auf das Hektar				
		ohne Zu- schlag	mit 25 %	mit 50 %	mit 75 %	mit 100 %
			Zuschlag			
1	2	3	4	5	6	7
1	Rotklee . . . . .	23	28,8	34,5	40,3	46,0
2	Weisklee . . . . .	14	17,5	21,0	24,5	28,0
3	Bastardklee . . . . .	14	17,5	21,0	24,5	28,0
4	Luzerne . . . . .	31	38,8	46,5	54,3	62,0
5	Hopfenklee . . . . .	23	28,8	34,5	40,3	46,0
6	Esparsette . . . . .	194	242,5	291,0	339,5	388,0
7	Wundklee . . . . .	23	28,8	34,5	40,3	46,0
8	Gemeiner Schotenklee . . . . .	23	28,8	34,5	40,3	46,0
9	Sumpfschotenklee . . . . .	14	17,5	21,0	24,5	28,0
10	Englisches Raigras . . . . .	50	62,5	75,0	87,5	100,0
11	Italienisches Raigras . . . . .	48	60,0	72,0	84,0	96,0
12	Franz. Raigras (Fromental) . . . . .	81	101,3	121,5	141,8	162,0
13	Goldhafer . . . . .	33	41,3	49,5	57,8	66,0
14	Wiesenschwingel . . . . .	47	58,8	70,5	82,3	94,0
15	Rohrschwingel . . . . .	47	58,8	70,5	82,3	94,0
16	Roter Schwingel . . . . .	36	45,0	54,0	63,0	72,0
17	Schafschwingel . . . . .	33	41,3	49,5	57,8	66,0
18	Verschiedenblättriger Schwingel . . . . .	39	48,8	58,5	68,3	78,0
19	Knaulgras . . . . .	40	50,0	60,0	70,0	80,0
20	Timothee . . . . .	19	23,8	28,5	33,3	38,0
21	Wolliges Honiggras . . . . .	23	28,8	34,5	40,3	46,0
22	Wiesenfuchsschwanz . . . . .	25	31,3	37,5	43,8	50,0
23	Kammgras . . . . .	28	35,0	42,0	49,0	56,0
24	Wiesenrispengras . . . . .	23	28,8	34,5	40,3	46,0
25	Gemeines Rispengras . . . . .	23	28,8	34,5	40,3	46,0
26	Hainrispengras . . . . .	34	42,5	51,0	59,5	68,0
27	Fioringras . . . . .	17	21,3	25,5	29,8	34,0
28	Ruchgras . . . . .	33	41,3	49,5	57,8	66,0
29	Rohrglanzgras . . . . .	25	31,5	37,5	43,8	50,0
30	Aufrechte Trespe . . . . .	61	76,3	91,5	106,8	122,0
31	Wehrlose Trespe . . . . .	55	68,8	82,5	96,3	110,0
32	Gemeine Schafgarbe . . . . .	12	15,0	18,0	21,0	24,0
33	Wiesenflockenblume . . . . .	10	12,5	15,0	17,5	20,0
34	Becherblume, Poterium sanguisorba . . . . .	42	52,5	63,0	73,5	84,0
35	Kümmel . . . . .	23	28,8	34,5	40,3	46,0

Durch Vermittelung des Herrn Dr. C. Weber waren uns in dankenswertester Weise von der Moorversuchstation in Bremen für die 2. Auflage dieses Werkes ihre bewährten Mischungen für Moorzweiden zur Verfügung gestellt. Dieselben sind inzwischen in Thiel's Landw. Jahrbüchern, Bd. 27, Ergänzungsband 4, 1898, S. 451 veröffentlicht und eingehend begründet.

(Siehe Tabellen S. 348 bis 350.)

In den oben genannten Werken und überhaupt in fast allen Schriften über Wiesenbau sind noch für verschiedene andere Zwecke Samenmischungen angegeben. Man betrachte sie aber nicht, so wenig wie die hier mitgeteilten, als feststehende Rezepte, sondern ändere je nach Bedarf. Vor allem sehe man sich auch vorher die Preise des betreffenden Jahres an, lasse ganz teure Samen, wie z. B. Kammgras, Goldhafer, echtes Ruchgras, gemeines Rispengras etc. gegebenenfalls weg und nehme dann dafür von andern Gräsern mit ähnlichem Wuchs mehr; statt Kammgras, Goldhafer und Ruchgras z. B. mehr Fioringras oder gemeines Straußgras, *Agrostis vulgaris*, und Wiesenrispengras; statt gemeines Rispengras ebenfalls mehr Wiesenrispengras. Goldhafer sollte man aber nach Stebler für Dauerweiden möglichst immer verwenden, wenn auch nur 2—3%; er vermehrt sich später schon; ebenso würde ich raten, immer etwas Fuchschwanz zu nehmen, wenn er auch teurer ist. Wenn möglich, sehe man sich die Umgegend an und wähle solche Gräser, die dort gut gedeihen, falls es Gräser erster Güte sind.

Die Samenmischungen lasse man nicht vom Samenhändler machen, sondern sich die Arten einzeln schicken, sende dann, wo möglich, von jeder eine Probe zur Untersuchung an eine Samen-Kontrollstation und stelle die Mischungen, wie oben angegeben, selbst zusammen.

Die Aussaat erfolgt am besten im Frühjahr, nötigenfalls auch früh im Herbst, doch ist dann ein Ausfrieren der jungen Saat nur zu leicht zu befürchten.

Oft pflegt man, um die junge Grassaat im Schutze erwachsen und kein Unkraut aufkommen zu lassen, eine Überfrucht aus Hafer, seltener Sommerroggen, noch seltener Gerste, Buchweizen (oder wenn die Saat im Herbst erfolgt, aus Roggen) zu geben. Diese muß vor der Klee- und Grassaat eingebracht werden. Während meistens geraten wird, nur halb so viel Überfrucht zu säen, als wenn diese allein auf der Fläche stehen sollte, empfiehlt Stebler, gerade den Hafer recht dick zu säen, 5 hl pro ha, und ihn dreimal grün zu schneiden: 1. wenn er eine Höhe von 15 bis 20 cm erreicht hat, 2. wenn er wieder 60—90 cm hoch ist, zugleich mit dem Grase, 3. im Herbst, wo dann vorwiegend Gras, weniger Hafer in den Schwaden zu finden sein wird. — In vielen Fällen ist eine Überfrucht gar nicht nötig, namentlich wenn man viel englisches Raigras in der Saat hat. Dieses entwickelt sich schnell und bildet selber gewisser-

(Fortsetzung auf S. 351.)

## Samenmischungen für Dauerwiesen in kg auf das ha.

U bedeutet Untergras, sf sehr früh, f früh, mf mittelfrüh, s spät.

Laufende No.	Grüenentwicklung	Name	Rieselwiesen:					Frische Wiese nach Strecken	Entsäuerter Moorwiese nach Strecken	Moorwiese nach Stebler	Moor-dammwiese nach Wittmack
			Nach Schenk <sup>1)</sup> abgerundet	Nach Werner	Nach Stebler	Guter Sandboden nach Strecken					
			0/0   kg	0/0   kg	0/0   kg	0/0   kg	0/0   kg	0/0   kg	0/0   kg	0/0   kg	0/0   kg
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<i>Gräser</i>											
1	U	<i>Agrostis stolonifera</i> (Fioringras)	14,3 1	.	10 3	?	?	2	10 3	5 1,5	
2	sf	<i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesenfuchsschwanz)	14,3 21	10 12	10 4,4	.	.	4	5 2,2	5 2	
3	U	<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Ruchgras)	.	.	.	.	.	.	.	1 0,5	
4	sf	<i>Arrhenatherum elatius</i> (Französisches Raigras)	14,3 42	.	.	.	.	2	.	5 7	
5	U	<i>Avena flavescens</i> (Goldhafer)	.	.	5 3	2	.	3	5 2,9	2 1	
6	mf	<i>Avena pubescens</i> (Weichhaariger Hafer)	.	10 20	.	.	.	6	.	.	
7	f	<i>Briza media</i> (Zittergras)	.	.	.	.	1	1	.	.	
8	U	<i>Cynosurus cristatus</i> (Kammgras)	.	10 6	.	.	9	6	.	2 1	
9	mf	<i>Dactylis glomerata</i> (Knaulgras)	.	.	10 7	3,5	.	10	2,5	5 3,5	
10	f	<i>Festuca arundinacea</i> (Robruchwingel)	.	.	10 8,2	15	.	.	5 4,1	5 4	
11	mf	<i>Festuca pratensis</i> (Wiesenschwingel)	14,3 14	20 40	10 8,2	15	.	8	5 4,1	10 8	





Grassamenmischungen der Moorsuchstation Bremen für Moorwiesen und Weiden.<sup>1)</sup>

Lauf. No.	Name	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		J.	
		Weiden	Wiesen	Weiden	Wiesen	Weiden	Wiesen	Weiden	Wiesen	Weiden	Wiesen	Weiden	Wiesen	Weiden	Wiesen	Weiden	Wiesen	Weiden	Wiesen
1	<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Ruchgras)	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,3 0,5	0,3 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5	0,2 0,5
2	<i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesenfuchschwanz)	2,2 6,0	2,2 6,0	2,0 5,0	2,3 6,0	2,3 6,0	2,3 6,0	2,3 6,0	2,3 6,0	2,0 5,0	2,0 5,0	1,9 5,0	1,9 5,0	2,5 5,0	2,5 5,0	1,5 4,0	2,0 5,0	2,0 5,0	2,0 5,0
3	<i>Phleum pratense</i> (Timotheegrass)	3,5 12,0	2,8 10,0	3,4 12,0	3,4 12,0	3,4 12,0	3,4 12,0	3,4 12,0	3,4 12,0	3,0 10,0	3,0 10,0	2,8 10,0	2,8 10,0	3,8 10,0	3,8 10,0	3,4 12,0	3,4 12,0	3,0 10,0	2,9 10,0
4	<i>Agrostis alba stolonifera</i> (Fioringras)	1,3 5,0	3,0 12,0	2,5 10,0	3,8 15,0	2,8 11,0	3,7 15,0	3,2 12,0	4,6 18,0	5,1 20,0	6,6 26,0	5,1 20,0	6,6 26,0	2,4 7,0	3,4 10,0	2,5 10,0	4,8 15,0	3,4 13,0	5,0 20,0
5	<i>Avena elatior</i> (Französisches Raigras)	6,1 5,0	6,1 5,0	6,0 5,0	6,0 5,0	6,0 5,0	6,0 5,0	6,0 5,0	6,0 5,0	6,0 5,0	6,0 5,0	6,0 5,0	6,0 5,0	8,0 5,0	8,0 5,0	2,4 2,0	2,4 2,0	2,5 2,0	2,5 2,0
6	<i>Poa pratensis</i> (Wieserispengras)	6,2 18,0	8,3 24,0	3,5 10,0	5,2 15,0	4,8 15,0	6,9 20,0	3,5 10,0	5,5 16,0	6,0 20,0	6,0 20,0	6,0 20,0	6,0 20,0	6,9 15,0	9,2 20,0	3,1 9,0	5,2 15,0	3,5 10,0	5,2 15,0
7	<i>Dactylis glomerata</i> (Knaulgras)	3,0 5,0	3,0 5,0	3,0 5,0	3,0 5,0	3,0 5,0	3,0 5,0	3,0 5,0	3,0 5,0	3,0 5,0	3,0 5,0	3,0 5,0	3,0 5,0	8,0 10,0	4,0 5,0	1,5 2,5	1,5 2,5	1,5 2,5	1,5 2,5
8	<i>Festuca pratensis</i> (Wiesenschwingel)	11,1 15,5	10,0 13,5	11,0 13,5	10,1 13,5	11,0 15,5	10,0 14,5	11,0 15,5	12,3 17,5	12,7 18,0	13,4 19,0	14,0 20,0	14,0 20,0	7,5 8,0	4,7 5,0	10,8 15,0	10,8 15,0	10,8 15,0	10,8 15,0
9	<i>Lolium perenne</i> (Englisches Raigras)	3,7 5,0	7,5 10,0	3,7 5,0	5,2 7,0	2,3 3,0	2,3 3,0	2,3 3,0	3,8 5,0	3,8 5,0	3,8 5,0	3,7 5,0	3,7 5,0	5,0 5,0	5,0 5,0	3,0 4,0	3,0 4,0	3,7 5,0	3,7 5,0
10	<i>Lolium italicum</i> (Italienisches Raigras)	1,4 2,0	1,4 2,0	1,5 2,0	1,4 2,0	1,5 2,0	1,5 2,0	1,5 2,0	1,5 2,0	1,5 2,0	1,5 2,0	1,5 2,0	1,5 2,0	2,9 2,0	2,9 2,0	1,4 2,0	1,4 2,0	2,2 3,0	2,2 3,0
11	<i>Lotus uliginosus</i> (Sumpf-Hornklee)	1,7 8,0	0,6 3,0	1,7 8,0	0,6 3,0	1,3 6,0	0,6 3,0	0,6 3,0	0,6 3,0	0,6 3,0	0,6 3,0	0,5 2,5	0,5 2,5	0,7 2,5	0,7 2,5	0,6 3,0	0,6 3,0	1,0 5,0	0,6 5,0

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	J.
12	Medicago lupulina (Hopfen-Luzerne)	$\left\{ \begin{array}{l} 1,4 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,9 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,1 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,1 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,5 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,5 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %
13	Trifolium pratense perenne (Bullenklee)	$\left\{ \begin{array}{l} 1,7 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,7 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,7 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,7 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,4 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %
14	Trifolium hybridum (Bastardklee)	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,5 \\ 7,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,5 \\ 7,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,8 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,6 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,6 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %
15	Trifolium repens (Weisklee)	$\left\{ \begin{array}{l} 1,7 \\ 8,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,1 \\ 10,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,7 \\ 10,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,1 \\ 10,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,7 \\ 9,5 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 3,0 \\ 10,5 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,3 \\ 7,0 \end{array} \right\}$ %
16	Carum Carvi (Kümmel)	$\left\{ \begin{array}{l} 0,2 \\ 0,2 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,2 \\ 0,2 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,2 \\ 0,2 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,2 \\ 0,2 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,2 \\ 0,2 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,2 \\ 0,2 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,1 \\ 0,1 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,2 \\ 0,2 \end{array} \right\}$ %
17	Poa trivialis (gemeines Rispengras)	$\left\{ \begin{array}{l} 1,4 \\ 4,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,4 \\ 4,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,4 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,4 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,4 \\ 4,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,3 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,3 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,4 \\ 4,0 \end{array} \right\}$ %
18	Cynosurus cristatus (Kammgras)	$\left\{ \begin{array}{l} 0,8 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,8 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,8 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,8 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,8 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,0 \\ 3,5 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,0 \\ 3,5 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,8 \\ 1,5 \end{array} \right\}$ %
19	Festuca rubra (Echternrot-Schwingel) oder Festuca heterophylla (Verschiedenblätt. Schwingel)	$\left\{ \begin{array}{l} 1,6 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,6 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,6 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,6 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,6 \\ 3,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 3,9 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 3,9 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,1 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %
20	Phalaris arundinacea (Rohrglanzgras)	$\left\{ \begin{array}{l} 1,9 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,9 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,2 \\ 6,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,2 \\ 6,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 3,7 \\ 10,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 2,3 \\ 6,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,5 \\ 4,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 3,0 \\ 8,0 \end{array} \right\}$ %
21	Glyceria fluitans (Flutendes Mannagras)	$\left\{ \begin{array}{l} 3,4 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 3,4 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 3,4 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 3,4 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 3,4 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 3,4 \\ 5,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,3 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,3 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %
22	Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 1,0 \\ 2,0 \end{array} \right\}$ %
23	Lotus corniculatus (Wiesen-Hornklee)	$\left\{ \begin{array}{l} 0,7 \\ 2,5 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,7 \\ 2,5 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,7 \\ 2,5 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,7 \\ 2,5 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,7 \\ 2,5 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,7 \\ 2,5 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,7 \\ 2,5 \end{array} \right\}$ %	$\left\{ \begin{array}{l} 0,7 \\ 2,5 \end{array} \right\}$ %
.	Summa	45,0	40,0	35,5	38,0	40,0	61,0	42,0	39,0

(Bezeichnung der Buchstaben siehe Seite 350.)

<sup>1)</sup> Jetzt auch abgedruckt in Thiel's Landw. Jahrbüchern, Bd. 27, Ergänzungsbd. IV, S. 498—502.

*Bezeichnung der Buchstaben* (zu S. 348 u. 349):

- A** für Wiesen und Weiden auf besandetem Niedermoor im Binnenlandsklima. Mittlerer Grundwasserstand, im Sommer, 60—80 cm tief.
- B** besonders für das Küstengebiet der Nordsee, für Wiesen und Weiden auf besandetem Niedermoor. Grundwasser wie bei A.
- C** für Wiesen und Weiden auf nicht besandetem Niedermoor mit 40—50 cm durchschnittlichem Grundwasserstand im Sommer.
- D** besonders für das Küstengebiet der Nordsee, für Wiesen und Weiden auf nicht besandetem Niedermoor wie bei C.
- E** für Wiesen und Weiden auf nicht besandetem Niedermoor mit ca. 30 cm durchschnittlichem Grundwasserstand im Sommer.
- F** besonders für das Küstengebiet der Nordsee, für Wiesen und Weiden auf nicht besandetem Niedermoor mit ca. 30 cm durchschnittlichem Grundwasserstand im Sommer.
- G** für Wiesen und Weiden auf nicht abgetragenen Hochmoor.
- H** für Wiesen und Weiden auf abgetragenen Hochmoor ohne Sandmischung.
- J** für Wiesen und Weiden auf abgetragenen und mit Sand gemischtem Hochmoor.

Endlich folge noch Weber's Mischung

**K** für abgetragenen und mit Marschklei bedeckten Hochmoorboden:

	a. Wiese		b. Weide	
	‰	kg	‰	kg
1. Anthoxanthum odoratum . . . . .	0,5	0,2	0,5	0,2
2. Alopecurus pratensis . . . . .	10	3,8	5	1,5
3. Phleum pratense . . . . .	12	3,4	12	3,4
4. Agrostis alba . . . . .	15	3,8	17,5	4,5
5. Cynosurus cristatus . . . . .	—	—	5	2,2
6. Festuca pratensis . . . . .	19,5	13,7	15	10,7
7. Lolium perenne . . . . .	15	11,3	15	11,3
8. Lolium italicum . . . . .	2	1,5	2	1,5
9. Lotus uliginosus . . . . .	5	1,0	5	1,0
10. Trifolium pratense perenne . . . . .	8	2,8	5	1,7
11. Trifolium hybridum . . . . .	8	1,5	8	1,5
12. Trifolium repens . . . . .	5	1,0	10	2,0
Summa:		44,0		41,5

maßen die Überfrucht. Auf frischem, graswüchsigem Boden kann eine Überfrucht sogar schädlich sein, da sie den raschen Schluß des Rasens behindert. Sog. Klee-gras-gemeinde (Klee mit Timothee) kann man auch im ersten Frühjahr in Wintergetreide säen.

Das *Aussäen* der Gras- und Kleesamen erfolgt am besten in zwei Abteilungen. Zuerst sät man die spezifisch schwereren, d. h. die *Kleesamen*, die man mit dem gleichfalls schweren Timotheesamen, allenfalls auch noch mit Kammgras mischen kann. Darauf folgt die Saat der übrigen, vorher gut zu mischenden Samen.

*Pflege der Wiesen.* Im ersten Jahre lasse man das Gras nicht zu kurz abschneiden, ferner lasse man junge Wiesen nach dem ersten Winter und auch in den nächsten Frühjahren walzen. Ältere Wiesen müssen in jedem Frühjahr geeeggt werden. Ob die Wiesen alle Jahre oder alle zwei Jahre im Winter zu düngen sind, kommt auf den Boden an, bei Rieselwiesen ist in der Regel eine Düngung nicht nötig. Auf Moortwiesen düngt man meist nur mit Kainit und Thomasschlacke (meist 8 Doppelzentner Kainit und 2 Doppelzentner Thomasschlacke aufs ha) beide begünstigen den Wuchs der Leguminosen. Der Stickstoff wird vom Boden geliefert, zum Teil von den Leguminosen. — Zeigt eine Wiese kahle Stellen, so muß  $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{3}$  der Vollsaats *nachgesät* werden. Zur Nachsaat empfiehlt Stebler besonders Kammgras, auch Timothee, Wiesenfuchsschwanz, Rohrglanzgras, Wiesenschwingel und Knaulgras, Goldhafer, englisches und italienisches Raigras, welch letztere beiden aber meist nur ein bis zwei Jahre dauern. Klee kann ebensogut nachgesät werden. Stebler rät auch, und mit Recht, diese Nachsaat *nach dem zweiten Schnitt* zu geben, nachdem die Wiese vorher geeeggt ist, nicht, wie es gewöhnlich geschieht, im Frühjahr, weil dann das ältere, stark treibende Gras die Keimpflanzen leicht unterdrückt.

### § 81.

**Erträge der Wiesen und der einzelnen Futterpflanzen.** Selbstverständlich sind die Erträge der Wiesen je nach deren Beschaffenheit, aber auch je nach der Witterung sehr verschieden. Dasselbe gilt für Bestände aus nur wenigen Gras- und Kleearten, sog. Klee-grass-schläge, und für rein angebaute Gras- und Kleearten. Eine einzelne Grasart wird selten für sich allein angebaut, es sei denn der Samengewinnung wegen; leider hat aber die Grassamenzucht und auch das Sammeln von Samen wildwachsender Gräser in Deutschland immer mehr abgenommen und sind wir meist auf die Einfuhr vom Auslande mit angewiesen. Trotzdem geben wir auf besonderen Wunsch zunächst die Erträge der einzelnen Klee-gewächse und Gräser, soweit diese bekannt sind, und folgen dabei der Tabelle des verstorbenen Prof. Dr. Wollny in München im Landwirtschaftlichen Kalender von Mentzel und v. Lengerke 1902, Verlag von

Paul Parey, Berlin, I. Teil, S. 78; alles in Doppelzentnern aufs Hektar. Einige Zahlen erscheinen uns zu hoch.

<i>Kleegewächse:</i>	Samen	Stroh	Heu, desgl.	Außerord. Maximalerträge
Rotklee . . . . .	3—6	16—20	30— 60	100
Weißklee . . . . .	3—6	20—28	16— 30	40
Inkarnatklee . . . . .	4—7	20—30	24— 36	50
Bastardklee . . . . .	1,6—3,2	12—18	24— 48	60
Wundklee . . . . .	4—8	24—36	20— 50	80
Luzerne . . . . .	4—8	20—30	48—120	160
Sandluzerne . . . . .	2,4—3,6	10—18	36— 72	90
Hopfenluzerne (Gelbklee)	4—6	20—32	20— 48	64
Esparsette . . . . .	6—9	16—32	30— 60	80
Serradella . . . . .	4—15	8—36	24— 60	104
Bokharaklee . . . . .	8—16	36—72	40— 80	100
Schotenklee, gehörnter .	—	—	14— 28	40
Futterwicke . . . . .	—	—	32— 48	60
Sandwicke . . . . .	—	—	32— 64	100
<i>Gräser:</i>				
Rispengras, Wiesen- . .	—	—	32— 64	90
„ gemeines . . . . .	—	—	32— 64	90
„ spätes. . . . .	—	—	48— 72	96
Knaulgras . . . . .	2,2—3,0	—	120—168	208
Kammgras . . . . .	1,6—2,4	—	26— 52	64
Schwingel, Wiesen- . .	2,2—2,8	7,2—12,6	52—140	176
„ rohrartiger . . . . .	3,6—4,0	—	104—160	200
„ Schaf- . . . . .	—	—	26— 44	62
„ roter . . . . .	—	—	34— 68	84
„ härlicher . . . . .	—	—	50—100 (?)	134 (?)
Raigras, englisches . .	2,8—4,0	24—32	40— 80	100
„ italienisches . . . .	3,2—4,4	40—60	76—106	120
„ französisches . . . .	3,0—4,0	40—60	38— 96	172
Gold-Hafer . . . . .	2,0—4,0	—	40— 70	80
Straußgras, gemeines .	—	—	50—100 (?)	130 (?)
Wiesenfuchsschwanz . .	2,0—4,0	—	38— 90	110
Timotheegras . . . . .	3—8	10—20	34—106	140

Theoretisch betrachtet, müßte man, wenn das Mischungsverhältnis der ausgesäten Gräser und Kleegewächse bekannt ist, aus vorstehender Tabelle den Ertrag des Gemisches berechnen können; aber einmal fehlen in der Tabelle manche Gräser, die doch in die Mischung genommen werden, zweitens weiß man nicht, ob sie auch in dem ausgesäten Verhältnis auf der Wiese wirklich erscheinen, da das eine oder das andere vielleicht einen Vorsprung erhält, drittens entwickelt sich öfter noch eine Anzahl anderer Gräser, die gar nicht ausgesät worden, sondern deren Samen im

Boden lagen oder durch Anflug u. dgl. hinzugekommen sind, sodaß die Rechnung nie stimmen würde. Es ist daher viel besser, die an der Hand langjähriger Erfahrung gewonnenen Zahlen über die Erträge der Wiesen zu Grunde zu legen. Darüber gibt es in vielen Büchern Tabellen, bei denen zugleich die Erträge nach der *Güte* der Wiesen, nach deren „Bonität“ geordnet sind.

Wir geben nachstehend die Wiesen- und Weiden erträge nach Prof. Dr. W. Strecker in Leipzig, welche dieser im Landwirtschaftlichen Kalender von Mentzel und v. Lengerke zuerst 1888 veröffentlichte. Sie sind seitdem fast unverändert abgedruckt worden, und nach einer Mitteilung des Herrn Prof. Strecker an den Verf. haben sie auch heute noch im wesentlichen Geltung.

*Heuerträge der Wiesen und Weiden* nach Strecker in Doppelzentnern aufs ha:

Beste 2—3schürige Niederungs- oder Bewässerungswiesen . . . . .	60—80
Sehr gute 2schürige Niederungs- oder Talwiesen, gute Bewässerungswiesen, gut gedüngte Höhenwiesen . . . . .	50—60
Gute 2schürige Wiesen, bewässert oder gedüngt . . . . .	40—50
Mittelgute 2schürige Wiesen, bewässert oder gedüngt . . . . .	30—40
Geringe 2schürige Wiesen, mangelhaft bewässert oder gedüngt . . . . .	25—30
1schürige Wiesen, nicht bewässert, ungedüngt . . . . .	20—25
Geringe 1schürige Wiesen, nicht bewässert, ungedüngt . . . . .	15—20
Sehr geringe 1schürige Wiesen, auch torfige Wald- und Bergwiesen . . . . .	7—15

---

Mast- oder Fettweiden (2,5—3 Stück Rindvieh zu 500 kg aufs ha) . . . . .	55—70
Sehr gute Kuhweiden (2—2,5 Stück Rindvieh aufs ha) . . . . .	45—55
Gute Kuhweiden (1,5—2 Stück Rindvieh aufs ha) . . . . .	35—45
Geringe Kuhweiden (1—1,5 Stück Rindvieh aufs ha) . . . . .	25—35
Gute Schafweiden (9—12 Schafe aufs ha) . . . . .	25—35
Mittelmäßige Schafweiden (6—9 Schafe aufs ha) . . . . .	15—25
Geringe Schafweiden (3—6 Schafe aufs ha) . . . . .	6—15
Sehr geringe Schafweiden (1—3 Schafe aufs ha) . . . . .	3—6

Den brieflichen Nachrichten des Herrn Prof. Strecker zufolge kommt er auf Grund der Jahresberichte der Landwirtschaftskammern für 1901, die ihm fast alle vorgelegen, zu folgenden Durchschnittszahlen in Doppelzentnern aufs ha:

Beste Niederungs- und Bewässerungswiesen . . . . .	76
Gute 2schürige Niederungs- und Bewässerungswiesen . . . . .	54—62
2schürige Wiesen . . . . .	40—49
Gute 1schürige Wiesen . . . . .	27—35
1schürige Wiesen . . . . .	15—22

„Durch die Kali-Phosphatdüngung ist der Ertrag zwar etwas gestiegen“, äußert sich Herr Prof. Strecker, „aber immer noch nicht genug, Grundlehren der Kulturtechnik. Erster Band. I. Teil. 3. Auflage. 23

und es ist geradezu unverzeihlich, daß sich die Landwirte mit niedrigen Erträgen begnügen. Der Wiesenbau ist in manchen Fällen noch immer das Stiefkind geblieben, was um so unerklärlicher ist, als der Futterbau auf dem Ackerlande vielmal teurer ist als der auf den Wiesen. Und doch geht so viel Geld für den Futterbau auf dem Ackerlande drauf, während man oft dicht daneben durch Verbesserung der Wiesen viel schneller vorwärts kommen würde.“

Wir können uns dem nur anschließen. Der Landwirt muß nach immer höheren Erträgen auf seinen Wiesen streben. Uns ist ein Gut in Pommern bekannt, wo durch passende Aussaat und gute Pflege der Wiesen bis 160 Doppelzentner Heu aufs Hektar gewonnen werden. Das ist allerdings vielleicht ein Ausnahmefall, aber wir müssen solche Fälle zu vermehren suchen. Schon 1882 gibt Hugo Werner in Thiel's Landwirtschaflichem Lexikon den Ertrag der Wiesen folgendermaßen an:

Gedüngte, gut bewässerte 3schürige Wiesen . . .	bis 85 dz aufs ha.
Gute natürliche 2schürige Wiesen . . . . .	40—60 „ „ „
1schürige Wiesen . . . . .	20—40 „ „ „

Vergleicht man diese Zahlen mit den obigen, so sehen wir, daß wir noch nicht viel weiter gekommen sind. Werner sagt sehr richtig: Wiesen mit weniger als 20 Doppelzentner Heu aufs ha sollte man nicht mehr als Wiesen benutzen. Wir möchten dem hinzufügen: Die muß man, wenn irgend möglich, zu verbessern suchen! In der Schweiz bringen die besten *Talwiesen* 50—70 Doppelzentner aufs ha und mehr, die *Alpenwiesen* bedeutend weniger, aber dafür nährstoffreicheres Futter. (Stebler und Schröter, Die besten Futterpflanzen, Teil III, S. 7.)

---

Schon v. d. Goltz, Landw. Taxationslehre 1882, S. 373, hat darauf hingewiesen, daß es das richtigste sei, bei der Klassifikation der Wiesen, ebenso wie beim Ackerlande, für jeden Klassifikationsbezirk, bzw. für jedes abzuschätzende Gut ein *besonderes System* aufzustellen. Und so wird ja auch bei den Bonitierungen der Generalkommissionen für jede Gemarkung ein besonderer Klassentarif aufgestellt. Dieser soll nur das *Verhältnis* der Güte der Wiesen in der betr. Gemarkung zu *einander* angeben, und darauf kommt es bei der Ablösung etc. nur an. Siehe Beispiele bei v. d. Goltz, Taxationslehre, und bei Hüser, Zusammenlegung der Grundstücke, 1890. Ferner bei Dünkelberg, Landw. Taxationslehre, 1898, S. 99.

---

## Literatur zum II. Abschnitt.

- Abromeit, J., unter Mitwirkung von A. Jentzsch und G. Vogel, Flora von Ost- und Westpreußen, 1899.
- Ascherson und Graebner, Flora des Nordostdeutschen Flachlandes (außer Ostpreußen). Berlin 1898—1899.
- Ascherson, Graebner und Beyer, Nordostdeutsche Schulflora. Berlin 1902. (Anzug aus voriger, für die meisten Zwecke ausreichend.)
- Birnbaum, Dr. Eduard, Wiesen- und Futterbau. Berlin 1892, Paul Parey.
- Birnbaum, K., Landwirtschaftliche Taxationslehre. Berlin 1877.
- Braungart, Dr. Richard, Handbuch der rationellen Wiesen- und Weiden-Kultur und Futterverwendung. München 1899, Theodor Ackermann.
- Burgtorf, F., Wiesen- und Weidenbau. 4. Aufl. Berlin 1895, Paul Parey (Thaer-Bibliothek).
- Dünkelberg, Dr. Friedrich Wilhelm, Der Wiesenbau in seinen landwirtschaftlichen und technischen Grundzügen. 3. Aufl. Braunschweig 1894, Friedrich Vieweg & Sohn.
- Dünkelberg, F. W., Landw. Taxationslehre. Braunschweig 1898.
- Fuchs, Dr. E., Der Petersen'sche Wiesenbau. Berlin 1889, Paul Parey (Thaer-Bibliothek).
- Garcke, Illustrierte Flora von Deutschland. 18. Aufl. Berlin 1898, Paul Parey.
- Heinemann, A., Grundregeln der Wiesenpflege. Siegen 1900, W. Vorländer.
- Hüser, A., Die Zusammenlegung der Grundstücke nach dem preussischen Verfahren. Berlin 1890, Paul Parey.
- Jessen, Deutschlands Gräser und Getreidearten. Leipzig 1863.
- Kirchner, O., Flora von Stuttgart und Umgebung mit besonderer Berücksichtigung der *biologischen* Verhältnisse.<sup>1)</sup> 1890.
- König, Dr. J., Die Pflege der Wiesen. Berlin 1893, Paul Parey.
- Kgl. preussisches Kriegsministerium, Anleitung zur Beurteilung des Pferdeheues. Berlin 1889, Paul Parey.
- Kutscher, H., Wiesenbau. 2. Aufl. Berlin 1898, Paul Parey (Landw. Unterrichtsbücher).
- Lackowitz, W., Flora von Berlin und der Provinz Brandenburg. 12. Aufl. Berlin 1901, Friedberg & Mode.
- Landwirtschaftliches Jahrbuch der Schweiz, 1892. Enthält einen sehr wichtigen Aufsatz von Stebler und Schröter: Versuch einer Übersicht über die Wiesentypen der Schweiz.

---

<sup>1)</sup> Fast für jede Gegend gibt es Lokalfloren, die man gegebenenfalls zu Rate ziehen muß. Wir können sie hier nicht alle nennen, die Kirchner'sche aber berücksichtigt zum erstenmale ausführlicher die Biologie (die Bestäubungsverhältnisse etc.).



- Langethal, Handbuch der Landw. Pflanzenkunde. 5. Aufl. Berlin 1874, Paul Parey. 4 Bde. (1. Teil: Gras und Getreide; 2. Teil: Klee- und Wickpflanzen). Noch immer brauchbar.
- Lehrke, Mischung und Aussaat von Grassämereien. Breslau 1888.
- Nowacki, Der praktische Klee grasbau. 3. Aufl. Frauenfeld 1891, J. Huber's Verlag.
- von Seelhorst, Dr. C., Acker- und Wiesenbau auf Moorboden. Berlin 1892, Paul Parey.
- Stebler, Dr. F. G., Die besten Grassamenmischungen. 3. Aufl. Bern, K. J. Wyss.
- Stebler und Schröter, Die besten Futterpflanzen. Abbildungen und Beschreibungen nebst Angaben über Kultur, landwirtschaftlichen Wert, Samen-Gewinnung, Verunreinigungen, Verfälschungen etc. Im Auftrage des Schweizerischen Landwirtschaftsdepartements bearbeitet. 4<sup>o</sup>. I. Teil 2. Aufl., 1892; II. Teil 2. Aufl. (von Stebler allein), 1895; III. Teil: Die Alpenfutterpflanzen, 1889; IV. Teil: Die besten *Streu*epflanzen (von Stebler allein), 1898. Das beste und mit schönen farbigen Tafeln versehene Werk über die wichtigsten Futterpflanzen. Verlag von K. J. Wyss in Bern.
- Strecker, Dr. W., Erkennen und Bestimmen der Wiesengräser. 3. Aufl. Berlin 1900, Paul Parey.
- Die Kultur der Wiesen. Berlin 1894.
- Trommer, Dr. C., Die Bonitierung des Bodens vermittelt wildwachsender Pflanzen. Greifswald 1853, C. A. Koch's Verlagsbuchhandlung.
- Ulbrich, Dr. Rudolf, Der praktische Wiesenwirt. Leipzig 1901, Hugo Voigt.
- Weber, C. A., Über die Zusammensetzung des natürlichen Graslandes in Westholstein, Dithmarschen und Eiderstedt. Sonderabdruck aus Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein, Bd. IX, Heft 2. Kiel 1892, Druck von Schmidt & Klaunig.
- Über die Wiesentypen auf den Moorwiesen und deren Ansaat etc., in Tacke, Mitteilungen der Moor-Versuchs-Station Bremen; (Thiel's landw. Jahrb., Bd. XXVII, Ergänzungsbd. IV.)
- in Emmerling und Weber, Beiträge zur Kenntnis der Dauerweiden. Arbeiten der Deutsch. Landw.-Gesellschaft, Heft 61, 1901. — (Siehe auch S. 237.)
- Werner, Dr. Hugo, Handbuch d. Futterbaues. 2. Aufl. Berlin 1889, Paul Parey.
- Wittmack, Dr. Ludwig, Gras- und Kleesamen, kurze Anleitung zu ihrer Erkennung und Prüfung, nebst deren Verfälschungen und Verunreinigungen. Berlin 1872, Paul Parey. Mit 8 Tafeln.
- Die Beurteilung des Heues. (Abdruck aus Nachrichten des Klubs der Landwirte zu Berlin.) Berlin 1889, Paul Parey.
- Die eidgenössische Samenkontrollstation in Zürich, ihre Versuchsfelder daselbst und auf der Fürstenalp, nebst Bemerkungen über einige Alpenwiesen und -weiden, in Thiel's Landw. Jahrb., Bd. XXIII, 1894, S. 47.
- Die Wiesen auf den Moordämmen in der Kgl. Oberförsterei Zehdenick, 2. bis 9. Bericht. Abdruck aus Thiel's Landw. Jahrb.; der 9. (Schluß-)Bericht in Bd. XXVIII, 1900, S. 539, mit 5 Tafeln. Berlin, Paul Parey.
- Wünsche, Otto, Die Pflanzen Deutschlands. 8. Aufl. Leipzig 1901, B. G. Teubner,

### Dritter Abschnitt.

## Grundzüge der technischen Mechanik und Hydraulik.

### Kapitel I.

#### Bewegung fester Körper und mechanische Arbeit.

##### § 1.

**Von der Bewegung.** Bevor man versucht, die oft sehr verwickelte Bewegung eines Körpers zu beschreiben, ist es zweckmäßig, nur einen Punkt desselben ins Auge zu fassen. Dieser befindet sich bei seiner Bewegung nach und nach an verschiedenen Stellen, deren Gesamtheit eine *gerade* oder *krumme* Linie bildet und *Bahn* des Punktes genannt wird. Gleichzeitig hat man auf die fortschreitende Zeit zu achten. Man zählt dieselbe nach Sekunden, von einem gewissen Augenblicke (zur Zeit Null) ausgehend.

Zur Zeit 0 möge ein bewegter Punkt  $P$  (Fig. 116) im Punkte  $A$  seiner Bahn gewesen sein und sich zur Zeit  $t$  in  $B$  befinden. Die Länge der Strecke  $AB$ , längs der Bahn gemessen, sei  $s$ , dann heißt der Wert  $u$  des Verhältnisses  $s:t$  die *mittlere Geschwindigkeit* des Punktes für die Strecke  $AB$ .



Fig. 116.

Wir wollen uns die mittlere Geschwindigkeit auch für kürzere Strecken, z. B.  $s:2$ ,  $s:3$ ,  $s:4$ , berechnet denken und annehmen, die Werte von  $u$  seien für die immer kürzer werdenden Strecken beziehentlich  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$ , so wird man einsehen, daß sich auch ein ganz bestimmter Wert von  $u$  ergeben muß, wenn die zugehörige Strecke unendlich klein genommen wird. Dieser Grenzwert wird *Geschwindigkeit* des Punktes  $P$  in seiner Lage  $A$  genannt.

##### § 2.

**Gleichförmige Bewegung.** Erhält man für  $u$  stets denselben Wert, wie groß oder wie klein man auch die Strecke der Bahn zur

Berechnung von  $u$  nimmt, so sagt man, die Bewegung des Punktes sei gleichförmig. Es ist dann auch der mit  $c$  zu bezeichnende Wert der Geschwindigkeit für alle Stellen der Bahn derselbe, und man hat

$$c = \frac{s}{t} \quad (1), \quad \text{woraus folgt } s = ct \quad (2), \quad \text{und } t = \frac{s}{c} \quad (3).$$

Setzt man  $t=1$ , so folgt  $c=s$ , d. h.: *Die Geschwindigkeit ist gleich dem in der Zeiteinheit zurückgelegten Wege.*

*Beispiel.* Jemand legt in einer Stunde 3960 m zurück; wie groß ist seine mittlere Geschwindigkeit? — Es ist  $s$  gleich 3960 m zu setzen und  $t$  gleich  $1 \times 60 \times 60$  Sekunden und nach (1) zu rechnen. Man erhält  $c$  gleich 1,1 m.

### § 3.

**Geschwindigkeits-Kurve.** Es sei für einen bewegten Punkt, z. B. an einem schwimmenden Körper, ermittelt, daß während der auf-




Fig. 117.

einander folgenden Zeiträume  $t_1, t_2, t_3, t_4, \dots, t_{n-1}, t_n$  seine mittleren Geschwindigkeiten beziehentlich betragen  $u_1, u_2, u_3, \dots, u_{n-1}, u_n$ . Die durchlaufene Weglänge ist dann nach § 1 während des ersten Zeitraumes  $t_1$  gleich  $u_1 t_1$ , während des zweiten  $u_2 t_2$  u. s. w., sodaß die ganze durchlaufene Strecke gefunden wird aus

$$s = u_1 t_1 + u_2 t_2 + u_3 t_3 + \dots + u_n t_n.$$

Dieser Ausdruck ist in Fig. 117 graphisch dargestellt. Es sind auf  $OX$  die Zeiten durch ihrer Größe entsprechende, aneinander gesetzte Strecken bezeichnet. In der Mitte jeder dieser Strecken ist eine Senkrechte errichtet, deren Länge der entsprechenden mittleren Geschwindigkeit gleichkommt. Ferner sind Rechtecke konstruiert, deren Grundlinien die aufgetragenen Zeiten, und deren Höhen die aufgetragenen Geschwindigkeiten sind. Der Inhalt des ersten dieser Rechtecke ist  $u_1 t_1$ , der des zweiten  $u_2 t_2$  u. s. w. Man erkennt, daß die Inhalte der aufeinanderfolgenden Rechtecke gleich sind den während der Zeiten  $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$  durchlaufenen Weglängen. Mithin entspricht der Inhalt der Figur  $OABC$  der ganzen durchlaufenen Weglänge.

Wären die Zeiten  $t_1, t_2, t_3 \dots t_n$  unendlich klein genommen, so würde sich die treppenförmig abgestufte Linie nur um unmerklich kleine Werte von der in Fig. 117 punktierten Kurve entfernen. Diese Kurve hat dann die Eigentümlichkeit, daß jede Ordinate derselben ( $u_1, u_2, u_3 \dots u_n$ ) die zu dem entsprechenden Zeitpunkt stattfindende Geschwindigkeit  $v$  des bewegten Punktes bedeutet. Wir wollen eine solche Kurve kurz die *Geschwindigkeitskurve* nennen. Es ist auch ersichtlich, daß die von der Geschwindigkeitskurve  $AB$  begrenzte Figur  $OABC$  der ganzen durchlaufenen Weglänge  $s$  gleich ist.




Fig. 118.

Fig. 118 zeigt die gewöhnliche Art, die Geschwindigkeitskurve zu zeichnen. Dabei sind auf  $OX$  Teilpunkte abgetragen, die den einzelnen Sekunden bis zur ganzen in Betracht kommenden Zeit  $t$  entsprechen. Jede Ordinate würde also die Geschwindigkeit zu der entsprechenden Zeit bedeuten, z. B.  $o$  diejenige zur Zeit 2,5 Sekunden. Die ganze durchlaufene Weglänge ergibt der Inhalt der Figur  $OABC$ .

#### § 4.

**Gleichförmig beschleunigte Bewegung.** Es kommt vor, daß die Geschwindigkeitskurve gerade ist, wie in Fig. 119. Der Wert der Geschwindigkeit zur Zeit Null, *Anfangsgeschwindigkeit*, sei  $c$  und ihr Wert zur Zeit  $t$ , *Endgeschwindigkeit*,  $v$ , dann ist  $v-c$  die ganze Zunahme der




Fig. 119.

Geschwindigkeit während der Zeit  $t$ . Für eine Sekunde beträgt also die Zunahme  $(v-c):t$ . Diese Größe, *Beschleunigung* genannt, werde mit  $G$  bezeichnet. Es ist dann offenbar am Ende der ersten Sekunde die Geschwindigkeit gleich  $c+G$ , am Ende der zweiten  $c+2G$ , am Ende der

dritten  $c + 3G$  u. s. w., sodaß allgemein der Wert  $v$  der Geschwindigkeit zu irgend einer Zeit  $t$  sich darstellt, wie folgt:

$$v = c + Gt. \quad (4)$$

Eine Bewegung, bei der, wie es vorstehende Gleichung ausdrückt, die Geschwindigkeiten in gleichen Zeiten um gleichviel wachsen, heißt eine *gleichförmig beschleunigte Bewegung*. Will man den während irgend einer Zeit  $t$  durchlaufenen Weg  $s$  wissen, so braucht man sich nur zu erinnern, daß er nach § 3 gleich ist dem Inhalt der Figur  $OABC$  oder

$$s = \frac{c+v}{2} t; \quad (5)$$

setzt man für  $v$  den Wert aus (4), so folgt auch

$$s = ct + \frac{G}{2} t^2. \quad (6)$$

### § 5.

**Gleichförmig verzögerte Bewegung.** Ist die Geschwindigkeitskurve nicht, wie in Fig. 119, eine Gerade, die sich von der Linie  $OX$  ent-




Fig. 120.

fernt, sondern eine solche, die sich derselben nähert, wie in Fig. 120, so bedeutet jetzt  $v-c$  die Abnahme der Geschwindigkeit während der Zeit  $t$ , d. i. eine negative Gröfse. Die Abnahme auf eine Sekunde ist wie oben  $(v-c):t$ , und sei als eine negative Gröfse mit  $-G$  bezeichnet und *Verzögerung* genannt. Die Geschwindigkeit zur Zeit  $t$  ist offenbar

$$v = c - Gt. \quad (7)$$

Die gesamte Weglänge  $s$  ist auch hier dem Inhalte der Figur  $OABC$  gleich oder

$$s = \frac{v+c}{2} t. \quad (8)$$

Oder für  $v$  den Wert aus (7) gesetzt

$$s = ct - \frac{G}{2} t^2. \quad (8)$$

### § 6.

**Fallgesetze.** Ein frei im luftleeren Raume fallender Körper bewegt sich nach den Beobachtungen der Physiker gleichförmig beschleunigt.

Die Beschleunigung ist dabei an demselben Orte für alle Körper gleich, sie wird mit  $g$  bezeichnet und beträgt für unsere Breiten 9,81 m. Beim Fallen hinreichend schwerer Körper in der Luft kann man den Einfluß des Luftwiderstandes vernachlässigen.

Wir können daher das Fallen von Steinen, Metallkugeln u. s. w., die nicht gar zu klein sind, durch Rechnung verfolgen. Die Zeit  $t$  wollen wir dabei von dem Augenblicke an zählen, in dem der betreffende Körper losgelassen wird. Die Anfangsgeschwindigkeit  $c$  wäre dann gleich Null. Die verflossene Zeit werde mit  $t$ , der durchlaufene Weg, die *Fallhöhe*, mit  $h$  bezeichnet, dann hat man nach (4) § 4 die zur Zeit  $t$  erlangte Geschwindigkeit

$$v = gt = 9,81 t \text{ Meter} \quad (11)$$

und den zurückgelegten Weg nach (6) § 4

$$h = \frac{g}{2} t^2 = 4,91 t^2 \text{ Meter.} \quad (12)$$

Aus diesen beiden Gleichungen lassen sich  $v$  und  $h$  berechnen, wenn  $t$  gegeben ist. Wäre  $v$  gegeben, so folgt aus (11)

$$t = \frac{v}{g} = 0,102 v \text{ Sekunden,} \quad (13)$$

und setzt man diesen Wert in (12) ein, so folgt

$$h = \frac{v^2}{2g} = 0,051 v^2 \text{ Meter.} \quad (14)$$

Es kann auch  $h$  gegeben sein, dann ergibt (12)

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0,452 \sqrt{h} \text{ Sekunden} \quad (15)$$

und (14)

$$v = \sqrt{2gh} = 4,429 \sqrt{h} \text{ Meter.} \quad (16)$$

*Beispiele.* a) Vom Rande eines Brunnens läßt man einen Stein fallen und beobachtet die Zeit bis zum Aufschlagen. Wie tief ist der Brunnen, und mit welcher Geschwindigkeit kommt der Stein unten an, wenn die beobachtete Zeit beziehentlich 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden beträgt? Die Werte ergeben sich aus (12) und (11) zu

Zeit in Sekunden	1	2	3	4	5
Brunnentiefe in m	4,91	19,6	44,2	78,6	122,8
Geschwindigkeit in m	9,81	19,6	29,4	39,2	49,0

b) Welche Höhe muß ein Körper durchfallen, um eine Endgeschwindigkeit von 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 1,0 m zu erreichen, und wie viel Zeit gebraucht er dazu? — Die gesuchten Werte ergeben sich aus (14) und (13) wie folgt:

Geschwindigkeit in m	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0
Fallhöhe in mm	0,51	2,04	4,59	8,16	12,7	51,0
Zeit in Sekunden	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,10

## § 7.

**Aufsteigende Bewegung.** Wird ein Körper mit einer Anfangsgeschwindigkeit  $c$  lotrecht aufwärts geworfen, so verliert er in jeder Sekunde vermöge der Einwirkung der Schwerkraft den Betrag der Fallbeschleunigung  $g$  an Geschwindigkeit. Die Bewegung ist eine gleichförmig verzögerte, und nach  $t$  Sekunden ist die Geschwindigkeit  $v = c - gt$ . Der Körper wird nun so lange steigen, bis  $v$  den Wert 0 erreicht oder  $0 = c - gt$ , woraus folgt  $t = c : g$ . Die Länge des dabei zurückgelegten Weges oder die Steighöhe  $h$  findet man nach (9) § 5, indem man für  $t$  den eben erhaltenen Wert setzt, zu

$$h = ct - \frac{g}{2} t^2 = \frac{c^2}{g} - \frac{g}{2} \cdot \frac{c^2}{g^2} = \frac{c^2}{2g}.$$

$c^2 : 2g$  oder  $h$  heißt die *Geschwindigkeitshöhe* zu  $c$ . Wenn der gestiegene Körper frei wieder heruntermfällt, so läßt sich leicht zeigen, daß in demselben Punkte seiner Bahn seine Geschwindigkeit auch die beim Aufsteigen dort vorhandene GröÙe erreicht.

## § 8.

**Mechanische Arbeit.** Man betrachte ein Pferd, Fig. 121a, welches auf horizontaler StraÙe einen Wagen zieht. Das Pferd übt auf den Wagen eine *Kraft* aus und leistet eine *mechanische Arbeit*.

Um zunächst über die *GröÙe* der Kraft eine genauere Vorstellung zu bilden, denken wir das Pferd ausgespannt und statt dessen ein Seil an den Wagen befestigt, welches über eine sehr leicht gehende Rolle gelegt und mit einem Gewicht belastet wird, das in einen tiefen Brunnen hinabsinken kann (Fig. 121c). Durch das Gewicht soll nun der Wagen genau ebenso fortgezogen werden, wie vorhin durch das Pferd. Dann gibt uns das Gewicht ein Maß für die vom Pferde ausgeübte *Zugkraft*. Allerdings hat ersteres noch einige andere Arbeiten zu verrichten, die nicht beabsichtigt sind; es muß nämlich das Seil krümmen und die Rolle drehen. Wir wollen annehmen, das Gewicht betrage 76 kg und davon sei ein kg nötig zur Überwindung der Nebenwiderstände. Dann ist das die Zugkraft des Pferdes ersetzende Gewicht gleich 75 kg. Wir sagen dementsprechend, das Pferd ziehe mit einer *Kraft* von 75 kg. Die GröÙe jeder beliebigen anderen Kraft kann in gleicher Weise in kg ausgedrückt werden, und so mißt man im praktischen Leben gewöhnlich die Kräfte durch Vergleichung derselben mit Gewichten.

Die Kraft, welche das Pferd auf den Wagen ausübt, ist, bei der vorausgesetzten Gleichförmigkeit der Bewegung desselben, genau bestimmt durch die GröÙe des Widerstandes, den der Wagen seiner Fortbewegung entgegensetzt. Wir können uns demnach die Wirkung des Wagens auf das Pferd durch ein zu hebendes Gewicht nach Fig. 121b ersetzen. Das

Pferd hebt nun allerdings nicht bloß das Gewicht, sondern muß auch die Rolle drehen und das Seil krümmen. Wir wollen, wie vorhin, annehmen, daß die dazu nötige Kraft 1 kg beträgt, dann würde das vom Pferde *wirklich* gehobene Gewicht nur 74 kg betragen können, da die Zugkraft des Pferdes 75 kg ausmacht.

Wenn nun das Pferd das Gewicht von 74 kg emporzieht, so ist der Wert der dadurch geleisteten *Arbeit* leicht in Zahlen auszudrücken. Als Einheit wird das *Kilogramm-meter* angenommen, oder die Arbeit, welche durch Hebung von 1 kg um 1 m geleistet wird. Hebt das Pferd hier




Fig. 121.

74 Kilogramm um 1 m, so leistet es offenbar die Einheit der Arbeit 74 mal, also 74 Kilogramm-meter, oder kürzer 74 kgm. Werden diese 74 kg nicht auf 1 m, sondern auf  $h$  Meter Höhe gehoben, so wird die eben genannte Leistung  $h$  mal gemacht. Demnach beträgt dann die Leistung  $74 h$  Kilogramm-meter und, mit Rücksicht auf die 1 kg entsprechende Überwindung der Nebenwiderstände, die Gesamtarbeit des Pferdes  $75 h$  kgm.

*Die durch Hebung von Gewichten geleistete Arbeit wird ausgedrückt durch das Produkt aus dem gehobenen Gewicht und der Höhe, um die es gehoben wurde.*

*Wird die Kraft des Pferdes, oder irgend eine andere, in Kilogrammen ausgedrückt und mit der Länge des Weges, den ihr Angriffs-*



punkt in der Richtung der Kraft zurückgelegt, *multipliziert*, so erhält man die von *der Kraft geleistete Arbeit in kgm*.

Bei Angabe bestimmter Arbeitsleistungen pflegt man die Zeit anzugeben, in der sie ausgeführt werden. Die Leistung von 1 kgm in einer Sekunde nennt man ein *Sekundenkilogramm*, oder, abgekürzt geschrieben, *skgm*, und benutzt sie als Einheit. Entspricht z. B. die Leistung eines arbeitenden Mannes in jeder Sekunde der Hebung von 2 kg um 4 m, so leistet er  $2 \times 4 = 8$  kgm in der Sekunde oder 8 skgm. Als Einheit für große Arbeitsleistungen gebraucht man die *Pferdekraft*, die einer Leistung von 75 skgm entspricht.

### § 9.

**Energie.** In Fig. 121c wurde die Kraft des Pferdes durch ein ziehendes Gewicht ersetzt, und in Fig. 121b der Widerstand des Wagens. Jetzt möge nach Fig. 121d beides geschehen. Man hat dann ein steigendes und ein fallendes Gewicht, die durch einen Faden verknüpft und von gleicher Größe sind, wenn man absolut vollkommene Einrichtungen und damit die Nebenwiderstände als verschwindend klein annimmt. Insofern das steigende Gewicht von dem sinkenden gehoben wird, sagt man, dieses leiste eine Arbeit; insofern es imstande ist, eine mechanische Arbeit zu leisten, sagt man, es habe *Energie* oder das Vermögen zu Arbeitsleistungen. Beträgt das niedersinkende Gewicht 75 kg und die Höhe, um die es fallen kann, 10 m, so kann es das andere, dessen Gewicht ebenso groß ist, um 10 m heben. Sein Vorrat an Energie wird also durch  $75 \times 10 = 750$  kgm gemessen. Ist das Gewicht um 5 m gesunken, so ist die Hälfte seiner Energie verbraucht, dagegen hat das gehobene Gewicht um ebensoviel an Energie gewonnen, weil es jetzt die 5 m, um die es gehoben ist, wieder durchfallen und dabei, vollkommene Einrichtungen vorausgesetzt, ein ihm gleiches Gewicht um 5 m heben kann. Man wird daraus erkennen, daß die *Gesamtenergie des Systems* der beiden Gewichte *nicht* abnimmt, denn was eines verliert, gewinnt das andere.

### § 10.

**Erhaltung der Energie.** Die Physiker behaupten dasselbe von der Welt als Ganzes betrachtet, indem sie sagen: *der Gesamtvorrat an Arbeitsvermögen oder die Energie im Weltganzen ist von unveränderlicher Größe*. Was ein Körper an Energie, d. i. Arbeitsvermögen, verliert, ist nur an andere übergegangen.

### § 11.

**Formen der Energie.** Wenn man das vorhin betrachtete Gewicht von 75 kg nicht durch ein Seil mit einem andern verknüpft, sondern frei

fallen läßt, so wird es auch diejenige Energie, die es vermöge seiner Lage über dem Boden besaß, verlieren, und es fragt sich nun, wo sie geblieben ist. Man bemerkt am fallenden Gewicht eine Veränderung, nämlich den Übergang aus der Ruhe zu der Bewegung mit wachsender Geschwindigkeit. Nun wurde in § 7 gezeigt, daß ein schwerer Körper, wenn er mit einer Geschwindigkeit  $v$  lotrecht nach oben geworfen wird, eine Höhe gleich  $\frac{v^2}{2g}$  erreicht, bis er zur Ruhe kommt. Vermöge seiner Geschwindigkeit vermag also ein Körper durch Hebung seines Gewichtes eine Arbeit zu verrichten, die für ein Gewicht  $P$  mit einer Geschwindigkeit  $v$  gleich ist  $P \frac{v^2}{2g}$  kgm. Demnach enthält ein in Bewegung befindlicher Körper stets einen Energievorrat, welcher *Energie der Bewegung* oder *kinetische Energie* genannt wird, während die aus der Stellung des Körpers zu andern hervorgehende Energie des § 9 *Energie der Lage* oder *potentielle Energie* genannt wird.

Folgende Betrachtung zeigt beide Arten der Energie in sehr lehrreicher Weise. Es werde eine aus vollkommen elastischem Stoffe bestehende Kugel  $h$  Meter über einer vollkommen harten Platte (Fig. 122) losgelassen. Beim Beginn der Bewegung hat das kugelförmige Gewicht  $P$  einen Energievorrat  $Ph$ , weil es die Höhe  $h$  durchfallen kann. Ist von  $h$  bereits eine Strecke  $x$  durchfallen, so beträgt seine Energie der Lage nur noch  $P(h-x)$ . Dafür hat  $P$  aber nach § 6 (16) eine Geschwindigkeit  $v$  gleich  $\sqrt{2gx}$  erlangt. Vermöge einer solchen Geschwindigkeit  $v$  kann nach § 7 das Gewicht um  $\frac{v^2}{2g}$  Meter steigen, was, wenn man für




Fig. 122.

$v$  obigen Wert setzt,  $x$  ergibt. Die Energie der Bewegung ist also gleich  $Px$ , die noch vorhandene Energie der Lage ist  $P(h-x)$ , mithin sind beide zusammen  $P(h-x) + Px = Ph$ . Die *Gesamtenergie* bleibt also während des Fallens *unverändert*. Trifft nun die Kugel auf die Platte, so wird sie eine veränderte Form annehmen und einen Augenblick zur Ruhe kommen. Ist die Kugel aber, wie angenommen, vollkommen elastisch, so wird sie ihre frühere Gestalt in kurzer Zeit wieder gewinnen und mit derselben Geschwindigkeit von der Platte abfliegen, mit der sie auftraf, die frühere Höhe erreichen und das beschriebene Spiel ins Unendliche wiederholen. Die Gesamtenergie bleibt bei jeder Lage des Gewichts dieselbe.

Wie verhält sich aber die Sache, wenn die Kugel unelastisch ist und beim Auftreffen auf die Platte liegen bleibt? Dann scheint jede Spur von Energie verloren. Indessen wird man bei näherer Untersuchung finden, daß die Kugel wärmer geworden ist. Nun ist aber bekannt, wie durch das in der Wärme steckende Arbeitsvermögen vermittelt der sogenannten Dampfmaschinen, die eigentlich Wärmemaschinen heißen sollten, weil die Wärme ihre eigentliche Triebkraft, der Dampf aber nur ein Vermittler ist, die grüßten mechanischen Arbeiten geleistet werden. Die Wärme ist also eine besondere Form der Energie, und wenn in unserm Beispiele durch das Fallen der Kugel Wärme erzeugt wurde, so ist die Energie nicht verloren, sondern hat nur die Wärmeform angenommen. Es ist bis jetzt keine Erfahrung bekannt, die dem Gesetz von der Erhaltung der Energie widerspricht, sodaß es als ein allgemein gültiges Naturgesetz angenommen werden kann. Durch sorgfältige Versuche hat man gefunden, daß 425 kgm Arbeit der Erzeugung einer Wärmeeinheit entsprechen, nämlich derjenigen Wärmemenge, die nötig ist, um 1 kg Wasser von Null Grad um einen Grad Celsius zu erwärmen.

## § 12.

**Energie des fallenden Wassers.** Bei dem in Fig. 123 dargestellten Wasserlaufe möge das Wasser oben mit einer gewissen Geschwindigkeit ankommen, um eine Höhe  $h$  herabstürzen und mit der früheren Geschwindigkeit



Fig. 123.

weiter fließen. Es hat dann das ankommende Wasser ebensoviel kinetische Energie, wie das abfließende, aber an Energie der Lage hat jedes kg des letzteren wegen seines Fallens um  $h$  Meter einen Verlust von ebensoviel kgm erlitten, was durch eine Erwärmung des Wassers um  $h : 425$  Grad C. ausgeglichen ist (§ 11). Es ist zu berechnen, wie viel der Wasserfall zum Betriebe einer Mühle leisten könnte. Aus § 9 folgt, daß ein um die Höhe  $h$  fallendes kg bei einer

absolut vollkommenen Einrichtung ein anderes kg um ebensoviel heben, also  $h$  kgm leisten kann. Bringt nun der Wasserlauf in der Sekunde  $l$  Liter Wasser, von denen jedes ein kg wiegt, so wird die Wasserkraft bei vollkommener Ausnutzung  $lh$  skgm leisten. Es sei z. B. die in der Sekunde zufließende Wassermenge 120 Liter und das Gefälle oder der lotrechte Abstand des Oberwasserspiegels vom Spiegel des Unterwassers gleich 10 m. Da nun jedes Liter Wasser 1 kg wiegt, so verliert es beim Durchfallen von 10 m Höhe 10 kgm an Energie der Lage, mit denen ebensoviel Arbeit geleistet werden kann. 120 l ergeben aber  $120 \times 10 = 1200$  kgm. Da 75 skgm eine Pferdekraft bedeuten, so hätte man also  $1200 : 75 = 16$  Pferdekraften verfügbar. Wegen der Unvollkommenheiten jeder Maschine

kann man aber diese im Wassersturz vorhandene Arbeitskraft niemals voll zu den beabsichtigten Zwecken, z. B. zum Betriebe einer Mühle, verwenden. Bei Turbinen und Wasserrädern ist man meist froh, wenn nicht mehr als 25% zur Überwindung der Nebenhindernisse verbraucht werden. Es würden dann 75% oder  $0,75 \times 16 = 12$  Pferdekräfte nutzbar zu machen sein. Das in Prozenten ausgedrückte Verhältnis, 75:100, der nutzbar gemachten zur vorhandenen Energie heisst *Wirkungsgrad* der Anlage.

### § 13.

**Arbeit zum Heben von Wasser.** Häufig ist die Frage zu beantworten, wie viel es kostet, um eine gewisse Wassermenge, z. B. zum Bewässern von Grundstücken, aus einem vorbeifliessenden Flusse zu heben. Dann ist zuerst die Frage nach der dazu nötigen Arbeitskraft zu beantworten. Es seien z. B. 50 l in der Sekunde um 3 m zu heben. Da das Liter ein kg wiegt, so gewinnen 50 l, wenn man sie um 3 m hebt,  $50 \times 3 = 150$  kgm Energie. Ebensoviel Arbeitsaufwand ist mindestens nötig und wegen der Nebenwiderstände in der Regel 20% mehr. Man würde also auf die Sekunde 180 kgm oder  $180:75 = 2,4$  Pferdekräfte gebrauchen.

Wird eine Dampfmaschine zum Heben des Wassers verwendet, so kostet bei günstigen Verhältnissen und sehr grossen Anlagen die Hebung von 1 cbm Wasser auf das Meter Höhe 0,05 Pfennig, bei kleinen Anlagen 0,20 bis 0,30 Pfennig.

---

## Kapitel II.

### Vom Gleichgewicht fester Körper.

#### § 14.

**Darstellung von Kräften durch gerade Linien.** Denkt man sich (Fig. 124), den ein Gewicht  $G$  tragenden Faden unendlich dünn, so kann man die Kraft, mit der er das Fallen des Gewichtes verhindert, durch eine gerade Strecke  $AB$  darstellen. An ihr sind die drei Bestimmungsstücke der Kraft: *Angriffspunkt*, *Richtung* und *Größe* beziehentlich ausgedrückt durch den Punkt  $A$ , die Pfeilspitze bei  $B$  und die Länge  $AB$ , welche die Längeneinheit (etwa mm) eben so oft enthält, als die Kraft die Kräfteinheit (etwa kg).



Fig. 124.

#### § 15.

##### **Voraussetzungen über die Beschaffenheit der Körper.**

Jedem unter der Einwirkung von Kräften stehenden Körper werden einstweilen die folgenden in der Wirklichkeit nur annähernd vorkommenden Eigenschaften beigelegt:

1. Der Körper sei so absolut fest und starr, daß die einwirkenden Kräfte seine Gestalt nicht verändern.
2. Der Körper sei im Zustande der Ruhe, schwebe frei im Raume (etwa wie ein Himmelskörper) und werde nur von den jedesmal angegebenen Kräften beeinflusst.
3. Jede der vorhandenen Kräfte würde, für sich allein angebracht, den Körper bewegen. Alle zusammen sollen jedoch so gegeneinander wirken, daß der Körper in Ruhe bleibt, oder die Kräfte einander das Gleichgewicht halten.
4. Alle vorkommenden Angriffspunkte von Kräften sind entweder Punkte des Körpers selbst oder vollkommen fest und starr mit demselben verbunden.

#### § 16.

##### **Als selbstverständlich gelten folgende Grundsätze:**

1. Man kann ohne etwas im Zustande eines Körpers zu ändern, Kräfte, die einander das Gleichgewicht halten, anbringen oder fortlassen.

2. Zwei Kräfte, die denselben Angriffspunkt haben, können nur dann im Gleichgewicht sein, wenn sie gleich groß und entgegengesetzt gerichtet sind.

3. Das Gleichgewicht wird nicht gestört, wenn man den Körper mit andern ruhenden Körpern verbindet oder an denselben befestigt.

### § 17.

**Kräfte an einem Punkte wirkend.** In Fig. 125 mögen fünf Kräfte  $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$  am materiell gedachten Punkte  $A$  angreifen. Um die Wirkung zu erkennen, welche bei gleichzeitigem Wirken der Kräfte eintritt, lassen wir sie in Gedanken nacheinander in Tätigkeit treten. Zuerst wirke allein  $P_1$  auf  $A$ . Diese Kraft bewege in  $t$  Sekunden den Punkt von  $A$  nach  $B$  ( $AB = P_1$ ). In  $B$  werde der Punkt  $A$  beruhigt und nun während der gleichen Zeit  $t$  ausschließlich der Wirkung einer Kraft  $BC$  ausgesetzt, die an Größe und Richtung gleich ist der Kraft  $P_2$ . Der Punkt macht dann den der Größe der Kraft entsprechenden Weg  $BC = P_2$ . Er werde in  $C$  beruhigt und nun für  $t$  Sekunden allein der Wirkung einer Kraft  $CD$ , die an Größe und Richtung gleich  $P_3$  ist, unterworfen u. s. f. Wir wollen annehmen, daß die zuletzt anzubringende Kraft  $EA$  gleich  $P_5$  den Punkt nach dem Ausgangspunkte  $A$  zurückbringt. Dann ist ersichtlich, daß die Rückkehr des Punktes  $A$  nach seinem Ausgangspunkte auch eintreten wird, wenn man die ganze Betrachtung für eine beliebige kleinere Zeit  $t : n$  wiederholt, denn das dann entstehende Polygon wird  $ABCDEA$  ähnlich. Hieraus ist weiter zu schließen, daß auch, wenn  $t$  eine unendlich kleine Zeit bedeutet, der Punkt nach  $A$  zurückkehren wird und bei gleichzeitigem Wirken der Kräfte ganz in Ruhe bleibt. Denkt man sich die Betrachtung für beliebig viele Kräfte wiederholt, so folgt allgemein:

*Beliebig viele an demselben Punkte angreifende Kräfte halten einander im Gleichgewicht, wenn sie, nach Richtung und Größe fortlaufend zusammengesetzt, ein geschlossenes Polygon, das sogenannte Kräfte-Polygon, ergeben.*

Ist das Kräfte-Polygon nicht geschlossen, so wird das Gleichgewicht nur eintreten, wenn man zu den vorhandenen noch eine das Polygon schließende Kraft hinzufügt.

Von jeder einzelnen Kraft, z. B.  $P_1$ , läßt sich sagen, daß ihre Wirkung durch das Zusammenwirken der übrigen aufgehoben wird. Diese wirken also genau so wie eine einzige Kraft —  $P_1$ , welche  $P_1$  an Größe gleich und an Richtung entgegengesetzt ist.




Fig. 125.

Diejenige Kraft, welche dieselbe Wirkung hervorbringt, wie mehrere einzelne Kräfte zusammen, und diese deshalb ersetzen kann, heißt ihre *Resultante* oder *Mittelkraft*. Das Verfahren, mehrere Kräfte durch *eine* zu ersetzen, heißt Kräfte *zusammensetzen*. Ersetzt man umgekehrt eine Kraft durch mehrere Kräfte, so heißen diese *Komponenten* oder *Seitenkräfte* derselben.

### § 18.

**Konstruktion der Mittelkraft.** Halten sich die an einem Punkte wirkenden Kräfte nicht das Gleichgewicht, so setze man sie der Größe und Richtung nach zu einem Linienzuge zusammen. Die Linie, welche den letzten Punkt desselben mit dem Angriffspunkt der Kräfte verbindet, gibt Größe und Richtung der Kraft, deren Anbringung das Gleichgewicht herstellt. Die ihr an Größe gleiche, an Richtung entgegengesetzte Kraft ist also die *Resultierende* oder *Mittelkraft* der übrigen Kräfte.

Als besonderer Fall ist derjenige zu beachten, bei dem alle Kräfte in einer Geraden wirken. Man bildet dann die sogenannte *algebraische Summe* der Kräfte, bei der die nach der einen Richtung wirkenden durch positive und die entgegengesetzt wirkenden durch negative Zahlen ausgedrückt werden. Diese Summe ergibt den Wert der Mittelkraft. Ist er Null, so sind die Kräfte im Gleichgewicht.




Fig. 126.

### § 19.

**Parallelogramm der Kräfte.** Sind nur drei Kräfte  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  (Fig. 126) vorhanden, so wird aus dem Kräftepolygon ein *Dreieck* der Kräfte konstruiert. Man es einmal mit  $P$ , ein zweites Mal mit  $Q$  anfangend, so erscheint  $R$  als Diagonale des aus  $P$  und  $Q$  konstruierten sogenannten *Parallelogramms der Kräfte* und man kann das über die Mittelkraft Gesagte auch so ausdrücken: *Die Mittelkraft zweier an einem Punkte wirkenden Kräfte wird dargestellt durch die Diagonale des aus ihnen konstruierten Parallelogramms.*

Da die Linien, welche die Kräfte  $P$ ,  $Q$  und ihre Resultierende  $R$  darstellen, ein Dreieck bilden, so gelten die Gleichungen, welche zwischen den Seiten und den Winkeln eines Dreiecks bestehen, auch für die Kräfte und die von denselben gebildeten Winkel.

### § 20.

**Verlegung des Angriffspunktes einer Kraft.** Fig. 127. Es wirke in  $A$  eine Kraft  $P$ , und  $B$  sei ein mit  $A$  starr verbundener Punkt in der Verlängerung von  $P$ . In  $B$  bringen wir zwei an Richtung entgegen-

gesetzte Kräfte  $P_1$  und  $P_2$  in der Linie  $AB$  an, die an GröÙe  $P$  gleich sind. Dadurch wird nichts geändert (§ 16). Die Wirkungen von  $P$  und  $P_2$  heben sich auf. Man kann diese beiden Kräfte also fortlassen, ohne etwas zu ändern. Es bleibt dann eine Kraft  $P_1 = P$  übrig, welche  $P$  ersetzt. *Ohne etwas zu ändern, kann man den Angriffspunkt einer Kraft nach einem beliebigen Punkte ihrer Richtungslinie verlegen.*

### § 21.

**Mittelkraft zweier gleichgerichteter Kräfte.**  $P$  und  $Q$  (Fig. 128) seien parallele Kräfte von gleicher Richtung,  $A$  und  $B$  ihre Angriffspunkte. Man bringe an  $A$  und  $B$  zwei gleiche in die Linie  $AB$  fallende Hilfskräfte  $H$  und  $-H$  an. Dadurch wird nichts geändert (§ 16).  $-H$  und  $P$ , ebenso  $H$  und  $Q$  mögen (§ 19) durch ihre Mittelkräfte  $S$  und  $T$  ersetzt werden. Die Angriffspunkte letzterer verlege man (§ 20) nach




Fig. 127.




Fig. 128.

dem Durchschnittspunkte  $D$  ihrer Richtungen und zerlege sie wieder in die Seitenkräfte, aus denen sie entstanden sind.  $H$  und  $-H$  in  $D$  kann man, ohne etwas zu ändern, fortlassen (§ 16), dann bleiben nur  $P$  und  $Q$  übrig. Diese ersetze man durch eine Mittelkraft  $P + Q = R$  und verlege deren Angriffspunkt nach  $C$  in  $AB$ . Es verhält sich

$$P : H = DC : AC$$

$$H : Q = BC : DC.$$

Die Multiplikation der Gleichungen ergibt, daß

$$P : Q = BC : AC.$$

*Die Mittelkraft zweier paralleler Kräfte ist ihnen parallel, ihrer Summe gleich, und teilt die Verbindungslinie ihrer Angriffspunkte im umgekehrten Verhältnis der Kräfte.*

### § 22.

In Fig. 129 seien  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  drei parallele Kräfte, in einer Ebene wirkend, die sich das Gleichgewicht halten. Von einem beliebigen Punkt  $O$





Man kann also zwei gleiche, parallele und entgegengesetzt gerichtete Kräfte nicht durch eine Mittelkraft ersetzen. Man betrachtet sie deshalb als ein Element der Mechanik und nennt sie zusammen ein *Kräfte- oder Drehungspaar*. Ihr senkrechter Abstand heißt der *Hebelarm* des Paares und das Produkt aus einer der beiden Kräfte und dem Hebelarm heißt *Moment des Paares*.

### § 24.

Ein Kräftepaar kann ohne Änderung seiner Wirkung parallel zu sich selbst verlegt werden. In Fig. 130 seien  $P$  und  $Q$  die in  $A$  und  $B$  angreifenden gleichen Kräfte eines Kräftepaares. — Man ziehe außerhalb der Ebene des Paares eine Linie  $CD$  gleich und parallel  $AB$ . An  $C$  und  $D$  bringe man Kräfte  $R, S, T, U$  parallel und gleich  $P$  und  $Q$  an, die sich gegenseitig aufheben. Ziehe  $AD$  und  $BC$ . Diese Linien sind die Diagonalen des Parallelogramms  $ABCD$  und durchschneiden sich in ihren Mitten  $E$ . Man setze  $R + Q$ , ferner  $U + P$  zusammen.




Fig. 130.




Fig. 131.

Nach § 21 gehen ihre Mittelkräfte durch  $E$  und heben einander als gleiche und entgegengesetzte Kräfte auf, können mithin, ohne etwas zu ändern, fortgelassen werden. Dann bleiben nur die Kräfte  $S$  und  $T$  übrig. Diese bilden ein Kräftepaar, welches das ursprüngliche der Behauptung entsprechend ersetzt.

Da man das parallel zu sich selbst versetzte Kräftepaar  $ST$  auf gleiche Art in die Ebene des ursprünglichen Paares zurückversetzen kann, so gilt die ausgesprochene Behauptung ohne jede Einschränkung.

### § 25.

Ein Kräftepaar kann ohne Änderung seiner Wirkung um die Mitte seines Hebelarmes gedreht werden. In Fig. 131 seien  $P$  und  $Q$  die Kräfte des Paares und  $AB$  sein Hebelarm. Durch die Mitte  $E$  von  $AB$  ziehe man eine beliebige Gerade und mache darauf

$$EC = ED = EA = EB.$$

An den Punkten  $C$  und  $D$  bringe man Kräfte  $R, S, T, U$  senkrecht zu  $CD$  an, welche gleich  $P$  und  $Q$  sind und sich gegenseitig aufheben, ver-

längere  $S$  und  $P$ , ebenso  $Q$  und  $U$  bis zu ihren Schnittpunkten  $F$  bzw.  $G$ , verlege die Angriffspunkte der Kräfte nach den genannten Schnittpunkten und ersetze  $S$  und  $P$ , ebenso  $U$  und  $Q$  durch ihre Mittelkräfte  $V$  und  $W$ . Diese sind gleich, liegen beide in der Geraden  $F, E, G$  und sind einander entgegengesetzt gerichtet. Man kann sie deshalb fortlassen. Es bleibt dann nur das Kräftepaar  $B, T$  an  $CD$  übrig, das auch entsteht, wenn man das Paar  $P, Q$  um die Mitte seines Hebelarms dreht.

### § 26.

Man kann den Hebelarm eines Kräftepaares ohne Änderung seiner Wirkung verlängern oder verkürzen, wenn nur das Moment und der Sinn der Drehung unverändert bleiben. Es seien in Fig. 132  $P$  und  $Q$  die Kräfte und  $AB = p$  der Hebelarm eines Paares. Man verlängere  $AB$  bis  $C$  und setze  $AC = x$ . In  $C$  bringe man zwei gleiche entgegengesetzte Kräfte  $X$  und  $Y$  an, wodurch nichts geändert wird. Man




Fig. 132.

denke  $P$  in zwei Teile zerlegt, von denen der eine gleich  $X$  oder  $Y$  ist. Dann ist der Rest  $= P - Y$ . Man bestimme die Größe von  $Y$  so, daß sich verhält

$$(P - Y) : Y = (x - p) : p.$$

Setzt man dann  $Y$  in  $C$  und  $P - Y$  in  $A$  zu einer Mittelkraft zusammen,

so ist dieselbe gleich ihrer Summe, also gleich  $P$ , mithin auch gleich  $Q$ , und ihr Angriffspunkt liegt wegen der letzten Gleichung (§ 21) in  $B$ . Demnach kann man die sich gegenseitig aufhebenden Kräfte  $P - Y$  in  $A$ ,  $Y$  in  $C$  und  $Q$  in  $B$  fortlassen. Es bleibt dann das Kräftepaar  $X, Y$  am Hebelarm  $x$  übrig. Aus der vorstehenden Proportion folgt

$$Pp - Yp = Yx - Yp \text{ oder } Pp = Yx.$$

Das ursprüngliche Paar ist also ersetzt durch ein anderes mit gleichem Momente und mit gleichem Sinne der Drehung.

### § 27.

**Wesentliche Bestandteile eines Kräftepaares.** Nach § 24 kann man ein Kräftepaar beliebig parallel zu sich selbst verlegen, nach § 25 um die Mitte seines Hebelarmes drehen und nach § 26 letzteren verlängern oder verkürzen, wenn nur das Moment ungeändert bleibt und der Sinn der Drehung. Demnach ist an einem Kräftepaar wesentlich nur die *Lage seiner Ebene*, der *Sinn der Drehung* und die *Größe seines Moments*.

### § 28.

**Versetzung des Angriffspunktes einer Kraft** (Fig. 133). Ist  $P$  eine in  $A$  angreifende Kraft und  $B$  ein beliebiger Punkt im Raume, so

kann man an  $B$ , ohne etwas zu ändern, zwei zu  $P$  parallele und  $P$  gleiche, aber einander aufhebende Kräfte  $P$  und  $-P$  anbringen. Fällt man von  $B$  eine Senkrechte  $BC$  auf  $P$ , so kann man sich die ursprünglich allein vorhandene Kraft  $P$  in  $A$  ersetzt denken durch eine ihr gleiche Kraft  $P$  in  $B$ , wenn man noch das Kräftepaar  $P, -P$  mit dem Hebelarm  $BC$  hinzufügt. Man nennt dies: *Versetzung der Kraft  $P$  von  $A$  nach  $B$ .*

## § 29.

**Gleichgewicht paralleler Kräfte im Raume.** Es sei  $P$  die eine von vielen parallelen Kräften und  $A$  ihr Angriffspunkt. Man denke sich ein rechtwinkliges Koordinatensystem (Fig. 134), dessen  $Z$ -Achse parallel ist zu  $P$ . Die Koordinaten des Angriffspunktes  $A$  von  $P$  seien  $BA = z$ ,  $CB = y$ ,  $OC = x$ . In  $C$  und  $O$  denke man Kräfte  $P, -P$ ;  $P, -P$  angebracht, die gleich und parallel zu  $P$  sind und sich gegenseitig aufheben. Dadurch wird nichts geändert. Es bilden nun  $P$  in  $A$  und




Fig. 133.




Fig. 134.

$-P$  in  $C$  ein Kräftepaar parallel der Ebene  $YZ$  mit dem Moment  $Py$  und  $P$  in  $C$  und  $-P$  in  $O$  ein Paar in der Ebene  $XZ$ , dessen Moment gleich  $Px$  ist. Das Paar  $Py$  verlege man nach § 24 in die  $YZ$ -Ebene. Auf diese Weise wird die Kraft  $P$  in  $A$  ersetzt durch eine ihr gleiche und parallele Kraft  $P$  in  $O$  und zwei Kräftepaare  $Px$  und  $Py$ , die beziehentlich in den Ebenen  $XZ$  und  $YZ$  liegen.

Denkt man die übrigen parallelen Kräfte in gleicher Weise behandelt, so werden dieselben im Gleichgewicht sein, wenn die algebraischen Summen der Kräfte in  $O$  und diejenigen der Momente der Paare in den Koordinatenebenen einzeln gleich Null sind oder

$$\Sigma(P) = 0; \quad \Sigma(Py) = 0; \quad \Sigma(Px) = 0.$$

Letztere Momente können auch aufgefasst werden als bezogen auf  $OX$  und  $OY$  als Drehachsen.

## § 30.

**Gleichgewicht beliebiger Kräfte im Raume.** In Fig. 135 sei  $P$  im Punkte  $A$  angreifende Kraft;  $x, y, z$  seien die rechtwinkligen Koordinaten von  $A$ . Man denke  $P$  als Diagonale eines Parallelepipedes, dessen Flächen den Koordinatenebenen parallel sind. Die drei in  $A$  zusammenstoßenden Kanten betrachte man, als stellten sie drei in  $A$  angreifende Kräfte  $X, Y, Z$  dar. Setzt man dieselben nach dem Kräftepolygon zusammen, so bilden sie mit  $-P$  einen geschlossenen Linienzug  $ABCD A$ . Nach § 18 ist also  $P$  die Mittelkraft von  $X, Y$  und  $Z$ . Es möge nun die Kraft  $P$  durch ihre Seitenkräfte  $X, Y, Z$  ersetzt werden. Sind dann  $\alpha, \beta, \gamma$  die Winkel, welche  $P$  mit den Richtungen der Koordinatenachsen oder den Kräften  $X, Y, Z$  bildet, so ist

$$X = P \cos \alpha; \quad Y = P \cos \beta; \quad Z = P \cos \gamma.$$




Fig. 135.

Verfährt man in gleicher Weise mit jeder der vorhandenen Kräfte, so erhält man drei Systeme von parallelen Kräften, die einzeln nach § 29 zu behandeln sind. Gleichgewicht findet statt, wenn die algebraische Summe der nach  $O$  versetzten Kräfte und diejenigen der Paare in den drei Koordinatenebenen einzeln Null ergeben.

## § 31.

**Vom Schwerpunkt.** Nach § 21 lassen sich zwei parallele gleichgerichtete Kräfte  $P_1$  und  $P_2$  ersetzen durch eine Mittelkraft  $M_2 = P_1 + P_2$ , welche die Verbindungslinie der Angriffspunkte in einem Punkte  $S$  trifft, der sie im umgekehrten Verhältnis der Kräfte teilt. Denkt man sich  $P_1$  und  $P_2$  um ihre Angriffspunkte beliebig, doch so gedreht, daß sie parallel bleiben, so wird ihre Mittelkraft  $M_2$  stets durch denselben Punkt  $S$  gehen. Sind beliebig viele parallele und gleichgerichtete Kräfte  $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$  vorhanden, so setze man  $P_1$  und  $P_2$  zu einer Mittelkraft

$M_2 = P_1 + P_2$  zusammen, dann  $M_2$  mit  $P_3$  zu  $M_3 = P_3 + M_2 = P_1 + P_2 + P_3$  und  $M_3$  mit  $P_4$  zu  $M_4$  u. s. w., bis man schließlich aus  $P_n$  und  $M_{n-1}$  die Resultierende  $M_n = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$  aller Kräfte  $P_1, P_2$  u. s. w. erhält.

Denkt man sich nun alle Kräfte  $P_1, P_2, P_3 \dots P_n$  um ihre Angriffspunkte beliebig, jedoch so gedreht, daß sie parallel bleiben, so wird auch jede einzelne der Kräfte  $M_2, M_3, M_4 \dots M_n$  stets durch einen unveränderlichen Punkt gehen. Derjenige Punkt, durch den stets die Mittelkraft  $M_n$  aller parallelen Kräfte geht, heißt der *Mittelpunkt* der Kräfte, oder wenn diese Schwerkkräfte sind, ihr *Schwerpunkt*.

### § 32.

**Bestimmung des Schwerpunktes eines Körpers.** In Fig. 136 sei ein Körper dargestellt und  $v$  ein unendlich kleines Rauteilchen desselben. Es werde ferner angenommen, der Körper habe an allen Stellen dieselbe Dichte  $a$  (Gewicht der Volumeinheit), sodaß das Gewicht irgend eines Rauteilchens desselben vom Inhalt  $v$  durch  $av$  ausgedrückt wird.  $av$  ist




Fig. 136.

dann die in  $v$  angreifende Kraft der Schwere:  $x, y, z$  seien die Koordinaten ihres Angriffspunktes. Im Schwerpunkt  $S$  des Körpers mit den Koordinaten  $s, t, u$  denke man sich die der Mittelkraft der Schwerkkräfte aller Rauteilchen zusammen entgegenwirkende Kraft  $P$  angebracht, so findet Gleichgewicht statt. Es ist  $P$  gleich der Summe der Gewichte aller Rauteilchen, aus denen der Körper bestehend gedacht wird, oder, wenn  $V$  das Volumen des Körpers bedeutet:

$$P = \Sigma(av) = a \Sigma(v) = aV.$$

Denkt man sich alle wirkenden Kräfte in die Ebene  $YZ$  versetzt, so erhält man Kräftepaare parallel zur Ebene  $XZ$ . Wegen des vorausgesetzten Gleichgewichtes muß die algebraische Summe der Momente dieser

Paare Null sein, oder, wenn  $s$  den Abstand des Schwerpunktes von der Ebene  $XY$  bedeutet:

$$Ps = \Sigma(avx) = a\Sigma(vx),$$

daraus erhält man

$$s = \frac{a\Sigma(vx)}{P} = \frac{a\Sigma(vx)}{a\Sigma(v)} = \frac{\Sigma(vx)}{V}.$$

*Der Abstand des Schwerpunktes eines an allen Stellen gleich dichten (homogenen) Körpers von einer Ebene wird erhalten, wenn man jedes unendlich kleine Raumteilchen desselben mit seinem Abstände von der Ebene multipliziert und alle diese Produkte (statische Momente genannt) durch die Summe aller Raumteilchen (oder den Inhalt des ganzen Körpers) dividiert.*

**Zusatz 1.** Besteht der Körper aus Bestandteilen, von denen man die Rauminhalte  $V_1, V_2, V_3 \dots$  und die Abstände ihrer Schwerpunkte  $s_1, s_2, s_3 \dots$  von einer beliebigen Ebene kennt, so findet man den Abstand  $x$  des Schwerpunktes des Körpers von der Ebene aus

$$x = \frac{V_1 s_1 + V_2 s_2 + V_3 s_3 + \dots}{V_1 + V_2 + V_3 + \dots}.$$

**Zusatz 2.** Ist die Summe der im Zähler stehenden Momente gleich Null, so ist  $x = 0$ , oder die Ebene geht durch den Schwerpunkt des Körpers.

## Kapitel III.

### Elastizität und Festigkeit der Baumaterialien.

#### § 33.

**Voraussetzungen.** Die betrachteten Körper bestehen aus Metall oder Holz und sind, wie Stäbe, Säulen, Wellen oder Achsen, von prismatischer Gestalt. Ihre Abmessungen werden in cm und die einwirkenden Kräfte in kg ausgedrückt. — Alle Einwirkungen von Stützen oder Befestigungen werden durch die von ihnen ausgeübten Kräfte ersetzt gedacht, die dann mit den außerdem einwirkenden Kräften im Gleichgewicht sind.

#### § 34.

**Zug- und Druckfestigkeit.** Ein Stab (Fig. 137) habe im unbelasteten Zustande die Länge  $l$ . Durch in seiner Längsachse wirkende Kräfte  $P$  und  $-P$  werde  $l$  entweder vergrößert (a) oder verkleinert (b). Dann sagt man im ersten Falle: der Körper widersteht durch seine *absolute* oder seine Festigkeit gegen *Zerreißen (Zugfestigkeit)*, im zweiten durch seine *einfach rückwirkende* oder *Druckfestigkeit*, oder, wenn der Stab bei größserer Länge nicht in sich zusammengedrückt wird, sondern seitlich durch Biegung ausweicht: durch *zusammengesetzt-rückwirkende* oder *Knick-Festigkeit*.

Ist der Querschnitt des Stabes *ein* qcm, seine Länge *ein* cm und die Belastung  $P$  *ein* kg, so heisst die dadurch bewirkte Längenänderung  $\alpha$  *Dehnungs- oder Verkürzungskoeffizient* und ihr reziproker Wert  $1:\alpha = \epsilon$  der *Elastizitätsmodulus* des Materials.

Entfernt man die den Stab beanspruchenden Kräfte, so wird er seine ursprüngliche Länge entweder bis auf eine verschwindend kleine GröÙe wieder annehmen, oder es wird eine Längenänderung zurückbleiben: im ersten Falle blieben dann die Längenänderungen innerhalb der *Grenze der vollkommenen Elastizität*, im zweiten wurde letztere überschritten. Die gröÙste Belastung, welche der Stab von 1 qcm Querschnitt innerhalb der Grenze der vollkommenen Elastizität zu tragen vermag, heisst der *Tragmodul* des Materials.




Fig. 137.



Wird ein Stab (Fig. 137) durch Kräfte  $P$  und  $-P$  beansprucht, so werden zwei vor der Belastung unmittelbar benachbarte Querschnitte des Stabes nach derselben sich von einander entfernen oder einander näher rücken. Es treten dann zwischen den Querschnitten Kräfte, sogenannte *Spannungen* auf, welche den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen bestrebt sind, und deren Summe gleich  $P$  ist. Praktisch ist die Annahme einer gleichmäßigen Verteilung dieser Spannungen auf die ganze Fläche der Querschnitte zulässig. Ist dann  $F$  der Inhalt des Querschnitts in qcm, so ist  $P:F=S$  die in 1 qcm herrschende *Spannung*. Diese darf bei Baukonstruktionen oder Maschinen ohne Gefährdung der Sicherheit niemals größer werden, als der Tragmodul. Der Sicherheit wegen und mit Rücksicht auf Abweichungen in der Beschaffenheit des Materials werden deshalb die Abmessungen der Konstruktionsteile so gewählt, daß die Spannung der Rechnung nach für die größte voraussichtlich vorkommende Belastung doch nur einen Bruchteil, gewöhnlich die Hälfte, des Tragmoduls erreicht. Diesen Wert nennt man die *zulässige Spannung*.

### § 35.

**Schubfestigkeit.** Wirken die Kräfte so, daß sie, wie in Fig. 138




Fig. 138.

bei  $a$  und  $b$ , benachbarte Querschnitte gegeneinander zu verschieben streben, so wird die *Gleitungs- oder Schubfestigkeit* des Materials beansprucht. Hinsichtlich derselben gelten entsprechende Ausdrücke, wie sie in § 34 für Zug- und Druckfestigkeit aufgestellt sind.

### § 36.

**Biegezugfestigkeit.** Es sei ein prismatischer Balken gegeben. Im Innern desselben denke man parallel zur Achse ein Prisma von unendlich kleinem Querschnitt. Werden die in demselben enthaltenen Teile des Balkens in Gedanken zusammengefaßt, so nennt man sie eine *Faser*. Hiernach wird der Balken als aus unendlich vielen geraden und einander parallelen *Fasern* bestehend vorgestellt.

Legt man nun den Balken wagrecht auf zwei Stützen  $A$  und  $B$  (Fig. 139) und belastet ihn durch Kräfte  $P_1, P_2, P_3, P_4 \dots$  senkrecht zur Achse, so wird er auf *Zerbrechen, relative oder Biegezugfestigkeit* beansprucht, und seine ursprünglich geraden Fasern werden gebogen und erleiden durch Messungen nachweisbare Längenänderungen. Durch diese werden Spannungen hervorgerufen, die den äußeren Kräften das Gleichgewicht halten.

Die Länge des Balkens sei  $l = AB$ , die Entfernungen der Kräfte  $P_1, P_2, P_3, P_4 \dots$  von  $A$  seien der Reihe nach  $x_1, x_2, x_3, x_4 \dots$  und die beiden Stützen mögen durch gleichwertige Kräfte  $X$  und  $Y$  ersetzt gedacht werden. Ihre Werte ergeben sich mit Hilfe der nachfolgenden beiden, das Gleichgewicht ausdrückenden Bedingungen (§ 29):

$$Yl = P_1x_1 + P_2x_2 + P_3x_3 + P_4x_4 + \dots$$

$$Xl = P_1(l - x_1) + P_2(l - x_2) + P_3(l - x_3) + \dots$$

Es sind also  $X$  und  $Y$  als bekannte Größen aufzufassen.

Die genannten äußeren Kräfte erzeugen neben den Biegungen auch durch Messungen nachweisbare *Verkürzungen* der Fasern an der Oberseite des Balkens und *Verlängerungen* an der Unterseite desselben. Von der Oberseite nach der Unterseite hin fortschreitend findet man, daß die Verkürzungen nach und nach bis auf Null abnehmen und nun in stetig zunehmende Verlängerungen übergehen. Die Gesamtheit der

keine Längenänderungen erleidenden Fasern nennt man die *neutrale Faserschicht*.




Fig. 139.




Fig. 140.

Fig. 140 sei ein Querschnitt des Balkens senkrecht zu seiner gebogenen Achse. Dann heißt die Gerade  $NN_1$ , in der er die neutrale Faserschicht durchschneidet, seine *neutrale Achse*. Nun sei  $f$  der Querschnitt irgend einer Faser und  $y$  ihr Abstand von der neutralen Achse. Vermöge der Längenänderung der Faser wird in  $f$  eine Zug- oder Druckspannung  $s$  erzeugt.  $s:f$  ist dann die an dieser Stelle *im qcm* herrschende Spannung. Solange an keiner Stelle die Spannungen über die Grenze der vollkommenen Elastizität hinaus gehen, sind nach angestellten Beobachtungen ihre Werte ebenso, wie die gemessenen Längenänderungen, proportional den Entfernungen von der neutralen Achse. Bezeichnet  $e$  den Abstand der entferntesten Faser von der neutralen Achse und  $k$  ihre Spannung aufs qcm, so verhält sich

$$k:(s:f) = e:y, \text{ woraus folgt } s = \frac{k}{e}fy.$$

Um nun die Beziehungen zwischen diesen inneren und den äußeren Kräften zu erkennen, denken wir uns den Balken durch einen zur gebogenen Achse senkrechten Querschnitt zerschnitten (Fig. 141) und die inneren Kräfte durch gleichwertige äußere ersetzt, die das Gleichgewicht wieder herstellen. Wegen der voranzusetzenden Geringfügigkeit der Biegung kann man in der Zeichnung und bei Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen ganz davon absehen.

Bezeichnet  $Z$  die durch Verschiebung des Endquerschnitts gegen den früher ihm benachbarten auftretende Schubspannung, so erfordert das Gleichgewicht (§ 30) die Erfüllung folgender Gleichung:

$$X + Z = P_1 + P_2 + \dots \text{ oder } Z = P_1 + P_2 + \dots - X.$$




Fig. 141.

Ferner muß auch die algebraische Summe der horizontal wirkenden, die Zug- und Druckspannungen ersetzenden Kräfte gleich Null sein oder

$$\Sigma((k:e)fy) = - (k:e) \Sigma(fy) = 0.$$

Da nun  $(k:e)$  nicht Null ist, muß  $\Sigma(fy) = 0$  sein. Nach § 32, Zusatz 2 bedeutet dies: *Die neutrale Achse geht durch den Schwerpunkt des Querschnitts.*

Zur Erhaltung des Gleichgewichts müssen ferner die Momente aller Kräfte in Beziehung auf irgend eine Drehachse gleich Null sein (§ 30). Als Momentenachse nehmen wir die neutrale Achse des Endquerschnittes und bezeichnen die Abstände der Kräfte  $X, P_1, P_2, \dots$  von derselben mit  $a, p_1, p_2, \dots$ , dann muß sein

$$Xa - (P_1 p_1 + P_2 p_2 + \dots) = \Sigma(y(k:e)fy) = k \frac{\Sigma(fy^2)}{e}$$

$\Sigma(fy^2)$  heißt *Trägheitsmoment* des Querschnitts und  $(1:e)\Sigma(fy^2)$  das *Widerstandsmoment* desselben. Bezeichnen wir letzteres kurz mit  $W$  und mit  $M$  das Moment der äußeren Kräfte in Beziehung auf die neutrale Achse des Endquerschnitts, so ist

$$M = kW \text{ oder } k = M : W.$$

Die Dimensionen des Balkens sind nun so zu wählen, daß  $k$  an keiner Stelle größer ist als die zulässige Spannung. Da nun wegen der

prismatischen Gestalt des Balkens  $W$  für alle Querschnitte unverändert bleibt, so wird  $k$  für denjenigen Querschnitt seinen größten Wert erreichen, dessen neutrale Achse als Drehachse gedacht den größten Wert des Momentes  $M$  der äußeren Kräfte ergibt. Dieser größte Wert heißt *Bruchmoment* und der zugehörige Querschnitt der am *meisten gefährdete* oder *Bruchquerschnitt*. Sollte ein Bruch eintreten, so wird er voraussichtlich im Bruchquerschnitt an dessen am weitesten von der neutralen Achse entfernten Faser beginnen. — Ein Balken ist als *sicher* zu betrachten, wenn für den Bruchquerschnitt  $k \leq M : W$ .

## § 37.

**Widerstandsmoment eines Rechtecks** (Fig. 142,  $ABCD$ ). Die neutrale Achse  $NN_1$  sei parallel  $AB = b$  und senkrecht zu  $BD = h$ . Ein Flächenelement parallel zu  $NN_1$  habe die unendlich kleine Höhe  $\delta$  und den Abstand  $y$  von  $NN_1$ , dann ist  $b\delta = f$  sein Querschnitt. Bezeichnet  $J$  das Trägheitsmoment




Fig. 142.

des Querschnitts, so ist  $\frac{J}{2}$  sein Wert für die obere Hälfte des Querschnitts oder

$$\frac{J}{2} = \Sigma(fy^2) = \Sigma(b\delta y^2) = b \Sigma(\delta y^2).$$

Setzt man der Reihe nach für  $y$  die Werte  $\delta, 2\delta, 3\delta \dots n\delta$ , so folgt

$$\frac{J}{2} = b \cdot \Sigma(\delta y^2) = b\delta(1^2\delta^2 + 2^2\delta^2 + 3^2\delta^2 + \dots + n^2\delta^2)$$

$$\text{oder} \quad \frac{J}{2} = b\delta^3(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2) = b \frac{\delta^3 n^3}{3} = \frac{b}{3} \cdot \left(\frac{h}{2}\right)^3 = \frac{bh^3}{24}.$$

Mithin

$$J = \frac{bh^3}{12}.$$

Durch Division mit dem größten Abstände  $h:2$  einer Faser von der neutralen Achse erhält man das gesuchte Widerstandsmoment

$$W = \frac{1}{6} bh^2.$$

## § 38.

**Widerstandsmoment eines doppelt T- oder U-förmigen Querschnitts.** Die genannten Querschnitte mögen durch die in Fig. 143 eingezeichneten horizontal und vertikal gedachten Abmessungen bestimmt sein.

Um das Trägheitsmoment  $J$  des Doppel-T-Querschnitts in Beziehung auf die neutrale Achse zu finden, hat man von demjenigen des Rechteckes mit den Abmessungen  $B$  und  $H$  zweimal dasjenige eines Rechteckes mit den Dimensionen  $\frac{b}{2}$  und  $h$  abzuziehen. Also ist

$$J = \frac{BH^3}{12} - 2 \frac{\frac{b}{2}h^3}{12} = \frac{BH^3}{12} - \frac{bh^3}{12}.$$

Das Trägheitsmoment des U-Querschnitts ergibt auf entsprechende Art denselben Wert. Durch Division mit  $H:2$  wird das Widerstandsmoment  $W$  eines jeden der beiden Querschnitte erhalten:

$$W = \frac{BH^3 - bh^3}{6H}.$$

### § 39.

**Beispiel 1.** Ein rechtwinkliger Balken von der freien Länge  $l$ , der wagrecht liegenden Breite  $b$  und der Höhe  $h$ , Fig. 144, sei in einer Mauer unwandelbar befestigt und trage auf seiner freien Länge eine gleichmäßig verteilte Last  $G$  und am Ende ein Gewicht  $P$ . Man soll Breite  $b$  und Höhe  $h$  seines Querschnitts so bestimmen, daß an keiner Stelle die Spannung den höchstens zulässigen Wert  $k$  überschreitet.




Fig. 143.




Fig. 144.

Denkt man in der Entfernung  $x$  vom freien Ende des Balkens einen Querschnitt nach  $AB$ , so ist  $Px$  das Moment von  $P$ , bezogen auf die neutrale Achse desselben. Außerdem hat die Länge  $x$  aufs laufende Meter ein Gewicht  $(G:l)$  zu tragen, oder im ganzen  $(G:l)x$ . Dies Gewicht kann man durch eine ihm gleiche, in seinem Schwerpunkte angreifende Kraft ersetzt denken. Das Moment, bezogen auf die neutrale Achse des Querschnitts  $AB$ , wäre dann  $(x:2)(G:l)x = x^2(G:2l)$ . Mithin das gesamte Moment der äußeren Kräfte, bezogen auf dieselbe Achse,

$$Px + x^2(G:2l).$$

Offenbar erreicht dieser Ausdruck für  $x=l$  seinen größten Wert, den des *Bruchmoments* (§ 36). Letzteres ist gleich  $k$  mal dem Widerstandsmoment  $(1:6)bh^2$  zu setzen (§ 37), also wäre

$$Pl + (l:2)G = k(1:6)bh^2.$$

Es sei nun  $l=120$  cm,  $P=300$  kg und  $G=100$  kg, ferner der Balken aus Eichenholz und darum  $k=80$  zu setzen, so folgt

$$300 \cdot 120 + 60 \cdot 100 = 80(1:6)bh^2.$$

Daraus folgt

$$bh^3 = 3150.$$

Man kann nun je nach den im besonderen Falle maßgebenden Rücksichten die eine Dimension des Querschnitts wählen und dann die andere bestimmen. Nimmt man z. B.  $h = 10$  cm, so ist  $h^3 = 100$  und  $b = 31,5$  cm zu nehmen; für  $h = 20$  cm erhält man  $b = 7,87$  oder rund 8 cm.

**Beispiel 2.** Ein Balken mit dem Widerstandsmoment  $W$  liege auf zwei Stützen  $A$  und  $B$ , die um  $AB = l$  von einander entfernt sind. Wie groß ist die gleichmäßig verteilte, vom Balken höchstens zu tragende Last  $G$ ? (Fig. 145.)

Zuerst sind die gleichen Kräfte  $X$  zu ermitteln, welche jede Stütze ausübt. Offenbar ist

$$X + X = G, \text{ also } X = G : 2.$$




Fig. 145.

In Beziehung auf die neutrale Achse irgend eines Querschnitts im Abstände  $x < \frac{l}{2}$  von  $B$  ist das Moment der äußeren Kräfte

$$\frac{G}{2}x - \frac{G}{l}x \cdot \frac{x}{2} = \frac{Gx}{2l}(l - x).$$

Dieser Ausdruck erreicht seinen größten Wert für  $x = \frac{l}{2}$ . Der Bruchquerschnitt liegt also in der Mitte des Balkens und das Bruchmoment wird gleich  $(G : 4)(l : 2) = Gl : 8$ . Dieser Wert ist gleich dem Widerstandsmoment mal der zulässigen Spannung zu setzen, daher

$$\frac{Gl}{8} = kW \text{ oder } G = \frac{8kW}{l}.$$

Wäre  $k = 80$ , der Balken rechteckig, 6 cm breit und 20 cm hoch, so wäre das Widerstandsmoment gleich  $(1 : 6)6 \cdot 20 \cdot 20 = 400$ . Ist ferner die Länge 4 Meter oder  $l = 400$  cm, so folgt  $G = 640$  kg.

## § 40.

**Die zulässigen Spannungen** für verschiedene Materialien nach den Bestimmungen der Berliner Bau-Polizei (21. Februar 1887) und der Bauabteilung des preuß. Ministeriums der öffentlichen Arbeiten (16. Mai 1890) sind aus nachstehender Tabelle zu entnehmen.

Material	$k$ kg aufs qcm			Material	$k$ Druck	Material	$k$ Druck
	Zug	Druck	Schub				
Schmiedeeisen .	750	750	600	Basalt . . . .	75	Ziegelm. in Zement	11
Gufseisen . .	250	500	200	Granit . . . .	45	Marmor . . . .	24
Eichenholz . .	100	80	20	Rüdersd. Kalkstein	25	Steine aus Zement,	
Tannenholz . .	60	50	10	Sandstein . 15 bis	30	Schlacke u. Sand	12
Kiefernholz . .	100	60	10	Ziegelm. in Kalk	7	Guter Baugrund .	2,5

## § 41.

**Knickfestigkeit.** Prismatische Säulen, die durch in der Richtung ihrer Achse wirkende Kräfte auf Druck in Anspruch genommen sind, müssen nach § 34 bei verhältnismäßig großer Länge gegen Zerknicken gesichert und daraufhin berechnet werden. Ist  $P$  die zu tragende Last,  $l$  die Länge des nach Fig. 146 in der Linie  $AB$  geführten Stabes mit gerade abgeschnittenen Enden,  $E$  der Elastizitätsmodulus des Materials und  $J$  das kleinste Trägheitsmoment seines Querschnitts, bezogen auf eine durch dessen Schwerpunkt gezogene Achse, so berechne man (Euler'sche Formel)




Fig. 146.

$$Q = \pi^2 \frac{EJ}{l^2},$$

worin für  $E$  bei Gufseisen 1000000, bei Schmiedeeisen 2000000 und bei Holz 100000 zu setzen ist.

Die zulässige Belastung darf bei Gufseisen  $1/8$ , bei Schmiedeeisen  $1/5$  und bei Holz  $1/10$  des Wertes von  $Q$  betragen. Auch ist zu untersuchen, ob die Berechnung auf einfach rückwirkende Festigkeit nicht eine geringere zulässige Belastung ergibt. Dann darf nur letztere gelten.

## § 42.

**Drehungsfestigkeit.** Wird ein Stab von kreisförmigem Querschnitt aus Schmiedeeisen durch zwei in parallelen Ebenen gegeneinander wirkende gleiche Kräftepaare mit den Seitenkräften  $P$  und dem Hebelarm  $r$  auf *Drehungs-* oder *Torsionsfestigkeit* beansprucht, so ist bei gewöhnlichen kurzen Drehachsen der Durchmesser  $d$  zu nehmen

$$d = 0,30 \sqrt[3]{Pr},$$

wobei  $d$  und  $r$  in cm und  $P$  in kg auszudrücken sind und die Welle nur in einer Richtung beansprucht werde. Wirkt das Moment in wechselnden Richtungen, so ist statt 0,30 der Wert 0,35 zu nehmen.

## Kapitel IV.

### Hydrostatik oder Lehre vom Gleichgewichtszustand der Flüssigkeiten.

#### § 43.

**Die Oberfläche** des in einem Gefäße stillstehenden Wassers oder einer andern Flüssigkeit bildet eine wagrechte Ebene. Dies kommt daher, weil die kleinsten Teilchen, aus denen das Wasser besteht, durch die geringste Kraft gegeneinander verschoben werden können und alle vermöge der Schwere das Bestreben haben, sich soweit als möglich lotrecht abwärts zu bewegen. Befände sich also irgend ein Wasserteilchen höher als die benachbarten, so würde es sofort herabfließen.

Allgemeiner kann man dies so aussprechen: *Die Oberfläche einer Flüssigkeit stellt sich senkrecht ein zu den Kräften, die auf jedes Teilchen einwirken.*

So bildet das Wasser in einem mit gleichförmiger Geschwindigkeit um eine lotrechte Achse rotierenden Zylinder (Fig. 147) eine krumme Oberfläche (Paraboloid). Hier wirkt auf jedes rotierende Teilchen außer der Schwerkraft noch die durch Rotation erzeugte Zentrifugalkraft in horizontaler Richtung. Beide zusammen wirken wie eine schräg gerichtete Kraft, und zu dieser stellt sich die Oberfläche senkrecht ein. Daher ist in der Drehachse selbst die Oberfläche wagrecht, weil hier die Zentrifugalkraft Null ist, und die Fläche wird mit der Entfernung von der Achse steiler wegen der wachsenden Fliehkraft.




Fig. 147.

Auch an den Wänden der Gefäße beobachtet man oft ein Ansteigen der Oberfläche, nämlich dann, wenn die an der Wand liegenden Wasserteile von dieser stärker angezogen werden, als sie sich untereinander anziehen. Hierauf beruht das Aufsteigen des Wassers in engen Glasröhren und in entsprechenden sehr engen Zwischenräumen des Erdbodens. (*Kapillar- oder Haarröhrchenkraft.*)



## § 44.

**Fortpflanzung des Druckes.** Ist eine Flüssigkeit allseitig eingeschlossen, und wird auf einen Teil ihrer Oberfläche ein Druck ausgeübt, so erleiden alle ebenso grossen Teile der Gefäßwände von der Flüssigkeit einen ebenso grossen *senkrecht gegen die Gefäßwände gerichteten* Druck. Um diese auf der leichten Verschiebbarkeit beruhende Fortpflanzung des Druckes zu erweisen, kann man den aus zwei miteinander verbundenen Zylindern bestehenden Apparat (Fig. 148) benutzen. Er enthält Wasser und darüber zwei leicht bewegliche, dicht eingeschliffene, massive Kolben aus gleichem Material und von gleicher Höhe. Hat nun der grössere Kolben den 100fachen Querschnitt und mithin auch das 100fache Gewicht des kleinen, so wird diese auf der Flüssigkeit ruhende Last doch den kleinen Kolben nicht empordrücken; denn obgleich dieser 100 mal weniger auf der Flüssigkeit lastet, ruht diese Belastung auch auf einer 100 mal




Fig. 148.

kleineren Fläche. Der Druck auf die Flächeneinheit ist also an den Grundflächen beider Kolben derselbe.

Setzt man nun auf den kleinen Kolben 1 kg, so wird der grosse sofort aufsteigen, und man muß ihn mit 100 kg belasten, um das Gleichgewicht herzustellen. In dieser Weise wird bei der hydraulischen Presse durch einen geringen Druck ein

sehr grosser hervorgebracht. Mancher glaubt auch, es würde an Arbeitskraft oder Energie gewonnen. Eine leichte Überlegung zeigt, daß dies nicht der Fall ist. Denn lassen wir das eine kg auf dem kleinen Kolben 100 mm heruntergehen, so wird das dadurch verdrängte Wasser den grossen Kolben, wegen seiner 100 mal grösseren Grundfläche, nur um 1 mm heben können. Die aufgewendete Arbeit ist dann  $1 \times 100 = 100$  kgmm und die geleistete  $100 \times 1 = 100$  kgmm. Beide sind also, wie es sein muß, wenn von Nebenwiderständen abgesehen wird, gleich gross.

Die *Zusammendrückbarkeit* des Wassers ist sehr gering, denn eine drückende Kraft von 1 kg auf das qcm (1 Atmosphäre) drückt das Wasser nur um 50 Milliontel seines Rauminhaltes zusammen. Für die Praxis ist daher das Wasser nicht in erheblicher Weise zusammendrückbar.

## § 45.

**Prinzip des Archimedes.** Es ist ein von selbst einleuchtender Grundsatz der Mechanik, daß der Zustand des Gleichgewichts eines

Systems nicht gestört wird, wenn man, ohne sonst etwas zu ändern, Teile fest macht, die vorher beweglich waren. So möge man sich in der ruhenden Wassermasse (Fig. 149) einen beliebig gestalteten Teil  $K$  des Wassers plötzlich erstarrt denken, dann wird er genau ebenso ruhig von der umgebenden Flüssigkeit getragen werden, wie vorher. Nun wirkt aber auf den Körper die Schwerkraft und zieht ihn genau ebenso abwärts, wie dies eine im Schwerpunkt  $S$  angebrachte Kraft  $P$  tun würde, die dem Gewicht des Körpers gleich ist. Damit also keine Bewegung eintreten kann, müssen die von der Flüssigkeit senkrecht gegen die Oberfläche von  $K$  wirkenden Druckkräfte des umgebenden Wassers in ihrer Gesamtheit eine Wirkung hervorbringen, wie eine Kraft  $W$ , welche  $P$  gleich und entgegengesetzt ist. Man denke nun den Körper  $K$  durch einen festen Körper von genau derselben Gestalt ersetzt. Dann wirken die Druckkräfte der Flüssigkeit auf seine Oberfläche genau ebenso, wie vorhin auf den Körper  $K$ , d. h. wie eine lotrecht aufwärts gerichtete Kraft, die im Schwerpunkte des verdrängten Wassers (*Mittelpunkt des Druckes* genannt) angreift und deren GröÙe dem Gewichte desselben gleich ist. Denkt man sich den Körper durch einen Faden an dem einen Arm einer ins Gleichgewicht gebrachten Wage aufgehängt und dann in die Flüssigkeit eingetaucht, so wird es gerade so sein, als ob der Körper von seinem Gewichte ebensoviel verloren hätte, als von demselben durch die Flüssigkeit getragen wird. Darum wird das Gesetz des Archimedes gewöhnlich so ausgesprochen: *Ein eingetauchter Körper verliert so viel an Gewicht, wie die Flüssigkeit wiegt, die er verdrängt.*




Fig. 149.

## § 46.

**Schwimmende Körper.** Aus dem vorigen § lässt sich leicht folgern, daß ein schwimmender Körper, dessen Schwerpunkt mit dem der verdrängten Flüssigkeit zusammenfällt, in beliebiger Lage schwimmt, daß aber sonst das Gleichgewicht nur eintritt, wenn die beiden Schwerpunkte lotrecht übereinander liegen. Befindet sich indessen der Schwerpunkt des Körpers über dem der verdrängten Flüssigkeit, so ist das Gleichgewicht *labil*, d. h. der Körper wird bei der geringsten Drehung ganz umschlagen, bis sein Schwerpunkt unter dem andern liegt und so ein *stabiler* Gleichgewichtszustand eintritt.

## § 47.

**Auftrieb eines Zylinders.** Man denke sich von der Flüssigkeit (Fig. 150a) einen lotrechten, bis zur Oberfläche reichenden zylindrischen

oder prismatischen Körper abgesondert. Derselbe wird von der umgebenden Flüssigkeit getragen. Da aber die seitlich wirkenden Druckkräfte sämtlich wagrecht sind, so sind es nur die gegen die Grundfläche wirkenden, lotrecht aufwärts gerichteten Kräfte, die dem Fallen entgegenwirken. Ihre Gesamtheit, oder der sogenannte Auftrieb, muß deshalb gleich dem Gewichte des Körpers sein. Ist nun  $F$  die GröÙe der Grundfläche und  $h$  die Höhe des Körpers, so ist sein Inhalt gleich  $Fh$  und  $wFh$  sein Gewicht, wenn  $w$  das Gewicht einer Kubikeinheit Flüssigkeit bedeutet.

Der aufwärts gerichtete Druck gegen eine wagrechte ebene Fläche von  $F$  qcm Inhalt, die sich  $h$  cm unter dem Wasserspiegel befindet, beträgt  $Fh$  Gramm, da  $w = 1$  Gramm.

### § 48.

**Bodendruck.** Denkt man sich statt des Körpers im vorigen Paragraphen die umgebende Flüssigkeit erstarrt (Fig. 150 b), so ist der




Fig. 150.

Bodendruck, den der flüssig gebliebene Teil auf die wagrechte Grundfläche ausübt, genau ebenso groß oder  $wFh$ .

Erweitert sich das über dem Boden befindliche Gefäß (Fig. 150 c) nach oben hin, so kann man sich, ohne etwas zu ändern, alles Wasser erstarrt denken, das sich nicht lotrecht über dem Boden befindet. Dann hat man den eben behandelten Fall, mithin auch jetzt den Bodendruck gleich  $wFh$ .

Hat das Gefäß eine ganz beliebige Gestalt (Fig. 150 d), so kann man sich immer, wie in der Figur punktiert ist, ein nach oben sich erweiterndes Gefäß denken, aus dem jenes dadurch entstanden ist, daß man einen Teil der Flüssigkeit fest werden läßt. Mithin gilt allgemein:

*Der Druck, den eine Flüssigkeit auf einen wagrechten Boden ausübt, ist gleich der GröÙe des Bodens mal dessen lotrechtem Abstände vom Flüssigkeitsspiegel mal dem Gewicht einer Kubikeinheit der Flüssigkeit.*

### § 49.

**Kraft zur Hebung eines Ventils.** Ein rundes Ventil von 10 cm Durchmesser (Fig 151) liegt 80 cm unter dem Wasserspiegel. Dasselbe

wird durch Ziehen an einer Stange  $S$  geöffnet; man soll berechnen, wie viel Kraft dazu gehört. Die ziehende Kraft hat den Druck zu überwinden, der auf dem Ventil lastet. Derselbe ist (§ 48)

$$\frac{\pi 10^2}{4} 80 = 78,54 \times 80 = 6283 \text{ g}$$

oder rund 6,3 kg. Addiert man dazu das Gewicht des Ventils, so hat man die Antwort.

### § 50.

**Druck gegen lotrechte ebene Wände.** Fig. 152 zeigt den Durchschnitt eines Flüssigkeit enthaltenden Gefäßes, dessen eine Wand  $BD$  ein lotrecht stehendes Rechteck sein soll, benetzt bis zur Höhe  $h$  und in seiner Breite  $b$ . Man denke sich durch eine wagrechte Ebene  $EF$  die Flüssigkeit in einen oberen Teil  $O$  und einen unteren  $U$  zerlegt. Dann drückt  $O$  auf jeden Punkt der Oberfläche von  $U$  mit dem Gewicht einer lotrechten Wassersäule vom Punkte  $E$  bis zum Spiegel  $AB$ . Ihre Höhe sei  $e$ . Da nach § 44 dieser Druck in  $U$  nach




Fig. 151.




Fig. 152.

allen Richtungen in gleicher Stärke sich fortpflanzt, so erfährt auch der Punkt  $F$  der lotrechten Wand einen senkrecht zu dieser gerichteten Druck, der durch  $FG$  gleich  $e$  dargestellt werden möge. In dieser Weise denke man in jedem Punkte der vertikalen Wand eine Linie gezogen, die den daselbst stattfindenden Druck darstellt. Die Gesamtheit dieser Linien bildet ein dreiseitiges Prisma vom Querschnitt  $BDH$ . Man denke sich nun zu jedem der Drucke so viel hinzugefügt, daß die Summe gleich  $h$  wird. Dann erhält der den Druck darstellende Körper den Querschnitt  $BDHJ$  und ist genau doppelt so groß wie zuvor. Da der Druck an jeder Stelle der Wand jetzt einer Wassersäule von der Höhe  $h$  entspricht, so ist er gleich Grundfläche  $bh$  mal Höhe  $h$  mal dem Gewicht  $w$  der Kubikeinheit Flüssigkeit. Der Druck auf die lotrechte Wand ist halb so groß, mithin gleich

$$\frac{1}{2} w b h^2.$$

## § 51.

**Kraft zum Aufziehen einer lotrecht stehenden Schütze.** Fig. 153 zeigt, von der Wasserseite gesehen, den Schieber einer Schleuse von 80 cm Breite, 60 cm Höhe und 4 cm Dicke. Es ist die zum Aufziehen nötige Kraft  $P$  zu bestimmen. — Wenn das Wasser bis zum oberen Rande des Schützenbrettes reicht, so ist die GröÙe der gedrückten Fläche  $60 \times 80 = 4800$  qcm. Um den Gesamtdruck zu erhalten, müssen wir diese Fläche mit der halben Höhe ( $60 : 2 = 30$ ) und dem Gewicht von 1 ccm Wasser (1 g) multiplizieren. Das ergibt

$$4800 \times 30 \times 1 = 144000 \text{ g} = 144 \text{ kg}.$$

Dieser Druck von 144 kg verursacht zwischen dem Schützenbrett und seiner Unterlage einen Reibungswiderstand, der beim Übergange von der Ruhe zur Bewegung etwa 0,7 des Druckes ausmacht, wenn vorausgesetzt wird, daß Schütze und Unterlage beide aus nassem Eichenholz




Fig. 153.




Fig. 154.

bestehen. Demnach muß  $P$ , um diesen Widerstand zu überwinden,  $0,7 \times 144 = 101$  kg sein.

Nun hat aber  $P$  noch das Gewicht des Schleusenbrettes zu heben. Dasselbe nimmt einen Raum von  $60 \times 80 \times 4 = 19200$  ccm ein. Da 1 ccm nasses Holz etwa ebensoviel wiegt, wie 1 ccm Wasser oder 1 g, so ist das gesuchte Gewicht gleich 19200 g oder rund 19 kg. Rechnet man für Leisten und an der Schleuse befestigte Eisenteile noch 20% oder rund 4 kg dazu, so erhält man 23 kg.

Somit ist die gesuchte Kraft beim Übergange von der Ruhe zur Bewegung gleich  $101 + 23 = 124$  kg. Sobald die Bewegung eingeleitet ist, fällt der Reibungswiderstand auf die Hälfte und die Kraft  $P$  ist deshalb um  $101 : 2 = 50$  kg kleiner zu veranschlagen.

## § 52.

**Druck gegen eine geneigte ebene Fläche.**  $BC$  (Fig. 154) sei der Schnitt einer ebenen, vom Wasser gedrückten Fläche von beliebiger Gestalt, und  $P$  ein Punkt derselben;  $e$  sei die lotrechte Entfernung

von  $P$  bis zum Wasserspiegel. Dann ist der in  $P$  senkrecht zur Fläche  $BC$  gerichtete Druck des Wassers nach der in § 50 befolgten Schlussweise durch eine senkrecht zur Fläche  $BC$  in  $P$  errichtete Linie  $PQ$  gleich  $e$  darzustellen. Denkt man in jedem Punkte der Fläche  $BC$  eine solche den Wasserdruck darstellende Senkrechte errichtet, so bestimmt die Gesamtheit dieser Senkrechten einen Körper  $CBDE$ , den wir uns aus einem Material gefertigt denken wollen, von dem 1 ccm genau ebensoviel wiegt, wie 1 ccm Wasser. Denkt man sich nun die Fläche  $BC$  wagrecht und den Körper  $CBDE$  darauf stehend, so wird offenbar die Fläche jetzt vom Körper ebenso gedrückt, wie vorher vom Wasser. Der Gesamtdruck des Wassers entspricht also dem Gewichte des Körpers  $CBDE$ , welches seinem Rauminhalte mal dem Gewicht der Kubikeinheit Wasser gleich ist. Den Rauminhalt mißt das Produkt aus der Grundfläche  $BC$  und einer in ihrem Schwerpunkte senkrecht auf derselben stehenden und bis zur Oberfläche  $DE$  reichenden Linie. Diese Linie ist auch gleich dem lotrechten Abstände des Schwerpunktes der Fläche  $BC$  vom Wasserspiegel. Daher gilt folgende Regel:

*Um den Druck einer Flüssigkeit auf eine von derselben gedrückte ebene Fläche zu finden, bildet man das Produkt: Gröfse der Fläche mal lotrechtem Abstand ihres Schwerpunktes vom Wasserspiegel mal Gewicht der Kubikeinheit der Flüssigkeit.* Diese Regel umfaßt die vorher entwickelten als besondere Fälle.

---

## Kapitel V.

### Hydrodynamik oder Lehre von der Bewegung der Flüssigkeiten.

#### A. Bewegung des Wassers durch Öffnungen.

##### § 53.

**Ausfluß aus einer gerundeten Öffnung.** Das im Gefäß (Fig. 155) enthaltene Wasser soll durch eine Öffnung, die durch sorgfältig gerundeten Übergang sich an den Boden anschließt, mit der Geschwindigkeit  $v$  durch den Mündungsquerschnitt vom Inhalt  $F$  abfließen. Die Oberfläche des Wassers werde so groß angenommen, daß sie nur mit zu vernachlässigender Geschwindigkeit herabsinkt, auch werde die in der Sekunde ausfließende Wassermenge  $Q$  durch Zufluß ersetzt, sodaß der Abstand des Wasserspiegels von der Mündung, oder die *Druckhöhe*  $h$ , unverändert bleibt.




Fig. 155.

Verfolgt man nun in Gedanken eine kleine Gewichtsmenge  $p$  der Flüssigkeit, wie sie von der Oberfläche bis zum Querschnitt der Mündung herabsinkt, so erkennt man leicht, daß sie an Energie der Lage verliert und daß  $ph$  die Größe dieses Verlustes ausdrückt. Nach § 11 würde dieser Verlust an Energie der Lage durch vermehrte Energie der Bewegung ersetzt werden, sofern keine Nebenwiderstände auftreten, und man hätte  $ph = 0,5 (p \cdot g) v^2$ . Mit Rücksicht auf Reibungswiderstände und dergl., auf deren Überwindung eine Energiemenge  $ph_1$  verbraucht werden möge, hat man

$$ph = ph_1 + \frac{1}{2} p v^2, \text{ woraus folgt } v = \sqrt{2g(h - h_1)} = \sqrt{1 - \frac{h_1}{h}} \sqrt{2gh}.$$

Der Wert, mit dem  $\sqrt{2gh}$  multipliziert werden muß, um, mit Rücksicht auf Widerstände, den Wert der Ausfließgeschwindigkeit  $v$  zu erhalten, heißt *Geschwindigkeitskoeffizient*. Bezeichnet man ihn mit  $\varphi$ , so folgt

$$v = \varphi \sqrt{2gh} \text{ und } Q = Fv = \varphi F \sqrt{2gh}.$$

Dafs die in der Sekunde ausfliessende Wassermenge gleich dem Querschnitt  $F$  mal der Geschwindigkeit  $v$  ist, wird man leicht durch folgende Erwägung einsehen. Man denke sich alle Wasserteile, die sich zu Anfang einer Sekunde in der Mündung befinden, mit der Geschwindigkeit  $v$  eine Sekunde unter Ausschluss aller etwa jenseits der Mündung wirkenden Kräfte fortbewegt, dann beschreiben sie einen prismatischen Körper von der Basis  $F$  und der Höhe  $v$ , dessen Inhalt also  $Fv$  ist, und der die in der Sekunde ausfliessende Wassermenge darstellt.

### § 54.

**Ausfluss in dünner Wand.** Es möge jetzt die Ausflussöffnung sich in einer grösseren ebenen, ganz dünnen Wand befinden, oder was dasselbe ist, die Öffnung sei nach ausen abgeschrägt, wie Fig. 156 sie, über Verhältnis erweitert, zeigt. Der austretende Strahl erscheint jetzt nicht, wie oben, als Zylinder, sondern zeigt eine konoidische Form. Man sagt, er erleide eine *Zusammensziehung* oder *Kontraktion*. Die Fig. 156 ist nach Strahlenmessungen von Bousset für eine kreisförmige Öffnung gezeichnet. Setzt man ihren Durchmesser gleich 10, so ist derselbe im Querschnitt der stärksten Kontraktion gleich 8, und dieser liegt 5 Teile von der Mündung entfernt. Um den Grund dieser Kontraktion zu erkennen, verrührt man das Wasser mit wenig Kreidestaub. In Glasgefässen sieht man dann an der Bewegung der Staubteilchen den Weg der mit ihnen fliessenden Wasserteilchen. Es zeigt sich, dafs die Wasserteilchen nicht blofs in lotrechter und schräger Richtung, sondern auch längs der wagrechten Wand der Ausflussöffnung zueilen, wie Fig. 156 durch die punktierten Bahnen oder *Wasserfäden* andeutet. Somit fliessen die Wasserteilchen in konvergierenden Bahnen durch die Öffnung, und diese werden erst im Querschnitt der stärksten Kontraktion parallel. Deshalb wird die oben errechnete Geschwindigkeit




Fig. 156.

$$v = \varphi \sqrt{2gh} \quad (1)$$

hier erst im Querschnitt der stärksten Kontraktion erreicht, dessen Inhalt  $F_1$  sein möge. Man erhält dann für die in der Sekunde ausfliessende Wassermenge

$$Q = F_1 v = \varphi F_1 \sqrt{2gh}. \quad (2)$$

Ist  $F$  der Querschnitt der Mündung, so heisst  $F_1 : F$  der *Kontraktionskoeffizient*.



Wenn nun  $\frac{F_1}{F} = \alpha$ , so ist  $F_1 = \alpha F$ , und setzt man diesen Wert in (2) ein, so folgt

$$Q = \alpha \varphi F \sqrt{2gh}. \quad (3)$$

Das Produkt  $\alpha \varphi$  möge  $\mu$  heißen. Man nennt seinen Wert den *Ausflusskoeffizienten*. Demnach wäre

$$Q = \mu F \sqrt{2gh}. \quad (4)$$

### § 55.

**Widerstandshöhe.** Zur Erlangung seiner Geschwindigkeit  $v$  muß das ruhend gedachte Wasser von einer Höhe  $h_2 = \frac{v^2}{2g}$  herabfallen (§ 11). Diese Höhe ist kleiner als die wirklich vorhandene Druck- oder Fallhöhe  $h$ . Die Differenz  $h - h_2 = h_1$  nennt man die verlorene Druck- oder die „*Widerstandshöhe*“. Vom Wasserspiegel bis zur Mündung geht Energie der Lage verloren, von der sich ein Teil als Energie der Bewegung im ausfließenden Strahl wiederfindet, der andere aber sich bei Überwindung der Reibungswiderstände in Wärme umsetzt. Dieser Teil entspricht der Widerstandshöhe. Man sagt deshalb auch, ein Teil der Druckhöhe diene dazu, das ruhende Wasser in mit der Ausflusgeschwindigkeit bewegtes umzuwandeln, der Rest werde durch die Widerstände verbraucht. Es ist nun die Widerstandshöhe

$$h_1 = h - \frac{v^2}{2g}. \quad \text{Da nun } v = \varphi \sqrt{2gh}, \text{ so folgt } h = \frac{v^2}{2g} \cdot \frac{1}{\varphi^2}.$$

$$\text{Mithin } h_1 = \frac{v^2}{2g} \cdot \frac{1}{\varphi^2} - \frac{v^2}{2g} = \frac{v^2}{2g} \left( \frac{1}{\varphi^2} - 1 \right) = \zeta \frac{v^2}{2g}.$$

Der Zahlenwert  $\frac{1}{\varphi^2} - 1 = \zeta$  heißt „*Widerstandskoeffizient*“.

### § 56.

**Die Zahlenwerte** für den *Geschwindigkeits-, Kontraktions-, Ausflus- und Widerstandskoeffizienten* betragen im Mittel beim Ausfluß aus dünner Wand

$$\varphi = 0,96; \alpha = 0,64; \mu = 0,615; \zeta = 0,085 \text{ und } \mu \sqrt{2g} = 2,724$$

und die Abweichungen dürfen in praktischen Fällen 4% nicht erreichen, wenn die Wand im Umkreise von mindestens der  $2\frac{1}{2}$ -fachen größten Dimension der Öffnung eben ist und der Wasserspiegel als ruhend betrachtet werden kann, somit *normale Kontraktion* stattfindet.

### § 57.

**Beispiele.** a) Eine abgerundete Öffnung von 2 cm Weite befindet sich 50 cm unter dem Wasserspiegel eines großen Behälters. Mit welcher

Geschwindigkeit fließt das Wasser aus und in welcher Menge? — Nach § 53 ist die gesuchte Geschwindigkeit für  $\varphi = 0,96$

$$v = \varphi \sqrt{2gh} = 0,96 \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,5} = 0,96 \cdot 4,43 \sqrt{0,5} = 4,253 \sqrt{0,5} = 3 \text{ m.}$$

Die Wassermenge  $Q$  wird erhalten durch Multiplikation des Querschnitts  $F$  der Mündung mit  $v$ . Mithin ist

$$Q = Fv = \frac{\pi \cdot 0,02^2}{4} \cdot 3 = 0,000314 \cdot 3 = 0,000942 \text{ cbm}$$

oder 0,942 Liter in der Sekunde.

b) Wie groß wäre die ausfließende Wassermenge, wenn die Öffnung, statt abgerundet zu sein, sich in einer dünnen Wand befunden hätte? — Da die Geschwindigkeit  $v$  des Wassers in diesem Falle zwar nicht an der Mündung, aber doch an der Stelle der stärksten Kontraktion erreicht wird, so hat man das unter a) gefundene Resultat nur mit dem Kontraktionskoeffizienten zu multiplizieren. Also ist

$$Q = 0,64 \cdot 0,942 = 0,603 \text{ l.}$$

c) Wie groß ist der Durchmesser einer Öffnung in dünner Wand zu nehmen, damit bei einer Druckhöhe von 0,5 m eine Wassermenge von 1 l in der Sekunde ausfließt? — Setzt man die hier gegebenen Werte in die Formel (4) § 54, so entsteht

$$0,001 = 0,615 \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,50} = 0,483 \cdot 3,13 \cdot d^2 = 1,512 d^2.$$

Daraus folgt:

$$d = \sqrt{\frac{1}{1512}} = \frac{1}{38,9} = 0,0257 \text{ m} = 2,57 \text{ cm.}$$

### § 58.

**Für Ausflußöffnungen in lotrechter dünner Wand** benutzt man die in § 54 entwickelten Formeln, indem man unter  $h$  den Abstand des Schwerpunktes der Ausflußöffnung vom Wasserspiegel versteht. Solche Öffnungen gebraucht man zu Wassermessungen. Ist z. B. die in Fig. 157 dargestellte Öffnung in die Wand eines großen Behälters eingebaut, dem Wasser zufließt, dessen Menge bestimmt werden soll, so wartet man bis zum Eintreten des Beharrungszustandes, d. h. bis der Wasserspiegel weder steigt noch fällt, weil durch die Öffnung ebensoviel Wasser aus dem Teiche abfließt, als ihm von anderer Seite zugeführt wird. Jetzt bestimmt man im Abstände von 1—1,5 m vor der Ausflußöffnung die Höhe des Wasserspiegels über dem Schwerpunkte der Öffnung und dann mit Hilfe




Fig. 157.

der Formel  $Q = \mu F \sqrt{2gh}$  die Menge des ausfließenden Wassers. Will man dabei einen hohen Grad von Genauigkeit erreichen, so ist eine Öffnung zu wählen, deren Ausflusskoeffizienten bekannt sind.

Derartige Bestimmungen machten Poncelet und Lesbros für lotrecht stehende rechteckige Öffnungen in dünner Wand von 0,2 m Breite bei normaler Kontraktion. *Normale Kontraktion* tritt ein, wenn der Wasserspiegel in 1 m Entfernung von der Öffnung als ruhend betrachtet werden kann und letztere sich sowohl in dünner Wand befindet, wie Fig. 157 zeigt, als auch um mindestens das 2,7 fache ihrer größten Dimension von benachbarten Wänden absteht. Die Ausflusskoeffizienten für verschieden hohe Öffnungen von 0,2 m Breite, deren obere Seite um  $h_2$  m unter dem ruhenden Wasserspiegel liegt, zeigt die nachstehende Tabelle, deren Werte auch gelten, wenn Breite und Höhe der Öffnungen verwechselt werden.

$h_2$ m	Höhe der Öffnung = $(h_1 - h_2)$ Meter					
	0,20	0,10	0,05	0,03	0,02	0,01
0,02	0,572	0,596	0,615	0,634	0,659	0,694
0,03	0,578	0,600	0,620	0,638	0,659	0,688
0,04	0,582	0,603	0,623	0,640	0,658	0,683
0,05	0,585	0,605	0,625	0,640	0,658	0,679
0,10	0,592	0,611	0,630	0,637	0,654	0,666
0,50	0,603	0,617	0,628	0,630	0,640	0,644
1,0	0,605	0,615	0,626	0,628	0,633	0,632
2,0	0,601	0,607	0,613	0,612	0,612	0,611
3,0	0,601	0,603	0,606	0,608	0,610	0,609

### § 59.

**Unvollständige, teilweise oder partielle Kontraktion** tritt bei der im vorigen § behandelten Ausflußöffnung ein, wenn durch anschließende Gefäßwände ein seitliches Zuströmen der Wasserteilchen verhindert wird. Liegt z. B. die untere Seite der rechteckigen Öffnung in der Höhe des Bodens, so ist die Kontraktion an dieser Seite aufgehoben. Ist nun  $p$  der ganze Umfang der rechteckigen Öffnung und  $\alpha$  diejenige Länge derselben, an der die Kontraktion aufgehoben ist, ferner  $\mu$  der Ausflusskoeffizient bei normaler Kontraktion, so ist nach Weisbach der hier anzuwendende Ausflusskoeffizient

$$= \mu \left( 1 + 0,155 \frac{\alpha}{p} \right).$$

*Unvollkommen* wird dagegen die *Kontraktion* genannt, wenn zwar die Öffnung in gehöriger Entfernung von Seitenwänden sich befindet, aber

das Wasser derselben nicht aus einem großen Behälter, sondern durch einen Kanal oder ein Gerinne zugeführt wird, in dem es der Öffnung schon mit einer größeren Geschwindigkeit zufließt. Mißt man nun die Druckhöhe (§ 55) im bewegten Wasser des Kanals und setzt  $m$  gleich Querschnitt der Öffnung geteilt durch Querschnitt des Kanals, wobei  $m < 0,6$ , so ist nach Weisbach folgender Ausflusskoeffizient anzuwenden, wenn  $\mu$  denselben für normale Kontraktion bedeutet (§ 58):

$$\mu (1 + 0,641 m^2).$$

### § 60.

**Schützenöffnungen mit seitlicher Kontraktion** und horizontalen, an den Boden des Behälters sich anschließenden, 3 m langen Ansatzgerinnen sind von Lesbros untersucht. Derselbe erhielt für 0,2 m breite und ebenso hohe Öffnungen, wenn die Höhe  $h_2$  unmittelbar an der lotrecht stehenden Schütze von Oberkante der Mündung bis zum Wasserspiegel gemessen wurde, folgende Werte für die Ausflusskoeffizienten  $\mu_2$ :

$h_2 =$	0,02 m	0,05 m	0,10 m	0,20 m	0,50 m	1,0 m	3,0 m
$\mu_2 =$	0,502	0,520	0,545	0,575	0,600	0,602	0,601

Liegt der *Ausfluß des Wassers* bei einer Schützenöffnung ganz *unter dem Unterwasserspiegel*, so ist als Druckhöhe der lotrechte Abstand des Oberwasserspiegels von dem des Unterwassers anzunehmen. Da diese für alle Stellen der Öffnung gleich groß ist, so gilt dasselbe für die an verschiedenen Stellen des Querschnittes stattfindenden Geschwindigkeiten. Die Ausflusskoeffizienten sind nur in einzelnen Fällen genauer bekannt und daher im allgemeinen annähernd wie sonst anzunehmen.

### § 61.

**Bei geneigten Schützen**, bei denen an den Seiten und am Boden keine Kontraktionen stattfinden, sind nach Poncelet die Ausflusskoeffizienten bei einer Neigung der Schütze gegen den Horizont

von	40	45	50	55	60 Grad
gleich	0,83	0,81	0,79	0,76	0,74.

### § 62.

**Überfälle in dünner Wand.** Es sei  $AB$  (Fig. 158) die ebene und lotrechte Wand eines großen Wasserbehälters. Die vom Wasserspiegel ausgehende Länge  $AB$  denke man sich in eine sehr große Anzahl  $n$  gleicher Teile geteilt, von denen jeder gleich  $a$  sein mag. Der unterste dieser Teile  $a$  sei auch die Höhe einer rechteckigen Ausflußöffnung mit der horizontal liegenden Breiteseite  $b$ . Dann wäre  $ab$  der Querschnitt dieser

Öffnung, und ihre Druckhöhe  $AB - \frac{1}{2}a$  sei gleich  $h$ . Die Menge  $q_n$  des in der Sekunde durch  $ab$  ausfließenden Wassers (§ 58) wird ohne Rücksicht auf Nebenwiderstände gefunden zu

$$q_n = b \cdot a \sqrt{2gh}.$$

Wäre nicht das tiefste Teilchen  $a$ , sondern das nächste die Höhe einer entsprechenden Ausflußöffnung, so wäre die in Betracht kommende Druckhöhe  $h - a$ ; die in der Sekunde ausfließende Wassermenge  $q_{n-1}$  betrüge:

$$q_{n-1} = b \cdot a \sqrt{2g(h-a)}.$$

Eine Ausflußöffnung, von der das nächstfolgende Teilchen  $a$  die Höhe vorstellte, würde entsprechend ergeben

$$q_{n-2} = b \cdot a \sqrt{2g(h-2a)}.$$

In dieser Weise denke man sich entsprechende Ausdrücke bis zum Wasserspiegel aufgestellt und dann alle einzeln betrachteten Öffnungen gleichzeitig vorhanden. Fließt durch die so entstehende Öffnung von der Breite  $b$  und der Höhe  $h + \frac{1}{2}a$  die Wassermenge  $Q$  in der Sekunde, so ergibt die Rechnung:

$$\begin{aligned} Q &= q_n + q_{n-1} + q_{n-2} + q_{n-3} \dots \\ &= b \cdot [a \sqrt{2gh} + a \sqrt{2g(h-a)} + \dots]. \end{aligned}$$

Denkt man sich nun über der Mitte jeder der gedachten Ausflußöffnungen senkrecht zu  $AB$  die entsprechenden Werte

$$\sqrt{2gh}, \sqrt{2g(h-a)} \dots$$

errichtet und deren Enden durch eine stetige Linie verbunden, so ist leicht zu erkennen, daß der Inhalt der Fläche  $ABC$  dem Werte des oben eckig eingeklammerten Ausdruckes um so mehr gleichkommt, je kleiner  $a$  genommen wird. Möge nun  $a$  unendlich klein sein, dann ist  $BC$  gleich  $\sqrt{2gh}$ ,  $AC$  ein Parabelbogen, mithin  $ABC$  gleich  $\frac{2}{3}h\sqrt{2gh}$ . Setzt man diesen Wert oben ein, so folgt

$$Q = \frac{2}{3}bh\sqrt{2gh}.$$

Eine, wie die betrachtete, bis zum Wasserspiegel reichende Ausflußöffnung heißt ein *Überfall*, und zwar ein *vollkommener*, wenn der ausfließende Strahl, wie bei der Entwicklung der Formel vorausgesetzt, frei in die Luft herabfällt, der Spiegel des Unterwassers also tiefer liegt als die Überfallkante.

Der vorstehenden theoretischen Formel ist für praktische Rechnungen noch ein aus Beobachtungen stammender Ausflußkoeffizient  $\mu$  (§ 63) hinzuzufügen, sodaß

$$Q = \frac{2}{3}\mu bh\sqrt{2gh}.$$




Fig. 158.

Da die Werte von  $\mu$  für Überfälle in dünner Wand recht genau bekannt sind, bilden diese meist das beste Mittel, um fließende Wassermengen genau zu messen. So wird z. B. in Oberitalien alles aus dem Cavour-Kanal verkaufte Wasser durch Überfälle gemessen.

### § 63.

**Ausflusskoeffizienten für Überfälle in dünner Wand** nach Lesbros bei normaler Kontraktion (§ 56) für Druckhöhen von 0,01 bis 0,60 m, die in 1 m Entfernung von der Überfallkante gemessen werden, gibt die folgende Tabelle für zwei Überfallbreiten (Fig. 159).

Für eine Breite $b = 0,2$ m und				Für eine Breite $b = 0,6$ m und			
$h =$	$\frac{2}{3}\mu =$	$h =$	$\frac{2}{3}\mu =$	$h =$	$\frac{2}{3}\mu =$	$h =$	$\frac{2}{3}\mu =$
0,01	0,424	0,08	0,397	0,06	0,412	0,30	0,391
0,02	0,417	0,10	0,395	0,10	0,406	0,40	0,391
0,04	0,407	0,15	0,393	0,15	0,400	0,50	0,391
0,06	0,401	0,20	0,390	0,20	0,395	0,60	0,390

Muß man den Überfall in einen Kanal legen, in dem ihm das Wasser mit einer gewissen Geschwindigkeit zufließt, wodurch die Kontraktion unvollkommen wird, so sind die Ausflusskoeffizienten nach Weisbach zu bestimmen, wie folgt. Ist  $n$  das Verhältnis von  $bh$  zum Querschnitt des Zufluskanals und  $\mu_2$  der Ausflusskoeffizient für den Fall, daß  $b$  kleiner ist als die Kanalbreite, während  $\mu_3$  den entsprechenden Wert für  $b$  gleich der Kanalbreite bedeutet, so gilt für:




Fig. 159.

$n =$	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
$\mu_2 =$	1,000 $\mu$	1,001 $\mu$	1,003 $\mu$	1,007 $\mu$	1,014 $\mu$	1,044 $\mu$	1,107 $\mu$
$\mu_3 =$	1,045 $\mu$	1,049 $\mu$	1,056 $\mu$	1,064 $\mu$	1,074 $\mu$	1,100 $\mu$	1,133 $\mu$

Bei der praktischen Ausführung einer Wassermessung in kleineren Bächen benutzt man gewöhnlich zur Anbringung des Überfalleinschnittes eine mit Feder und Nut zusammengefügte Bretterwand, die 60 bis 100 cm in Boden- und Seitenwände des Bettes eingreift und mit Lehm oder Ton

hinterstampft wird. Ein Meter oberhalb derselben schlägt man einen Pfahl mit lotrechter Seitenfläche ein und bestimmt an derselben den Punkt  $P$ , der mit der Überfallkante gleich hoch liegt, durch Nivellement oder einfacher, bei langsamem Zulassen des Wassers, wenn der Wasserspiegel gerade mit der Überfallkante gleich hoch steht.  $P$  nimmt man als Nullpunkt eines geteilten Stabes, an dem man  $h$  abliest.

### § 64.

Hansen hat in ein rechteckiges Gerinne von 1,082 m Breite eine Wand von gleicher Breite und 0,514 m Höhe eingebaut und als Überfall ohne Seitenkontraktion benutzt. Er fand zwischen  $h = 0,08$  und 0,360 m Druckhöhe die Ausflusskoeffizienten  $z/\mu$  als lineare Funktion der letzteren und steigend von 0,415 bis 0,446. F. Frese findet für denselben Fall aus einer größeren Anzahl von Resultaten verschiedener Beobachter, wenn  $H$  die Wassertiefe im Kanal bedeutet und die Breite beliebig ist:

$$\mu = \left( 0,615 + \frac{0,0021}{h} \right) \left[ 1 + 0,55 \left( \frac{h}{H} \right)^2 \right].$$

Derselbe findet entsprechend für Überfälle mit Seitenkontraktion in Kanälen von der Breite  $B$ , wenn  $b$  die Überfallbreite ist:

$$\mu = \left( 0,5755 + \frac{0,017}{h + 0,18} - \frac{0,075}{b + 1,2} \right) \left[ 1 + \left( 0,25 \left( \frac{b}{B} \right)^2 + z \right) \left( \frac{h}{H} \right)^2 \right],$$

$$\text{worin } z = 0,025 + \frac{0,0375}{\left( \frac{h}{H} \right)^2 + 0,02}.$$

### B. Durchfluß durch Röhren.

### § 65.

**Bewegung des Wassers in Röhren.**  $AB$  (Fig. 160) sei der Spiegel des zufließenden Wassers, das durch eine kreisförmige Röhre von der Länge  $l$  und dem Durchmesser  $d$  mit der Geschwindigkeit  $v$  bei  $C$  aus-




Fig. 160.

fließt. Ist  $h$  der lotrechte Abstand des Oberwasserspiegels von dem Spiegel des Unterwassers (die Druckhöhe), so verliert jede kleine Gewichtsmenge  $p$ , welche durch die Rohrleitung herabsinkt, an Energie der Lage  $ph$ . Dagegen gewinnt  $p$  an Energie der Bewegung (§ 11) in der Röhre, wenn

wir die ursprüngliche Zufußgeschwindigkeit als unbedeutend annehmen, um  $\frac{1}{2} \frac{p}{g} v^2$ . Dieser Wert ist aber um den Betrag der Arbeit der Nebenwiderstände kleiner als  $ph$ . Was insbesondere die Reibung in der Röhre betrifft, so wollen wir zu ihrer Bestimmung annehmen, daß  $p$  in der Röhre einen Zylinder von der Höhe  $x$  einnimmt. Dann lehrt die Erfahrung, daß die Reibung proportional ist der Fläche  $\pi dx$ , in welcher der Zylinder die Röhre berührt. Es ist nun leicht auszurechnen, daß die GröÙe dieser Berührungsfläche dem Durchmesser  $d$  der Röhre für dasselbe Gewicht  $p$  umgekehrt proportional ist. Mithin ist auch unter sonst gleichen Umständen die Reibung dem Durchmesser  $d$  der Röhre umgekehrt proportional. Außerdem werde den Beobachtungen entsprechend angenommen, die Reibung vergrößere sich im Verhältnis mit dem Quadrat der Geschwindigkeit  $v$ , oder was dasselbe sagt, sie wachse proportional der Geschwindigkeitshöhe (§ 7)  $v^2:2g$ . Ist also  $k$  der Wert der Reibung für die Einheit des Gewichts, des Durchmessers und der Geschwindigkeitshöhe, so ist für den Durchmesser  $d$ , das Gewicht  $p$  und die Geschwindigkeit  $v$  die GröÙe der Reibung:  $k \frac{1}{d} \frac{v^2}{2g} p$  und ihre Arbeit für die Rohrlänge  $l$  gleich  $k \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} p$ . Jetzt ist noch die Arbeit des *Eintrittswiderstandes* zu berücksichtigen, der beim Eintritt des Wassers in die Rohrleitung entsteht und der sowohl  $p$  als der Geschwindigkeitshöhe proportional gesetzt werden kann, also gleich  $ep(v^2:2g)$ , wenn  $e$  den Wert derselben für die Einheit des Gewichts und diejenige der Geschwindigkeitshöhe bezeichnet. Nun ist die beim Fallen von  $p$  verschwindende Energie der Lage den von den Nebenwiderständen geleisteten Arbeiten und der erlangten Energie der Bewegung gleich zu setzen, oder

$$ph = e \frac{v^2}{2g} p + k \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} p + \frac{v^2}{2g} p$$

oder, da  $p$  sich forthebt,

$$h = \left(1 + e + k \frac{l}{d}\right) \frac{v^2}{2g}. \quad (1)$$

Was den Zahlenwert von  $e$  betrifft, so ist derselbe nach Weisbach gewöhnlich gleich 0,505, kann aber durch Abrundung der Eintrittsöffnung auf 0,08 herabgemindert werden. Der Wert von  $k$  ist nicht ganz unabhängig von  $v$ , sondern nach Weisbach folgender Tabelle entsprechend zu nehmen:

$v =$	0,10 m	0,20 m	0,30 m	0,5 m	1,0 m	2,0 m	5,0 m	10,0 m
$k =$	0,0444	0,0356	0,0317	0,0278	0,0239	0,0211	0,0187	0,0174



Die Formel (1) gestattet zu berechnen, wie viel Druckhöhe erfordert wird, um in einer Röhre von gegebenen Dimensionen eine bestimmte Geschwindigkeit hervorzubringen. Aus (1) sind andere Formeln, in denen  $v$  oder  $d$  als unbekannte Größen betrachtet werden, leicht abzuleiten, z. B.

$$v = \frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{1 + e + k \frac{l}{d}}}. \quad (2)$$

Da aber  $k$  von  $v$  abhängt, ist zuerst ein Näherungswert von  $k$ , z. B. 0,03 einzusetzen, damit  $v$  zu berechnen und nun ev. mit einem verbesserten Werte die Rechnung zu wiederholen. — Nach  $v$  findet man die von der Rohrleitung in der Sekunde geführte Wassermenge  $Q$  gleich Querschnitt mal Geschwindigkeit:

$$Q = \frac{1}{4} \pi d^2 v. \text{ Daraus folgt auch } v = \frac{4Q}{\pi d^2} = 1,2732 \frac{Q}{d^2}. \quad (3)$$

Um für eine gegebene Wassermenge  $Q$  den Durchmesser der Rohrleitung zu finden, setze man diesen Wert von  $v$  in (1), dann entsteht

$$h = \left(1 + e + k \frac{l}{d}\right) \frac{16 Q^2}{2g \pi^2 d^5} = \left((1 + e)d + kl\right) \frac{16 Q^2}{2g \pi^2} \cdot \frac{1}{d^5},$$

woraus

$$d = \sqrt[5]{\left((1 + e)d + kl\right) \frac{16}{2g \pi^2} \cdot \frac{Q^2}{h}} = 0,6075 \sqrt[5]{\left((1 + e)d + kl\right) \frac{Q^2}{h}}. \quad (4)$$

In der letzten Formel müssen rechts  $k$  und  $d$  versuchsweise angenommen und nach den erzielten Resultaten verbessert werden, wobei das zur Bestimmung von  $k$  nötige  $v$  aus (3) berechnet wird.

### § 66.

**Beispiele.** 1. In einer Rohrleitung von 100 m Länge und 0,1 m Durchmesser fließt das Wasser mit 1 m Geschwindigkeit. Es sollen die Druckhöhen bestimmt werden, die zur Erzielung der Geschwindigkeit von 1 m, zur Überwindung des Eintrittswiderstandes und der Röhrenreibung gehören. Man braucht zur Erlangung der Geschwindigkeit  $v = 1$  m

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{1^2}{2 \cdot 9,81} = 0,051 \text{ m} = 5,1 \text{ cm Druckhöhe.}$$

Für den Eintrittswiderstand unter gewöhnlichen Verhältnissen ist  $e = 0,505$ , mithin die entsprechende Druckhöhe gleich  $e$  mal der vorigen  $= 5,1 \times 0,505 = 2,6$  cm. Der Koeffizient der Röhrenreibung für 1 m Geschwindigkeit ist (§ 36) 0,0239, daher für  $d = 0,1$  und  $l = 100$  die entsprechende Druckhöhe  $= 0,0239 \frac{100}{0,1} \cdot 0,051 = 1,219$  m oder 121,9 cm.

Die Gesamtdruckhöhe  $h$  ist also

$$h = 5,1 + 2,6 + 121,9 = 129,6 \text{ cm.}$$

2. Eine Röhre von 40 m Länge soll in jeder Sekunde 0,02 cbm Wasser liefern bei einer Druckhöhe von 1,5 m. Wie groß ist ihr Durchmesser zu nehmen? — Setzt man für  $\epsilon$  den gewöhnlichen Wert, so folgt aus (4):

$$d = 0,608 \sqrt[5]{(1,505 d + 40 k) \frac{0,02^2}{1,5}} = 0,608 \sqrt[5]{0,0004 d + 0,0107 k}.$$

Setzt man versuchsweise  $k = 0,02$  und vernachlässigt  $d$  unter der Wurzel, so kommt

$$d = 0,608 \sqrt[5]{0,000214} = 0,112 \text{ m; dann wird genauer}$$

$$d = 0,608 \sqrt[5]{0,0004 \cdot 0,112 + 0,000214} = 0,116 \text{ m.}$$

Diesem  $d$  entspricht ein Querschnitt  $F = 0,0106 \text{ qm}$ , also eine Geschwindigkeit

$$v = \frac{Q}{F} = \frac{0,02}{0,0106} = 1,89 \text{ m.}$$

Zu diesem  $v$  gehört  $k = 0,0213$ , mithin wird

$$d = 0,608 \sqrt[5]{0,0004 \cdot 0,116 + 0,0107 \cdot 0,0213} = 0,118 \text{ m.}$$

### § 67.

**Neuere Versuchsergebnisse.** Die oben angegebenen Werte des Koeffizienten  $k$  der Röhrenreibung sind folgender, einer großen Anzahl von Versuchen angepaßten Formel von Weisbach entnommen:

$$k = 0,01439 + \frac{0,0094711}{\sqrt{v}}.$$

Spätere Versuche von Darcy mit Röhren aus sehr verschiedenen Materialien von 0,012 bis 0,5 m Durchmesser und bei Geschwindigkeiten von 0,16 bis 5 m und 100 m Röhrenlänge ergaben eine größere Abhängigkeit des Reibungskoeffizienten von der Beschaffenheit der Röhrenwände, als man bis dahin vermutet hatte. Auch fand Darcy, daß nicht, wie in der Weisbach'schen Formel, der Wert von  $k$  sich wesentlich mit der Geschwindigkeit ändere, sondern mit der Größe des Durchmessers  $d$ . Die Weisbach'sche Formel gilt für Metallröhren. Der nach Darcy's Angaben entsprechende Wert von  $k$  für neue Metallröhren bei Geschwindigkeiten über 0,2 m ist

$$k = 0,01989 + \frac{0,0005078}{d}.$$

Nach neueren Versuchen mit Wasserleitungen aus eisernen Röhren bis zu 1 m Durchmesser hat diese Darcy'sche Formel den Beobachtungen am besten entsprochen, sodaß man ihr bei praktischen Rechnungen den Vorzug geben wird.

Darcy gibt auch praktische Regeln für die Berücksichtigung der gröfseren Widerstände durch die während des Gebrauches in den Röhren entstehenden Rauigkeiten.

a) Hat die Glätte der Innenfläche durch leichte Ablagerungen oder durch Rosten des Eisens gelitten, so bringe man, um eine gegebene Geschwindigkeit  $v$  zu erzielen, eine doppelt so hohe Druckhöhe in Anwendung, als die Rechnung für glatte Röhren ergibt; entsprechend setze man, um aus der gegebenen Druckhöhe die Geschwindigkeit zu ermitteln, in die für glatte Röhren geltende Formel nur den halben Wert der vorhandenen Druckhöhe ein.

b) Bringt das Leitungswasser im Laufe der Zeit die lichte Weite der Röhre verkleinernde Ablagerungen hervor, so ist deren schädlicher Einfluss um so gröfser, je kleiner der Röhrendurchmesser. Um den Röhren die nötige Leitungsfähigkeit zu erhalten, ist der berechnete Durchmesser um die doppelte Dicke der zu erwartenden Ablagerungen zu vergrößern.

Diese Regeln haben selbstverständlich nur den Wert, die Aufmerksamkeit des Technikers auf die darin berührten Verhältnisse zu richten. Den guten Zustand der eisernen Röhren sucht man durch Überziehen derselben mit Teer und Asphalt zu erhalten. Ist dann das Wasser reines Quellwasser, so mag man Resultate wie in Danzig und Wiesbaden erzielen, wo nach fünf Jahren die Widerstände in den Röhren nicht merklich zugenommen hatten; während in der Hamburger Elbwasserleitung Röhren beobachtet worden sind, bei denen die Druckhöhe nach 19 Jahren mehr als das Zwanzigfache von derjenigen ausmacht, die man für den ursprünglichen Zustand durch Rechnung erhält. Durch Inkrustierung ist dort der Reibungswiderstand gewachsen und der Durchmesser vermindert worden.

$k$  wurde von Weisbach für Holzröhren 1,75 mal gröfser gefunden, als oben für Metallröhren angegeben.

### § 68.

**Lange Röhren.** Bei der Berechnung von langen Rohrleitungen ist es meistens erlaubt, in den Formeln die rund das 1,5fache der Geschwindigkeitshöhe betragenden Druckhöhenverluste beim Eintritt in die Rohrleitung zu vernachlässigen oder  $1 + e$  gleich Null anzunehmen. Die Formeln (1), (2), (4) § 65 erhalten dann folgende Gestaltung:

$$h = k \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2g}; \quad v = \sqrt{\frac{2g}{k} \cdot \frac{h}{l} \cdot d}; \quad d = 0,6075 \sqrt[5]{\frac{l}{k} Q^2} = \sqrt[5]{\frac{16k}{2g\pi^2} \frac{l}{h} Q^2}.$$

Die letzte Formel ergibt bei Anwendung des Darcy'schen Wertes für  $k$ , und wenn  $\frac{h}{l}$ , „das relative Gefälle der Rohrleitung“, mit  $J$  bezeichnet wird, oder  $\frac{l}{h} = \frac{1}{J}$ :

$$d^5 = \frac{16k}{2g\pi^2} \cdot \frac{Q^2}{J}$$

oder  $\frac{J}{Q^2} = \frac{16(0,01989 + [0,0005078 : d])}{2g\pi^2} \cdot \frac{1}{d^5}$ .

In der folgenden Tabelle sind die zusammengehörigen Werte von  $d$  und  $J : Q^2$  enthalten, um die Bestimmung von  $d$  zu erleichtern.

$d$ cm	$\frac{J}{Q^2}$	$d$ cm	$\frac{J}{Q^2}$	$d$ cm	$\frac{J}{Q^2}$
1	58 393 600	7	1334	25	1,855
2	1 169 200	8	662	30	0,734
3	125 200	9	357	35	0,336
4	26 296	10	206	40	0,171
5	7 945	15	25,3	45	0,094
6	4 781	20	5,8	50	0,055

**Beispiel:** Eine Röhre von 1% Gefälle soll 2 Liter Wasser in der Sekunde führen, wie groß ist ihr Durchmesser zu nehmen? — Hier ist  $J = 1 : 100$  und  $Q = 0,002$ , mithin  $J : Q^2 = 10000 : 4 = 2500$ . Die vorstehende Tabelle zeigt, daß  $d$  zwischen 6 und 7 cm liegt. Es ist  $4781 - 2500 = 2281$  und  $2500 - 1334 = 1166$ . Da  $2281 : 1166$  rund wie 2 : 1, wird der gesuchte Durchmesser rund 6,7 cm betragen müssen.

### § 69.

**Einfluß der Krümmungen.** Zeigt eine Rohrleitung im Längsprofil Senkungen und Hebungen, wie Fig. 161, so wird man auf Grund der Heberwirkung geneigt sein, bei der Rechnung das Gefälle der vom Einfluß bis zur Mündung gezogenen Linie  $AC$  als maßgebend zu betrachten. Die Versuche in Danzig haben indessen ergeben,




Fig. 161.

daß die Rechnung nur dann richtige Resultate liefert, wenn man bloß das Gefälle der Linie  $AB$  als maßgebend für die ganze Leitung annimmt. Dies widerspricht übrigens der Theorie nicht, wenn vorausgesetzt wird, das Rohr enthalte auf der Strecke  $BC$  so viel Luft, daß es nicht voll laufen kann.

*Kurze Krümmungen* oder Kniee vermehren stets den Widerstand in der Rohrleitung und beanspruchen deshalb zu ihrer Überwindung einen Teil der Druckhöhe, den man nach Weisbach findet, wenn man die Geschwindigkeitshöhe mit dem Widerstandskoeffizienten multipliziert.

Der Widerstandskoeffizient  $\zeta$  für ein Knie, dessen Schenkel unter einem Winkel  $\delta$  zusammenstoßen, ist für

$\delta =$	160°	140°	120°	100°	90°	80°
$\zeta =$	0,046	0,139	0,364	0,470	0,984	1,26

Sind die Schenkel durch ein nach einem Kreise vom Radius  $R$  gebogenes Rohr vom Querschnittsradius  $r$  verbunden und ist  $r : R = n$ , ferner  $\beta$  der Mittelpunktswinkel des gekrümmten Teiles in Graden, so ist nach Versuchsergebnissen der Druckhöhenverlust:

$$h = \zeta \frac{\beta}{90} \frac{v^2}{2g},$$

worin für

$n =$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,0
$\zeta =$	0,131	0,138	0,158	0,206	0,294	0,977	1,978

Kurven von 3,12 m Radius haben in der Danziger Leitung keine merklichen Druckverluste ergeben.

### C. Bewegung des Wassers in Flüssen und Kanälen.

#### § 70.

**Allgemeine Erklärungen.** Das Wasser fließt entweder in von der Natur gebildeten *Betten* und bildet *Ströme, Flüsse, Bäche*, oder in künstlichen *Kanälen, Gräben, Rinnen* oder *Gerinnen*.

Bildlich dargestellt wird der Wasserlauf durch Lageplan, Quer- und Längenprofile. Die Querprofile zeigen den Durchschnitt einer senkrecht zur Richtung der mittleren Bahn der Wasserteilchen gestellten lotrechten Ebene mit der Erd- und Wasseroberfläche und gewöhnlich auch mit der wagrechten Ebene (*Horizont*), worauf sich die angegebenen Höhen beziehen. Die Verbindungslinie der tiefsten Stellen aller Querprofile heißt *Sohle*. Denkt man sich durch jeden Punkt der Sohle eine lotrechte Linie, so bildet die Gesamtheit derselben eine abwickelbare Fläche, die man sich in eine Ebene ausgebreitet (abgewickelt) denken kann. Trägt man *Sohle, Wasserspiegel*, die beiden *Uferlinien* und den *Horizont* in die abgewickelte Fläche ein, so hat man ein vollständiges *Längenprofil* des Wasserlaufes. Bisweilen folgt man mit dem Längenprofil

auch den Mitten der *Wasserbreiten*, in denen das Querprofil die Wasseroberfläche schneidet.

### § 71.

**Der Wasserspiegel im Längenprofil** bildet eine geneigte Linie, deren Neigungswinkel gegen den Horizont sein *Abhang* genannt wird. Den lotrechten Abstand zweier Punkte des Wasserspiegel-Längenprofils (die Differenz ihrer Höhen gegen den Horizont) nennt man *absolutes Fallen* (oder Gefälle) für die betreffende Flusstrecke. Dividiert man es durch die Länge derselben, so hat man das *Fallen auf die Längeneinheit*, das *relative Gefälle* (auch Rösche genannt) oder kurz Gefälle.

### § 72.

**Berechnung der Wassermenge.** Die Berechnung der Wassermenge eines durch bildliche Darstellung gegebenen Wasserlaufes ist nur möglich unter Annahmen, die in der Natur niemals ganz erfüllt sind. Indessen




Fig. 162.



Fig. 163.

ist doch die Entwicklung von Formeln notwendig, um auf ihnen mit Hilfe von Beobachtungsergebnissen praktisch brauchbare Regeln aufzubauen.

Es möge also angenommen werden, daß das Wasser sich in einem Bette bewegt, dessen Sohle geradlinig und dessen Querprofil überall dasselbe ist. Die Bewegung aller Wasserteile erfolge mit der gleichförmigen, bei allen gleichen Geschwindigkeit  $v$  in parallelen Bahnen, sodaß Reibung nur da stattfindet, wo Wasser und Bett sich berühren.

Man betrachte im Längenprofil (Fig. 162) einen Wasserkörper  $ABDC$  mit der Länge  $AB = l$ , der von zwei Querprofilen vom Flächeninhalt  $F$  begrenzt wird und von seiner ursprünglichen Lage nach  $BEFD$  gelangt ist. Dabei hat sich die Höhenlage jedes Wasserteilchens um den Betrag  $J$  des Fallens auf die Längeneinheit vermindert. Bezeichnet also  $P$  das Gewicht des ganzen Wasserkörpers, so hat dessen Arbeitsvermögen um  $PJ$  abgenommen. Da die Energie der Bewegung nicht zugenommen hat, ist diese Arbeit zur Überwindung der Reibung am Bett verbraucht, welche entsprechend der Röhrenreibung proportional ist dem Quadrate der Geschwindigkeit  $v$  des Wassers und der Größe der Fläche, in welcher das Bett berührt wird. Bezeichnet  $U$  im Profil (Fig. 163) die Länge des vom Wasser benetzten Umfanges, so ist jene Fläche gleich  $U \cdot l$ . Ferner sei die

Gröfse der widerstehenden Kraft für  $v=U=1$  mit  $a$  bezeichnet, dann ist sie allgemein gleich  $aUv^2$  zu setzen und die von ihr verbrauchte Arbeit  $1 \cdot aUv^2$ , mithin

$$PJ = aUv^2.$$

Bezeichnet  $w$  das Gewicht von 1 cbm Wasser (1000 kg), so ist  $P = wF$ . Dies in die vorige Gleichung eingeführt, liefert

$$wFJ = aUv^2 \text{ oder } v^2 = \frac{w}{a} \frac{F}{U} J.$$

Das Verhältnis  $\frac{F}{U}$ , welches *mittlerer Radius* heifst, sei mit  $R$ , und  $\sqrt{\frac{w}{a}}$  mit  $k$  bezeichnet, dann wird

$$v = k \sqrt{JR}.$$

Diese Formel kann schon deshalb die wirkliche Bewegung des Wassers nicht genau darstellen, weil sie voraussetzt, dafs die Geschwindigkeit an allen Stellen des Wasserquerschnitts dieselbe sei, während die Beobachtung lehrt, dafs sie um so gröfser wird, je weiter man sich vom Bett entfernt. Da man indessen nichts Besseres hat, so benutzt man die Formel, um durch geeignete Wahl des Wertes von  $k$  die Beobachtungen möglichst genau darzustellen. Dabei mufs man unter  $v$  die *mittlere* Wassergeschwindigkeit verstehen, d. h. diejenige Geschwindigkeit, die, wenn sie allen Wasserteilchen gemeinsam wäre, ebensoviel Wasser durch den Querschnitt bringen würde, als in Wirklichkeit durchfliefst. Dies vorausgesetzt, wird man  $k$  aus möglichst vielen Beobachtungen ableiten. In unserer Wasserbautechnik hat lange Zeit der von Eytelwein ermittelte Wert  $k = 50,9$  sich eines grofsen Ansehens zu erfreuen gehabt. Indessen wollten weder die späteren umfangreichen Versuche von Humphreys und Abbot am Mississippi, noch diejenigen, welche Darcy und Bazin mit einem Versuchskanal von rund 690 m Länge, 2 m Breite und 1 m Tiefe, der nach und nach verschiedenartige Wände erhielt, und Gefälle von 1:1000 bis 9:1000, sich in genügender Weise durch ein  $k$  von unveränderlichem Zahlenwert darstellen lassen. Die letztgenannten Versuche zeigten namentlich, dafs  $k$  wesentlich von der Oberflächenbeschaffenheit des Bettes abhängt (von dem „*Rauhigkeitsgrade*“) und bei ganz glatten Wänden viel gröfser ist, als bei Wänden aus Erde oder rauen Steinen. Ferner fand Bazin, dafs man, um die Versuche genügend darzustellen, eine Abhängigkeit zwischen  $k$  und dem mittleren Radius  $R$  annehmen müsse, wie sie die umstehende Tabelle angibt. Die Werte derselben wird man gebrauchen, wenn das Gefälle und der Kanalquerschnitt sich nicht zu sehr von den oben angegebenen Versuchswerten entfernen.

§ 73.

**Werte von  $k$  nach den Versuchen von Bazin für Kanalwände in Erde und solche mit Gerölle für verschiedene Werte von  $R$ .**

$R =$	0,10	0,20	0,30	0,40	0,60	0,80	1,0	2,0	3,0	4,0
für Erde $k =$	16,3	22,2	26,3	29,4	34,0	37,3	39,8	46,9	50,2	52,2
für Geröll $k =$	11,6	16,0	19,1	21,6	25,3	28,0	30,2	36,5	39,7	41,7

§ 74.

**Durch das Suchen nach allgemein anwendbaren Ausdrücken,** welche den gemachten Beobachtungen möglichst genau entsprechende Werte ergeben und deshalb auch für zwischenliegende Fälle Richtiges erhoffen lassen, sind eine große Anzahl von Formeln entstanden, die sich sämtlich gewissen Beobachtungen gut anschließen, in andern Fällen aber abweichende Resultate ergeben. Ein genaueres Eingehen dürfte in einer so kurzen Schrift nur verwirrend wirken, da der Praktiker im gegebenen Falle doch nicht weiß, welchen Resultaten er am meisten Wahrheit beimessen soll. Deshalb möge es genügen, die Formel von Ganguillet und Kutter, die sich den Versuchen von Darcy und Bazin ebenso gut anschließt, als denen am Mississippi, also den kleinsten und den größten Verhältnissen, hier ausführlich zu behandeln. Außer dem allgemeinen Vertrauen, das ihr schon seit Jahren entgegengebracht wird, hat sie noch den großen Vorzug, daß Ingenieur Kutter in Bern nach ihren Ergebnissen umfangreiche Tabellen berechnet hat, aus denen man ohne Mühe für Gräben und Kanäle die Wassermengen, Geschwindigkeiten und Gefälle entnehmen kann. Für die Berechnung der Wassermengen natürlicher Flüsse aus Messungen von Profilen und Gefällen gibt die Formel Resultate, die, wie diejenigen aller übrigen, von den Beobachtungen mehr oder weniger abweichen. Indessen kann das auch nicht anders sein, solange es nicht gelingt, ohne die jetzt üblichen, der Wirklichkeit nicht voll entsprechenden Voraussetzungen die Gesetze der Bewegung des Wassers abzuleiten.

§ 75.

**Die Formel von Ganguillet und Kutter** benutzt als Grundlage den oben abgeleiteten Ausdruck

$$v = k \sqrt{JR},$$

indessen wird  $k$ , wie bei Bazin, als abhängig vom mittleren Radius und außerdem nach den Ergebnissen am Mississippi auch als abhängig vom Gefälle  $J$  angenommen; es wird nämlich gesetzt:



$$k = \frac{23 + \frac{1}{n} + \frac{0,00155}{J}}{1 + \left(23 + \frac{0,00155}{J}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}}$$

Darin drückt der Koeffizient  $n$  den Einfluß der Beschaffenheit des Flußbettes, den sogenannten „*Rauhigkeitsgrad*“ aus. Sein Wert für jeden besonderen Fall ist der Schätzung, gemäß der Anleitung der folgenden Tabelle, überlassen.

Gat- tung	Beschaffenheit des Bettes	$n$	$\frac{1}{n}$
I	Gehobeltes Holz, glatter Zement . . . . .	0,010	100
II	Rohe Bretter . . . . .	0,012	83
III	Behauene Quadern, gute Ziegel . . . . .	0,013	77
IV	Bruchsteine . . . . .	0,017	59
V <sub>1</sub>	Erde, steiniger Boden, wenig Pflanzen (kleine Kanäle) . . . . .	0,025	40
V <sub>2</sub>	Erde mit Pflanzen und Gras, auch felsig mit Steinwürfen (kleine Kanäle) . . . . .	bis	bis
V <sub>3</sub>	Wie in natürlichen Bächen und Flüssen, Weser, Seine etc. . . . .	0,03	33
VI	Gewässer mit Geschieben, vielen Wasserpflanzen, ohne Unterhaltung . . . . .	0,03—0,035	33—29

### § 76.

**Vorteilhaftestes Querprofil.** Bei Anlage eines Kanals, für den das Gefälle und die Wassermenge durch die örtlichen Verhältnisse gegeben sind, wird man sich stets fragen, mit welcher Form des Profils man den Zweck unter Aufwendung der geringsten Mittel erreicht. Da nun zuweilen die Kosten dem Inhalte  $F$  des Querprofils proportional sind, so gehört hierher die Untersuchung, welche Gestalt man dem Querprofil geben muß, damit es beim kleinsten Inhalt die gegebene Wassermenge  $Q$  mit dem vorhandenen Gefälle  $J$  befördert.

Hierbei wird wegen  $Q = Fv$  offenbar  $F$  um so kleiner, je größer  $v$  ist, und da  $v = k\sqrt{JR}$ , wird  $v$  um so größer, je größer der mittlere Radius  $R$  ist.

Demnach erscheint diejenige Gestalt des Profils als die vorteilhafteste, bei der für einen bestimmten Wert der Größe  $F$  des Querschnitts der mittlere Radius den größten Wert erreicht.

Die diesbezüglichen mathematischen Untersuchungen ergeben, daß der Halbkreis, dessen wagrechter Durchmesser in die Wasseroberfläche

fällt, unter allen möglichen Figuren von gleichem Inhalt das größte  $R$  ergibt. Will man aber eckige Formen anwenden, so sind am günstigsten die Hälften regulärer  $n$ -Ecke, bei denen der wagrecht liegende Durchmesser des eingeschriebenen Kreises in die Wasseroberfläche fällt. Für den *rechteckigen Kanal* ist mithin die Tiefe gleich der halben Sohlenbreite zu nehmen u. s. f. Die genannten Formen eignen sich nicht zur Ausführung in Erde. Für diese ist die Trapezform (Fig. 164) üblich. Bezeichnet  $b$  die Sohlenbreite,  $a$  die Wassertiefe und  $\delta$  den Neigungswinkel der Böschung gegen den Horizont, so ist für das vorteilhafteste Querprofil



Fig. 164.

$$a = \sqrt{\frac{F \sin \delta}{2 - \cos \delta}}; \quad b = \frac{F}{a} - a \cot \delta; \quad \frac{a}{b} = \frac{1}{2} \cot \frac{\delta}{2}.$$

Für $\delta =$	90°	60°	45°	36° 52'	33° 41'	30°	26° 34'
ist die Böschung	0,00	0,58	1,00	1,33	1,50	1,73	2,00 fach
und $\frac{a}{b} =$	0,50	0,87	1,21	1,50	1,65	1,87	2,12.

### § 77.

**Beispiel.** Es ist ein Kanal in Erde mit  $1\frac{1}{2}$  facher Böschung anzulegen, der bei einem Gefälle von 1 : 1000 eine Wassermenge von 120 l in der Sekunde befördert. Die Sohlenbreite  $b$  und die Wassertiefe  $a$  sollen bestimmt werden. — Da die Aufgabe verschiedene Lösungen zulässt, wollen wir zuerst diejenige suchen, bei welcher das Querprofil nach § 76 die vorteilhafteste Gestalt hat, oder  $a = 1,65 b$ , dann ist

$$\begin{aligned} F &= a(b + 1,5a) = 1,65b(b + 1,5 \cdot 1,65b) = 5,74b^2, \\ U &= b + 2\sqrt{a^2 + (1,5a)^2} = b + 2\sqrt{(1,65b)^2 + (1,5 \cdot 1,65b)^2} \\ &= b(1 + 1,65\sqrt{13}) = 6,96b. \quad R = \frac{F}{U} = \frac{5,74}{6,96}b = 0,825b. \end{aligned}$$

Bezeichnet nun  $v$  die mittlere Geschwindigkeit des Wassers, so ist

$$\begin{aligned} v &= \frac{Q}{F} = \frac{0,120}{5,74b^2} = k\sqrt{JR} = k\sqrt{0,001 \cdot 0,825b} = 0,0287k\sqrt{b} \\ \text{oder} \quad \frac{1}{b^2\sqrt{b}} &= 1,37k. \end{aligned}$$

Diese Gleichung ist nur durch Probieren zu lösen. Setzt man versuchsweise  $b = 0,25$ , so folgt  $R = 0,825 \times 0,25 = 0,206$ , demnach aus § 73 der Wert  $k = 22,5$ , mithin

$$\frac{1}{b^2\sqrt{b}} = 32 = 1,37 \cdot 22,5 = 30,8.$$

Demnach müsste  $b$  noch etwas größer genommen werden. Der nächste praktisch in Betracht kommende Wert ist 0,26. Dafür wird

$R = 0,825 \times 0,26 = 0,215$ , mithin  $k = 22,9$ , also

$$v = 22,9 \sqrt{0,001 \cdot 0,215} = 0,0229 \sqrt{215} = 0,336 \text{ m.}$$

Ferner ist  $F = 5,74 \cdot (0,26)^2 = 5,74 \cdot 0,0676 = 0,388$ . Demnach die geführte Wassermenge

$$Q = F \cdot v = 0,388 \cdot 0,336 = 0,130.$$

Berechnet man auch für  $b = 0,25$  die Wassermenge, so erhält man  $Q = 0,110$ . Eine praktisch kaum mit Sicherheit inne zu haltende Größe von 1 cm in der Sohlenbreite beeinflusst also die geführte Wassermenge um 20 l in der Sekunde, oder um 1:6 des Betrages von 120 l.

### § 78.

**Die Geschwindigkeit des fließenden Wassers** darf eine von der Beschaffenheit des Bettes abhängige Größe nicht überschreiten, weil sonst der Boden angegriffen und fortgeführt würde. Als höchstens zulässige Werte für die *mittlere* Geschwindigkeit in Betten werden angegeben für Wände aus schlammiger Erde und Töpferton 0,11, für fetten Ton 0,23, festen Flusssand 0,46, kiesigen Boden 0,96, grobsteinigen Boden 1,23, Konglomerat von Schieferstücken 1,86, lagerhafte Gebirgsarten 2,27, harte Felsarten 3,69. Vergl. damit *Sohlen*geschwindigkeiten Teil II, S. 48.

### § 79.

**Ungleichförmige Bewegung des Wassers.** Aus der Formel  $v = k \sqrt{JR}$  läßt sich die Geschwindigkeit des fließenden Wassers berechnen, wenn Querschnitt und Gefälle des Wasserlaufes gegeben sind. Es entsteht aber die Frage, wie man zu rechnen hat, wenn auf der gegebenen Flusstrecke der Querschnitt nicht derselbe bleibt, sondern sich stetig von  $F_1$  in  $F_2$  verändert. Dann ermittle man den mittleren Radius für den ersten und für den letzten Querschnitt und nehme aus beiden das Mittel. Für diesen Wert von  $R$  und das gemessene Gefälle berechne man den zugehörigen Wert von  $v$  aus  $v = k \sqrt{J\bar{R}}$  entsprechend dem mittleren Profil  $(F_1 + F_2) : 2$ , dessen Wert gleich  $F$  gesetzt werden möge. Die Geschwindigkeit im ersten Profile würde dann sein, da durch alle Profile dieselbe Wassermenge fließt,  $v_1 = (F : F_1)v$  und im letzten  $v_2 = (F : F_2)v$ . Ist nun  $v_1 > v_2$ , so hat die Energie der Bewegung auf das kg abgenommen um  $(v_1^2 : 2g) - (v_2^2 : 2g)$ . Diese verschwundene Energie der Bewegung ist nun neben der durch das Fallen  $h$  auf der betrachteten Strecke, deren Länge  $l$  sein möge, ( $J = h : l$ ), verlorenen Energie der Lage zur Überwindung der Widerstände verbraucht. Demnach war es nicht richtig, in der Formel  $v = k \sqrt{JR}$  das Gefälle  $J = h : l$  zu setzen, sondern es muß für  $h$  gesetzt werden  $h + (v_1^2 : 2g) - (v_2^2 : 2g)$ . Mit diesem verbesserten Werte des Gefalles ist nun die Rechnung zu wiederholen, und dann kann angenommen werden, daß  $v$  genau genug die im Mittelprofil  $F$  herrschende

Geschwindigkeit angibt und  $Fv = Q$  die geführte Wassermenge. Zur Kontrolle kann man indessen noch einmal die Werte von  $v$  und  $Q$  unter der Voraussetzung berechnen, daß einmal der erste und dann der zweite Querschnitt auf der ganzen Strecke bestehen bliebe, wobei das verbesserte Gefälle in die Formel eingesetzt wird. Man wird dann die Wassermenge im ersten Falle zu klein, im zweiten zu groß finden, und das Mittel als wahrscheinlichsten Wert annehmen.

Für den Fall, daß  $v_1 < v_2$ , ist eine Zunahme der Energie der Bewegung erfolgt und das gemessene Fallen demnach größer, als dem Arbeitsverbrauch durch die Widerstände entspricht. Demnach muß man die Differenz der  $v_1$  und  $v_2$  entsprechenden Geschwindigkeitshöhen in Abzug bringen, um das verbesserte Fallen zu erhalten. Letzteres ist also ganz allgemein gleich

$$h + ([v_1^2 : 2g] - [v_2^2 : 2g]).$$

### § 80.

**Der Einfluß von Gefällen** über 0,3 bis 0,5 m für das km auf die Größe von  $k$  wird meist wenig in Betracht kommen. Deshalb pflegt man für gewöhnlich  $k$  aus folgender Tabelle nach Kutter und Grebenau zu entnehmen, in der nur seine Abhängigkeit von  $R$  berücksichtigt wird. Überhaupt darf man niemals vergessen, daß, schon wegen der Schätzung des Rauheitsgrades, allen diesen Rechnungen nur ein beschränkter Grad von Genauigkeit zukommt.

Tabelle der Werte von  $k$  in der Formel  $v = k \sqrt{JR}$  nach Kutter und Grebenau.

Mittlerer Radius $R = \frac{F}{U}$ m	Werte von $k$ für die Gattungen des § 75							
	I	II	III	IV	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	VI
0,01	45,5	27,0	23,2	15,2	9,7	7,6	5,6	3,9
0,03	59,0	39,0	33,1	23,6	15,7	12,4	9,4	6,6
0,05	65,1	45,3	39,0	28,6	19,4	15,5	11,8	8,4
0,07	68,8	49,5	43,1	32,1	22,2	17,8	13,7	9,8
0,10	72,5	53,9	47,5	36,1	25,4	20,6	15,9	11,5
0,13	74,7	56,9	50,5	39,0	27,8	22,7	17,7	12,8
0,15	76,3	58,9	52,5	40,9	29,4	24,1	18,9	13,7
0,20	78,8	62,3	56,1	44,4	32,4	26,8	21,1	15,5
0,25	80,4	64,7	58,6	47,0	34,8	28,9	22,9	17,0
0,30	82,0	67,0	61,0	49,5	37,1	31,0	24,7	18,4
0,40	84,0	70,1	64,4	53,0	40,4	34,1	27,5	20,6

(Fortsetzung der Tabelle von S. 415.)

Mittlerer Radius $R = \frac{F}{U}$ m	Werte von $k$ für die Gattungen des § 75							
	I	II	III	IV	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	VI
0,50	85,5	72,4	66,9	55,8	43,2	36,7	29,7	22,5
0,60	86,6	74,2	68,9	58,1	45,5	38,9	31,7	24,1
0,80	88,2	76,8	71,9	61,5	49,0	42,3	34,9	26,8
1,00	89,3	78,7	74,0	64,1	51,8	45,0	37,5	29,1
1,50					56,1	49,4	41,7	32,9
2,00					60,3	53,7	45,9	36,7
3,00					65,0	58,7	50,9	41,5
4,00					68,3	62,1	54,5	45,0
6,00					72,5	66,8	59,5	50,1

## § 81.

**Berechnung des Rückstaues.** Will man natürliche Wasserläufe zum Betriebe von Mühlen, zur Wiesenbewässerung oder dergl. benutzen, so ist man meistens genötigt, durch eine Stauanlage (Wehr oder dergl.) den von Natur gegebenen Wasserspiegel zu heben. Diese Hebung würde sich auch bei ruhendem Wasser von der Stauanlage rückwärts fortpflanzen und der Rückstau (die sogen. *hydrostatische Stauweite*) würde bis dahin reichen, wo der wagrechte neue Wasserspiegel den früheren trifft. Dagegen wird die wirkliche (die *hydraulische Stauweite*) sich weiter erstrecken, nach Funk bis zur  $1\frac{1}{2}$ -fachen hydrostatischen, nach andern bis zur 2-fachen. Indessen sind diese Angaben nicht als hinreichend begründet zu erachten. Ebenso wenig lassen sich Sasses Beobachtungen an Weser und Saale, daß der Rückstau oder die sogenannte *Staukurve* (Längsschnitt der neuen Oberfläche des Wassers) da beginnt, wo im Längenprofil die Horizontale durch die Wehrkrone die Sohle des Oberwassers trifft, auf andere Fälle übertragen.

Um zu besser begründeten Resultaten zu gelangen, wird man alle 50—100 m (ev. auch in kleineren oder größeren Entfernungen) oberhalb der Stauanlage Querprofile des Wasserlaufes aufnehmen und die abzuführende Wassermenge  $Q$ , für welche die Staukurve ermittelt werden soll, bestimmen. Die Querprofile sind auf einen gemeinsamen Horizont zu beziehen, und in dem ersten, das an der Stauanlage liegt, ist die Höhe des gestauten Wasserspiegels anzugeben. Für dieses kann man dann den Flächeninhalt  $F_1$ , den benetzten Umfang  $U_1$ , und daraus den mittleren Radius  $R_1$  bestimmen. Mit Hilfe der Tabelle des § 80 erhält man dann das zugehörige  $k$ . Nun nimmt man vorläufig an, für die erste Strecke

oberhalb der Stauanlage sei der Querschnitt bis zum zweiten Profil gleich  $F_1$ , und berechne das Gefälle  $J_0$ , welches unter diesen Umständen nötig wäre, um die Wassermenge  $Q$  zu fördern. Dazu hat man die Formel von § 72

$$v_1 = \frac{Q}{F_1} = k \sqrt{J_0 R_1}, \text{ worin } R_1 = \frac{F_1}{U_1}$$

oder

$$J_0 = \frac{v_1^2}{k^2 R_1} = \frac{Q^2 U_1}{k^2 F_1^3}.$$

Ist nun  $l_1$  die Länge der Strecke zwischen den beiden ersten Profilen, so wäre die Wasserhöhe  $h$  für das zweite Profil

$$h_2 = h_1 + J_0 l_1.$$

Jetzt kann man ebenso, wie vorhin für das erste, für das zweite Profil  $F_2$ ,  $U_2$  und  $R_2$  ermitteln und daraus das Gefälle  $J_1$ , welches ein Wasserlauf mit dem unveränderlichen Profil  $F_2$  haben müßte, um die Wassermenge  $Q$  zu führen. Nun würde das wirklich zwischen dem ersten und zweiten Profil stattfindende Gefälle zwischen  $J_0$  und  $J_1$  liegen, wenn die beiden Profile  $F_1$  und  $F_2$  gleiche Größe hätten. In der Regel wird aber  $F_1 > F_2$  sein, mithin auch die mittlere Geschwindigkeit  $v_2 = Q : F_2$  des Wassers in  $F_2$  größer sein als diejenige  $v_1 = Q : F_1$  in  $F_1$ . Man würde daher, streng genommen, das ganze Fallen für die erste Strecke um die Differenz der Geschwindigkeitshöhen  $(v_2^2 : 2g) - (v_1^2 : 2g)$  zu vermindern haben. Ist letztere Differenz  $d$ , so wäre also ein besserer Wert für die Höhe des Wassers im zweiten Profil

$$h_2 = h_1 + ([J_1 + J_2] l : 2) - d.$$

Durch Wiederholung der Rechnung für diesen neuen Wert ließe sich derselbe noch verbessern. Indessen ist im allgemeinen für praktische Zwecke eine zu subtile Genauigkeit nicht angezeigt, man wird nur immer so rechnen müssen, daß kein zu kleiner Wert des Rückstaues herauskommt, denn es ist immer zu berücksichtigen, ob die Gestalt des Flußbettes, die man bei Anlage des Wehres vorfand, sich auch wird erhalten lassen. In den meisten Fällen ist es wahrscheinlich, daß der Fluß an den tieferen Stellen vor dem Stau auch von oben kommendes Geschiebe oder Detritus ablagernd wird, wegen der geringeren Wassergeschwindigkeit. Namentlich ist dies zu befürchten, wenn bei Hochwasser der Stau nicht zeitweise aufgehoben und eine gründliche Spülung des Bettes bewirkt werden kann.

Meistens wird man deswegen die Erniedrigung des Gefälles durch Berücksichtigung der abnehmenden Geschwindigkeit ganz vernachlässigen und von Profil zu Profil so weit rechnen, bis der erhaltene Wasserspiegel dem ursprünglichen auf zu vernachlässigende Größen nahe kommt. Übrigens läßt sich die Erniedrigung des Gefälles durch die abnehmende

Geschwindigkeit des Wassers von vornherein in ihrer ganzen GröÙe überschlagen, indem man die Geschwindigkeit im ungestauten Flußprofil mit derjenigen im Profil unmittelbar vor der Stauanlage vergleicht. Danach läßt sich beurteilen, ob es überhaupt nötig erscheint, diese GröÙe zu berücksichtigen.

Die meist sehr umständlichen Rechnungen lassen sich sehr abkürzen, wenn die Begrenzungen der Profile sich nur durch verschieden hohe Wasserstände unterscheiden. Es sind dann die GröÙen  $F$ ,  $U$ ,  $R$  und das zugehörige  $J$  nur von der Wassertiefe abhängig. Man wird sich also für runde Wassertiefen diese GröÙen ausrechnen und sie nach geeignetem Maßstab als Ordinaten, die zugehörigen Wassertiefen als Abscissen auftragen und die erhaltenen Punkte stetig verbinden. Die so entstehenden Kurven geben dann ohne weiteres für jede Wassertiefe die erforderlichen GröÙen.

### § 82.

**Einfluß der Krümmungen.** Natürliche Wasserläufe sind selten auf längere Strecken geradlinig, und die Krümmungen haben eine Tendenz, sich zu vergrößern. Beim Übergange von dem geraden zum krummen Lauf hat nämlich die Wassermasse ein Bestreben, vermöge ihres Beharrungsvermögens in gerader Linie weiter zu fließen. Dadurch entsteht am hohlen Ufer eine größere Wassergeschwindigkeit, welche dies Ufer angreift und durch Fortführung von Stoffen die Krümmung vergrößert. Dagegen wird die Geschwindigkeit am konvexen Ufer vermindert, und es lagern sich hier Sinkstoffe ab, welche das mit schnellerer Bewegung ankommende Wasser mitbrachte. So liegt das eine Ufer im *Abbruch*, während das andere *anlandet*. Auf diese Weise ist die Natur bemüht, dem Flusse eine immer größere Länge zu verschaffen. Dadurch werden Gefälle und Geschwindigkeit so weit vermindert, bis schließlich ein Gleichgewichtszustand eintritt, bei dem das Wasser so langsam fließt, daß es überhaupt sein Bett nicht mehr angreift. — Auch ist es von Interesse, die Erhebung des Wasserspiegels anzudeuten, die durch den Einfluß der Zentrifugalkraft am hohlen Ufer entstehen muß. Nehmen wir beispielsweise an, das Wasser hätte eine Geschwindigkeit  $v = 1$  m und bewege sich in einer kreisbogenförmigen Krümmung vom Radius  $r = 10$  m, dann wäre die wagrechte, senkrecht zur Bahn gerichtete Zentrifugalkraft für 1 kg Wasser gleich  $v^2 : gr$ , oder wenn man die gegebenen Zahlenwerte einsetzt,  $1^2 : 9,81 \cdot 10$ , wofür rund 0,01 gesetzt werden mag. Die Zentrifugalkraft eines Wasserteilchens wäre also gleich 0,01 seiner Schwerkraft. Setzt man nun diese beiden auf alle Wasserteilchen je horizontal und lotrecht wirkenden Kräfte zu einer Resultierenden zusammen, so bildet diese mit dem Lot einen Winkel, dessen Tangente gleich 0,01 ist. Wie wir schon früher

gesehen haben (§ 43), steht der Wasserspiegel stets senkrecht zu den Richtungen der Kräfte, die auf jedes Wasserteilchen einwirken. Demnach muß also die Oberfläche des Wassers um denselben Winkel gegen die wagrechte Richtung geneigt sein. Auf 1 m Länge, in radialer Richtung gemessen, muß also der Wasserspiegel um 0,01 m oder 1 cm ansteigen.

#### D. Wassermessungen in Flüssen und Kanälen.

##### § 83.

**Gefällmessungen.** Aus vorstehendem ist zu ersehen, wie vorsichtig man bei Gefällmessungen verfahren muß, um nicht in grobe Fehler zu verfallen. Jedenfalls ist an allen Krümmungen der Wasserstand an beiden Ufern zu messen. Auch da, wo durch rasche Vergrößerung der Geschwindigkeit ein schnelles Fallen, oder durch die umgekehrten Verhältnisse ein schnelles Steigen des Wasserspiegels erfolgt, hat man die Messungen so auszuführen, daß diese Verhältnisse deutlich hervortreten. Gewöhnlich will man durch Messen des Gefälles die auf Überwindung der Bewegungshindernisse verwendete Arbeit bestimmen. Man darf dann aber niemals vergessen, daß dies nur für solche Strecken richtig ist, bei denen die Geschwindigkeit des Wassers am Ende ebenso groß ist, wie am Anfange. Sonst ist das für Vergrößerung der Energie verbrauchte Gefälle vom gemessenen abzuziehen, oder das durch Verkleinerung derselben gewonnene zuzusetzen, um das für Reibung verbrauchte Gefälle zu erhalten. Siehe auch § 79.

##### § 84.

**Schwimmer.** Will man durch Beobachtung die Geschwindigkeit des fließenden Wassers bestimmen, so besteht die einfachste Methode darin, daß man durch einen schwimmenden Körper die Bewegung des Wassers sichtbar macht. Als Schwimmer benutzt man ein Stück weißes Holz, eine Glasflasche, die so weit mit Wasser gefüllt ist, daß der weiße Stopfen nur so viel aus dem Wasser hervorragt, als zur Sichtbarkeit nötig ist, eine in entsprechender Weise beschwerte hohle Messingkugel u. dergl. m. Je weniger der Schwimmer aus dem Wasser hervorsteht, desto weniger wird seine Bewegung durch den Widerstand oder Strömungen der Luft beeinflusst.

Zur Beobachtung wählt man einen windstillen Tag, damit Wasseroberfläche und Schwimmer in ihren Bewegungen durch den Wind nicht gestört werden, und womöglich eine gerade Flußstrecke, in der das Wasser sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegt. Am Ufer wird eine Länge von etwa 50 bis 100 m durch je zwei Fluchtstäbe mit einer



Visierlinie senkrecht zur Flußrichtung bezeichnet. Man setzt nun den Schwimmer so weit oberhalb der durch die beiden ersten Fluchtstäbe bestimmten Linie in das Wasser, daß er beim Passieren derselben die Geschwindigkeit des Wassers angenommen hat. Mit einer Sekunden zeigenden Uhr stellt man nun die Zeiten fest, in denen die Linien der Fluchtstäbe passiert werden. Die Differenz ergibt die Zeit, welche der Schwimmer gebrauchte, um die abgesteckte Strecke zu durchlaufen. Die Strecke selbst, geteilt durch die beobachtete Zeit, liefert dann den Weg in der Zeiteinheit oder die gesuchte Geschwindigkeit des Wassers. War die Strecke z. B. 100 m lang und betrug die Zeit zum Durchlaufen derselben 250 Sekunden, so ist die gesuchte Geschwindigkeit gleich  $100 : 250 = 0,4$  m. Gewöhnlich wird auf diese Weise nur die Geschwindigkeit im *Stromstrich* bestimmt, d. i. diejenige Stelle der Oberfläche, welche die größte Geschwindigkeit zeigt. Macht man nämlich den Versuch an andern Stellen, so gelingt es selten, den Schwimmer während seiner ganzen Bewegung in gleicher Entfernung vom Ufer zu halten.



Fig. 165.

Verbindet man nach Fig. 165 mit einem Schwimmer einen andern von gleicher Größe und Gestalt durch einen feinen Draht und beobachtet die Bewegung dieses Systems wie beim einfachen Schwimmer, so erhält man eine Geschwindigkeit  $v_1$ , welche das Mittel ist aus der Geschwindigkeit  $v$  des Wassers an der Oberfläche und derjenigen  $x$  in der Tiefe des zweiten Schwimmers. Man hat also

$$v_1 = \frac{v + x}{2}, \text{ woraus } x = 2v_1 - v.$$

Durch Beobachtung von  $v$  und  $v_1$  läßt sich also die Geschwindigkeit  $x$  in einer bestimmten Tiefe ermitteln. Cabeto gab dem Schwimmer die Gestalt eines Stabes, der dadurch, daß er unten beschwert war, eine aufrechte Stellung behielt. Durch Beobachtung desselben wird die mittlere Geschwindigkeit in der vom Schwimmer durchlaufenen senkrechten Ebene erhalten.

### § 85.

**Pitot'sche Röhre.** Bringt man nach Pitot eine gebogene Glasröhre  $ABC$  (Fig. 166) so in fließendes Wasser, daß  $BC$  genau gegen den Strom gerichtet ist und  $AB$  lotrecht steht, dann wird der Wasserspiegel in der Röhre um ein Stück  $h$  höher stehen, als derjenige, welcher die Röhre umgibt.  $h$  wird um so größer, je größer die Geschwindigkeit  $v$  des Wasserstromes ist. Mithin wird man aus der beobachteten Größe von  $h$  auf die Größe von  $v$  einen Schluß ziehen können, wenn man weiß, wie diese beiden Größen zusammenhängen. — Denkt man sich die Röhre

in ruhendes Wasser getaucht und ihr von oben her so viel Wasser zugeführt, daß der Spiegel des Wassers in der Röhre um  $h$  über dem äußeren Spiegel steht und das Wasser durch eine sehr kleine Öffnung bei  $C$  abfließt, dann ist die Ausflusgeschwindigkeit, wenn von Widerständen abgesehen wird, nach § 53 gleich  $\sqrt{2gh}$ . Denkt man sich nun das Wasser gegen die Röhre in der Richtung  $CB$  fließend, so wird es dadurch ein Bestreben erhalten, in die Röhre einzutreten. Das Gleichgewicht tritt nun ein, wenn das Bestreben einzutreten ebenso groß ist, als das Bestreben auszufließen. Daraus erhellt die Beziehung

$$v = \sqrt{2gh}.$$

Die Benutzung der Pitot'schen Röhre in strömendem Wasser, dessen Geschwindigkeit bekannt war, hat ergeben, daß bei zweckmäßiger Konstruktion der Unterschied zwischen Theorie und Wirklichkeit nur wenige Prozent beträgt. Für jede bestimmte Röhre wäre also durch Versuche,




Fig. 166. Pitot'sche Röhre.



Fig. 167. Darcys Röhre.

ähnlich denen im nächsten Paragraphen, ein Wert  $x$ , der nahe gleich 1 ist, zu ermitteln, sodaß die wirkliche Geschwindigkeit

$$v = x\sqrt{2gh} \text{ oder einfacher, wenn } x\sqrt{2g} = k \text{ gesetzt wird, } v = k\sqrt{h}.$$

Für 1 m Geschwindigkeit ergibt sich, wenn  $x = 1$  angenommen wird,  $h = 51$  mm. Demnach würde man bei 0,1 m Geschwindigkeit den hundertsten Teil dieses Wertes erhalten oder 0,51 mm. Daraus ist ersichtlich, wie namentlich für kleine Geschwindigkeiten eine genaue Messung

des Niveauunterschiedes nötig erscheint. Da man nun bei der beschriebenen ursprünglichen Einrichtung  $h$  wegen der Nähe des Wasserspiegels nicht genau messen kann, so verbesserte Reichenbach die Röhre dadurch, daß er, wie in der Figur punktiert, eine zweite Röhre mit einer *seitlichen* Öffnung anbrachte, in der sich der Wasserspiegel mit dem äußeren gleich einstellte. Während nun in dieser Weise die Röhre im Wasser stand, konnte man durch Drehung eines durch beide Röhren gehenden Hahnes das Wasser in den Röhren absperren, die Röhren aus dem Wasser nehmen und bequem ablesen. Ein weiterer Vorteil der Anwendung von zwei Röhren wird dadurch erzielt, daß man beide Röhren von genau gleicher Weite nimmt. Denn in einer Röhre wird der Wasserspiegel immer durch die Haarröhrchenkraft etwas gehoben. Wenn diese Hebung aber in den beiden Röhren in gleicher Weise stattfindet, so entsteht dadurch kein Fehler, weil es nur auf die Differenz der Wasserstände ankommt.

Eine Röhre mit den Verbesserungen Darcys, wie sie für die Landwirtschaftliche Akademie Bonn-Poppelsdorf aus Paris bezogen wurde, zeigt Fig. 167 in etwa 1:4,5 natürl. Größe. Die Röhre findet ihren Halt an einem hohlen Eisenstab (Gasrohr), der mit einer Spitze in den Boden des Flußbettes so weit eindringt, als eine unten befestigte Eisenscheibe gestattet. Die obere sehr feine Mündung  $m$  nimmt das Wasser auf. Ein längeres, enges, dunkel gezeichnetes Röhrchen bringt es dann bis an die Bohrung des Hahnes, die es weiter durch ein Gummistück dem Glasrohr  $n$  zuführt. Neben letzterem steht ein ebenso weites Glasrohr  $o$ , dem das Wasser in gleicher Weise von der nach unten gerichteten Öffnung  $s$  zugebracht wird. Die Zuführungsröhrchen sind absichtlich so eng gewählt, damit die Schwankungen des Wasserspiegels sich nicht bis in die Glasröhren fortpflanzen.

Hält man das Rohr so im fließenden Wasser, daß die Röhre  $m$  gegen den Strom gerichtet ist, so steigt das Wasser in kurzer Zeit in der Glasröhre  $n$  zu einem Niveau auf, das um eine von der Geschwindigkeit des Wassers abhängige Größe höher liegt als der äußere Wasserspiegel, bis zu dessen Höhe sich das Wasser in der Glasröhre  $o$  einstellt. Schließt man jetzt durch einen Zug an der entsprechenden Schnur den Hahn  $h$ , so kann man das Instrument aus dem Wasser nehmen, um darauf den Unterschied der beiden Wassersäulen festzustellen. Nun besteht Darcys Verbesserung darin, daß er die beiden Röhren oben verband, bei  $e$ , und hier einen durch den Hahn  $z$  verschließbaren Gummischlauch ansetzte, durch den man Luft absaugen kann. Tut man dies, so steigen die Wasserspiegel in den Glasröhren in eine zum Ablesen bequeme Höhe. Jetzt kann man in aller Ruhe, während das Instrument im Wasser steht, mit Hilfe der zwischenliegenden Skala mit Nonien ablesen, und es ist leicht ersichtlich, daß die Differenz der Höhen, auf die es ankommt, sich

durch das Aufsaugen nicht ändert. — Die obere Verbindung der Röhren entspricht nicht mehr dem Pariser Modell, sondern ist nach des Verfassers eigener Idee so verändert, daß man den ganzen Luftraum über den Wasserspiegeln mit einer Flüssigkeit füllen (und oben durch einen Pfropfen abschließen) kann, die leichter ist als Wasser, z. B. Petroleum. Dadurch erreicht man für geringe Geschwindigkeiten des Wassers, daß die Höhenunterschiede der Wasserspiegel erheblich größer werden. Bei Anwendung von Petroleum werden sie etwa 10 mal so groß, wie sonst. Sie werden in demselben Maße größer, als das spezifische Gewicht der Hilfsflüssigkeit sich dem des Wassers nähert.

### § 86.

**Der Woltmann'sche Flügel** (Fig. 168, nach einer Ausführung von Amsler in Schaffhausen) gilt als ein besonders geeignetes Instrument zur Bestimmung der Geschwindigkeit des fließenden Wassers. Er besteht aus einer sehr leicht drehbar gelagerten Achse  $a$ , die zwei Flügel von schraubenförmiger Gestalt trägt, bei denen die Tangente an die äußere Windung  $c$  unter einem Winkel von  $45^{\circ}$  gegen die Achse geneigt ist.

Der die Achse  $a$  tragende Bügel ist mit einem Hohlzylinder verbunden, welcher durch zwei Druckschrauben  $e$  an einer hohlen eisernen Stange (Gasrohr) in beliebiger Höhe befestigt werden kann. Die eiserne Stange steckt man in die Sohle des Wasserlaufs so ein, daß die Achse gegen die Strömung des Wassers gerichtet ist. Durch den Druck des Wassers werden dann die Flügel in Drehung versetzt, und die Anzahl der Umdrehungen, die sie in einer Minute machen, wird mit der Geschwindigkeit des Wassers größer. Wenn man also eine Einrichtung anbringt, die es ermöglicht, die Umdrehungen zu zählen, so würde damit der Flügel brauchbar werden, um die Geschwindigkeit des Wassers zu messen.

Auf der Achse befindet sich bei  $s$  ein Schraubengewinde, das in ein darunter liegendes Rädchen mit 100 dreieckigen Zähnen eingreifen kann, wenn der gabelförmige Hebel, dessen Drehpunkt bei  $w$  liegt und der die Achse des Zahnrades trägt, etwas gehoben wird. Auf der Achse des Zahnrades mit 100 Zähnen befindet sich ein zweites mit nur 10 Zähnen, das ein anderes, in demselben Hebel gelagertes Rädchen mit 100 Zähnen dreht. Geht die Achse des Flügelrades einmal herum, so geht das erste Zahnrad, wenn es zum Eingriff gebracht ist, um 1 Zahn weiter, was man an einem am Hebel befestigten Zeiger beobachten kann. 100 Flügel-drehungen drehen das erste Zahnrad einmal und das zweite um 0,1 seines Umfangs. Hat man nun beispielsweise die Zeiger der beiden Zahnräder auf die Zähne 0 eingestellt und beobachtet nach 5 Minuten, daß der Zeiger

des letzten Rades zwischen 5 und 6 steht, der des ersten auf 24, so ist die Zahl der Umdrehungen 524, mithin in der Minute  $524 : 5 = 104,8$ .

Es wäre jetzt noch zu zeigen, wie das Ein- und Ausrücken der Zahnräder erfolgt. Bei *v* sitzt, durch einen Stift gehalten, eine Spiralfeder, die dem Hebel stets das Bestreben gibt, sich nach oben zu bewegen. Verhindert wird die Bewegung durch ein Röllchen *w* am Ende des Hebels, das sich an einen sternförmigen drehbaren Messingkörper legt. Über diesem liegt ein zweiter Hebel, der durch Ziehen an der Öse *n* oder einer in




Fig. 168. Woltmann'scher Flügel.

derselben befestigten Schnur gehoben werden kann, worauf ihn der Druck einer in der Nähe seines Drehpunktes drückenden Spiralfeder zurückbringt. Wird der Hebel gehoben, so nimmt er bei *m* an ihm drehbar befestigte Sperrhaken mit, die den Stern um eine Teilung verstellen. Dann kann sich das Röllchen am Ende des die Zahnräder tragenden Hebels ein Stück aufwärts bewegen, bis das Eingreifen der Zahnräder in die Schraube erfolgt. Zieht man nun noch einmal an der Öse *n*, so ziehen die Sperrkegel den Stern wieder weiter in eine seiner ersten entsprechende Lage, das Röllchen *w* wird wieder heruntergedrückt, das Zahnrad kommt außer Berührung mit der Schraube *s* und eine Hakenfeder *x* faßt zwischen die Zähne

und verhindert die weitere Drehung. Die Schnur, durch welche der Ausrückhebel gezogen wird, ist in der Figur nicht an der Öse  $n$  gedacht, sondern, um seine Berührung mit dem strömenden Wasser zu vermeiden, durch den hohlen Eisenstab geführt und um einen Stift geschlungen, der sich im gegabelten Ende des Ausrückhebels befindet und durch schlitzförmige Öffnungen durch das Innere des Rohres geht.

Der Gang der Beobachtungen ist folgender. Man rückt den Eingriff aus und stellt die Zahnräder so, daß die Zeiger auf Null zeigen. Nun bringt man den Flügel in gehöriger Richtung (§ 87 b) gegen das strömende Wasser, dessen Geschwindigkeit man bestimmen will. Nachdem der Flügel einige Minuten leer gelaufen und seine größte Geschwindigkeit erreicht hat, sieht man nach einer Sekunden zeigenden Uhr und rückt durch einen Zug an der Schnur ein, wenn der Sekundenzeiger über 60 geht; dann läßt man etwa 5 Minuten eingerückt, rückt durch einen zweiten Zug an der Schnur aus, nimmt den Flügel aus dem Wasser, liest die Zahl der Umdrehungen ab und berechnet deren Anzahl auf die Minute oder Sekunde.

Der Zusammenhang zwischen der Zahl der Flügeldrehungen und der Geschwindigkeit ist durch Beobachtung zu bestimmen. Dazu gibt es zwei Wege. Erstens kann man den Flügel in fließendes Wasser bringen, dessen Geschwindigkeit man auf andere Weise, z. B. durch Schwimmer, bestimmt hat. Zweitens kann man ruhendes Wasser benutzen, indem man den Flügel gegen das Wasser bewegt. Man verbindet dabei zwei Kähne durch eine Brücke aus Brettern. Vorn an dieser Brücke, zwischen den beiden Nachen, wird die Stange des Flügels so befestigt, daß die Achse wagrecht im Wasser liegt, und dann der ganze Apparat durch ein Seil vom Ufer aus in der geraden Richtung der Achse mit gleichmäßiger Geschwindigkeit vorwärts gezogen. Am Ufer werden in einiger Entfernung vom Ausgangspunkte zwei Fluchtstäbe aufgestellt, deren Verbindungslinie senkrecht zur Fahrrichtung steht. Etwa 50 bis 100 m weiter wird eine zu der ersten parallele Linie durch Stäbe in gleicher Weise bezeichnet. Läßt man nun die Nachen vom Ausgangspunkte ziehen, so setzt sich der Flügel gerade so in Bewegung, als ob das Wasser gegen ihn strömte. Sobald der Beobachter die Linie der ersten Fluchtstäbe passiert, rückt er das Zählwerk ein und sieht nach der Uhr. Beim Passieren der Linie der zweiten Fluchtstäbe wird das Zählwerk ausgerückt und wieder die Zeit notiert. Ist nun  $u$  die Anzahl der Flügeldrehungen,  $t$  die zwischen dem Passieren der beiden Marken verflossene Zeit und  $l$  ihre Entfernung, so war die Geschwindigkeit  $v$  der Bewegung  $v = l : t$  und die Zahl  $n$  der Flügeldrehungen in der Zeiteinheit (Minute oder Sekunde) ist  $n = u : t$ . Nach der ersten und zweiten Methode sucht man möglichst viele zusammengehörige Werte der Wassergeschwindigkeit  $v$  und der Anzahl der Flügeldrehungen auf die Zeiteinheit zu ermitteln. Die zusammengehörigen Werte

von  $n$  und  $v$  trägt man sich (z. B. auf Millimeterpapier) als Abscissen und Ordinaten auf und legt durch deren Endpunkte eine stetige Linie. In der Regel wird diese als eine Gerade anzusprechen sein von der Gleichung

$$v = a + bn,$$

in der  $a$  und  $b$  zwei konstante Größen sind, deren Werte man mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate möglichst genau aus den Beobachtungen ableiten kann, wenn man sich nicht mit der graphischen Darstellung, als einfacher und hinreichend genau, begnügen will. Die vorstehende Formel ist die einfachste und meistens ausreichend, doch haben verschiedene Beobachter für ihre Flügel besondere Formeln aufgestellt, die sich den Beobachtungen besser anschließen sollen. Amaler gibt für den Flügel der Fig. 168 die Formel, in der  $n$  sich auf die Sekunde bezieht:

$$v = 0,011 + 0,2239 n;$$

hierin wird für  $n = 0$  die Geschwindigkeit  $v = 0,011$ , d. h. derjenigen gleich, bei welcher Reibungswiderstände die Flügeldrehung verhindern.<sup>1)</sup>

Anstatt den Flügel fest mit der Stange zu verbinden, kann man denselben auch auf einem unterhalb des Flügels an der Stange befestigten Ringe ruhen lassen. Es wird dann bei  $z$  das Steuerruder  $st$  (Fig. 168) am Flügel befestigt und die Schnur an der Öse  $n$ , auch der durch die Stange gehende Stift entfernt, sodaß der Flügel sich nach Art einer Windfahne in die Stromesrichtung einstellen kann. Bei tiefen Gewässern wird der Flügel durch ein Drahtseil getragen, das unten durch ein schweres Gewicht belastet wird. Dabei ist es zweckmäßig, damit man den Flügel nicht immer aus dem Wasser zu nehmen braucht, ihn mit einer elektrischen Einrichtung zu versehen, die jedesmal ein Glockenzeichen gibt, wenn der Flügel 100 Umdrehungen gemacht hat. Es gibt noch eine ganze Reihe von Instrumenten für Geschwindigkeitsmessungen, die aber wenig gebraucht werden. Näheres darüber findet man in Rühlmanns Hydromechanik.

### § 87.

#### **Bestimmung der Wassermenge aus Profilaufnahmen und Geschwindigkeitsmessungen.**

a) *Profilmessungen* sind hinsichtlich ihrer Ausführung wesentlich von Breite, Tiefe und Strömungsgeschwindigkeit des Wassers abhängig. Bei Bächen ist man leicht in der Lage, eine vorhandene Brücke zu benutzen oder eine solche aus Balken und Brettern herzustellen. Die Brücke wird dann nach Fig. 169a durch Kreidestriche mit einer Einteilung (z. B. in ganze m) versehen und am Ufer ein Nivellierinstrument so aufgestellt, daß sein Fernrohr das ganze Profil überblickt. An den bezeichneten Punkten läßt man die Nivellierlatten aufhalten und notiert jedesmal die Ablesung.

<sup>1)</sup> Die Technische Hochschule zu München hat Einrichtungen getroffen, Woltmann'sche Flügel gegen mäßige Gebühr sehr sorgfältig zu untersuchen.

Danach kann man das Profil so auftragen, wie es die Figur zeigt, und aus den eingemessenen Punkten, deren gerade Verbindungslinien sich hinreichend genau an die wirkliche Gestaltung des Bettes anschließen müssen, und der Lage des Wasserspiegels ist der Inhalt  $F$  des Wasserprofils zu ermitteln. Die Messungen lassen sich auch ohne Nivellierinstrument mit einer geteilten Stange, die unten gewöhnlich mit einem Brettchen versehen ist, damit sie nicht in den Schlamm dringt, der *Peil-* oder *Sondierstange*, ausführen, indem man die Tiefen bis zum Wasserspiegel mißt.

b) *Die Geschwindigkeitsmessungen* werden sodann in den einzelnen Vertikalen (Fig. 169a) 1b, 2c u. s. w. in möglichst vielen Punkten ausgeführt, indem man jede in eine Anzahl, gewöhnlich gleicher, Teile geteilt denkt (z. B. dm). Macht man die Messungen etwa mit dem Woltmann'schen Flügel (§ 86), so hat man die Achse des Instruments genau horizontal und senkrecht zur Richtung des Profils an die bestimmten Punkte zu bringen. Es würde ein Fehler sein, den Flügel mit Steuerruder zu ge-




Fig. 169.

brauchen, denn dann würde an Stellen, wo die Strömung nicht genau senkrecht zum Profil ist, der Flügel sich dem entsprechend einstellen, und man statt der Geschwindigkeitskomponente senkrecht zum Profil, die man haben will, die Strömungsgeschwindigkeit an sich erhalten. Die beobachteten Geschwindigkeiten müssen stets durch doppelte Messung geprüft werden, weil sich leicht ein nicht sichtbares Fädchen oder dergl. im Wasser Schwimmendes an die Flügel hängt und die Resultate unbrauchbar macht. Auch eine sichere Marke zur Bezeichnung des veränderlichen Wasserspiegels darf man nicht vergessen und muß danach den Stand bei jeder Messung notieren. Die in den einzelnen Vertikalen erhaltenen Resultate trägt man auf, wie Fig. 169b für die Vertikale 2c zeigt, und verbindet die Endpunkte der Geschwindigkeiten durch eine stetige Linie. So erhält man in der schraffierten Figur einen Querschnitt desjenigen Wasserkörpers, der in einer Sekunde durch das gemessene Profil fließt. Aus den einzelnen Profilen berechnet man den Inhalt dieses Wasserkörpers nach bekannten Methoden und hat damit die in einer Sekunde durch das Profil fließende Wassermenge. — Steht bei breiteren Gewässern zu den Messungen keine





Brücke zur Verfügung, so ist ein Seil über den Fluß zu spannen, an dem durch rote Bändchen eine Einteilung für die einzelnen aufzunehmenden Profilpunkte gemacht ist. Die Messungen geschehen von zwei durch eine Brücke verbundenen Kähnen aus, die durch einen Anker gehalten werden. Bei noch größeren Verhältnissen fällt auch die Bezeichnung des Profils




Fig. 171.

durch ein Seil fort, und die Stellen der Messungen werden vom Ufer aus durch Mefstisch oder Theodolit bestimmt.




Fig. 172.

c) Die Messung der Geschwindigkeit des Wassers allein im Stromstrich durch einen Schwimmer wird auch oft zur schätzungsweisen Messung der Wassermenge benutzt, indem man nach Bazin annimmt, daß das Verhältnis der mittleren Geschwindigkeit zu derjenigen im Stromstrich für verschiedene Werte des mittleren Radius  $R$  und die verschiedenen Rauigkeitsklassen des § 75 durch die folgenden Zahlen gegeben ist.

$R = 0,10$	0,20	0,40	0,70	1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	6,00
I	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
II	0,80	0,82	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84
IV	0,71	0,76	0,78	0,80	0,81	0,81	0,81	0,82	0,82
$V_1$	0,54	0,61	0,68	0,72	0,74	0,76	0,77	0,78	0,79
VI	0,45	0,53	0,61	0,66	0,68	0,71	0,72	0,74	0,76

Ist also z. B. in einem Kanal aus Erde die Geschwindigkeit im Stromstrich zu 0,4 m gefunden, der Profilhinhalt 2 qm und  $R = 1,25$ , so ergibt die Tabelle die mittlere Geschwindigkeit für Klasse  $V_1$  zu  $0,75 \cdot 0,4 = 0,3$ . Die geführte Wassermenge ist also  $2 \cdot 0,3 = 0,6$  cbm.

d) Einen vorzüglichen Überblick über die Resultate von Geschwindigkeitsmessungen gibt die Fig. 170 auf S. 428, welche der „Bewegung des Wassers in natürlichen Wasserläufen“ von W. Plenkner entnommen ist. Die obere Figur stellt das Flußprofil in seiner wirklichen Gestalt dar, darunter steht dasselbe verzerrt durch den größeren Höhenmaßstab. In letzterem Profil sind alle Punkte verbunden, deren Geschwindigkeiten je 1,35, 1,30, 1,25 u. s. w. bis 0,05 m betragen, wodurch Kurven gleicher Geschwindigkeit entstehen. Ferner sind die Stellen der größten Geschwindigkeiten in allen Vertikalen verbunden, woraus man sieht, daß überall die größte Geschwindigkeit etwas unter dem Wasserspiegel liegt. Außerdem geben die Verbindungslinien aller Punkte, die je der mittleren Geschwindigkeit in jeder Vertikalen und im ganzen Profil entsprechen, zu interessanten Vergleichen Veranlassung. Auch sind noch vom Wasserspiegel aus als Ordinaten aufgetragen und durch die entsprechend bezeichneten Kurven verbunden: die Größen der Oberflächengeschwindigkeit an den betreffenden Stellen, sowie die der mittleren Geschwindigkeit in jeder Vertikalen. Sehr interessant sind auch die nach den Vertikalen 5 (Fig. 171) und 6 (Fig. 172) genommenen Querschnitte des sich in einer Sekunde durch das Profil bewegenden Wasserkörpers.

### § 88.

**Schätzungen der Wassermengen aus der Größe des Gebietes,** von dem das Wasser zufließt, sind sehr unsicher. In Deutschland rechnet man auf das qkm Niederschlagsgebiet eines Wasserlaufes bei größtem Hochwasser in Gebirgen 400 bis 800, in bergiger Gegend 200 bis 500, im Hügelland 120 bis 250, in flacher Gegend 60 bis 140 Liter; doch wurden in Gebieten von 200 qkm (Pliesnitz) bei Wolkenbrüchen Abflussmengen bis 6,7 cbm auf das qkm beobachtet. Das niedrigste Wasser ist im Gebirge nur etwa 1:300 bis 1:150 des Hochwassers, und das Verhältnis steigt, bis es im Flachlande etwa 1:30 erreicht. Michaelis fand für die Emscher in der Zeit von November bis April eine mittlere Abflussmenge von 13,8 l und für April bis November 4,7 l auf das qkm.

### Literatur zum III. Abschnitt.

- Bazin, H., *Experiences nouvelles sur l'écoulement en déversoir*. Paris, Vve Dunod.
- Breme, H., 182 Tafeln zur graphischen Berechnung der Wassermengen und zur Bestimmung der Profilabmessungen der Wasserläufe nach der Formel von Ganguillet und Kutter. Freiburg i. d. Schweiz 1889.
- Duhamel, *Lehrbuch der analytischen Mechanik*. 2. Aufl. Leipzig 1861.
- Grashof, F., *Theoretische Maschinenlehre*. I. Band: Hydraulik. Leipzig 1873.
- Patt, G., *Wiesenbaumeister, Tabellen zur Ermittlung der Wassergeschwindigkeiten und der Wassermengen etc. für regelmässige und unregelmässige Grabenprofile*. Kassel 1902, Selbstverlag des Herausgebers.
- Plenkner, W., *Bewegung des Wassers in natürlichen Wasserläufen*. Leipzig 1879.
- Ritter, August, *Lehrbuch der technischen Mechanik*. 5. Aufl. Leipzig 1884.
- Rühlmann, Dr. Moritz, *Hydromechanik*. 2. Aufl. Hannover 1880.
- Schümgel, A., *Tafeln zur graphischen Ermittlung der Wassergeschwindigkeit für trapezförmige Flufs- und Grabenprofile*. Hannover 1900.
- Weisbach, *Ingenieur- und Maschinenmechanik*. Braunschweig 1880.
- Siehe auch Literatur zum IV. Abschnitt, Teil II, S. 213.
-



# Sachregister.

- Abhang** 409.  
**Abkürzungen u. Zeichen, Erklärung der botanischen** 173.  
**Absolute Festigkeit** 379.  
**Absolutes Fallen** 409.  
**Absorptionsvermögen** 148.  
**Achat** 26, 28.  
**Achillea Millefolium** 225, 247.  
   — *Ptarmica* 225.  
**Achyrophorus maculatus** 228.  
**Ackerboden** 3.  
**Ackerkrume** 3.  
**Acorus Calamus** 181.  
**Adonis aestivalis** 338, 339.  
   — *flammeus* 338, 339.  
   — *vernalis* 338.  
**Aegopodium Podagraria** 205, 208.  
**Aethusa Cynapium** 205, 208.  
**Agrostaeae** 260, 271.  
**Agrostemma Githago** 193.  
**Agrostis** 265.  
   — *alba* 249, 274.  
   — *canina* 249, 274.  
   — *spica venti* 275.  
   — *stolonifera* 246, 274.  
   — *vulgaris* 246, 275.  
**Ahl** 55.  
**Ährchen, einblütig** 264.  
   — *Gras-* 252.  
   — *zwei bis vielblütig* 265.  
**Ährengräser** 261, 262, 297, 300.  
**Ähren, Schein-** 252.  
**Aira** 249, 265.  
   — *caespitosa* 281.  
   — *canescens* 281.  
   — *flexuosa* 281.  
**Ajuga Chamaepitys** 339.  
   — *genevensis* 215.  
   — *reptans* 215.  
**Alant** 224.  
**Albersia blitum** 192.  
**Albit** 29, 30, 33, 34, 36.  
**Alchemilla arvensis** 339.  
   — *vulgaris* 200.  
**Alectorolophus hirsutus** 218.  
   — *major* 218.  
   — *minor* 218.  
**Algae** 169, 170.  
**Algebraische Summe der Kräfte** 370, 372.  
**Algen** 169, 170.  
**Algierphosphat** 42.  
**Alismaceae** 175, 178.  
**Alisma Plantago** 178.  
**Allium** 184.  
   — *fallax* 338.  
   — *sphaerocephalum* 339.  
**Alluvialboden** 107.  
**Alluvium** 8.  
**Alm** 58.  
**Alopecurus** 263.  
   — *agrestis* 272.  
   — *arundinaceus* 272, 339.  
   — *fulvus* 272.  
   — *geniculatus* 272.  
   — *nigricans* 272.  
   — *pratensis* 246, 271.  
**Alsine viscosa** 339.  
**Alsinoideae** 193.  
**Altalluvium** 8.  
**Althaea officinalis** 340.  
**Alyssum saxatile** 338.  
**Amarantaceae** 187, 192, 338, 339.  
**Amarant, rauhaariger** 192.  
**Amarantus retroflexus** 192.  
**Amethyst** 26.  
**Ammonium** 19.  
**Ammoniumkarbonat** 38.  
**Ammophila** 263.  
   — *arenaria* 276.  
   — *arundinacea* 276.  
**Amphibol s. Hornblende.**  
**Anabaena flos aquae** 182.  
**Anacamptis pyramidalis** 186, 338.  
**Analcim** 30, 32, 33, 35, 36, 74.  
**Analyse, chemische** 10.  
   — *mechanische* 121.  
**Andromeda** 100.  
**Andropogoneae** 259, 266.  
**Andropogon Sorghum** 266.  
**Anemone nemorosa** 339.  
   — *ranunculoides* 339.  
   — *silvestris* 338.  
**Anfangsgeschwindigkeit** 359.  
**Angelica** 206.  
   — *silvestris* 209.  
**Angiospermae** 169, 173.  
**Anhydrid** 44.  
**Anmoorige Böden** 157.  
**Anorthit** 30, 33, 34, 36.  
**Antennaria dioica** 224.  
   — *uliginosa* 224.  
**Anthemis arvensis** 225.  
   — *tinctoria* 339.  
**Anthoxanthum** 263.  
   — *aristatum Puelii* 269.  
   — *odoratum* 246, 269.  
**Anthriscus** 206.  
   — *silvestris* 207.  
**Anthyllis vulneraria** 328, 339.  
**Antirrhinum Orontium** 216, 339.  
**Äolische Bildungen** 8.  
**Apargia hispida** 229.  
**Apatit** 41.  
**Apera** 265.  
   — *spica venti* 275.  
**Apetalae** 187.  
**Aphanizomenon flos aquae** 182.  
**Apium graveolens** 340.  
**Apokrensäure** 86.  
**Arabis arenosa** 197.  
   — *hirsuta* 197.  
   — *petraea* 338.  
**Araceae** 175, 181.  
**Arbeit, mechanische** 362.  
**Arboretum** 94.  
**Archaische Periode** 6.

- Archangelica 205.  
 — officinalis 209.  
 Archegoniatae 169, 170.  
 Archichlamydeae 187, 189.  
 Armeria vulgaris 211.  
 Armleuchtergewächse 170.  
 Arnica 226.  
 — montana 226.  
 Arnoseris minima 339.  
 Aroideae 181.  
 Aron, gefleckter 181.  
 Arongewächse 175, 181.  
 Arrhenatherum elatius 144, 241, 265, 279.  
 Artemisia Absinthium 226.  
 — maritima 340.  
 — vulgaris 226.  
 Arum maculatum 181.  
 Asclepiadaceae 188, 212, 338, 339.  
 Asperifoliaceae 213.  
 Asperula arvensis 220.  
 — glauca 339.  
 — odorata 220.  
 Assimilation 250.  
 Aster, Alpen- 224.  
 — alpinus 224.  
 — Amellus 224, 339.  
 — Berg-, Strand- 224.  
 — Tripolium 224, 340.  
 Astragalus glycyphyllos 330.  
 Astrantia major 205, 338.  
 Atmung 250.  
 Atom 12.  
 Atomgewicht 12, 13.  
 Atomistische Anschauung 12.  
 Atriplex hastatum 191.  
 Aueböden 67.  
 Aufblühen der Ährchen 254.  
 Auffrieren 124.  
 Auftrieb 389.  
 Augentrost 217.  
 Augit 31, 33, 34, 36, 37, 73.  
 Ausfluß 394, 395, 397, 401.  
 Ausflusskoeffizienten 396, 398, 399, 401.  
 Ausläufer 245.  
 Aussäen der Gras- und Klee-  
 samen 351.  
 Aussaatmenge, Berechnung  
 342 bis 351.  
 — Zuschlag 343.  
 Avena brevis 277.  
 — elatior 265, 279.  
 — fatua 277.  
 — flavescens 246, 249, 277.  
 — nuda 277.  
 Avena orientalis 277.  
 — pubescens 248, 249, 277.  
 — sativa-pratensis 278.  
 — strigosa 277.  
 Aveneae 247, 260.  
 Bachbunze 217.  
 Bacterium radicola 82.  
 Baker-Guano 42.  
 Baldgreis, Sumpf- 226.  
 Baldrian, zweihäusiger 221.  
 Baldriangewächse 189.  
 Baldingera arundinacea 267.  
 Balg 252.  
 Balken auf zwei Stützen  
 381, 385.  
 — eingemauert 384.  
 Bambuseae 260.  
 Barbaraea vulgaris 197.  
 Bärenklau 206.  
 — steifbehaarte 208.  
 Bärenschote, stülsholzblät-  
 tige 330.  
 Barren 67.  
 Bärwurz 206.  
 — haarblättrige 206.  
 Basalt 51, 52, 76, 77, 81.  
 Basaltboden 81, 107.  
 Basen 19.  
 Bazin, Versuche 411.  
 Bedecktsamige 169, 173.  
 Befruchtung 254.  
 Beifufs, gemeiner 226.  
 Beinbruchstein 56.  
 Beinwell 213.  
 Bellis 223.  
 Bergkristall 26.  
 Berle 206, 208.  
 Berula 206.  
 — angustifolia 208.  
 Beschleunigung 359.  
 Besenpfriemen 319.  
 Besenried 289.  
 Bestäubung 254.  
 Beta Cicla 191.  
 — Rapa 191.  
 Betonica (Vettonica) offic-  
 nalis 215.  
 Betonie, gebr. 215.  
 Bettelerde 79.  
 Bewegung, aufsteigende  
 362.  
 — gleichförmig beschleu-  
 nigte 359.  
 — Fall- 361.  
 — gleichförmige 357.  
 — gleichförmig verzögerte  
 360.  
 Bibernelle, große 207.  
 Bidens cernuus 224.  
 — tripartitus 224.  
 Biegungsfestigkeit 380.  
 Bienensaug 214.  
 Bindigkeit 123.  
 Binse 93.  
 — flatterige 183.  
 — geknäulte 183.  
 — glanzfrüchtige 183.  
 — Kröten- 183.  
 — Meerstrands- 183.  
 — Rasen- 305.  
 — sparrige 183.  
 — Teich- 305.  
 — zusammengedrückte 247.  
 Biotit 31, 33, 35, 36, 37, 74.  
 Bisilikat 28.  
 Bitterkalk s. Dolomit.  
 Bitterklee 211.  
 Bitumen 85.  
 Blattbüschel, sterile 244.  
 Blätter, gefaltete 249.  
 Blatthäutchen, lange 249.  
 Blocklehm 56.  
 Blumenbinse 179.  
 Blutaue, Sumpf- 200.  
 Blüte der Pflanzen 251.  
 Blütenlose Pflanzen 169.  
 Blutlaugensalz 165.  
 Blutwurz 201.  
 Bocksbart 229, 281.  
 Boden, Begriffsbestim-  
 mung 3.  
 — leichter 123.  
 Bodenabsorption 148.  
 Bodenanalyse, mechanische  
 121.  
 Bodenchemie 9.  
 Bodendruck 390.  
 Bodenfruchtbarkeit 146.  
 Bodengare 124.  
 Bodenhold 338.  
 Bodenklassifikation 107.  
 Bodenkunde 4.  
 Bodenskelett 122.  
 Bodenstet 338.  
 Bodenvag 338.  
 Bodenwasser 128, 152.  
 Bohne, große 335.  
 Bohrregister 114.  
 Bokharaklee 324.  
 Bonitierungspflanzen 205,  
 338.  
 Boretschgewächse 213.  
 Borraginaceae 188, 213, 338,  
 339.  
 Borstengras 262.

- Borstengras, gleiches 250, 303.  
 Borstenhirse 263.  
 Botanik der kulturtechnisch wichtigen Pflanzen 169.  
 Brachypodium 249, 263.  
 — pinnatum 297.  
 — silvaticum 297.  
 Brassica 198.  
 — Napus 198.  
 — nigra 198.  
 — oleracea 198.  
 — Rapa 198.  
 Braunelle, gemeine 215.  
 Braunkohle 82.  
 Braunwurz, Wasser- 216.  
 Breccien 53.  
 Breccienböden 156.  
 Brennessel, zweihäusige 247.  
 — grofse 247.  
 Briza 265.  
 — media 248, 285.  
 Bromus 249, 260, 266.  
 — arvensis 297, 339.  
 — erectus 246, 249, 296, 338.  
 — inermis 246, 296.  
 — mollis 249, 295.  
 — racemosus 249, 295.  
 — secalinus 295.  
 Broomcorn 266.  
 Bruch 94.  
 Bruch-Eicheln 179.  
 Bruchkraut 194.  
 Bruchmoor 74.  
 Bruchmoment 383.  
 Bruchquerschnitt 383.  
 Bruchwaldtorf 96.  
 Bruchit 37.  
 Brunella alba 339.  
 — grandiflora 215, 339.  
 — vulgaris 215.  
 Brunnenkresse 197.  
 Brustwurz 206.  
 — Wald- 209.  
 Bryophyta 169, 170.  
 Buchweizen 191.  
 — türkischer 191.  
 Buffbohne 335.  
 Buntsandstein 6.  
 Buntsandsteinboden 107.  
 Bupleurum 205.  
 — falcatum 208.  
 — longifolium 208.  
 — rotundifolium 208.  
 — tenuissimum 208, 340.  
 Butomaceae 175, 179.  
 Butomus umbellatus 179.  
 Butterblume 229.  
 Caesalpiniaceae 311.  
 Calamagrostis 93, 265.  
 — arundinacea 249.  
 — epigeios 276.  
 — lanceolata 275.  
 — neglecta 276.  
 — stricta 276.  
 Calamintha Acinos 214.  
 Calcinieren 44.  
 Calcium 10.  
 Calciumchlorid 47.  
 Calciumkarbonat 38.  
 Calciumnitrat 48.  
 Calciumoxyd 10.  
 Calciumphosphat 41.  
 Calciumsulfat 44.  
 Calciumsulfid 44.  
 Calciumverbindungen im Drainwasser 153.  
 Caliche 48.  
 Calla palustris 181.  
 Callitrichaceae 188, 203.  
 Callitriche stagnalis 203.  
 — verna 203.  
 Calluna s. Heide.  
 — vulgaris 210.  
 Caltha palustris 195.  
 Campanula bononiensis 339.  
 — patula 222.  
 — persicifolia 222.  
 — rapunculoides 222.  
 — rotundifolia 222.  
 Campanulaceae 189, 222, 339.  
 Campanulatae 189, 222.  
 Cañons 65.  
 Capsella procumbens 339.  
 Carbonyl 22.  
 Cardamine amara 197.  
 — pratensis 197.  
 Carduus acanthoides 339.  
 — crispus 227.  
 Carex 93.  
 — acuta 309, 310.  
 — acutiformis 310.  
 — ampullacea 310.  
 — arenaria 308.  
 — caespitosa 309.  
 — distans 339.  
 — extensa 339.  
 — flava 309.  
 — gracilis 310.  
 — Goodenoughii 309.  
 — hirta 247, 310.  
 — ligetica 308.  
 — muricata 308.  
 — Oederi 309.  
 — paludosa 310.  
 Carex panicea 309.  
 — paniculata 308.  
 — paradoxa 308.  
 — Pseudo-Cyperus 310.  
 — riparia 310.  
 — rostrata 310.  
 — secalina 339.  
 — stricta 308.  
 — teretiuscula 308.  
 — vesicaria 310.  
 — vulgaris 309.  
 — vulpina 307.  
 Carlina acaulis 226, 339.  
 — vulgaris 226, 339.  
 Carnallit 47.  
 Carum Carvi 205, 206.  
 Caryophyllaceae 187, 192, 338, 339.  
 Catabrosa aquatica 266.  
 Caulis daucoides 338, 339.  
 Cellulose 87.  
 Centaurea Cyanus 228.  
 — Jacea 228.  
 — montana 228.  
 — paniculata 339.  
 — phrygia 228.  
 — rhenana 339.  
 Centrospermae 187, 191.  
 Centunculus minimus 339.  
 Cephalanthera grandiflora 186, 338, 339.  
 Cerastium arvense 194.  
 Ceratophyllaceae 188, 195.  
 Ceratophyllum demersum 195.  
 — submersum 195.  
 Chaerophyllum 206.  
 — temulum 207.  
 Chalcedon 26, 28.  
 Chara fragilis 170.  
 Chelidonium majus 185.  
 Chemische Analyse 10.  
 — Bestandteile 9.  
 — Formel 15.  
 — Gleichung 15.  
 — Verbindungen 9.  
 — Zeichensprache 14.  
 Chenopodiaceae 187, 191, 339.  
 Chenopodium album 191.  
 Chilisalpeter 48.  
 Chloride s. Chlorverbindungen.  
 Chlorideae 260, 283.  
 Chlorit 32 bis 37, 73, 75.  
 Chlornatrium 47.  
 Chlorverbindungen 47.  
 Chrysanthemum Chamomilla 339.



- Chrysanthemum Leucanthemum* 225.  
 — *segetum* 225.  
*Cichorie* 228.  
*Cichorium Intybus* 228.  
*Cicuta virosa* 205, 208.  
*Cirsium acaule* 227.  
 — *arvense* 227.  
 — *lanceolatum* 227.  
 — *palustre* 227.  
*Colchicum autumnale* 184.  
*Comarus palustre* 200.  
*Compositae* 189, 223, 339, 340.  
*Coniferae* 173.  
*Conium maculatum* 206, 208.  
*Conringia orientalis* 338, 339.  
*Contortae* 188, 211.  
*Convolvulaceae* 188, 212, 339.  
*Convolvulus arvensis* 213, 339.  
 — *sepium* 213.  
*Cordierit* 29, 31, 33, 35, 36, 37.  
*Coronaria flos cuculi* 193.  
*Coronilla montana* 338.  
 — *varia* 331.  
*Coronillinae* 330.  
*Coronopus Ruellii* 339.  
*Corynephorus canescens* 281.  
*Coulées* 65.  
*Crassulaceae* 339.  
*Crepis biennis* 231, 339.  
 — *foetida* 231.  
 — *paludosa* 231.  
 — *tectorum* 231.  
 — *virens* 231.  
*Cruciferae* 188, 197, 338, 339.  
*Cujavischer Boden* 161.  
*Curçaophosphat* 42.  
*Cuscuta Trifolii* 213.  
*Cyanophyceae* 170.  
*Cycadaceae* 173.  
*Cynodon* 263.  
*Cynosurus* 264.  
 — *cristatus* 246, 249, 291.  
*Cyperaceae* 93, 175, 181, 243, 304, 339.  
*Cyperaceen s. Cyperaceae*.  
*Cypripedium (Cypripedium)* *Calceolus* 186, 338.  
*Dachrohr* 93.  
*Dactylis* 265.  
 — *Aschersoniana* 290.  
*Dactylis glomerata* 246, 249, 250, 289.  
*Dammkultur* 163.  
*Darcys Röhre* 421.  
*Darf s. Darg*.  
*Darg* 95.  
*Dari* 266.  
*Darrgras* 270.  
*Daucus Carota* 207.  
*Daun* 214.  
*Deckblatt* 251.  
*Decksand* 7.  
*Deckton* 7.  
*Dehnungskoeffizient* 379.  
*Delme-Phosphate* 42.  
*Derivathoden* 108.  
*Devonische Formation* 6.  
*Devonkalk* 58.  
*Diabas* 51, 52, 77.  
*Diallag* 31.  
*Dianthus Carthusianorum* 193.  
 — *deltoides* 193.  
*Diatomeen* 170.  
*Diatomeenerde* 7.  
*Dichroit s. Cordierit*.  
*Dicotyledoneae* 169.  
*Dictamnus albus* 338.  
*Diffusion* 83.  
*Digitaria sanguinalis* 266.  
*Digraphis arundinacea* 267.  
*Dikotyledonen* 187.  
*Diluvialboden* 107.  
*Diluvialgrand* 54.  
*Diluvialmergel* 59.  
*Diluvialzeit* 60.  
 — *s. Eiszeit*.  
*Diluvium* 7.  
*Dinkel* 298.  
*Diorit* 51, 52, 77.  
*Dipsaceae* 189, 221.  
*Dipsacus Fullonum* 221.  
 — *silvester* 221.  
*Distel, krause* 227.  
*Doldenblütler* 188.  
*Doldengewächse* 188, 204.  
*Dolerit* 51, 52.  
*Dolomit* 6, 38, 57, 72, 80.  
*Dolomitböden* 160.  
*Doppelsilikate* 29, 149.  
*Dotterblume* 195.  
*Drainwasser* 152.  
*Drehungsfestigkeit* 386.  
*Drehungspaar* 373.  
*Dreiblatt, Sumpf-* 211.  
*Dreiborste* 278.  
*Dreieck der Kräfte* 370.  
*Dreizackbinse* 177.  
*Dreizackbinse, Meerstrand-* 176, 177.  
 — *Sumpf-* 177.  
*Dreizahn, niederliegender* 250.  
*Drosera* 100.  
*Druckfestigkeit* 379.  
*Dünen* 69.  
*Düngemittel, indirekte* 151.  
*Durrha* 266.  
*Dürrwurz, kanadische* 224.  
 — *scharfe* 224.  
*Dyasformation* 6.  
*Eberwurz, stengelloser* 227.  
*Efflorescenz* 38.  
*Ehrenpreis, ähriger* 216.  
 — *breitblättriger* 216.  
 — *efeublättriger* 216.  
 — *niederliegender* 217.  
 — *schildfrüchtiger* 216.  
 — *Wasser-* 217.  
*Ei des Samens* 255.  
*Einkeimblättrige* 169, 173, 174.  
*Einkorn* 298.  
*Einzelkornstruktur* 123.  
*Eisenbisulfid* 45.  
*Eisenerze* 6.  
*Eisenkies s. Schwefelkies*.  
*Eisenocker* 41, 46.  
*Eisenquellen* 41.  
*Eisenrost* 9.  
*Eisenschüssiger Boden* 157.  
*Eisenspat* 39.  
*Eisenvitriol* 45.  
*Eiszeit* 7, 67.  
*Elastizität* 379.  
*Elastizitätsgrenze* 379.  
*Elastizitätsmodulus* 379.  
*Elemente* 10.  
*Elodea* 96.  
 — *canadensis* 180.  
*Elymus* 263.  
 — *arenarius* 299.  
 — *europaeus* 299.  
*Embryo des Samens* 255.  
*Emmer* 298.  
*Empetrum nigrum* 100.  
*Endgeschwindigkeit* 359.  
*Endmoräne* 7, 66.  
*Energie* 364, 365.  
 — *des fallenden Wassers* 366.  
*Engelwurz* 205, 209.  
*Enkrinitenkalk* 58.  
*Enstatit* 28, 29, 31.  
*Entengrütze* 182.

- Enzian, gemeiner 212.  
 — schwachbitterer 212.  
 Enziangewächse 188.  
 Eocän 7.  
 Epidot 32, 33, 35, 36, 75.  
 Epikotyl 242.  
 Epilobium hirsutum 204.  
 — palustre 204.  
 — parviflorum 204.  
 — roseum 204.  
 Epipactis mikrophylla 186, 338.  
 Equisetum arvense 171, 247, 339.  
 — Heleocharis 172.  
 — hiemale 172.  
 — limosum 172.  
 — palustre 172, 347.  
 — silvaticum 172.  
 Equisetaceae 171, 339.  
 Erbse, gebaute 336.  
 — gelbe 336.  
 — graue 336.  
 — grüne 336.  
 Erdharz 85.  
 Erdstamm 244.  
 Erdwachs 85.  
 Erica s. Heide.  
 — Tetralix 210.  
 Ericaceae 188, 209.  
 Ericales 188, 209.  
 Erigeron acer 224.  
 — canadensis 224.  
 Eriophorum 93, 99, 100.  
 — latifolium 306.  
 — polystachyum 306.  
 — vaginatum 306.  
 Erklärung der botanischen Abkürzungen u. Zeichen 173.  
 Erlenbrüche 96.  
 Erratische Blöcke 7.  
 Ersthüllige 187.  
 Eruptivgesteine 5.  
 Erve, einblütige 335.  
 — rauhfrüchtige 335.  
 Ervoidinae 333.  
 Erym hirsutum 335.  
 — monanthos 335.  
 — tetraspermum 335.  
 Erysimum cheiranthoides 198.  
 — odoratum 198, 338.  
 — orientale 338.  
 Erythraea Centaurium 212.  
 — linariifolia 212.  
 — litoralis 212, 339.  
 — pulchella 212, 339.  
 Esparsette 332.  
 Estremadura-Phosphat 42.  
 Euhedysarinae 332.  
 Eupatorium cannabinum 223.  
 Euphorbiaceae 188, 202, 339.  
 Euphorbia Cyparissias 203.  
 — Esula 203.  
 — exigua 339.  
 — pinifolia 203.  
 Euphrasia Odontites 217, 339.  
 — officinalis 217.  
 — stricta 217.  
 — verna 217.  
 Eytelweins Formel 410.  
 Fächerzellen 251.  
 Fagaceae 338.  
 Fagopyrum esculentum 191.  
 — tataricum 191.  
 Fagus silvatica 338.  
 Fahne 311.  
 Falcaria Rivini 339.  
 — vulgaris 339.  
 Fallgesetze 360.  
 Färbarscharte 227.  
 Farnkräuter 171.  
 Farnpflanzen 169, 171.  
 Fasern 380, 381.  
 Fayencemergel 54.  
 Feinerde 122.  
 Feldspat 30.  
 Felsarten 26, 49.  
 Ferkelkraut 228.  
 — glattes 194.  
 Ferriphosphat 42.  
 Ferrokarbonat 39.  
 Festigkeit 379.  
 — absolute oder Zug- 379.  
 — Biegungs- 380.  
 — Drehungs- 386.  
 — Druck- 379.  
 — Gleitungs- 380.  
 — Knick- 386.  
 — Schub- 380.  
 Festuca 266.  
 — arundinacea 293.  
 — distans 339.  
 — duriuscula 293.  
 — elatior 292.  
 — fallax 294.  
 — heterophylla 250, 293.  
 — ovina 246, 250, 294.  
 — pratensis 246, 256, 292.  
 — rubra 246, 250, 294.  
 Festuceae 260, 265, 283.  
 Fettkraut 218.  
 Feuerstein 26.  
 Fieberklee 211.  
 Filago arvensis 339.  
 — germanica 224, 339.  
 Filipendula hexapetala 200.  
 — Ulmaria 200.  
 Filz — Veen 94.  
 Fingerährengräser 261 bis 263.  
 Fingerhirse 261.  
 Fingerkraut, Gänse- 200.  
 — kriechendes 201.  
 Fioringras 246, 246, 249, 256, 274.  
 Firneis 65.  
 Firnschnee 65.  
 Flattergras 249, 264.  
 Flockenbildung 124.  
 Flockenblume, gemeine 228.  
 Florida-Phosphat 42.  
 Flözgesteine 49, 53.  
 Flugsand 8, 55.  
 Flunkerbart 289.  
 Flufsdelta 67.  
 Flufssand 8.  
 Flufssand 8.  
 Flufston 56.  
 Foraminiferen 58.  
 Fragaria 199.  
 Frauenschuh 186.  
 Frauenspiegel 222.  
 Froschbifs, gemeiner 180.  
 Froschlöffel, gem. 178.  
 Fruchtknoten 253.  
 Fuchserde 55.  
 Fuchsschwanz 256, 261, 263.  
 — Acker- 272.  
 — geknieter 272.  
 — rohrartiger 272.  
 — rotgelber 272.  
 — Wiesen- 246, 271.  
 Fungi 169, 170.  
 Galega officinalis 330.  
 Galegeae 319, 330.  
 Galeopsis angustifolia 339.  
 — bifida 215.  
 — Ladanum 214, 339.  
 — Tetrahit 214.  
 Galinsoga parviflora 225.  
 Galium Aparine 220.  
 — boreale 220.  
 — Mollugo 220.  
 — palustre 220.  
 — parisiense 339.  
 — tricornis 339.

- Galium uliginosum* 220.  
 — verum 220.  
*Gamander*, Berg- 216.  
 — gemeiner 215.  
 — knoblauchduftender 215.  
 — Trauben- 215.  
*Ganguillet* und *Kutters*  
 Formel 411.  
*Gänseblümchen* 223.  
*Gänsedistel*, Acker- 231, 247.  
 — glatte 230.  
 — rauhe 230.  
*Gänsefuß*, weißer 191.  
 — (Melden-) gewächse 187, 191.  
*Gänsekresse* 197.  
*Garbe*, Bertram- 225.  
 — Schaf- 225, 247.  
*Gebirgsarten* 26, 49.  
*Gebirgsmoore* 98, 104.  
*Geeß* 67.  
*Gefälle* 409.  
*Gefällmessungen* 419.  
*Gefäßbündel* 248.  
*Gefäßkryptogamen* 171.  
*Geinsäure* 86.  
*Geisfuß* 208.  
*Geisraute*, gebräunl. 330.  
*Genista tinctoria* 314.  
*Genisteae* 318, 319.  
*Gentiana Amarella* 212.  
 — ciliata 338.  
 — cruciata 338.  
 — germanica 212, 338.  
 — Pneumonanthe 338.  
 — verna 338.  
*Gentianaceae* 188, 211, 338, 339.  
*Geologische Formationen* 5.  
 — Perioden 5.  
*Geraniaceae* 188, 202, 339.  
*Geraniales* 188, 201.  
*Geranium dissectum* 202, 339.  
 — palustre 202.  
 — pratense 202.  
 — pyrenaicum 202.  
 — Robertianum 202.  
 — sanguineum 202.  
*Geröll* 7, 53.  
*Geröllböden* 156.  
*Gerste* 263.  
 — Mäuse- 300.  
 — roggenartige 300.  
 — sechszeilige 300.  
 — vierzeilige 300.  
 — zweizeilige 300.  
*Geruchgras* s. *Ruchgras*.  
*Geschiebelehm* 56, 60.  
*Geschiebemergel* 7, 59, 68.  
 — oberer 60.  
 — unterer 60.  
*Geschiebesand* 7, 60.  
*Geschwindigkeit* 358.  
 — des fließenden Wassers 414.  
 — im Stromstrich 420, 429.  
 — Messungen der 427, 429.  
 — mittlere 357.  
*Geschwindigkeitskoeffizient* 394, 396.  
*Geschwindigkeitskurve* 358.  
*Gesteine* 26.  
 — basische 50.  
 — bodenbildende 49.  
 — saure 50.  
*Getrenntes Geschlecht* 261.  
*Geum rivale* 201.  
 — urbanum 201.  
*Giersch* 205, 208.  
*Gifterde* s. *Bettelerde*.  
*Gilzgras* 285.  
*Ginster*, Färber- 319.  
 — Stachel- 319.  
*Gips* 6.  
*Gipsmergel* 44.  
*Glacial-Theorie* 68.  
*Glanzgras* 267.  
 — rohrartiges 267.  
*Glasschmalz*, krautartiges 192.  
*Glauberit* 43.  
*Glaukonit* 32, 33, 35, 36.  
*Glaux maritima* 211, 340.  
*Glechoma hederacea* 214.  
*Gleichgewicht* 368.  
*Gleitungsfestigkeit* 380.  
*Gletscher* 65.  
*Gletschermühlen* 65.  
*Gletscherschliffe* 68.  
*Gletschertöpfe* 65.  
*Gliederhülsige* 330.  
*Glimmer* 31, 37.  
*Glimmerschiefer* 6, 50, 51.  
*Globularia nudicaulis* 339.  
*Globulariaceae* 339.  
*Glockenblume*, ausgebreitete 222.  
 — pfeilsichblättrige 222.  
 — rundblättrige 222.  
*Glockenblumengewächse* 189, 222.  
*Glumae* 252.  
*Glumiflorae* 175, 181, 258.  
*Glyceria* 249, 250.  
 — aquatica 287.  
*Glyceria fluitans* 249, 288.  
 — plicata 288.  
 — spectabilis 287.  
*Gnadenkraut* 216.  
*Gnaphalium dioicum* 224.  
 — luteo-album 339.  
 — uliginosum 224, 339.  
*Gneifs* 6, 50, 51.  
*Gneisfboden* 81.  
*Goldhafer* 246.  
*Gramina* 175, 181, 258.  
*Gramineae* 175, 181, 243, 258, 338, 339.  
*Granat* 31, 33, 35, 36.  
*Grand* 7, 54, 121.  
*Granit* 50, 51, 76, 81.  
*Granitboden* 81, 107.  
*Gräser*, Allgemeiner Bau des Korns 240.  
 — annuelle 244.  
 — ausdauernde 244, 256.  
 — ausläufertreibende 244, 246.  
 — Bestimmen 261.  
 — Bestockung 244.  
 — Biegungsfähigkeit 248.  
 — Blätter 248.  
 — Blatthäutchen 248.  
 — Blattscheide 248.  
 — Blattspreite 248.  
 — Blattstellung 248.  
 — Blattstiel 248.  
 — Blüte 253.  
 — Dauer der 255.  
 — echte 258.  
 — einjährige 244.  
 — Einteilung 259.  
 — Entwicklung 241.  
 — Grannen 248.  
 — Halb- 181, 304.  
 — Halm 243.  
 — Hirse- 259, 266.  
 — Horstbildende 244, 246.  
 — Internodien 243.  
 — Keimung 241.  
 — Knoten 243.  
 — Merkmale 258.  
 — Nodi 243.  
 — Ober- 257.  
 — perennierende 244.  
 — Ried- 181.  
 — Sauer- 181, 243, 304.  
 — Schein- 243.  
 — Seitenzweige 243.  
 — Stengel 343.  
 — Stäbe- 243, 258.  
 — Systematik 258.  
 — Unter- 257.

- Gräser, Wuchsverhältnisse der 246, 257.  
 Grasnelke 211.  
 Grastorf 93.  
 Gratiola 216.  
 Grauwacke 6.  
 Grebenau 415.  
 Grenztorf 103.  
 Grobsand 122.  
 Grubengas s. Methan.  
 Grundachse 244.  
 Grundfeste, Dach- 231.  
 — grüne 231.  
 — stinkende 231.  
 — Sumpf- 232.  
 — zweijährige 231.  
 Grundmoräne 66, 68.  
 Grünlandstorf 93.  
 Grundsätze der Statik 368.  
 Grundstoffe (Elemente) 10.  
 Grünerde 37.  
 Grünsandstein 6.  
 Guano 38.  
 Gundermann 214.  
 Gundelrebe, efeublätterige 214.  
 Günsel, Genfer- 215.  
 — kriechender 215.  
 Gymnospermae 169, 173.  
 Gypsophila muralis 339.  
 — repens 338.  
 Haargras 263.  
 — europäisches 299.  
 Haarröhrchenkraft 387.  
 — s. Kapillarität.  
 Haarstrang 205.  
 Habichtskraut, doldiges 232.  
 — gem. 232.  
 — glattes 232.  
 — Mauer- 232.  
 — Öhrchen- 232.  
 — Wiesen- 232.  
 Hachelkopf, gefleckter 228.  
 Hafer, Flug- 277.  
 — gemeiner 277.  
 — Glatt- 279.  
 — Gold- 249, 256, 278.  
 — hoher 246.  
 — kurzer 277.  
 — nackter 277.  
 — Rauh- 277.  
 — Sand- 276, 277.  
 — Strand- 276.  
 — türkischer 277.  
 — weichhaariger 248, 249, 256, 277.  
 Hafer, Wiesen- 249, 278, 279.  
 — Wind- 277.  
 Haferwurzel 229.  
 Hahnenfuß, Gift- 196.  
 — kriechender 196.  
 — scharfer 196.  
 — Wasser- 196.  
 Hahnenfußgewächse 188.  
 Hahnenkamm 217.  
 Hainbinse 184.  
 Hainsimse 184.  
 Halogene 25.  
 Haloidsalze 25.  
 Haloidsäuren 25.  
 Halorrhagidaceae 188, 204.  
 Hanfnessel, Acker- 214.  
 — gemeine 214.  
 Hartgewebe 248.  
 Hartschwingel 246.  
 Hasenbrot 184.  
 Hasenohr 205.  
 — sichelförmiges 208.  
 Hauhechel, dornige 320.  
 Havelmielitz 246.  
 Hebelarm 372, 373.  
 Heben von Wasser 367.  
 Hederich 198.  
 — echter 199.  
 Hedysareae 319, 330.  
 Heide 93, 100.  
 — Glocken- 210.  
 — Sumpf- 210.  
 Heidebüten 100.  
 Heideerde 101.  
 Heidekraut, gemeines 210.  
 Heidekrautgewächse 188.  
 Heidesand 8.  
 Heidetorf 104.  
 Heinrich, roter 192.  
 Helleborus foetidus 338.  
 — niger 338.  
 Heleocharis palustris 305.  
 — uniglumis 305.  
 Helichrysum arenarium 224.  
 Helm, blauer 299.  
 Helmkraut, gemeines 215.  
 Helobiae 175, 176.  
 Helodea canadensis 180.  
 Hepatica triloba 338.  
 Heracleum 206.  
 — Sphondylium 208.  
 Herbstzeitlose 184.  
 Herniaria glabra 194.  
 Herzblatt, Sumpf- 199.  
 Hieracium Auricula 232.  
 — laevigatum 232.  
 — murorum 232.  
 Hieracium Pilosella 232.  
 — praealtum 339.  
 — pratense 232.  
 — umbellatum 232.  
 — vulgatum 232.  
 Hierochloa 264.  
 — australis 271.  
 — odorata 270.  
 Himmelschlüssel, gebräuchlicher 211.  
 — mehlig 211.  
 Hippocrepis comosa 331, 338.  
 Hippuris 96, 204.  
 Hirschwurz 207.  
 Hirse 264.  
 — Hühner- 266.  
 — Kolben- 266.  
 — linienförmige 266.  
 — Mohren- 266.  
 — Neger- 266.  
 — Rispen- 266.  
 Hochmoorboden 144.  
 Hochmoore 94.  
 Hochmoortorf 100, 104.  
 Höhendiluvium 7.  
 Holcus 265.  
 — lanatus 146, 149, 281.  
 — mollis 146, 282.  
 Honiggras 249, 265.  
 — weiches 246, 282.  
 — wolliges 246, 256, 281.  
 Hopfenklee 322.  
 Hopfenluzerne 322.  
 Hordeae 260, 297, 300.  
 Hordeum 263.  
 — distichum 300.  
 — hexastichum 300.  
 — murinum 300.  
 — secalinum 300, 339.  
 — tetrastichum 300.  
 — vulgare 300.  
 Hornblatt 195.  
 Hornblattgewächse 188.  
 Hornblende 31, 33, 34, 36, 37, 73, 75.  
 Hornklee, gemeiner 328.  
 — Sumpf- 329.  
 Hornkraut 194.  
 Hornsteinsporphyr 76.  
 Horst 245.  
 — dichter 245.  
 — ebener 245.  
 — lockerer 245.  
 — polsterförmiger 245.  
 — sehr dichter 245.  
 Hottonia palustris 211.  
 Howland-Guano 42.

- Hufeisenklee 331.  
 — schopfiger 331.  
 Huflattich 226, 247.  
 Hügelrohr 276.  
 Hülsenfrüchte 188, 201.  
 — Allgemeines 311.  
 — Bau des Samens 312.  
 — „ „ Stengels und der Blätter 313, 314.  
 — Bau der Wurzel 313.  
 — Bestäubung 315.  
 — Entwicklung 312.  
 — Keimung 312.  
 — Systematik 318, 319.  
 Humate 89.  
 Humin 86, 87.  
 Huminsäure 86, 87.  
 Humus 86.  
 — milder 88.  
 — saurer 88.  
 Humusböden 112, 144, 161.  
 Humussäure 87, 105.  
 Humus-saure Salze 89.  
 Humusstoffe 86.  
 Hundskamille, Acker- 225.  
 Hundspetersilie 205.  
 Hundsrippe 219.  
 Huronische Formation 6.  
 Hydraulik 387 ff.  
 Hydrocharis 96.  
 — morsus ranae 180.  
 Hydrocharitaceae 175, 179.  
 Hydrocotyle vulgaris 205.  
 Hydrostatik 387.  
 Hydroxyde 19, 20, 46.  
 Hydroxyl 22.  
 Hygroskopizität 47.  
 Hypersthen 31.  
 Hypneen 93.  
 Hypochaeris glabra 339.  
 — maculata 228, 339.  
 — radicata 228.  
 Iberis amara 338  
 Igelkolben, ästiger 176.  
 — einfacher 176.  
 Igelkolbengewächse 174, 176.  
 Immerschön 224.  
 Impfung des Bodens mit Spaltpilzen 314.  
 Infraaquatische Moore 94.  
 Infusorieneder 27, 170.  
 Interglacialzeit 7, 69.  
 Inula Britannica 224.  
 — Conyza 339.  
 Iridaceae 175, 185.  
 Iris pseudacorus 185.  
 — sibirica 185.  
 Jarvis-Guano 42.  
 Jasione, Berg- 222.  
 — montana 222.  
 Juncaceae 175, 182, 339.  
 Juncaginaceae 175, 177, 339.  
 Juncus 93.  
 — bufonius 183, 339.  
 — capitatus 339.  
 — communis 183.  
 — compressus 183, 247.  
 — conglomeratus 183.  
 — effusus 183.  
 — Gerardi 183, 339.  
 — glaucus 339.  
 — lampocarpus 183.  
 — Leersii 183.  
 — maritimus 183.  
 — ranarius 339.  
 — squarrosus 183.  
 — Tenageia 339.  
 Jura, brauner 6.  
 — mittlerer 6.  
 — oberer 6.  
 — schwarzer 6.  
 — weißer 6.  
 Jura-Formation 6.  
 Jurakalk 58.  
 Kainit 43.  
 Kälberkropf, betäubender 207.  
 Kalifeldspat s. Orthoklas.  
 Kaliglimmer s. Muscovit.  
 Kaliumchlorid 47.  
 Kaliumkarbonat 38.  
 Kaliumnitrat 48.  
 Kaliwasserglas 36.  
 Kalk 6.  
 — dolomitischer 39.  
 — gebrannter 9, 41.  
 Kalkboden 144.  
 Kalkböden 110, 112, 160.  
 Kalkbrennen 9.  
 Kalkfeldspat 30.  
 Kalkmergel 59.  
 Kalkmoor 58.  
 Kalkpflanzen 338.  
 Kalkspat 38.  
 Kalkstein 6, 8, 57, 80.  
 Kalktuff 7, 38, 58.  
 Kamille, echte 225.  
 — geruchlose 225.  
 Kammgras 246, 249, 264.  
 — gemeines 291.  
 Kanariengras 269.  
 Känozoische Periode 7.  
 Kaolin 30, 33, 35, 36, 73.  
 Kapillarität 125, 387.  
 Karbonate s. kohlen-saure Salze.  
 Karde, Weber- 221.  
 — wilde 221.  
 Kardengewächse 189.  
 Karolina-Phosphat 42.  
 Kartoffel 216.  
 Katzenpfötchen 224.  
 Keim 255.  
 Kerbel 206.  
 Keuperboden 107.  
 Keuper-Formation 6.  
 Keupermergel 59.  
 Kies 53, 122.  
 Kieselerde-Mineralien 26, 72.  
 Kieselgur 8, 27, 95, 170.  
 Kieselsäure, colloidale 28.  
 Kieselsaure Salze 26, 27, 36, 72.  
 Kieselsinter 27.  
 Kieserit 43.  
 Kilogramm-meter 363.  
 Kinetische Energie 365.  
 Klammen 65.  
 Klappen (Hüllspelzen) 252.  
 Klappertopf, kleiner 217.  
 Klatschrose 196.  
 Klauenschote 331.  
 Klee, Acker- 325.  
 — Alsike- 327.  
 — Bastard- 327.  
 — Berg- 326.  
 — Bitter- 211.  
 — Erdbeer- 326.  
 — Fieber- 211.  
 — Gelb- 322.  
 — Gold- 327.  
 — Horn- 328, 329.  
 — Hufeisen- 331.  
 — Inkarnat- 325.  
 — Katzen- 325.  
 — kleiner 328.  
 — kriechender 326.  
 — Mäuse- 325.  
 — mittlerer 326.  
 — niederliegender 328.  
 — pannonischer 325.  
 — Rot- 324.  
 — rötlicher 326.  
 — schwedischer 327.  
 — Wald- 325.  
 — Weiß- 326.  
 — Wiesen- 324, 325.  
 — Wund- 328.  
 Klee-gewächse 320.

- Kleeseide 213.  
 Kleiboden 162.  
 Kleinsamige 185.  
 Knabenkraut, Breitblättriges 185.  
 Knäuel, ausdauernder 194.  
 — einjähriger 194.  
 Knaulgras 245, 246, 249, 250, 256, 265, 291.  
 — gemeines 289, 291.  
 Knautia arvensis 221.  
 Knautie, Acker- 221.  
 Knick (Ortstein) 55.  
 Knickfestigkeit 379, 386.  
 Knopfkraut 225.  
 Knorpelkraut 192.  
 Knöterich, ampferblättriger 190.  
 — filziger 190.  
 — gemeiner 190.  
 — knotiger 190.  
 — ortwechselnder 190, 247.  
 — pfirsichblättriger 190.  
 — tatarischer 191.  
 — Vogel- 190.  
 Knöterichgewächse 187.  
 Kochsalz s. Steinsalz.  
 Koeleria 263.  
 — cristata 249, 284.  
 — glauca 284.  
 Koelerie 263.  
 — gekämmte 256.  
 — graugrüne 284.  
 — kammförmige 249, 284.  
 Kohärenz 123.  
 Kohl 198.  
 Kohlendioxyd 9, 10, 38, 70.  
 Kohlenflüze 6.  
 Kohlensäure 9, 36, 38, 70.  
 Kohlensaure Salze 26, 38, 40, 71.  
 Kohlenstoff 10.  
 Kohlrübe 198.  
 Komponente 370.  
 Konglomerate 53.  
 Konstante Proportionen 13.  
 Kontraktion 395.  
 — unvollständige 398.  
 — teilweise 398.  
 Kontraktionskoeffizienten 395, 396.  
 Koproliithe 42.  
 Korallen 42.  
 Korallenkalk 58.  
 Korbblütler 189, 223.  
 Kornblume, Garten- 228.  
 Kornrade 193.  
 Kraft 362, 368.  
 Kräftepaar 372, 373.  
 Kräftepolygon 369.  
 Krappgewächse 189, 220.  
 Kratzdistel, Acker- 227.  
 — kohlartige 227.  
 — lanzettliche 227.  
 — stengellose 227.  
 — Sumpf- 227.  
 Krebschere, aloeblättrige 180.  
 Kreide 6, 38, 42, 58.  
 Kreide-Formation 6.  
 Krensäure 86.  
 Kreuzblume 202.  
 Kreuzblütler 188, 197.  
 Kreuzkraut, Frühlings- 226.  
 Kriechtriebe 245.  
 Kristallinische Massengesteine s. Urgebirgsarten.  
 Kristallwasser 30.  
 Kronenwicke, bunte 331.  
 Krugit 43.  
 Krümelbildung 124, 161.  
 Krümelstruktur 123.  
 Krümmungen in Röhren 418.  
 Kryptogamae 169.  
 Kuckucksblume 193.  
 Kuhlblume 195, 229.  
 Kuhfleisch 99.  
 Kuhlen 79.  
 Kuhlerde 79.  
 Kulturboden 3.  
 Kümmel 205, 206.  
 Kupferschiefer 6.  
 Labiatae 188, 213, 339.  
 Labkraut, echtes 220.  
 — gemeines 220.  
 — Moor- 220.  
 — nordisches 220.  
 — Sumpf- 220.  
 Labrador 30, 33, 34, 36.  
 Lactuca perennis 339.  
 — saligna 340.  
 — sativa 230.  
 — Scariola 230, 339.  
 Lagerpflanzen 170.  
 Lagerung 123.  
 Lahn-Phosphorit 42.  
 Laichkraut 177.  
 — kammförmiges 177.  
 — krauses 177.  
 — schwimmendes 177.  
 — spiegelndes 177.  
 Laichkrautgewächse 175, 177, 277.  
 Lamium album 214.  
 — purpureum 214.  
 Lämmerschwanz 223.  
 Landrohr 249, 265.  
 — lanzettliches 275.  
 — vernachlässigtes 276.  
 Längenprofil 408.  
 Lapilli 54.  
 Lappa tomentosa 339.  
 Laserpitium latifolium 338.  
 Lateritböden 70.  
 Lathyroidinae 336.  
 Lathyrus heterophyllos 337.  
 — latifolius 337.  
 — platyphyllos 337.  
 — paluster 337.  
 — pratensis 247, 336.  
 — tuberosus 336, 339.  
 — silvester 336, 337.  
 Lauch 184.  
 Laurentinische Formation 6.  
 Läusekraut, Sumpf- 218.  
 — Wald- 218.  
 Lebertorf 95.  
 Ledum pallustre 100.  
 Leersia oryzoides 267.  
 Leguminosae 188, 201, 311, 338, 339, 340.  
 Lehm 56.  
 — strenger 159.  
 Lehm Boden 144.  
 Lehm Böden 110, 112, 159.  
 Lehmmergel 59.  
 Lehm pflanzen 339.  
 Leinkraut, gemeines 216.  
 — kleines 216.  
 Leitfossilien 5.  
 Lemna arrhiza 182.  
 — minor 182.  
 — gibba 182.  
 — polyrhiza 182.  
 — trisulca 182.  
 Lemnaceae 175, 181.  
 Lens esculenta 335.  
 Lentibulariaceae 188, 218.  
 Leontodon autumnalis 229.  
 — hastilis 229.  
 — hispidus 229.  
 — taraxoides 340.  
 Lepidium campestre 338, 339.  
 — latifolium 339.  
 Letten 56.  
 Lettenkohle 6.  
 Leucanthemum vulgare 225.  
 Leucit 28, 29, 31, 33, 34, 36, 75.  
 Lias 6.  
 Lichtnelke, weiße 193.  
 Lieschgras 256, 263.

- Lieschgras, Boehmers 256, 273.  
 — Wiesen- 272, 273.  
 Ligula 249.  
 Liguliflorae 228.  
 Liliaceae 175, 184, 338, 339.  
 Liliflorae 175, 182.  
 Limonit 46, 95.  
 Linaria arvensis 339.  
 — Elatine 339.  
 — minor 216, 339.  
 — spuria 339.  
 — vulgaris 216.  
 Linse, eßbare 335.  
 Lippenblütler 188.  
 Lithospermum officinale 213, 339.  
 Lohblüte 170.  
 Lohden 94.  
 Lolch 262.  
 — ausdauernder 301.  
 — Lein- 303.  
 — Taumel- 302.  
 Lolium 262.  
 — italicum 246, 249, 261, 302.  
 — multiflorum 261, 302.  
 — perenne 245, 246, 249, 250, 256, 301.  
 — remotum 303.  
 — temulentum 302.  
 Löss 56, 61, 69.  
 Lössboden 161.  
 Lösslehm 56.  
 Lössmännchen 61.  
 Lot-Phosphate 42.  
 Loteae 319, 328.  
 Lotus corniculatus 328.  
 — uliginosus 329.  
 Löwenmaul 216.  
 Löwenzahn 229.  
 — Herbst- 229.  
 — spießblättriger 229.  
 — rauhaariger 229.  
 Luch 94.  
 Lupine, blaue 320.  
 — doppeltweisse (ostpreussische weisse) 320.  
 — gelbe 320.  
 — perennierende 320.  
 — sibirische 320.  
 — weisse 320.  
 Lupinus albus 320.  
 — angustifolius 320.  
 — dipoleucus 320.  
 — hirsutus 320.  
 — leucospermus 320.  
 — luteus 320.  
 Lupinus melanospermus 320.  
 — polyphyllus 320.  
 Luzerne, Sand- 322.  
 — sichelfrüchtige 321, 322.  
 Luzula campestris 184.  
 — multiflora 184.  
 Lycopus europaeus 214.  
 Lysimachia Nummularia 211.  
 — thysiflora 211.  
 Lysimachie, gemeine 211.  
 — straußblütige 211.  
 Lythraceae 188, 203.  
 Lythrum salicaria 203.  
 Magnesia, gebrannte 41.  
 Magnesiaglimmer s. Biotit.  
 Magnesit 38.  
 Magnesiumchlorid 47.  
 Magnesiumkarbonat 38.  
 Magnesiumnitrat 48.  
 Magnesiumverbindungen 153.  
 Magneteisen 46.  
 Maibolt s. Bettelerde.  
 Maisgräser 259, 266.  
 Malden-Guano 42.  
 Malvaceae 340.  
 Mannagras 288.  
 Mannagrütze 288.  
 Mannaschwaden 249.  
 Marbel, gemeine 184.  
 Mariengras 264.  
 — südliches 271.  
 — wohlriechendes 270.  
 Markasit 45.  
 Marmor 57.  
 Marsch, Marschboden 61, 67.  
 Marschmoore 79.  
 Mafeliebchen 223.  
 Matricaria Chamomilla 225, 339.  
 — inodora 225.  
 Maydeae 259, 266.  
 Mechanik 357 ff.  
 Medicago falcata 322.  
 — lupulina 322.  
 — media 322.  
 — minima 322, 338.  
 — sativa 321.  
 — varia 322.  
 Meergeil s. Lebertorf.  
 Mehlkörper 241.  
 Melampyrum arvense 218, 339.  
 — nemorosum 218.  
 — pratense 218.  
 Melandryum album 193.  
 — noctiflorum 339.  
 Melaphyr 51, 52.  
 Melde, spießblättrige 191.  
 Melica 149, 265.  
 — ciliata 249, 264, 284.  
 — nutans 284.  
 — uniflora 284.  
 Melilotus albus 324, 339.  
 — altissimus 324, 340.  
 — dentatus 340.  
 — macrorrhizus 323.  
 — officinalis 323, 339.  
 Mentha aquatica 214.  
 — arvensis 214.  
 Menyanthes trifoliata 211.  
 Mergel 6, 59.  
 — bunter 59.  
 Mergelböden 160.  
 Mergelnieren 61.  
 Mergelsand 54, 157.  
 Mergelschiefer 59.  
 Merk 206.  
 — breitblättriger 209.  
 Mesotyp 32, 35.  
 Mesozoische Periode 6.  
 Metachlamydeae 188, 209.  
 Metadikieselsäure 29.  
 Metakieselsäure 27, 29.  
 Metalle 12.  
 Metalloide s. Nichtmetalle.  
 Methan 16, 90.  
 Meum 206.  
 — athamanticum 206.  
 — Mutellina 207.  
 Michaelis' Wasserstandsbeobachtungen 430.  
 Microspermae 175, 185.  
 Mielitz, echtes 249, 287.  
 — Havel- 267, 287.  
 Mikroklin 30, 33, 34.  
 Milchkraut, Seestrands- 211.  
 Milium 264.  
 — effusum 249.  
 Mimosoideae 311.  
 Mineralien, Definition 26.  
 Minze, Feld- 214.  
 — Wasser- 214.  
 Miocän 7.  
 Mittelkraft 370.  
 Mittelmoräne 66.  
 Mittelpunkt des Druckes 389.  
 Moder 89.  
 Mohngewächse 188.  
 Mohn, Sand- 196.  
 Mohrrübe 207.  
 Molasse 7.  
 Molekül 12.

- Molekulargewicht 12.  
 Molinia 266.  
   — *coerulea* 289.  
 Molinie 289.  
 Moment einer Kraft 372.  
   — eines Kräftepaars 373.  
 Monocotyledoneae 169.  
 Montia minor 192.  
   — *rivularis* 192.  
 Moor 91.  
 Moorbildung 7, 91.  
 Moorböden 112, 162.  
 Moore, schwimmende 97, 103.  
 Moormergel 58.  
 Moorwehen 162.  
 Moos 94.  
 Moosbruch 94.  
 Moospflanzen 169, 170.  
 Moostorf 93.  
   — älterer 102, 104.  
   — jüngerer 102, 104.  
 Moränenmergel 59.  
 Mösse 94.  
 Mullwehen s. Moorwehen.  
 Muschelkalk 58, 78.  
 Muschelkalk-Formation 6.  
 Muscovit 31, 33, 36, 37, 73.  
 Mutterkraut 207.  
 Myosotis caespitosa 213.  
   — *palustris* 213.  
 Myosurus minimus 339.  
 Myrica 100.  
 Myriophyllum 96.  
   — *alterniflorum* 204.  
   — *spicatum* 204.  
   — *verticillatum* 204.  
 Myrtiflorae 188, 203.  
 Myxomycetes 170.  
 Myxothallophyta 169, 170.  
  
 Nachtkerze, zweijährige 204.  
 Nachtkerzengewächse 188, 203.  
 Nachtschatten, schwarzer 216.  
 Nachtschattengewächse 188.  
 Nachtsamig 169, 173.  
 Nadelhölzer 173.  
 Nährgewebe 241.  
 Najas 95.  
 Narben 253.  
 Nardus 262.  
   — *stricta* 250, 303.  
 Nasturtium amphibium 147.  
   — *officinale* 147.  
   — *palustre* 147.  
   — *silvestre* 147.  
  
 Natriumchlorid 47.  
 Natriumkarbonat 38.  
 Natriumnitrat 48.  
 Natriumverbindungen 153.  
 Natrolith 32, 33, 35, 36.  
 Natronfeldspat s. Albit.  
 Natronsalpeter 48.  
 Natronseen 38.  
 Natronwasserglas 36.  
 Naturboden 3.  
 Natürliches System 12.  
 Navassa-Phosphat 42.  
 Nelke, Karthäuser- 193.  
   — *deltafleckige* 193.  
 Nelkengewächse 187, 192, 193.  
 Nelkenwurz, Bach- 201.  
   — *gem.* 201.  
 Nephelin 31, 33, 34, 36, 37.  
 Neptunische Gebirgsarten 49.  
 Neutrale Achse 381.  
   — *Faserschicht* 381.  
 Nichtmetalle 12.  
 Niederländische Moorkultur s. Veenkultur, Teil II.  
 Niederungsmoorboden 144.  
 Niederungsmoore 94.  
 Nigella arvensis 338, 339.  
 Nitella 170.  
 Nitrate s. salpetersaure Salze.  
 Nitrobakterium 49.  
 Nitroxyl 22.  
 Nonnea pulla 339.  
 Normale Kontraktion 396.  
 Nuphar 95.  
   — *luteum* 194.  
 Nutzeffekt s. Nutzwirkung.  
 Nutzwirkung 367.  
 Nymphaea 95.  
   — *alba* 194.  
 Nymphaeaceae 188, 194.  
  
 Oberfläche einer Flüssigkeit 387.  
 Obione pedunculata 339.  
 Ocker 46.  
 Oenanthe 205.  
   — *aquatica* 209.  
   — *fistulosa* 209.  
   — *Phellandrium* 209.  
 Oenothera biennis 204.  
 Oenotheraceae 188, 203.  
 Ökonomische Bodeneinteilungssysteme 109.  
 Oligocän 7.  
 Oligoklas 33, 34, 36.  
  
 Olivin 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 73.  
 Onobrychis sativa 332, 338.  
   — *viciaefolia* 338.  
 Ononis spinosa 320.  
 Oolithengebirge 6.  
 Opal 26, 28.  
 Ophrys fuciflora 186, 338.  
   — *muscifera* 186, 338.  
 Orchidaceae 175, 185, 338, 339.  
 Orchis incarnata 186.  
   — *latifolia* 185.  
   — *maculata* 185.  
   — *militaris* 186, 328.  
   — *purpurea* 186, 328.  
 Ornithopus perpusillus 331.  
   — *sativus* 331.  
 Orobanchaceae 339.  
 Orobanche pallidiflora 339.  
   — *reticulata* syn. *pallidiflora* 339.  
 Orthodikieselsäure 29.  
 Orthokieselsäure 27, 29.  
 Orthoklas 29, 30, 33, 34, 36, 37, 73, 75.  
 Ortstein 55, 71.  
 Oryza clandestina 267.  
   — *sativa* 267.  
 Oryzae 259, 267.  
 Oxyde (des Eisens) 46.  
 Oxydation 19, 70, 77.  
 Oxydationsstufen 20.  
 Oxyde 19, 20.  
   — *basenbildende* 20.  
   — *indifferente* 21.  
   — *säurebildende* 21.  
 Oxydul 20.  
 Ozon 70.  
  
 Paläozoische Periode 6.  
 Pandanales 194 195.  
 Paniceae 259, 266.  
 Panicoideae 259.  
 Panicum 264.  
   — *Crus galli* 266.  
   — *glaucum* 266, 339.  
   — *italicum* 266.  
   — *lineare* 266.  
   — *miliaceum* 266.  
   — *sanguinale* 266.  
 Papaveraceae 188, 196, 339.  
 Papaver Argemone 196, 339.  
   — *dubium* 197.  
   — *hybridum* 196.  
   — *Rhoeas* 196, 339.  
 Papilionaceae 311.  
 Papilionatae 311.



- Parallelogramm der Kräfte 370.  
 Parietales 188, 203.  
 Parnassia palustris 199.  
 Paronychioideae 193, 194.  
 Paspalum dilatatum 267.  
 Pastinaca sativa 205, 207.  
 Pastinake 207.  
 — gebaute 205.  
 Pede 298.  
 Pedicularis palustris 218.  
 — silvatica 218.  
 Peilstange 427.  
 Pennisetum typhoideum 266.  
 Peridot s. Olivin.  
 Periodisches System s. natürliches System.  
 Perlgras 249, 265.  
 — einblütiges 284.  
 — gewimpertes 249, 264, 284.  
 — nickendes 284.  
 Perlsand 157.  
 Permische Formation s. Dyas-Formation.  
 Peru-Guano 42.  
 Pestwurz 226.  
 Petasites officinalis 226.  
 Petroleum 81.  
 Peucedanum Cervaria 206, 207.  
 — officinale 205.  
 — palustre 206, 209.  
 — Oreoselinum 206, 207.  
 Pfeifengras 266.  
 — blaues 289.  
 Pfeifenräumer 289.  
 Pfeilkraut, gemeines 179.  
 Pfennigkraut 211.  
 Pferdebohne 335.  
 Pferdekraft 364.  
 Pferdekümmel 209.  
 Pferdesaat, röhrlige 209.  
 Pflanzen, wasserliebend 256.  
 — wasserfliehend 256.  
 Pflanzenformationen, Übersicht 233.  
 Pflanzenreich, Übersicht 169.  
 Phalarideae 260, 267.  
 Phalaris arundinacea 246, 249, 267, 268.  
 — canariensis 269.  
 Phanerogamae 169, 172.  
 Phaseoleae 319.  
 Phleum 263.  
 — pratense 246, 249, 256, 272.  
 — Boehmeri 273.  
 Phosphate s. Phosphorsäure Salze.  
 Phosphatkreide 42.  
 Phosphorit 41.  
 Phosphorsäure Salze 26, 41, 72.  
 Phragmites 265.  
 — communis 93, 283.  
 Phragmitestorf 95.  
 Phyteuma orbiculare 222, 339.  
 Pilze 169, 170.  
 Pimpinella 205.  
 — magna 207.  
 — saxifraga 208.  
 Pimpernelle 200.  
 Pinguicula vulgaris 218.  
 Pippau 231.  
 Pirus 199.  
 Pistazit s. Epidot.  
 Pisum arvense 336.  
 — sativum 336.  
 Pitot'sche Röhre 420.  
 Plagioklase 30, 37, 73.  
 Plänerkalk 6.  
 Plänermergel 59.  
 Plantaginaceae 189, 219, 340.  
 Plantaginales 189, 219.  
 Plantago arenaria 219.  
 — Coronopus 219, 340.  
 — lanceolata 219.  
 — major 219.  
 — maritima 219, 340.  
 — media 219.  
 — ramosa 219.  
 Platterbse, breitblättrige 337.  
 — flachblättrige 337.  
 — knollige 336.  
 — Sumpf- 337.  
 — verschiedenbl. 337.  
 — Wald- 336.  
 — Wiesen- 247, 336.  
 Plenkuer 430.  
 Pliocän 7.  
 Plumbaginaceae 188, 211.  
 Plumula 241.  
 Plutonische Gebirgsarten 49.  
 Poa 265.  
 — alpina 249.  
 — annua 249, 250, 285, 287.  
 — aquatica 93.  
 — bulbosa 285.  
 — compressa 286, 338, 339.  
 — dura 339.  
 — flabellata 287.  
 — nemoralis 286.  
 Poa palustris 286.  
 — pratensis 246, 249, 256, 287.  
 — serotina 249, 250, 286.  
 — trivialis 246, 249, 250, 286.  
 — vivipara 285.  
 Poaeoideae 259.  
 Podalyrieae 318.  
 Polder 67.  
 Polierschiefer 27.  
 Polycarpiceae 194.  
 Polycnenum arvense 192, 339.  
 — majus 192, 338.  
 Polygala amara 202.  
 — calcaria 202, 338.  
 — Chamaebuxus 338.  
 — comosa 338.  
 — vulgaris 202.  
 Polygalaceae 188, 202, 338.  
 Polygonaceae 187, 189.  
 Polygonales 187, 189.  
 Polygonum amphibium 190, 247.  
 — aviculare 190, 247.  
 — Bistorta 190.  
 — nodosum (lappathifolium) 190, 247.  
 — Persicaria 190, 247.  
 — tataricum 191.  
 — tomentosum 190.  
 Polyhalit 43.  
 Polykieselsäure 28, 29.  
 Polypetalae 186, 187.  
 Polythalamien 58.  
 Porosität 125.  
 Porphyr 50, 51, 76.  
 Porphyrboden 81.  
 Portulacaceae 187, 192.  
 Portulakgewächse 187, 192.  
 Porzellanerde 32.  
 Potamogeton 95.  
 — crispus 177.  
 — lucens 177.  
 — natans 177.  
 — pectinatus 177.  
 — perfoliatus 177.  
 Potamogetonaceae 175, 177.  
 Potentielle Energie 365.  
 Potentilla anserina 200.  
 — argentea 201.  
 — reptans 201.  
 — silvestris 201.  
 — Tormentilla 201.  
 Poterium officinale 200.  
 Primelgewächse 188.  
 Primitivböden 108.

- Primitive Bildungen 49.  
 — Periode s. Archaische Periode.  
 Primula elatior 211.  
 — farinosa 211.  
 — officinalis 211.  
 Primulaceae 188, 210, 339, 340.  
 Primulales 188, 210.  
 Prinzip des Archimedes 388.  
 Profilmessungen 426.  
 Prunus 199.  
 Psamma arenaria 276.  
 Pseudokoprolithe 42.  
 Pteridophyta 169, 171.  
 Puffbohne 334.  
 Pulicaria dysenterica 340.  
 Pulvererde s. Bettelerde.  
 Pyrit 45.  
 Pyroxen s. Augit.  
 Quadersandstein 6, 55.  
 Quartär-Formation 7.  
 Quarz 26.  
 Quarzite 6.  
 Quebben 97.  
 Quecke 246, 256, 298.  
 Queller 192.  
 Quellgras 266.  
 Quellsalz 86.  
 Quellsäure 86.  
 Quellungsvermögen 125.  
 Quendel, Feld- 214.  
 Querprofil, vorteilhaftestes für Gräben 412.  
 Rachenblütler 188.  
 Radischen 199.  
 Radikale 16.  
 Radius, mittlerer oder hydroaulischer 410.  
 Raigras 262, 300.  
 — englisches 245, 246, 249, 256, 301.  
 — französisches 244, 246, 250, 256, 265, 279.  
 — italienisches 246, 249, 256, 261, 302.  
 Rainfarn, gemeiner 225.  
 Ranales 188, 194.  
 Ranunculaceae 188, 195, 196, 338, 339.  
 Ranunculus acer 196.  
 — aquatilis 196.  
 — arvensis 196, 339.  
 — bulbosus 196.  
 — Flammula 196.  
 — Lingua 196.  
 Ranunculus repens 196.  
 — sceleratus 196.  
 RaphanusRaphanistrum 199.  
 — sativus 199.  
 Raps 198.  
 Rasen 245.  
 Raseneisenstein 42, 46.  
 Rasentorf 93.  
 Raubblättrige Gewächse 188.  
 Raubblättrige Pflanzen 213.  
 Rauhgigkeitsgrade 410, 412.  
 Raunkensenf, gebräuchl. 198.  
 Reaktion, alkalische 20.  
 — saure 21.  
 Rebendolde 205, 209.  
 Reduktion 19, 91.  
 Reduktionsprozefs 44, 90.  
 Reet (Dachrohr) 93.  
 Regenwürmer, bodenbildende Tätigkeit 86.  
 Reichenbach 422.  
 Reis 267.  
 Reisgräser 259, 267.  
 Resultante 370.  
 Rettich, Acker- 199.  
 Rhizobium 82.  
 Rhizom 244.  
 Rhoadales 188, 196.  
 Ried 93, 94.  
 — einbälziges 305.  
 — Sumpf- 305.  
 Riedgras 93.  
 Riesentöpfe 65.  
 Rispen 252.  
 Rispenährengräser 261, 263.  
 Rispengras 250, 261, 264, 265.  
 — einjähriges 285.  
 — gemeines 245, 246, 256, 286.  
 — Hain- 286.  
 — knolliges 256.  
 — spätes 256, 286.  
 — Sumpf- 286.  
 — Wiesen- 246, 256, 287.  
 — zusammengedr. 286.  
 — zwiebeliges 285.  
 Roggen 260, 262.  
 — gemeiner 299.  
 — Strand- 276, 299.  
 Röhren aus Holz 406.  
 — Darcys Versuche 405.  
 — Eintrittswiderstand 403, 404.  
 — für Wasserdurchfluß 402.  
 — Krümmungswiderstand 407, 408.  
 Röhren, lange 406.  
 — Reibung 403.  
 Röhrenblütige 212.  
 Rohrglanzgras 246, 256.  
 Rohrkolben 93.  
 — breitblättriger 175.  
 — schmalblättriger 175.  
 Rohrkolbengewächse 174, 175.  
 Rohrtorf 95.  
 Rohton 121.  
 Rosa 199.  
 Rosaceae 188, 199, 338, 339.  
 Rosales 188, 199.  
 Rösche 409.  
 Rosengewächse 188.  
 Rofskümmel 209.  
 Röt 59.  
 Rotliegendes 6.  
 Roter Heinrich 192.  
 Rubiaceae 189, 220, 339.  
 Rubiales 189, 219.  
 Rüben 198.  
 Rubus saxatilis 338.  
 Ruchgras 246, 263.  
 — begranntes 269.  
 — echtes 269.  
 — Puels 269.  
 Rückstau-Berechnung 416.  
 Ruhrkraut, Sumpf- 224.  
 Rumex acetosa 189.  
 — acetosella 189.  
 — crispus 190.  
 — conglomeratus 190.  
 — Hydrolapathum 190.  
 — obtusifolius 190.  
 Runkelrübe 191.  
 — Futter- 191.  
 — Speise- 191.  
 — Zucker- 191.  
 Rutaceae 338.  
 Sagittaria sagittifolia 179.  
 Salat, genießbarer 230.  
 — wilder 230.  
 Salbei 214.  
 Salicornia herbacea 192, 339.  
 Salpetersäure 91.  
 Salpetersaure Salze 26, 48.  
 Salsola Kali 192.  
 Salvia pratensis 214.  
 Salzbildner 25.  
 Salze 19.  
 Salzgebirge s. Trias-Formation.  
 Salzkraut, gemeines 192.  
 Salzpflanzen 339.

- Samen, Gebrauchswert 340.  
 — Mischungen 340, 341 bis 351.  
 Samenanlage 255.  
 Sand 54, 121.  
 Sandböden 110, 112, 144, 156.  
 Sanddeckkultur s. Dammkultur.  
 Sande, vulkanische 54.  
 Sandgras 276.  
 Sandhalm 263, 276.  
 Sandigen Lehm liebende Pflanzen 339.  
 Sandmergel 59.  
 Sandmischkultur (Niederländische Moorkultur) 163.  
 Sandstein 6, 54, 55.  
 Sandwehen 69.  
 Sanguisorba officinalis 200.  
 — minor 200, 338.  
 Sanidin 30, 33, 34.  
 Saprophyten 170.  
 Sarrothamnus scoparius 319.  
 Saubohne 335.  
 Saudistel 230.  
 Sauerampfer 189.  
 — kleiner 189.  
 Sauerstoff 9, 10.  
 Sauerstoffsäuren 25.  
 Säuren 12, 19.  
 Saxifraga Aizoon 338.  
 — caesia 338.  
 — granulata 199.  
 — tridactylites 339.  
 Saxifragaceae 188, 199, 339.  
 Scabiosa Columbaria 222.  
 Scabiose, Tauben- 222.  
 Scandix Pecten Veneris 338, 339.  
 Schachtelhalm 171, 172.  
 — Acker- 247.  
 — Sumpf- 247.  
 Schafgarbe 225, 247.  
 Schaumkraut, bitteres 197.  
 — Wiesen- 197.  
 Scheinähren 252.  
 Scheinährengräser 261.  
 Scheingräser 181.  
 Schellblume 185.  
 Scheuchzeria palustris 178.  
 Scheuchzeriartorf 99, 102.  
 Schiefertone 6, 56, 57.  
 Schierling, Garten- 205, 208.  
 — gefleckter 206, 208.  
 — Wasser- 205, 208.  
 Schiffchen der Schmetterlingsblüte 311.  
 Schilf 93.  
 Schilfrohr 265.  
 — gem. 283.  
 — gewürztes 181.  
 Schifftorf 95.  
 Schimmelkraut 224.  
 Schindermann 281.  
 Schizomycetes 170.  
 Schizophyta 169, 170.  
 Schlämmanalyse 122.  
 Schlämmapparat 122.  
 Schlammflaschen 122.  
 Schlammtofr 95.  
 Schlammzylinder 122.  
 Schleim-Lagerpflanzen 169.  
 Schleimpilze 170.  
 Schlengen 100.  
 Schlepp 54.  
 Schlick 56.  
 Schluffsand s. Schlepp.  
 Schlüssel, künstlicher 261.  
 Schmele 249, 265, 280.  
 — Draht- 281.  
 — geschlängelte 281.  
 — Rasen- 256, 281.  
 — gebogene 256.  
 — graue 256.  
 Schmetterlingsblütler } 82.  
 Schmetterlingsblütner } 311.  
 Schmiele s. Schmele.  
 Schneckenke, kleinster 322.  
 Schönit 43.  
 Schörl s. Turmalin.  
 Schotendotter, wohlriechender 198.  
 Schotter 7, 53.  
 Schotterböden 156.  
 Schubfestigkeit 380.  
 Schutt 53.  
 Schuttböden 156.  
 Schütze, Kraft zum Aufziehen 392.  
 — Ausflusskoeffizienten 399.  
 Schwaden 250.  
 — -gras 288.  
 — -grütze 288.  
 — flutender 256.  
 — Frankfurter 288.  
 — Wasser- 256, 287.  
 Schwalbenwurz 212.  
 Schwanenblume 179.  
 Schwarzerde 161.  
 Schwarzwurz 213.  
 Schwefel-Calcium 44.  
 Schwefeleisen 165.  
 Schwefelkies 45, 71.  
 Schwefelmetalle 26, 45.  
 Schwefelsaure Salze 26, 43, 72.  
 Schwefelwasserstoff 45.  
 Schweinekraut 181.  
 Schweineuhr (Schweineohr) 181.  
 Schwemmboden s. Derivatboden.  
 Schwere Lehme s. Strenge Lehme.  
 Schwerer Boden 123.  
 Schwerpunkt 376, 377, 378.  
 Schwertlilie 185.  
 Schwimmende Körper 389.  
 Schwimmer, Beobachtungen 419.  
 Schwingel 246, 266.  
 — rohrartiger 293.  
 — Rot- 246, 256, 294.  
 — Schaf- 246, 256, 294.  
 — verschiedenblättriger 256, 293.  
 — Wiesen- 246, 256, 292.  
 Schwingelschilf 266.  
 Scirpus 93, 100.  
 — caespitosus 305.  
 — lacustris 305.  
 — palustris = Heleocharis palustris 305.  
 — parvulus 339.  
 — radicans 305.  
 — rufus 339.  
 — silvaticus 305.  
 Scleranthoideae 193, 194.  
 Scleranthus annuus 194.  
 — perennis 194.  
 Sclerochloa dura 339.  
 Scolochloa festuacea 266.  
 Scrophularia alata 216.  
 — aquatica 216.  
 Scrophulariaceae 188, 216, 339.  
 Scutellaria galericulata 215.  
 Secale 262.  
 — cereale 299.  
 — montanum 299.  
 Sedimentärgesteine 49, 53.  
 Seegras 177.  
 Seeklei 61.  
 Seemarschboden 67.  
 Seerose, gelbe 194.  
 — weiße 194.  
 Seerosengewächse 188, 194.  
 Seeschlick 61.  
 Segge 93.  
 — abweichende 308.  
 — Blasen- 310.  
 — cypergrasähnliche 310.

- Segge, einährige 307.  
 — Flaschen- 310.  
 — fuchsbraune 308.  
 — gemeine 309.  
 — gelbe 309.  
 — gleichährige 307.  
 — geschnäbelte 310.  
 — hirseartige 309.  
 — kurzhaarige 309.  
 — Loire- 308.  
 — rasige 309.  
 — rauhaarige 247.  
 — rispige 308.  
 — Sand- 308.  
 — sperrfrüchtige 308.  
 — spitzkantige 309.  
 — steife 308.  
 — Sumpf- 310.  
 — Ufer- 310.  
 — verschiedenährige 308.  
 Seggentorf 95.  
 Seidenpflanzengewächse 212.  
 Seitenkräfte 370.  
 Seitenmoränen 66.  
 Seitentriebe, extravaginale 245.  
 — intravaginale 245.  
 Sekundäre Bildungen 49.  
 Sekundenkilogrammter 364.  
 Selinum 205.  
 Senecio aquaticus 226.  
 — campester 339.  
 — Jacobaea 226.  
 — paluster 226.  
 — vernalis 226.  
 — vulgaris 226.  
 Senf, Acker- 198.  
 — schwarzer 198.  
 Septarienmergel 59.  
 Serpentin 32, 33, 35, 73.  
 Serradella 331.  
 Serratula tinctoria 227.  
 Seseli Hippomarathrum 338.  
 Sesquioxid 29, 31.  
 Sesleria 263.  
 — coerulea 249, 285, 338.  
 Seslerie 263.  
 — blaue 249, 256, 285.  
 Setaria 263.  
 — glauca 266.  
 — viridis 266.  
 Sherardia arvensis 220, 339.  
 Sherardie, Acker- 220.  
 Sichelklee 323.  
 Sickerwässer 152.  
 Sieglingia 265.  
 — decumbens 250, 283.  
 Sieglingie 265, 283.  
 Silau 205.  
 Silaus pratensis 205.  
 Silbergras 265.  
 — graues 281.  
 Silene inflata 193.  
 — noctiflora 339.  
 — venosa 192.  
 — vulgaris 192.  
 Silenoideae 192, 193.  
 Siliciumdioxid 26.  
 Silikate s. Kieselsaure Salze.  
 Silje 205.  
 Silurische Formation 6.  
 Silurkalk 58.  
 Simse 93.  
 Singulosilikat 28.  
 Sisymbrium officinale 198.  
 Sium 206.  
 — angustifolium 208.  
 — latifolium 209.  
 Sklerenchym 248.  
 Sklerenchymstränge 248.  
 Skolezit 32, 33, 35, 36.  
 Sodalith 31, 33, 34, 36.  
 Sohle 408.  
 Solanaceae 188, 216.  
 Solanum nigrum 216.  
 — tuberosum 216.  
 Sombrero-Phosphat 42.  
 Sommephosphat 42.  
 Sonchus arvensis 231, 247.  
 — asper 231.  
 — oleraceus 230.  
 — paluster 231.  
 Sondierstange 427.  
 Sophoreae 318.  
 Sorghum vulgare 266.  
 Spaltalgen 170.  
 Spaltpflanzen 169.  
 Spaltpilze 170.  
 Spannung 380.  
 — zulässige 380, 386.  
 Spateisenstein 39.  
 Spätförste 162.  
 Spathiflorae 175, 181.  
 Spatsand 54.  
 Sparganiaceae 174, 176.  
 Sparganium ramosum 176.  
 — simplex 176.  
 Spark 194.  
 Speckstein s. Talk.  
 Specularia Speculum 222, 338.  
 Spelz 298.  
 Spelzblütige 181, 258.  
 Spelze, Deck- 251, 253.  
 — Hütl- 253.  
 — innere 252, 253.  
 — obere 252, 253.  
 — untere 251, 253.  
 — Vor- 252, 253.  
 Spergula arvensis 194.  
 Spergularia media 339.  
 — salina 339.  
 Sphagnum 101, 171.  
 Sphärosiderit 39.  
 Spierstaude, knollige 200.  
 — Sumpf- 200.  
 — ulmenblättrige 200.  
 Spinacia oleracea 192.  
 Spinat 192.  
 Spiraea Ulmaria 200.  
 Spitzsamen 269.  
 Splittlagen 99.  
 Sporenpflanzen 169.  
 Spörgel 194.  
 Sprosse 251.  
 Stachys arvensis 339.  
 — palustris 215.  
 Stalagmiten 38.  
 Stalaktiten 38.  
 Staub 121.  
 Stauweite 416.  
 Stechginster 319.  
 Steifhalm, blauer 289.  
 Steinböden 112, 156.  
 Steinbrech, körniger 199.  
 Steinbrechgewächse 188.  
 Steinklee, gebräuchlicher 323.  
 — hoher 323.  
 — langwurzeliger 323.  
 — weißer 324.  
 Steinkohle 82.  
 Steinkohlen-Formation 6.  
 Steinsalz 6, 47.  
 Steinsame, gebräuchlicher 213.  
 Stellaria glauca 194.  
 — graminea 194.  
 — media 194.  
 — palustris 194.  
 Stengel der Monokotyledonen, mechan. Prinzip im Bau 247.  
 Stenophragma Thalianum 198.  
 Stereomring 248.  
 Sternoldie, grosse 205.  
 Sternmiere 194.  
 Stiefmütterchen 203.  
 Stilbit 32, 33, 35, 36.

- Stirnmoränen s. Endmoränen.  
 Stolonen 245.  
 — oberirdische 245.  
 — unterirdische 245.  
 Storchschnabel 202.  
 Storchschnabelgewächse 188, 202.  
 Strahlkies s. Markasit.  
 Strandhafer 69, 276.  
 Strandroggen 276.  
 Stratiotes 96.  
 — aloides 180.  
 Stratiotoideae 180.  
 Straußgras 265.  
 — gemeines 246, 249, 256, 275.  
 — Hunde- 249.  
 — weißes 249.  
 — weißliches 274.  
 Strenge Lehme 159.  
 Strenze 205.  
 Strohblume 224.  
 Struktur 50, 76, 123.  
 Suaeda maritima 339.  
 Succisa pratensis 222.  
 Sulfate s. Schwefelsaure Salze.  
 Sulfide s. Schwefelmetalle.  
 Sulfuryl 22.  
 Sumpferz 46.  
 Sumpfgas 16, 90.  
 Sumpf-Heide 210.  
 Sumpfkraut 181.  
 Sumpffrprimel 211.  
 Sumpftorf 95.  
 Sumpfiest 215.  
 Supraaquatische Moore 94.  
 Süßgras 251.  
 — gefaltetes 288.  
 — flutendes 249.  
 Süßwasserquarz 27.  
 Syenit 51, 52.  
 Sylvin 47.  
 Symbol (chemisches) 14.  
 Sympetalae 187, 188, 209.  
 Symphytum officinale 213.  
 Taldiluvium 7, 8.  
 Talk 32, 33, 35, 36.  
 Talsand 7.  
 Talton 7.  
 Tanacetum vulgare 225.  
 Tange 170.  
 Tünnelgewächse 188.  
 Tannenwedel 204.  
 Taraxacum officinale 229.  
 Tätige Böden 157.  
 Taubenbohne 335.  
 Taubenkropf, aufgeblasener 193.  
 — gemeiner 193.  
 Taubnessel, rote 214.  
 — weisse 214.  
 Taumantel, gem. 200.  
 Tausendblatt 204.  
 Tausendblattgewächse 188.  
 Tausendgüldenkraut, gem. 212.  
 — niedliches 212.  
 — schmalblättriges 212.  
 Terebratelkalk 58.  
 Tertiär-Formation 7.  
 Tetragonolobus siliquosus 340.  
 Teucrium Botrys 215, 339.  
 — Chamaedrys 215, 339.  
 — montanum 216, 339.  
 — Scordium 215.  
 Teufelsabbiss 222.  
 Teufelskralle 222.  
 Thallophtya 169, 170.  
 Thlaspi arvense 339.  
 — perfoliatum 339.  
 Thrinicia hirta 340.  
 Thymian, gewöhnl. 214.  
 — Stein- 214.  
 Thymus Serpyllum 214.  
 — vulgaris 214.  
 Thysselinum palustre 209.  
 Tillaea muscosa 339.  
 Timotheegrass 246, 256, 272.  
 Tofieldia calyculata 338.  
 Ton 6, 56, 57.  
 Tonböden 110, 112, 144, 158.  
 Tongesteine 56.  
 Tonmergel 59.  
 Tonmineralien 32, 38.  
 Tonpflanzen 339.  
 Tonschiefer 6, 56, 57, 81.  
 Tonschieferböden 107.  
 Torf 91.  
 — weisser 102.  
 Torfcarnallit 47.  
 Torfkainit 47.  
 Torfleber s. Lebertorf.  
 Torfmoos 93, 99.  
 Torfmoose 171.  
 Torfatreu 102.  
 Torsionsfestigkeit 386.  
 Trachyt 50, 51.  
 Trägheitsmoment 382.  
 Tragmodul 379.  
 Tragopogon major 229.  
 — pratensis 229.  
 — porrifolius 229.  
 Transport 64.  
 Traube (Blütenstand) 252.  
 Travertin 58.  
 Trespe 249, 266.  
 — Acker- 297.  
 — aufrechte 246, 249, 256, 296.  
 — grannenlose 246, 296.  
 — Roggen- 295.  
 — traubenförmige 295.  
 — unbewehrte 246.  
 — weiche 295.  
 Trias-Formation 6.  
 Trifoliceen 318, 320, 324.  
 Trifolium agrarium 327.  
 — alpestre 325.  
 — arvense 325.  
 — elegans 327.  
 — filiforme 328.  
 — fragiferum 326, 340.  
 — hybridum 327.  
 — incarnatum 325.  
 — medium 326.  
 — minus 328.  
 — montanum 326.  
 — pannonicum 325.  
 — pratense 324, 325.  
 — — pratarum 325.  
 — — sativum 325.  
 — procumbens 328.  
 — repens 326.  
 — rubens 326.  
 — striatum 339.  
 Trift-Theorie 68.  
 Triglochin maritima 177, 339.  
 — palustris 17, 178.  
 Triodia decumbens 250.  
 Tripel 27.  
 Trisetum flavescens 246, 249, 278.  
 Triticum amyleum 298.  
 — caninum 299.  
 — compactum 298.  
 — dicoccum 298.  
 — durum 298.  
 — monococcum 298.  
 — polonicum 298.  
 — repens 246, 262, 298.  
 — Spelta 298.  
 — turgidum 298.  
 — vulgare 297.  
 Tropfstein 38.  
 Tubiflorae 188, 212, 223.  
 Tuff 54.  
 Tuffböden 156.  
 Tunica prolifera 338.  
 Türkischer Weizen 266.

- Turmalin 32, 33, 35, 36, 37.  
 Turmkrant, glattes 197.  
 Turrilis glabra 197.  
 Tussilago Farfara 226, 247, 339.  
 Tussock- oder Tussack-Gras 287.  
 Typha 93.  
 — angustifolia 175.  
 — latifolia 175.  
 Typhaceae 174, 175.  
 Überfälle in dünner Wand 399 bis 402.  
 Übergangsmoorboden 144.  
 Übergangsmoore 94, 98, 106.  
 Übergangstorf 99.  
 Übergangswaldturf 99.  
 Überkleien 79.  
 Übersicht des Pflanzenreichs 169.  
 Überwassermoore 94.  
 Uferlinien 408.  
 Ulex europaeus 319.  
 Ulmin 86.  
 Umbelliferae 188, 339, 340.  
 Umbelliferen, kulturtechnisch wichtige 206.  
 Umbelliflorae 188, 204.  
 Untergrund 3.  
 Untergrundkalkung 105.  
 Unterwassermoore 94.  
 Ur 55.  
 Urgebirgsarten 49, 50.  
 Urkalk 58.  
 Urtica dioica 247.  
 Utricularia vulgaris 218.  
 Utriculariaceae 218.  
 Vaccaria parviflora 339.  
 — Vaccaria 339.  
 Vaccinium Oxycoccus 100.  
 Valenz der Elemente 16.  
 Valeriana dioica 221.  
 — officinalis 221.  
 Valerianaceae 189, 220, 339.  
 Valerianella olitoria 221.  
 — rimosa 339.  
 Vallisneria spiralis 179.  
 Vallisneriorideae 179.  
 Vegetationsformen 234.  
 Veilchen, Sumpf- 203.  
 Veilchengewächse 188, 203.  
 Venn 94.  
 Ventil, Hebungskraft 390.  
 Verbrennung 19.  
 Vergiftsmeynnicht, rasiges 213.  
 — Sumpf- 213.  
 Verkohlung 89.  
 Verkürzungskoeffizient 379.  
 Verlegung von Angriffspunkten 370.  
 — von Kräftepaaren 373.  
 Vermoderung 89.  
 Veronica agrestis 339.  
 — Anagallis 217.  
 — Beccabunga 217.  
 — Chamaedrya 217.  
 — hederifolia 217.  
 — longifolia 217.  
 — officinalis 217.  
 — opaca 217, 339.  
 — polita 217, 339.  
 — praecox 217, 339.  
 — scutellata 216.  
 — spicata 217.  
 — Teucrium 217.  
 — Tournefortii 217, 339.  
 — triphyllus 339.  
 Verschwemmung 64.  
 Versetzung einer Kraft 375.  
 Vertorfung 91.  
 Verwandtschaftseinheit s. Valenz.  
 Verwehung 64.  
 Verwesung 84.  
 Verwitterung 70.  
 — einfache 70.  
 — komplizierte 74, 80.  
 Verwitterungsboden 108.  
 Verwitterungsschicht 101.  
 Verzögerung 360.  
 Vicia angustifolia 335.  
 — Cracca 333.  
 — Faba 335.  
 — sativa 334.  
 — sepium 247, 334.  
 — tenuifolia 333.  
 — varia 334.  
 — villosa 333.  
 Viciae 319, 333.  
 Vincetoxicum officinale 212, 338, 339.  
 Viola mirabilis 338.  
 — palustris 203.  
 — tricolor 203.  
 Violaceae 188, 203, 338.  
 Vivianit 42, 96, 97.  
 Vogelfuß, gebauter 331.  
 — kleinster 331.  
 Vogelmiere 194.  
 Volumgewicht 145.  
 Volumverhältnisse 127.  
 Vorblätter 251.  
 Wachtelweizen, Acker- 218.  
 — Hain- 218.  
 — Wiesen- 218.  
 Waldboden 3.  
 Waldbrustwurz 209.  
 Waldkerbel 207.  
 Waldmeister 220.  
 Waldturf 94.  
 Wandständige 188.  
 Warme Böden 157.  
 Wasseralee 180.  
 Wasserblüte 182, vergl. Cyanophyceae 170.  
 Wasserbreite 409.  
 Wasserdost 223, 224.  
 Wasserdruck, Fortpflanzung 388.  
 — am Boden 390.  
 — an lotrechten Wänden 391.  
 — an geneigten 392.  
 Wasserfäden 169, 170.  
 Wasserfenchel 209.  
 Wassergeschwindigkeit 427.  
 — Berechnungen 410, 411, 412.  
 — Messungen 419, 420, 423, 427.  
 Wassergras, schlaffes 266.  
 Wasserhelme 218.  
 Wasserkapazität 125.  
 Wasserliesch 179.  
 Wasserlinse 182.  
 — buckelige 182.  
 — dreifurchige 182.  
 — kleine 182.  
 — vielwurzelige 182.  
 Wassermenge, Berechnung 409.  
 — aus Flußgebiet 430.  
 Wassernabel, gem. 205.  
 Wasserpest 180.  
 Wasserrübe 198.  
 Wasserschlauch, gem. 218.  
 Wasserschlachgewächse 218.  
 Wasserspiegel 408.  
 Wasserstoff 9.  
 Wasserstoffsäuren 25.  
 Watten 67.  
 Wawellit 42.  
 Wealden-Formation 6.  
 Wechsellagerung 40.  
 Wegebreit, großer 219.  
 — kränfußartiger 219.

- Wegebreit, lanzettlicher 219.  
 — Strand- 219.  
 Wegerich, Spitz- 219.  
 Wegerichgewächse 189.  
 Wegwarte 228.  
 Wehr (Moor) 94.  
 Welle, Berechnung 386.  
 Weiden, Dauer- 246.  
 Weidenröschen 208.  
 Weiderich 203.  
 Weingaertneria 265.  
 — canescens 281.  
 Weizen, Bart- 297.  
 — bauchiger 298.  
 — gemeiner 297.  
 — Hart- 298.  
 — Hunds- 299.  
 — Kolben- 297.  
 — kriechender 298.  
 — polnischer 298.  
 — Rauh- 298.  
 — Zwerg- 298.  
 Wetterdistel 227.  
 Wermut 226.  
 Wertigkeit der Elemente  
 s. Valenz der Elemente.  
 Wicke, bunte 334.  
 — feinblättrige 333.  
 — gebaute 334.  
 — schmalblättrige 335.  
 — Vogel- 333.  
 — Zaun- 247, 334.  
 — zottige 332.  
 Wicklinse 335.  
 Widerstandshöhe 396.  
 Widerstandsmoment 382.  
 — eines Rechtecks 383.  
 — eines Doppel-T-Quer-  
 schnitts 383.  
 — eines U-Querschnitts  
 384.  
 Wiesen, Begriff 235.  
 — Bestandteile 236.  
 — Entstehung 235.  
 Wiesen, Erträge derselben  
 u. der einzelnen Futter-  
 pflanzen 351—354.  
 — Pflege 351.  
 — Typen 236—239.  
 Wiesenboden 3.  
 Wiesenerz 46.  
 Wiesenhafer 279.  
 Wiesenhaferwurz 229.  
 Wiesenkalk 7, 8, 58.  
 Wiesenknopf, gem. 200.  
 — kleiner 200.  
 Wiesenkönigin 200.  
 Wiesenmangel 58, 95.  
 Wiesenton 56.  
 Wiesentorf 93.  
 Windblüher 255.  
 Winde, Acker- 213.  
 — Zaun- 213.  
 Windengewächse 188.  
 Windhalm 265, 275.  
 Winterkresse 197.  
 Wirkungsgrad 367.  
 Wohlverleih, Berg- 226.  
 Wolffia arrhiza 182.  
 Wolfsbohne 319.  
 Wolfsfuß 214.  
 Wolfsmilch, zypressenartige  
 203.  
 Wolfsmilchgewächse 188.  
 Wolfstrapp 214.  
 Wollgras 93, 99.  
 — breitblättriges 306.  
 — scheidiges 306.  
 — vielähriges 306.  
 Wollkletten 322.  
 Woltmann'scher Flügel 423.  
 Wruke 198.  
 Wucherblume, gelbe 223,  
 225.  
 — Saat- 225.  
 — weiße 225.  
 Wühlen (Kuhlen) 79.  
 Wühlerde s. Kuhlerde.  
 Wurzelanlage 241.  
 Wurzelhärchen 242.  
 Wurzelhaube 242.  
 Wurzelhöschen 242.  
 Wurzelknöllchen 82.  
 Wurzelscheide 241.  
 Wurzelstock 244.  
 Zähle Lehme siehe Strenge  
 Lehme.  
 Zapfenträger 173.  
 Zea Mays 261, 266.  
 Zechstein-Formation 6.  
 Zeichen, Erklärung der bo-  
 tanischen 173.  
 Zellulose 87.  
 Zentralsamige 187.  
 Zeolithe 30, 32, 35, 37, 75,  
 121, 149.  
 Zerreißen 379.  
 Zertrümmerung 64.  
 Ziegenfuß 205.  
 Zittergras 265.  
 — mittleres 249, 256, 285.  
 Zostera marina 177.  
 Zugfestigkeit 379.  
 Zugkraft 362.  
 Zulässige Spannungen 380,  
 386.  
 Zungenblütige 228.  
 Zusammendrückbarkeit des  
 Wassers 388.  
 Zusammengesetztblütige  
 223.  
 Zweifachschwefeleisen 45,  
 79.  
 Zweikeimblättrige 169,  
 187.  
 Zweikorn 298.  
 Zweizahn, dreiteiliger 224.  
 — nickender 224.  
 Zwenke 249, 263.  
 — gefiederte 297.  
 — Wald- 297.  
 Zwitter 254.  
 Zwitterblüten 261.



---

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse 10.

---

## **Grundlehren der Kulturtechnik.**

**Zweite, erweiterte Auflage.**

Unter Mitwirkung von

**Dr. Fleischer**, Prof., Geh. Ober-Reg.-Rat zu Berlin, **Gerhardt**, Geh. Baurat zu Berlin, **Dr. Gieseler**, Prof., Geh. Reg.-Rat zu Poppelsdorf, **Dr. Freiherrn v. d. Golts**, Geh. Reg.-Rat, Professor zu Bonn, **Grants**, Reg.- u. Baurat zu Berlin, **Hüser**, Oberlandmesser zu Kassel, **Mahraun**, Reg.-Rat zu Kassel, **Schlebach**, Oberfinanzrat zu Stuttgart, **Dr. Wittmack**, Geh. Reg.-Rat, Prof. zu Berlin,

herausgegeben von

**Dr. Ch. August Vogler**,

Geh. Regierungsrat, Prof. an der landw. Hochschule zu Berlin.

**II. Band: Kameralistischer Teil.**

*Mit 18 Textabbildungen und 7 Tafeln. Gebunden, Preis 13 M.*

Der zweite Band behandelt den kameralistischen Teil der Kulturtechnik und wird eingeleitet durch einen Abriss der landwirtschaftlichen Betriebslehre. Ihm folgt ein Abschnitt „Das preussische Auseinandersetzungswesen“, der dem Kulturtechniker in dem trefflich geschilderten Wege- und Grabennetz eine Fülle direkt verwertbaren Materials bringt. Gewissermassen eine Fortsetzung dieses Abschnittes bildet das Kapitel „Meliorationswesen in Süddeutschland, Oesterreich und der Schweiz“. Der letzte Abschnitt behandelt schliesslich die Rechts- und Gesetzeskunde.

---

## **Geodätische Übungen**

**für Landmesser und Ingenieure.**

**Von Dr. Ch. A. Vogler**,

Geh. Regierungsrat, Prof. an der landw. Hochschule zu Berlin.

**Zweite, erweiterte Auflage.**

**Erster Teil: Feldübungen.**

*Mit 56 Textabbildungen. Gebunden, Preis 9 M.*

**Zweiter Teil: Winterübungen.**

*Mit 25 Textabbildungen. Gebunden, Preis 5 M. 50 Pf.*

---

## **Ausbildung und Prüfung der preussischen Landmesser und Kulturtechniker.**

**Verordnungen und Erlasse**

zusammengestellt im Auftrage des

**Königl. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.**

*Zweite, durchgesehene Auflage. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.*

---

## **Übungsbuch für die Anwendung der Ausgleichsrechnung**

nach der

**Methode der kleinsten Quadrate auf die praktische Geometrie.**

**Von E. Hegemann**,

Professor an der landw. Hochschule zu Berlin.

*Mit 37 Textabbildungen. Gebunden, Preis 5 M.*

---

## **Das topographische Zeichnen.**

**Eine Sammlung von zwölf Musterblättern.**

Zusammengestellt von

**E. Hegemann**,

Professor an der landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin.

*Mit 12 Tafeln. Gebunden, Preis 5 M.*

---

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

---



---

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse 10.

---

## **Die Zusammenlegung der Grundstücke**

nach dem preussischen Verfahren.

**Zum Gebrauche für Landwirte, Landmesser und Kulturtechniker, sowie Studierende der Landwirtschaft und Kulturtechnik.**

Bearbeitet von **A. Hüser**, Königl. preussischer Vermessungsrevisor und Kulturtechniker.

*Mit 18 eingedruckten Abbildungen. Preis 5 M.*

---

## **Die Veranschlagung und Verdingung von Bauarbeiten in Zusammenlegungssachen.**

Zum praktischen Gebrauch für

Vermessungsbeamte der landw. Verwaltung, Wegebau- und Meliorationstechniker

bearbeitet von **E. Deubel**, Landmesser und Kulturtechniker.

*Mit 7 Textabbildungen. Gebunden, Preis 7 M.*

---

## **Die Bodeneinschätzung**

unter besonderer

**Berücksichtigung der bei Preussischen General-Kommissionen**  
hieriüber erlassenen Bestimmungen.

Für die Beamten der General-Kommissionen, Landmesser,  
Kreiseinschätzer, Landwirte

zusammengestellt von **Thilo Eichholtz**, Königl. Landmesser in Lippstadt.

*Mit 11 Textabbildungen und 2 Tafeln. Gebunden, Preis 7 M. 50 Pf.*

---

## **Bodenreform und neue Grundsteuerveranlagung.**

Ein Beitrag zur Hilfe für die Landwirtschaft.

Von **Thilo Eichholtz**, Königl. Landmesser in Lippstadt.

*Preis 1 M. 20 Pf.*

---

## **Der Landmesser im Städtebau.**

Praktisches Handbuch

**zur sachgemässen Erledigung aller landmesserischen Geschäfte**  
**im Gemeindedienst.**

Von **Alfred Abendroth**, Städtischer Oberlandmesser in Hannover.

*Mit 4 Tafeln und 27 Textabbildungen. Gebunden, Preis 9 M.*

---

## **Anleitung für Landmesser-Zöglinge**

zur praktischen Ausführung von

**Feldarbeiten.**

Bearbeitet von **M. Friedersdorff**, Königl. Oberlandmesser in Leobschütz.

*Mit 93 Textabbildungen. Gebunden, Preis 4 M. 50 Pf.*

---

**Zeitschrift**

für die

## **Landeskultur-Gesetzgebung der Preussischen Staaten.**

Herausgegeben von dem **Königlichen Ober-Landeskulturgericht.**

*XXXV. Band. Preis 6 M.*

---

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

---

---

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse 10.

---

# Kulturtechnischer Wasserbau.

## Handbuch für Praktiker und Studierende

von

**Adolf Friedrich,**

o. ö. Professor an der k. k. Hochschule für Bodenkultur in Wien.

Mit 602 Textabbildungen und 32 Tafeln.

*Gebunden, Preis 28 M.*

Trotz der erschöpfenden Behandlung des Stoffes ist die Anordnung dieses Werkes eine so übersichtliche, die Fassung eine so kurze, dass es sich sowohl für den praktischen Kulturingenieur als passendes Handbuch, wie auch für den Studierenden als leicht fassliches Lehrbuch vortrefflich eignet. Es werden nacheinander behandelt die allgemeine Bodenmeliorationslehre, Erdbau, Bodenentwässerung und Bodenbewässerung. Eine sehr eingehende Behandlung finden die Abschnitte: Stauweiherbauten (Talsperre und Reservoirs), die Wasserversorgung der Ortschaften, die Entwässerung der Ortschaften und Reinigung der Abwässer. Zum Schluss werden die Pläne und Kostenanschläge einer Reihe von Ent- und Bewässerungsanlagen ausführlich dargelegt, und zahlreiche, sämtlich der Praxis entnommene Illustrationen, sowie vortrefflich gezeichnete Tafeln und Pläne tragen sehr zur Erleichterung des Verständnisses bei.

---

# Wildbachverbauungen

und

## Regulierung von Gebirgsflüssen

von

**E. Dubislav,**

Kgl. Meliorationsbauinspektor in Frankfurt a. O.

Mit 29 Plänen, 22 Lichtdrucktafeln und 139 Textabbildungen.

*Gebunden, Preis 40 M.*

Infolge Beteiligung an der im Jahre 1900 von der technischen Hochschule zu Berlin ausgeschriebenen Bewerbung um das Stipendium der Louis Boissonet-Stiftung wurde dem Verfasser von der Hochschule der Auftrag, über Wildbachverbauungen und die Regelung von Gebirgswässern in der Schweiz und in den angrenzenden österreichischen und süddeutschen Ländern auf Grund örtlicher Beobachtungen Bericht zu erstatten. Dieser Bericht ist in vorliegendem Werk niedergelegt, und wird das Thema in erschöpfender Weise an der Hand von zahlreichen Beispielen aus der Schweiz, Oberbayern und Österreich behandelt.

---

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

---

---

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse 10.

---

## **Erkennen und Bestimmen der Wiesengräser.**

Anleitung für  
**Land- und Forstwirte, Landmesser, Kulturtechniker und Boniteure,**  
sowie zum Gebrauch an  
landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten.

Von

**Dr. W. Strecker,**

Professor an der Universität Leipzig.

**Dritte, neubearbeitete Auflage.**

*Mit 68 Textabbildungen. Kartonniert, Preis 2 M. 25 Pf.*

---

## **Erkennen und Bestimmen der Schmetterlingsblütler**

(Papilionaceen, kleeartigen Gewächse).

Anleitung für  
**Land- und Forstwirte, Kulturtechniker, Landmesser und Boniteure,**  
sowie zum Gebrauch an allen  
landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten.

Von

**Dr. W. Strecker,**

Professor an der Universität Leipzig.

*Mit 107 Textabbildungen. Kartonniert, Preis 3 M.*

---

## **Landwirtschaftliche Taxationslehre.**

Von

**Dr. Th. Freiherr von der Goltz,**

Geh. Reg.-Rat, o. ö. Professor, Direktor der landwirtschaftlichen Akademie zu Poppelsdorf.

**Zweite, umgearbeitete Auflage.**

*Gebunden, Preis 14 M.*

---

## **Praktische Bodenkunde.**

Anleitung zur  
**Untersuchung, Klassifikation und Kartierung des Bodens.**

Von

**Dr. Anton Nowacki,**

Professor der Landwirtschaft am Polytechnikum in Zürich.

**Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.**

*Mit 9 Textabbildungen und 1 Farbendrucktafel. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.*

---

## **Anleitung zur wissenschaftlichen Bodenuntersuchung.**

Von

**Dr. Felix Wahnschaffe,**

Königl. Landesgeologe und Privatdozent in Berlin.

*Mit 47 Textabbildungen. Gebunden, Preis 4 M.*

---

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

---

---

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse 10.

---

**Anweisung für**

## **Spezialkommissare und Vermessungsbeamte**

im Bezirke der Königl. Generalkommission zu Kassel.

*Zwei Bände. Preis 25 M.*

---

## **Dienst-Vorschriften**

für die in der Provinz Hannover beschäftigten Spezialkommissare und  
Vermessungsbeamten der Königl. Generalkommission für die Provinzen

**Hannover und Schleswig-Holstein zu Hannover.**

*Fünf Teile. Preis 36 M. 50 Pf.*

---

## **Das Verfahren in Auseinandersetzungsangelegenheiten.**

Im Auftrage des

**Königl. Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten**

herausgegeben durch

**A. Glatzel und F. Sterneberg.**

**Zweite Auflage, neubearbeitet durch**

**F. Sterneberg,** und

**J. Peltzer,**

Unterstaatssekretär im Ministerium  
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Ober-Landeskulturgerichts-Rat  
in Berlin.

*Preis 25 M.*

Ergänzungsband:

## **Die Preussischen Rentengutsgesetze**

nebst den dazu ergangenen Erlassen und Entscheidungen.

*Preis 7 M.*

---

## **Landwirtschaftsrecht.**

Gemeinverständliche Darstellung der für den preussischen Landwirt wichtigen  
Bestimmungen

**des bürgerlichen und öffentlichen Rechtes.**

Von

**Dr. jur. Joh. Schumacher,**

Amtsgerichtsrat zu Köln, Professor an der landw. Akademie Poppelsdorf.

**Zweite, vollständig neubearbeitete Auflage.**

*Gebunden, Preis 15 M.*

---

## **Das Waldschutzgesetz**

vom 6. Juli 1875,

Zusammenlegung und Enteignung und andere Mittel zur Aufforstung, Wald-  
erhaltung und Waldpflege im privaten Wald- und Ödlandsbesitz.

**Gesetzes-Kommentar und Darstellung, Fingerzeige und Beispiele zum  
praktischen Gebrauch für Verwaltungsbeamte**

von **L. Offenberg,**

Regierungsrat, Mitglied der Generalkommission zu Düsseldorf.

*Kartonnirt, Preis 3 M. 50 Pf.*

---

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

---

---

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse 10.

---

## **Lehrbuch der praktischen Messkunst**

mit einem Anhang über Entwässerung und Bewässerung des Bodens.

Für land- und forstwirtschaftl. Lehranstalten und zum Selbstunterricht

bearbeitet von

**J. F. Zajicek,**

Professor an der landw. Lehranstalt „Francisco-Josephinum“ in Mödling.

**Zweite, neubearbeitete Auflage.**

*Mit 192 Textabbildungen und 4 Tafeln. Gebunden, Preis 6 M.*

Die neue Auflage erfuh auf Grund eigener langjähriger Erfahrungen des Verfassers in Schule und Praxis eine vollständige Neubearbeitung und wesentliche Erweiterung. Auch die beigegebenen Pläne wurden unter Berücksichtigung der konventionellen Zeichnungen neu hergestellt.

---

## **Der Landwirt als Kulturingenieur.**

Bearbeitet von

**Friedrich Zajicek,**

Professor an der landwirtschaftlichen Lehranstalt „Francisco-Josephinum“,  
behörl. aut. und beed. Civil-Geometer in Mödling.

*Mit 179 Textabbildungen. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.*

---

**Leichtfassliche Anleitung**

zum

## **Feldmessen und Nivellieren.**

Für praktische Landwirte und landwirtschaftliche Lehranstalten

bearbeitet von

**Dr. A. Wüst,** Professor in Halle a. S.

**Dritte Auflage.**

*Mit 96 Textabbildungen. Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.*

---

## **Lehrbuch der niederen Geodäsie.**

Vorzüglich für die praktischen Bedürfnisse der

**Geometer, Kameralisten, Forstmänner und Landwirte,**

sowie zum Gebrauche an

**militärischen und technischen Bildungsanstalten**

bearbeitet von

**Dr. Franz Baur,**

Professor an der Universität München.

**Fünfte, vermehrte und verbesserte Auflage.**

*Mit 304 Textabbildungen und 1 Tafel. Gebunden, Preis 12 M.*

---

## **Wasserkarte der Norddeutschen Stromgebiete.**

(Maßstab 1 : 200 000.)

Herausgegeben von

Kgl. Preuss. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

**42 Buntdruckkarten im Format von 86:67 cm in Leinenmappe,**

nebst einem Textband: **Flächeninhaltsverzeichnis der Stromgebiete.**

*Preis 150 M. (Versendungskiste 4 M.)*

---

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

---





S493

V7

V.1:1

121497



